



DUKE  
UNIVERSITY  
LIBRARY

*Treasure Room*



Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
Duke University Libraries





Bauhin, Kaspar

Pinax theatri botanici

CASPARI BAUHINI

*Viri Clariss.*

Π Ι Ν Α Ε

THEATRI  
BOTANICI

*sive*

I N D E X

IN THEOPHRASTI DIOSCORIDIS

PLINII ET BOTANICORVM

qui à seculo scripserunt

O P E R A

PLANTARVM CIRCITER SEX MILLIVM

AB IPSIS EXHIBITARVM

N O M I N A

cum earundem Synonymijs & differentijs

methodice

*secundum genera & species proponens.*

O P V S X L A N N O R V M

summo pere expetitur

ad Autoris autographum recensitum.



BASILEÆ

IMPENSIS JOANNIS REGIS

clō Ioc LXXI.





## LECTORI BENEVOLO.



Peris hujus Autor, Galeni Præceptoris scripta legens, singulari fato, in hunc locum ipsius, qui tertio de Compositione Medicamentorum κατὰ γένη habetur, incidit. Quisquis (inquit) auxiliorum undique copiam habere volet, omnis materiæ, stirpium, animalium & metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad Medicinæ usum ducimus, expertus esto; ut ex eis & exacta & notha cognoscat. Deinde, in Commentario, quem de Simplicium Medicamentorum facultate prodidi, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus, ad præsentis operis præsidia veniat, verbotenus quidem medendi methodum sciet, opus vero nullum ipsa dignum perficiet. Qua sententia permotus, præter cæteras Medicinæ partes necessarias, ad Botanica, quæ auxilia medica subministrant, animum studiumque convertit: ea qua fieri potuit diligentia, non solum Botanographos, tanquam mutos præceptores, legendo & relegendo sedulo consuluit: verum etiam vivos in Germania, Gallia & Italia, per aliquot annos peregrinando, varijs in Academijs coram attente audivit, de Plantarum historia, nominibus viribusque studiose inquisivit: &, quod præcipuum erat, Plantas locis natalibus inspiciendo, nullis molestijs, nullus laboribus nullisque sumptibus pepercit, imitatus Dioscoridis & Galeni exempla. Verum & ipsas Plantas cum autoribus contrahere, qua fieri potuit industria, quo genio & ingenio, lectas, exsiccatas asservavit, ut ingentem earum thesaurum aliquot millium, præter fructus, semina, ligna, &c. collegerit.

Nec his contentus, ad veriolem & certiolem cognitionem, plures Medicinæ studiosos, Galliam, Italiam, aliasque regiones adeuntes, rogavit, ut omnis generis Plantas, etiam vulgatissimas (ipsa quoque Gramina & Trifolia,) colligerent & transmitterent. Quod quia liberaliter ab ipsis factum, eorum nomina gratitudinis ergo, peculiari Catalogo consignata adjunxit. Insuper, hinc inde, literis ad plurimos Viros Clarissimos, rei plantariæ peritos, Germaniæ, Galliæ, Italiæ, Angliæ, Daniæ, Belgij, Cretæ in Græcia, sollicitare non destitit, ut plantas transmitterent, vel de illis suam sententiam, in bonum publicum exponerent: idque à multis, prona benignaque mente abunde factum, grato animo agnovit, ipsorumque honorificam mentionem fecit. Nihil autem eorum, quæ studiosis in hoc disciplinæ genere, (uti & in alijs,) utile fore existimavit, intentatum reliquit. Eos frequenter, ad Vegetabilium inspectionem & cognitionem manuduxit. Varijs utilissimis scriptis, in publicum editis, Plantarum studium illustravit & auxit. Verum cum, quæ terra, entium horum beneficentissima parens, sinu suo complectitur φύτα, ad infinitum pene numerum accedant, sicque huic studio difficultas inde maxima oriatur: auctorum quoque dissensus, atque ἀμεθοδία, hancce δυσκολίαν augeat & exaggeret, hæc ne ab hac amœnissima, humanoque generi à utilissima contemplatione, quemquam absterreant, de methodo Plantarumque Synonymijs cogitavit; quæ ambo in hunc ΠΙΝΑΚΑ contulit, Plantarum hocce μεθόδῳ καὶ συνωνύμων σύνταγμα concinnans: in quo ex methodice, secundum genera & species, habita potissimum ratione formæ externæ, distributæ habentur. Pro ea autem qua fuit æquitate & modestia, aliorum labores benigne interpretatus, suum cuique religiose tribuit, paremque benevolentiam ab alijs speravit, omnes hujus studij cultores & asseclas, rogavit, ut, si animadverterent se (quod non dubitet, sed ultro fateatur) alicubi lapsum esse, vel forte bis eandem Plantam reperijse, hujus studij immensitatem cogitent, quod fere Oceano simile dici possit. Nam, quemadmodum DEI in Oceano mira-

cula

cula imperscrutabilia sunt: sic etiam Botanicum studium infinitum: imprimis, cum indies movæ Plantæ, tum alibi, tum in Indijs reperiantur. Paratus bene monentes audire, candide & amice monentibus gratias agere. Zoilum nunquam curandum putavit, cujus socij neque nunc attendendi: qui postquam hoc opere usi sunt, sine quo nunquam in studio Botanico progredi potuissent, convicijs illud impetunt, & filum, quo via ipsis per labyrinthi mæandros facta, turpiter dilacerare & conspurcare tentant. Sed hæc est sciolorum & malefactorum natura, qua solent melioribus obrectare magis, quam laude dignum quicquam præstare: hac ratione potius suam prodentes invidiam & malevolentiam, quam ut virorum bonorum & bene meritorum famam obscurare possint. Editio autem hæcce recensita est ad Autoris autographum: quicquid à priori mutatum, ipsius manu factum. Utere

ergo, BENEVOLE LECTOR, aliorum laboribus ad DEI

LAVDEM, in commodum tuum, & typogra-

phica errata operantium infirmitati condona.





# ZACHARIAS ROSENBACHII,


Medic. Doct. & Professor in Illustri Schola Herborenſi, Corollario  
de methodo Plantarum, in Indice Plantar. Herbornæ  
Naſſoviorum 1626. edito.



*Rerum naturalium perfectæ mixtarum tanta per Orbem terrarum ac maria diverſitas eſt, ut eas omnes cognoscere, & in certas claſſes diſponere, ut. . . . . ni ſit plane impoſſibile. Unus enim homo vix unam ſpeciem, v. gr. piſces, vel aves, licet illi per totam ſuam vitam, mane & vèſperi, noctu & inter diu, jugiter operam det, plene cognoscet. Inventi ſunt tamen viri, qui heroico animo præditi, nullis ſumptibus laboribusq; parcentes, ad quarundam ſpecierum plenariam fere cognitionem pervenerunt, ut opera eorum ſatis teſtantur, &c. Sola res herbaria hucusq; imperſectè ac ſine certa methodo, tradita fuit. Quamvis enim de illa plurimi, tum veteres, tum recentiores ſcripſerint, omnes tamen, vel pauciſſimas plantas propoſuerunt, vel plures etiam ita permiscuerunt, ut nullus in eis ſtabilis ordo appareat. Unus CASPARVS BAVHINVS, circiter ſex millia plantarum primus propoſuit, easq; omnes mirabili ordine, in Pinace theatri ſui Botanici, digeſſit. Sentient nobiſcum in hoc, quicumque vel mediocriter in re herbaria verſati ſunt. Tanto magis autem præceptorem etiam illum noſtrum ſecuti ſumus, quia omnes ejus plantas, ſeu hortum ſiccum, non ſemel, ſed bis ac ter, non ſine magna admiratione, ipſi ſpectavimus. Nec credimus, in tanta plantarum varietate, meliorem ordinem unquam à quoquam adeò facilè inveniri poſſe. Incipit enim ab herbis tritiſſimis, ut graminibus, progreditur per fruges, olera, & legumina, donec tandem ad frutices*



*frutices & arbores perveniat, hoc perpetuo observando, ut plantas, sibi quoad externam formam maxime, vel viribus etiam internis, similes, pulcherrimis numeris conjungat, dissimiles, libris, sectionibus ac titulis diversis, elegantissime distinguat. Ceterum, miretur forte junior aliquis, cur princeps ille Botanicorum, cui palmam hac in re merito tribuimus, hunc Pinacem suum, opus XL. annorum, inscripserit, cum tamen liber parvus videatur, & multi sint, qui etiam uno anno magnum volumen scribant ac publicent. Verum non librorum quantitas, sed qualitas potius spectari debet. Sic qui Pinacem hunc legeri ac intellexerit, mirabitur, quomodo Autor Bauhinus eum tam cito absolvere potuerit. Est enim revera omnium herbarum, suffruticum, fruticam & arborum, quae in hortis, agris, pratis, vallibus, montibus, sylvis, littoribus, & aquis totius terrarum Orbis nascuntur, absolutissimum compendium. Hujusmodi libri facilius quidem oculis inspiciuntur ac describuntur, at materias singulas è remotissimis locis conquirere, methodice digerere, multis nova earum aptissima nomina imponere, easdem ad vivum describere, pingere, doctorum virorum judicijs subjicere, ac posteritatis memoria, cum centuplo fructu tradere, hoc vero opus, hic labor est, quem non novimus nisi experti, & pluribus annis plurimum exercitati. Praestat paucis verbis multa, quam multis pauca, vel nihil omnino dicere.*



*Gramen adest Bulbusq;, Oler atq; Umbella, Venenum,  
Atque Corona, Odor & Flos est, vescumque Legumen,  
Carduus in spinis, Frutex succedit & Arbor.*

F. M.

Ad



Ad  
CASPARUM BAVHINUM  
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.

I.



*U*l potius neclant benè olentia ferta Napæ,  
BAVHINE, quàm tibi, cedo?  
*M*ille etenim herbarum, plantarum nomina mille  
Collecta fasce uno doces?  
*T*ot grates debent, quod habent ridenti plantas  
Herbasq; prata & frutices.  
*C*ui potius violas, Junonia lilia, cuinam  
Milesias spargant rosas?  
*F*loreat & viget nomen, BAVHINE, perenne  
Tibi, dum rosa & flores erunt.  
*A*ssyriosq; Tibi ad cippum post fata Napæ  
Fundant odores perpetim.

GEORGIUS REMVS, J. C.  
Noricus.



II.

**L**ITTORA tot Ponti, tot campos visere & Hortos  
Desine, tot Sylvas, tot prata, totq; rupes.  
*H*æc loca quod Stirpes, totus quos proferat Orbis,  
BAVHINI scriptis conspice in Eiconicis.

PASCHALIS LE COQ, MED. apud Picta-  
vieneses Decanus & Senior.

III.

**D**E plantis Graij scripserunt atque Latini,  
 Scripsit Arabs, Teuto, Gallus, Iber, Italia.  
 De plantis quicquid scribunt Graij atque Latini,  
 Quicquid Arabs, Teuto, Gallus, Iber, Italia:  
 Omne hoc unus habet, BAVHINE, labore paratum  
 Per vigili, ingenio dispositumq; tuo.  
 Imò alijs non visa, velut te Lynce, pateſcunt,  
 Humanis deinceps uſibus utilia.  
 Ergò velut nomen planta una uniſue libellus  
 Iſtorum ſtudijs obtinuit celebre:  
 Sic quoq; Plantarum præſens opus, immortale  
 Dignum eſt Authoris nomen habere ſui:  
 Herbarumq; Tibi, BAVHINE, ſcientia laudem  
 Debeat, an Phœbo, lis erit hac Medicis.

SIGISMUNDVS SCHNITZERVS,  
 Med. Bambergenſis.



IV.

**Q**UID non BAVHINVS præſtat? nam ſubleuat agros;  
 Describit Plantas; mortua membra ſecat.  
 Jactitet Herophilas, Veſalius atq; Galenus  
 Se jactent; noſter præſtitit auſtor eos.  
 Illi parua docent magnis incluſa libellis;  
 Hic docet in parvis, magna ſtupenda, libris.  
 Qui BAVHINVM igitur non ſuſpicit, atq; miratur  
 In plantâ cerebrum calcêve molle gerit.

LAVRENTIVS HOFMANNVS, HALLA-  
 SAXO, Phil. Med. & Chérurg. D.

**A**RTIS dictator Medicæ clarissimus hic est,  
 Nostra cui haud similem secula tulere virum.  
 BAVHINVS scriptis toto celebratus in orbe  
 Perfectis, cujus nomen ubiq, sacrum.  
 Quem stupet Ausonius, Gallus veneratur, Iberus  
 Miratur, Teuto calica ad astra vehit.  
 Solo hoc Sole viget Plantarum notio vera,  
 Et Microcosmi, quæ est historia ampla, patet.  
 Ut meritò Hic artis dicatur Apollo & Apelles  
 Tam clarè illustrat quæ latuere prius.  
 Vivat BAVHINVS decus immortale medentum,  
 Perpetuò felix floreat & vigeat.

JOANNES CAROLVS Rosenberg/  
 Argentin. Med. & Ph. D.





# NOMINA AUTHORUM

*quorum operâ usi sumus.*

**A**DAMUS Lonicerus: is herbarium Eucharij Röslin sui in officio Francofurti antecessoris, Germanicè scriptum quartò auxit, & postremò an. 1569. prodijt: postmodum remoto Eucharij nomine, suum præfixit, & cum figuris 833. circiter, anno 1582. dedit. Francofurti.

**ADAMI** Zaluzanij, methodi herbariæ lib. 3. Francofurti 1604. 4.

**ADRIANI** Junij Medici, phallus ex fungorum genere in Holandia: Delphis 1564. 4. cum figura.

**ADRIANI** Spigelij Patavini Professoris, Isagoges in rem herbariam lib. 2. Patavij 1606. 4.

**ADVERSARIORUM** opus à Petro Pena & Matthia de Lobel, Londini anno 1570. editum, additis circiter 284. figuris: postmodum anno 1576. Antuerpiæ novus titulus præfixus, epistola ad Reginam omissa: cui operi Lobelius Observationes suas cum novis figuris junxit.

**ÆGIDII** Everhardij Antuerpiani, de herbanacea sive Nicotiana commentariolus, ejus vires proponens: ejusdem de usu radicis Meoachæ. Antuerpiæ 1587. 16.

**ÆMILII** Macri Veronensis, poësis de Herbarum virtutibus, cum obscuriorum succincta expositione Georgij Pictorij Villingani Medici. Basileæ cum figuris 52. ex Crescentio. 1581. 8.

**ALEXANDRI** Petronij, de victu Romanorum & valetudine conservanda lib. 5. Romæ 1592. 4.

**ALOYSIUS** Anguillara horti Patavini tertius in ordine præfectus, de plantis suam sententiam diversis communicavit: opusculum in partes 14. divisum, opera Johannis Marinelli Italicè prodijt (additis duabus figuris Chamæleontis & Sedi arborescents) Venetijs 1561. in 8.

**ALOYSIUS** Mundella, Medicus Brixienfis, horti Patavini secundus in ordine præfectus, Epistolarum librum unum (in quo 36. epistolæ) & Annotationes in Examen simplicium Brasavolæ scripsit: cum Epistolis Manardi simul cusa, Lugduni 1556. in fol.

**AMATI** Lusitani in libros quinque Dioscoridis enarrationes, additis diversarum lingua-

rum nominibus. Argentinæ 1554. in 4.

**ANDREAS** Bellunenfis notis in Avicennam.

**ANDREAS** Cæsalpinus Aretinus, in Acad. Pisana Professor, de plantis lib. 16. scripsit, nullis figuris additis: prodire Florentiæ 1583. Ejusdem appendix ad hos libros. Romæ 1603. in 4.

**ANDRÆ** Lacunæ, commentaria in Dioscoridem cum figuris Hispanica lingua conscripta. Salmant. 1552. fol.

Ejusdem annotationes in Dioscoridè, in quibus Ruellij versio castigatur. Lugduni 1554. 16.

**ANDRÆ** Theveti Cosmographia, Gallicè edita cum figuris aliquot plantarum & animalium.

Ejusdem singularitates Galliæ Antarticæ sive Americæ, cum 11. figuris plantarum, Gallicè: Lutetiæ 1557. 4.

**ANGELUS** Palea & Bartholomæus ab Urbe, veterum Ordinis minorum observantiæ provinciæ Romanæ, annotationes in Antidotarium Mesues. Venetijs 1543. fol.

**ANTONII** Mizaldi de Sena opusculum. Lutetiæ 1574. 8.

Ejusdem hortorum secreta: item de Arborum insitione & dendranatome. Ibid. 1575. 8.

**ANTONII** Musæ Brasavoli Ferrariensis, examen omnium simplicium quorum in officinis usus est. Lugduni 1556. 16.

**ANTONII** Pasini annotationes & emendationes in versionem Dioscoridis à Matthiolo propositam: Italicè. Bergomi 1591. 4.

**APULEIUS** Platonius de Herbarum virtutibus, addita demonstratione herbarum singulorum signorum Zodiaci, nec non & stellarum errantium Lutetiæ 1528. in fol.

**ATHENÆI** Deipnosophistarum lib. 15 Græcolatin. cum Dalechampij interpretatione. 1597. in fol.

**AUGUSTINI** Galli Pressani, de Agricultura, Italicè Venetijs 1569. 4.

**BARTHOLOMÆI** Carichterli liber, ostendens sub quo signo Zodiaci & in quo gradu plantæ sitæ sint, & quando colligendæ, Germanicè. Argent. 1589. 8.

**BARTHOLOMÆI** Marantæ Venufini, methodus

rhodus cognoscendorum simplicium lib. 3. Venetijs 1559. in 4.

Ejusdem de Theriaca & Mithridatio lib. duo à Camerario Latine reddit. Francofort. 1576. 8.

BASILII Besleri fasciculus rariorum animalium, lapidum, maritimorum & fructuum, cum iconibus fructuum 54. maritimarum plantarum 12. &c. In fig. oblonga, Norinbergæ.

Ejusdem Horti Eystettenfis descriptio cum figuris 1083. Norinbergæ. 1613.

BENEDICTI Aretij descriptio montium Stocchornij & Nelli in Bernatum ditione, & stirpium in eis nascentium : cum Cordo impressa.

BERNHARDI Deslenij Cronenburgij Medici Colonienfis lib. 10. de composit. medicam. cum ingredientium explicatione, Francofort. 1555. in fol.

BERNHARDI Paludani Medic. Encusani, notæ ad Linscottij historiam Indicam, additæ Operibus Indicis.

BOTANICUM Francofurtianum : sunt icones Eucharij Roeslin cum solis nominibus,

CAROLUS Clusius, Dodonæi historiam vernacula lingua conscriptam, Gallicam fecit, & corollarium de aromatibus addidit, cum figuris quæ separatim in octavo prodire anno 1560. in fol.

Idem Garziæ ab Horto dialogos de aromatibus & simplicibus Lusitanicè conscriptos, in Epitomen contraxit, Latinos fecit, annotationibus & figuris plantarum 30 illustravit. Antuerpiæ anno 1574. 8. cujus editio quinta auctior, additis 36. figuris cum ejusdem exoticis 1605. in folio prodijt.

Idem Nicolai Monardis de medicamentis Indiæ Occidentalis, ex Hispanico transtulit, notis & figuris 9. illustravit : Anno 1574. 8. cujus editio quarta cum exoticis excusa est.

Ejusdem Monardis lib. tertius ab eodem Latine redditus, Antverpiæ 1583. in 8. cufus.

Idem Christophori Acoftæ historiam ex Hispanico Latinam fecit, in epitomen contraxit, Scholijs illustravit, & anno 1582. edidit : tertio verò additis sex figuris cum exoticis anno 1605. in fol. prodijt.

Idem de plantis per Hispaniam observatis, lib. duos scripsit, figuris 230. additis. Antuerpiæ anno 1576. in 8.

Idem de Simplicibus per Pannoniam &

Austriam observatis libros quatuor conscripsit, figuras 353. addidit. Antuerpiæ 1583. in 8. Verum tam Hispanica quàm Pannonica historia alijs juncta in folio, anno 1601. excusa fuit.

Idem Historiam plantarum rariorum cum appendice & auctario, additis figuris 1135. anno 1601. Antuerpiæ publici juris fecit.

Idem exoticorum libros decem scripsit, quorum sex priores variam materiam circa animalia & plantas cum iconibus plantarum 194. continent. Item Garziæ lib. 2. Ch. Acoftæ lib. 1. Nic. Monardis lib. unum, qui prius separatim prodire. Item Nicol. Monardis lib. 3. de lapide Bezoar & Scorzonera, de Ferro & Nive, Anno 1605. in fol.

Ejusdem curæ posteriores post mortem editæ, additis 27. figuris, & libello Gregorij de Regio de Pipere Indico. His additamentum (unica figura adposita) junguntur. Antuerpiæ 1611. fol.

CAROLI Stephani domus rustica Gallicè scripta, 1554. in 4.

Ejusdem de re hortensi libellus, Lugduni 1536. in 8.

Ejusdem Seminarium sive plantarium earum arborum, quæ post hortos conferi solent, Lugd. 1537. 8.

CASPARUS Buihinus in Phytopinace 2460. plantarum nomina cum aliquot Synonymijs exhibuit, & 164. descriptiones novarum plantarum, octoq; figuras adposuit : Basileæ 1596. in 4.

Idem P. Andreae Matthioli opera omnia, in Germania prius non cusa, emaculata dedit, additis 330. figuris & 50. novis ab ipso primùm descriptis, cum Synonymijs. Francofurti 1598. fol.

Idem Animadversiones in Historiam generalem Lugduni cusam, in quibus circiter 400. figuras in 110. opere bis terve positas & repetitas esse ostendit. Francofurti 1600. in 4.

Idem Jacobi Theodori Tabernæmontani historiam Germanicam correxit, maxima parte auxit : figuras novas plures addidit : nonnullas descripsit & parti primæ Synonymias adposuit. Francofurti 1613. in fol.

Ejusdem Prodromus sui Theatri Botanici, in quo circiter sexcentæ plantæ ab ipso primùm descriptæ, additis 140. novis figuris, Francofurti 1620. in 4. editus est.

Ejusdem catalogus plantarum circa Basileam spontè

spontè nascentium, cum earundem Synonymijs & locis natalibus. Basileæ 1622. in 8.

CASPARI Pilleterij Middelburgensis Medici, plantarum synonymia alphabetico ordine proposita. Middelburgi 1610. 8.

CASPARI Schvvenckfeldij catalogus stirpium & fossilium Silesiæ. Lipsiæ 1601. 4.

CASTORIS Durantis Medici Romani, herbarium novum cum figuris plantarum quæ in tota Europa, India Orientali & Occidentali nascuntur Italicè, viribus Latinis versibus expressus: Ordinem alphabeticum observavit, & plantarum figuras 879. adposuit. Romæ 1585. folio.

CECHINI Martinelli discursus de Amomo & Calamo aromatico, Italicè. Venetijs 1604. 4. Ejusdem discursus examen, autore incerto, cum utriusque figura, Mantuæ 1605. 4.

CHRISTOPHORI Acostæ Africani Medici & Chirurgi historia eorum medicamentorum & Simplicium rariorum, quæ ex India Orientali in Europam adferuntur, Hispanicè primum, dein Italicè edita, additis 43. figuris. Venetijs 1585. in 4. hanc in Epitomen contractam, Clusius Latinam fecit.

CHRISTOPHORI Encelij de re metallica lib. 3. & de Uva quercina. Francofurti 1557. 8.

CLAVDII Galeni de facultatibus simplicium lib. II. & alimentorum lib. 3. & de compos. medic. in Oneribus ipsius.

CLAVDII Rochardi pharmacopœi Trecentis. tractatus de Absinthijs, cum Jo. Bauhini tractatu editus.

CONRADI Gesneri historia plantarum & vires, ex Dioscoride, Ægineta, Theophr. Plinio & recentioribus Græcis juxta elementorum ordinem. Venetijs 1541. 16.

Ejusdem Catalogus plantarum quadrilinguis: Tiguri 1542. in 4.

Ejusdem de Lunarijs & noctu lucentibus, cum figuris quinque & montis Fracti sive Pilati Lucernatum descriptione. Ibid. 1552. 4.

Ejusdem de hortis Germaniæ liber, cum appendice & Corollario ad Cordi historiam in quo figuræ quinque: cum Cordi operibus, Argentiniæ 1561. fol.

Ejusdem de fossilibus, lapidibus & gemmis, cum maritimarum plantarum octo figuris, Tiguri 1565. 8.

Ejusdem Epistolæ medicinales per Casp.

Wolffium editæ: addita de Aconito primo asseruatione cum tribus figuris. Tiguri 1577. 4.

Ejusdem de Stirpium collectione, per Wolffium edit. Tiguri 1587. 8.

CONSTANTINI Cæsaris de agricultura libri 20. opera Jo. Alexandri Brasiciani editi Græcè: Basileæ 1539. 8. Idem à Jano Cornaro Latinè reddit: Basileæ 1540. 8.

CRISPINI Passæi junioris horti floridi partes duæ, florum, fructuum herbarumque icones, 345. cum brevib. descriptionibus secundum quatuor anni tempora. Arnheimij 1614. 8. forma oblonga.

DAVIDIS Kyberi lexicon rei herbariæ trilingue: item tabulæ collectionum per 12. mentes Conradi Gesneri. Argentiniæ 1553. 8.

EMANUELIS Svvertij Florilegium, in quo præter figuras plurimas etiam 47. plantæ ex India utraque allatæ, hætenusque non descriptæ adduntur. Francofurti 1612. folio.

EUANGELISTÆ Quadramij Eremitæ, Theol. D. & Ducis Ferrariensis Simplicistæ, tractatus de Theriaca & Mithridatio: Ferrariæ anno 1597. in 4.

EUCHARII Roeslin Medici Francofordiani herbarium aliquoties Germanice cultum, prius sub Jo. Cubæ antecessoris sui, dein suo, & quidem postremo anno 1546. cum 642. fig. Franc. in fol. tandem Ada. Loniceri nomine.

EURICHI Cordi Simefusi Medici, Botanologicum per Dialogum propositum, Coloniae 1534. 8.

FABII Columnæ phytobasanos cum fig. 34. Neapoli 1592.

Ejusdem de minus cognitis plantis partes duæ, quarum prima figuras 161. Romæ anno 1603. altera pars cum fig. 44. Ibidem 1616. eusa est.

FERRANTIS Imperati Neapolitani pharmacopœi historię naturalis lib. 28. cum figuris lapidum, corallorum, spongiarum &c. plantarum verò & fructuum 33. Neapoli 1592. folio.

FRANCISCI Alexandri Vercellenis Medici Apollo, de compositione medicamentorum, radijs duodecim constans. Venetijs 1565. fol.

FRANCISCUS Lopez de Gomara historia Indiarum generalis.

GABRIELIS Alphonfi de Herera, opus de Agricultura Hispanicè scriptum, per Mambrianum de Fabriano Italicè redditum, cum figuris 74. parvis. Venetijs 1557. 4.



**GARZIÆ** ab Horto, proregis Indiæ Medici, de aromaribus & simplicibus medicamentis apud Indos nascentium historia ordine Alphabetico, per Dialogos lingua Lusitanica conscripta, à Clusio in epitomen contracta & Latine facta.

**CONSALVI** Ferdinandi Oviedi, Indiæ Occidentalis historia generalis, à Dureto in Gallicum translata.

**GREGORII** de Regio, Capuccini, de Capsico libellus, curis posterioribus Clusij additus.

**GULIELMI** Turneri Angli, plantarum historia, Anglicè scripta, cum paucis figuris. Londini, folio.

**HERMOLAI** Barbari in Dioscoridem Collariorum libri quinque. Coloniae 1530. fol.

Ejusdem in C. Plinij naturalis historiae libros castigationes. Basileae 1534. 4.

**HIERONYMI** Benzoni Mediolanensis, novi orbis historia, per Urbanum Calvatonem Latine reddita. Genevæ 1600. 8.

**HIERONYMI** Brunsvicensis apodixis Germanica, Brunfelsij herbario addita. Argentinae 1531. fol.

**HIERONYMI** Cardani de varietate rerum lib. 17. Basileae 1581. 8.

**HIERONYMI** Fracastorij opera, 1590. Lugduni 8.

**HIERONYMI** Tragi historia (quæ sæpius Germanicè Argentinae in folio prodijt) per Davidem Kyberum Latine reddita, cum iconibus 567. licet ad 800. describantur. Argentinae 1552. in 4.

Ejusdem editio Germanica à Melchiore Sebitzio & Nicolao Agerio emaculata. 1595. fol.

**HISTORIA** Generalis plantarum libris 18. per Joannem Molinæum collecta: Lugduni anno 1587. excusa, in qua figuræ 2686. proponuntur, verum circiter 400. bis rerve reperiuntur.

**HONORII** Belli Vicentini, Medici Cretensis epistolæ de plantis ad Clusium, cujus operibus additæ: nonnullas ad nos dedit, quæ necdum editæ.

**JACOBUS** Antonius Cortusius patricius Patavinus & horti Patavini V. præfectus, à Matth. Dodonæo & alijs frequenter citatur ob plantas ipsis communicatas, à quo & ego Patavij accepi: nil edidit nisi Catalogum horti Patavini, cum ejusdem areis, Italicè. Venerijs 1591. 8.

**JACOBI** Theodori Tabernæmontani historia Germanica tribus partibus edita cum figuris 2087. Francofurti 1588. fol.

Idem emaculatus auctus & plantarum descriptionibus & figuris ac medicamentis plurimis, à C. Bauhino anno 1613. fol.

Ejusdem icones cum nudo nomine Latino & Germanico. Francofurti 1590. in longa forma prodierunt.

**JANUS** Cornarus Germanus, Dioscoridem transtulit & singulis capitibus Emblemata addidit. Basileae 1557. folio.

**INDIÆ** Occidentalis partes decem cum additamento ad partem nonam, in folio.

**INDIÆ** Orientalis historiae partes decem, in folio.

**JOACHIMUS** Camerarius, Matthioli historiam Germanicam per Hantschium primum versam, & cum Matthioli figuris eusam, rursus emaculavit, novis iconibus 123. & notis auxit.

Idem Matthioli epitomen dedit cum figuris 1003. Francofurti. 1586. 4.

Idem hortum Medicum & Philosophicum scripsit: figuras 56. addidit. Francofurti 1588.

**JOSEPHI** Acoftæ, historia Indiæ, addita tomis Indicis, à Clusio Latinitate donata.

**JO. CUBÆ**, hortus sanitatis Germanicè cum figuris circiter 350. Augustæ 1486. fol.

**JO. Baptista** Portæ Neapolitani, Villæ libri 12. Francofurti 1592. 4.

Ejusdem Phytognomonica 1591. Franc. 8.

**JOHANNES** Bauhinus p. m. frater meus, scripsit libellum de Plantis à Divis denominatis. Basileae 1591. 8.

Idem de Absinthij generibus. Montisbelgardi 1593. 8.

Idem de plantis circa Balneum Bollenfense nascentibus catalogum scripsit, pomorum fig. 60. & pyrorum 40. additis: editus cum Historia de Balneo Bollenfi. Montisbelgardi 1598. 4.

**JO. Bruyerinus** Campegius Lugdunensis, dere cibaria lib. 22. Francofurti 1622. 8.

**JOANNIS** Costæi de universalis stirpium natura libri duo. Taurini 1578. 4.

Ejusdem annotationes in Mesuem, cum operibus Mesuæi. Venerijs 1570. fol.

**JO. du Choul** montium Lugdunensis agri præfectus, Lugdunensem Pilati montem descripsit, duabus parvis figuris additis: cum Gesneri libello de Lunarijs prodijt. 4.



JOANNIS Dantiz Aftenfis, tabulæ Simpli-  
cium quæ apud Dioscoridem, Galenum & Plin-  
ium facultates continent: & de Simplicium  
medicamentorum facultatibus, dialogi qua-  
tuor. Basileæ. 1543. fol.

JO. FRAGOSUS Hispaniarum regis Medi-  
cus & Chirurgus, aromatum, fructuum & sim-  
plicium aliquot ex utraque India in Europam  
delatorum historiam Hispanicè scripsit, Israel  
Spachius Med. Argentinenfis edidit. Argenti-  
næ 1600. 8.

JO. FRANCUS, hortum Lusatiæ sive Cata-  
logum plantarum in Lusatia nascentium, ad-  
ditis Latinis & Germanicis nominibus scri-  
psit. Budisina 1594. 4.

JO. Gerardi hiltoria plantarum Anglica cum  
figuris ipsius Tabernæ montani: nonnullis  
etiam Lobelij: & insuper 16. novis additis. Ita  
ut sint circiter 2190. Londini 1597. folio.

JO. Hugonis Linscoti itinerarium ac naviga-  
tio in Orientalem sive Lusitanorum Indiam, cū  
Bernhardi Paludani annotationibus. Hagæ co-  
mitis 1599. fol. jungitur etiam Historijs Indicis.

JO. Leonis Africæ descriptio.

JO. Lerus Burgundus, historiam Brasilia-  
nam Gallicè primū, deinde Latinè dedit. Ge-  
nevæ 1594. 8. etiam cum Hist. Indicis edita.

JO. Monardi Med. Ferrariensis, epistolarum  
Medicinalium lib. 20. cum annotationibus in  
Jo. Mesue simplicia medicamenta, & primū  
quæ à Mesuæ omiſsa sunt. Lugduni 1556. in  
fol. & etiam cum Mesuæ.

JO. Pona Pharmacopœus Veronenſis, simpli-  
cium in monte Baldo nascentium Catalogum  
scripsit, & nonnullarum descriptiones cum fig.  
16 addidit. Clusius suæ historiæ rariorū junxit.

Idem auctiorem dedit & nonnullarum planta-  
rum, ab Honorio Belli in Creta observatarū, de-  
scriptiones cum fig. 38. addidit. Basileæ 1608. 4.

Idem auctus, cum alijs plurib. exoticis, ex No-  
bilissimi Nicolai Contareni Senatoris Veneti  
horto instructissimo acceptis, figuris 91. addi-  
tis, à filio Francisco Pona Med. Doctore, in lin-  
guam Italicam translatus. Venetijs 1617. 4.

JO. Robini Botanici Regij, hortus Henrici  
IV. Regis Galliæ & Navarræ, cum figuris 214.  
Lutetiæ 1608. folio.

JO. Roderici Castelli albi Lusitani, index  
Dioscoridis, sive in Dioscoridis historiales  
campos exegemata. Antuerpiæ 1536. fol.

JO Ruellij de natura stirpium libri tres, Ba-  
silæ 1537. fol. Eiusdem Dioscoridis versio.

JO. Sturmij Lovaniensis professor, de rosa  
Hiericunthica libellum scripsit. Lovanii 1608. 8.

JO. Thalij Medici Northusani, Sylva Harcy-  
nica, sive Catalogus plantarum in montibus &  
locis vicinis spontè nascentium, cum plurima-  
rum descriptionibus cum Camerarij horto, no-  
vem figuris additis, editus Francofurti 1588. 4.

JO. Theodori de Bry florilegij partes tres.  
1612. 1614. & 1618 folio.

JULII Cæsaris Scaligeri, animadversiones  
in Theophrasti libros sex de causis plantarum.  
Genevæ 1566. fol. Eiusdem in libros de historia  
plantarum. 8.

Eiusdem in libros duos de plantis Aristoteli  
inscriptos, commentarij Genevæ 1566. folio.

Eiusdè de Subtilitate l. 15. Francofurti 1576. 8.

LAURENTII Phrifiij Synonyma, sive expli-  
catio nominum medicamentorum in officinis  
usitatorum, Germanicè. Argentinæ 1535. fol.

LEONHARDI Fuchsiij historia Latina cum  
516. figuris. Basileæ 1542. fol.

Eiusdem icones scorum editæ. Basileæ 1549. 8.

Eiusdem de composit. Medicamentorum lib.  
4. Lugduni 1556. 16.

LEONHARDI Rauvvolfij Medici Augusta-  
ni, peregrinatio in Orientem, in qua plurimæ  
plantæ describuntur, & figuræ 42. apponuntur.  
Lauingæ 1583. 4. Icones hæ etiam in Appendice  
Historiæ Lugdunensis habentur.

LEVINI Lemnij de plantis sacris, Lugduni  
1595. 8. cum Fr. Valesij sacra Philosophia.

L. Junij Moderati Columellæ de re rustica  
l. 12. & de Arboribus liber unus. Lugduni 1541. 8.

LUDOVICI Jungermanni D. Catalogus  
plantarum circa Altorhium nascentiū, à Casparo  
Hofmanno Professore recensitus. Altorfi 1615. 4.

LUDOVICI Romani navigatio in Orientē  
l. 7. Archangelo Madrignano interprete: cū alijs  
qui novum orbem describere. Basileæ 1555. fol.

MARCELLI Virgilij Florentini Secretarij  
Dioscoridis interpretatio, cum ejusdem Com-  
mentarijs. Colonia 1529. fol.

MARCI Catonis de re rustica liber. Lugdu-  
ni 1541. 8.

MARCI Terentij Varronis de re rustica libri  
tres. Ibid.

MARTINI Mylij, hortus philosophicus.  
Gorlici 1597. 8.

**MATTHÆI** Sylvatici, opus Pandectarum. Venerijs 1499. fol.

**MATTHÆI** de Lobel plantarum seu Stirpium historia, additis figuris 1476. cum Adversariorum volumine (prius tamen edito) adnexo. Antuerpiæ 1576. fol.

Ejusdem Icones seorsim cusæ, 2116. numero. Antuerpiæ 1581. in longa forma.

Ejusdem Adversariorum pars altera, cum rariorum simplicium Appendice, additis 39. figuris. Londini 1605. in fol.

Ejusdem Rondeletij pharmacica restituta, priorilibro addita.

Ejusdem de Balsamo libellus & Zingibere, cum 5. figuris. Londini 1592. 4. qui Adversar. parti alteræ etiam jungitur.

**MAXIMILIANI** Transylvani de Moluccis epistola, cum novi orbis scriptoribus edita.

**MELCHIORIS** Guilandini quarti horti Patavini præfati, Theon sive Apologia adversus Matthiolum. Patavij 1558. 4.

Ejusdem aliquot epistolæ de Stirpibus, ibid.

Ejusdem Papyrus sive commentarius in tria C. Plinij de papyro capita. Venetijs 1572. 4.

Ejusdem conjectanea Synonymica plantarum, cum Horti Patavini catalogo sub annum 1591. Jo. Schencki opera edita. Francofurti 1600. 8.

**MONACHI** in Mesuem, vide Angelus Palea.

**NICANDRI** Theriaca & Alexipharmaca, cum incerti authoris Græcis Scholijs. Venetijs 1523. 4. Ejusdem editio Græcolatina cum Goræi Scholijs. Lutet. 1557. 4.

**NICOLAI** Clavici Bellunensis pharmacopœi, de Absinthio umbellifero, cum ejus figura, & de Scorfonera Italica, Venerijs 1610. 4.

**NICOLAI** Loniceni, de Plinij & aliorum erroribus & ejusdem quædam de herbis & fructibus. Basileæ 1529. 4.

**NICOLAI** Maronæi Medici Veronensis, de Amomo commentarius, cum Jo. Ponæ montis Baldi descriptione editus.

**NICOLAI** Monardis Hispalensis medici, de simplicibus medicamentis ex Occidentali India delatis, lib. 2. Hispanicè scripti, à Clusio Latinè redditi, notis illustrati. Antuerpiæ 1574. 8. & editio quarta Clusij exoticis cum fig. 17. addita.

Ejusdem libri tres de Bezoar lapide, de Scorzonera, de ferro & nive, Ibidem.

Ejusdem libellus de Rosa & Citrijs Latinè scriptus, cum Clusij exoticis editus.

**NICOLAI** Winckleri Medici Hallensis chronica herbarum, florum, seminum, fructuum, radicum, succorum, animalium, &c. quo tempore singula legenda. Augustæ 1571. 4.

**OTTHONIS** Brunfelsii historia Latina tribus tomis prodijt : primus anno 1530. alter 1531. & tertius posthumus, anno 1536. Argentinae, cum figuris 238. at sedecim bis positæ sunt : summatim cum & sine figuris 288. describuntur.

Idem & Germanicè scripsit, in folio cum ejusdem figuris, & in 4. parvis figuris additis. Argentinae 1539.

**PALLADII** Rutilij, de re rustica lib. 14. Lugduni 1541. 8.

**PAULUS** Renealmus Blæsenfis, specimen historiæ plantarum cum figuris 43. typis æneis expressis, edidit. Lutetia 1611. 4.

**PEDACIUS** Dioscorides Anazarbæus, de materia medica, & quidem editio Marcelli Virgilij, Goupilij, Assulani, Joannis Ruellij, Jani Cornarij, Jo. Antonij Sarraceni.

**PEDACI** Dioscoridis libri sex Ruellio interprete, cum parvis iconibus 350. additis cuilibet capiti hujus secundæ editionis annotationibus compendiarijs ab H. B. P. medico : item & triginta icones stirpium nondum delineatarum à Jac. Dalechampio. Lugduni 1552. 8.

**PETRI** Andreæ Matthioli commentaria Italica cum magnis figuris 1568. Venetijs : ejusdem Italica, cum parvis figuris, 1563.

Ejusdem editio Germanica Camerariana.

Ejusdem editio à C. Bauhino emaculata.

Ejusdem epitome anno 1571. edita.

Ejusdem epitome à Camerario correctæ.

Ejusdem Epistolæ cum Commentarijs Francofurti editæ, cum Apologia in Amatum Lusitanum.

**PETRI** Bellonij Observationum libri tres à C. Clusio latinitate donati, additis plantarum figuris 10. Antuerpiæ 1589. 8.

Ejusdem de neglecta stirpium cultura, eodem ex Gallico vertente. ibidem : & simul cum libris exoticorum Clusij editi.

Ejusdem de arboribus coniferis, resiniferis & sempiterna fronde virentibus, cum earundem iconibus 480. Parisijs 1553. 4.

Ejusdem de medicato funere & medicamentis, ca-

ris, cadaveris servandi vim habentibus. Ibidem.

PETRI Crescentij Bononiensis de agricultura partibus, plantarum & animalium natura & utilitate lib. 12. ante annos ducentos scripti. Basileæ 148. cum paucis figuris.

PETRI Pavvii horti publici Academię Lugdunobatavę præsidis, ichnographia, descriptio, usus, & stirpium quas habet nomina. Leidæ 1603. in 8.

PETRUS Pena, vide Adversaria.

PH LIPPUS Pigafetta regni Congiani historiam scripsit, quę cum Indicis historijs edita.

POMPEIUS Sprechis, Antabsinthium Clavenæ, cum figura Absinthij umbelliferi. Venerijs 1611. 4.

PROSPER ALPINUS, sextus horti Patavini præfectus, de Balsamo dialogum, ejus figura addita, scripsit. Venerijs 1591. 4.

Ejusdem de plantis Ægypti liber, cum figuris 46. & cum Medicina Ægyptiorum. Venerijs 1592. 4.

Ejusdem de Rhapontico, cum ejusdem figura. Patavij 1612. 4.

Q. APOLLINARIS liber experimentorum Germanicè sæpius editus cum 141. figuris. Argentinæ 1589. 8.

REMBERTI Dodonęi Stirpium histor. Belgicè scripta, & à Clusio Gallicè reddita (vide Clusium) cum iconibus, quę seorsim duobus tomis in octavo prodierunt. Antverpiæ 1553. & 1559. Icones numero 840. cum annotationibus.

Ejusdem frugum historia, anno 1552. Latinè, Antverpiæ cusa & recusa in 8.

Ejusdem florum & purgantium historia seor-

sim cum novis figuris edita, in 8. Eadem simul juncta in libros triginta divisa. Antverpiæ anno 1583. in folio, cum 1305. figuris. Hęc historia denūo recusa Belgicè, cum cujusdam annotationibus prolixis, additis adhuc 36. novis figuris anno 1608. Latinè similiter ab auctore emaculata paucis muratis, & figuris quę in Belgica editione habentur, cum descriptione additis, anno 1616. prodijt.

SIMONIS Januensis Clavis sanationis obscuriora vocabula ordine Alphabetico exponens. Venerijs 1486. fol. cum Sylvatico recusa.

TARQUINIUS Ocyori Dormundani, de viginti radicibus adversus pestem probatis, cum earundem plantarum figuris, Germanicè cum Q Apollinaris libello.

THEOPHRASTI Græci de historia & de causis plantarum, editio Græca Veneta 1552. 8. Basileensis, 1541. 4. & Gazæ versio Lugduni 1552. 8. cum Joannis Jordani correctione.

THOBIÆ Roelsij Medici Medioburgensis epistolæ ad Clusium: cum historia Clusij edita.

THOMAS Hariot Insulam Virgineam descripsit: Clusius Latinè reddidit, est prima pars Ind. Occidentalis.

VALERII Cordi in Dioscoridem annotationes.

Ejusdem lib. 4. de stirpium historia, cum figuris 272. ex Trago & aliquot novis à Gesnero additis.

Ejusdem Sylva observationum, quę omnia simul, Gesnero curante, Argentinæ 1561. in fol. edita.

Ejusdem dispensatorium sæpius recusum.





# NOMINA EORUM QUI PLANTAS VEL SEMINA COMMUNICARUNT.

|  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Clarius, Medicus Alfterodamenfis.                   | Joan. Bauhinus, frater p. m. Archiater Wirtenbergicus.  |
| Angelus Buſti dictus Vidua, Medicus Venetus.                 | Joan. Fleiſſerus, Uraſiſl. Medicus.   |
| Arnoldus Gillenius, Ducis Megapolitani Medicus.              | Joan. Francus ſenior, Medicus Camicenſis.   |
| Baſilius Beſlerus, Pharmacop. Norinberg.                     | Joan. Carolus Roſenberger, Poliarer Wormat.   |
| Bernhardus Paludanus, Medicus Enchuſanus.                    | Joan. Henricus Cherlerus p. m. Med. Baſil.  |
| Casparus Bartolinus, Haſſniæ Medicinæ Profeſſor.             | Jo. Henricus Richinerus p. m. Med. Baſil.   |
| Casparus Hoffmannus, Altorfij Medicinæ Profeſſor.            | Joan. Dormannus, Pharmacop. Grüningenſis.   |
| Casparus Weckerlinus, Medic. Argent.                         | Joan. Neudorffer, Medicus Norinbergenſis.   |
| David Vaſmarus, Lubecenſis medicus.                          | Joan. Pona, Pharmacop. Veronenſis.  |
| Daniel Loritius, Ducis Wirtenberg Med.                       | Joan. Prevotius, Med. Profeſſor & horti Patavini ſeptimus præfeſtus.                                      |
| Everhardus Vorſtius, Lugd. Batavorum Medicinæ Profeſſ.       | Joann Rudolphus Saltzman, Poliater & Med. profeſſor Argentiniæ.   |
| Fabius Columna, I. C. Lynceus.                               | Joan. Sigfridus, Helmſtadi Medic. Profeſſor.  |
| Ferrandes Imperatus, Pharmacop. Neapolitan.                  | Joan. Terentius ex ſociet. Jeſu, qui ex India plantas miſit.  |
| Franciſcus Pona, Medicus Veronenſis.                         | Joan. Michael Wolffhardus, Med. Rorebur.  |
| Fridericus Meyer, Argent. in. p. m.                          | Laurent. Roſenau, Pharmacop. Lineburgenſis.   |
| Fridericus Monavius Med. D.                                  | Laurentius Scholtzius ſenior p. m. Med. Uraſiſlav.  |
| Georgius Fuëren, Medicus Haſniënſis.                         | Leonhard. Doldius p. m. Medicus Norinberg.  |
| Georgius Rumbaum, Med. Uraſiſlav.                            | Lucas Juſtus, Baſil. Ducis Bipont. Medicus.   |
| Georgius Spörlinus Baſil. Med. Candid.                       | Ludovicus Fürer, Senator Northuſanus.   |
| Gregorius de Regio Capuccinus.                               | Ludovicus Jungermannus, Profeſſor Giellanus   |
| Henricus Heyl, Medicus Dantiſcan.                            | Matthias de Lobel. p. m. Botanographus.   |
| Hermannus Hagius, Medicus Arnhem.                            | Matthæus Liſter, Londinenſis Medicus.   |
| Hieronymus Viſcherus, Med. Norinberg.                        | Nicolaus Agerius, Phyſices Profeſſ. Argent.   |
| Honorius Belli Vicentinus, Medic. Cretenſis.                 | Nicolaus Conrarenus, Senator Venetus.   |
| Jacobus Albinus, Medicus Hamburg.                            | Olaus Worm, Doctör & Profeſſor Haſſniæ.   |
| Jacobus Antonius Cortuſus, quintus Patavini horti præfeſtus. | Päſchalis le Coq, Piſtaviënſis, Med. & Profeſſ.   |
| Jacobus Cargillus, Medicus in Scotia.                        | Philip. Steph. Sprenger p. m. Pharmacop. Heidelb.   |
| Jacobus Guilelmi Hooft Amſtelredam.                          | Proſper Alpinus, Profeſ. & horti Patavini ſextus præfeſtus.   |
| Jacobus Hagenbachius, Medicus Baſil.                         | Samuel Sattler, Ducis Brunſvic. Medicus.  |
| Jacobus Zuingerus p. m. Medicus Baſil.                       | Thomas Platerus, Baſil. D. & Profeſſor.   |
| Joachimus Burſerus, Medicus Annæbergenſis.                   | Veſpaſianus Robinus, qui Lutetiæ hortum exoticis plantis inſtructiſſimum habet, & à quo plura expectamus. |
| Joan. ab Alen, pharmacop. Bremenſis.                         |   |
| Joan. Anarolius Privæus, Medicus Veſuntinus.                 |   |
| Joan. Backmeiſterus, Profeſſor Roſtochiënſis.                |   |

# EXPLICATIO NOMINUM

## Authorum citatorum.

**A** COSTA Cristophorus.  
 Aſuar. Aſtuarius.  
 Ad. Adverſaria Penæ.  
 Ægin. Ægineta.  
 Aet. Aetius.  
 Agric. Georgius Agricola.  
 Aldroan. Ulyſſes Aldroandus.  
 Alp. Alpi. Alpin. Alpinus.  
 Ama. Amatus.  
 Ang. Anguillara.  
 Apul. Apuleius.  
 Ariſt. Ariſtoteles.  
 Athenæ. Athenæus.  
 Avic. Avicen. Avicenna.  
 Barboſa Odoardus.  
 Belli Honorius Belli.  
 Bellon. Bellonius.  
 Bell. obſ. Belloni obſervationes.  
 Bell. cult. de cultura neglecta.  
 Bentz. Hieronymus Bentzo.  
 Bot. Franc. Botanologicum Francofordianum.  
 Braſ. Braſſav. Braſſavolus.  
 Bry. du Bry. Florilegium de Bry.  
 Brunf. Brunſelius in folio.  
 Brunf. 4. editione in 4.  
 Brunf. ico. quoad iconem.  
 Brunf. deſ. quoad deſcriptionem.  
 Buſbeq. Augerius Buſbequius.  
 Cadamuſt. Aloyſius Cadamuſtus.  
 Cæſ. Cæſalpinus.  
 Cam. Camer. Camerarius in horto.  
 Cam. ep. & hor. Camerarius in epitome Matthioli & ſuo horto.  
 Cam. ad Matth. Camerarius in Matthiolo à ſe emaculato.  
 Cam. fig. hort. Camerarius in figuris horto ſuo additis.  
 Carate Auguſtinus.  
 Carda. Cardanus de variët. rerum.  
 Car. Carolus Stephanus.  
 Caſt. Caſtor Durantès.  
 Caſt. ap. in Appendice.

Caſt. ico. ſecundum iconem, non deſcriptionem.  
 Caſt. deſ. Secundum deſcriptionem, nō iconem: idem apud alios intelligas.  
 Cat. Altorff. Catalogus Altorſenſis.  
 Caro. Marcus Caro.  
 Celf. Cornelius Celfus.  
 du Choul. Johannes du Choul.  
 Cieca. Petrus de Cieca.  
 Claven. Clavenna pharmacopœus.  
 Cl. h. Cluſius hiſtoria rariorum.  
 Cluſ. hiſt. deſ. ico. hiſtoria rarior: deſcriptione, vel icone.  
 Cluſ. pan. hiſtoria Pannonica.  
 Cluſ. hiſp. hiſtoria Hiſpanica.  
 Cluſ. ex. exor. hiſtoria exoticarum.  
 Cluſ. ap. appendice ad hiſtoriam rariorum: ap. alt. auct. appendicis alterius auctario.  
 Cluſ. cur. poſt. in curis poſterioribus.  
 Cluſ. in corol. in corollario ad Dodonæi editionem Gallicam.  
 Cluſ. in Garz. in Mon. Cluſius notis ſuis in Garziam, in Monardem.  
 Cod. Cæſ. Codex Cæſarius à Dodonæo ſæpè citatus.  
 Col. & Colum. ubi in frugum hiſtoria occurrit, Columella intelligas.  
 Col. Colum. Fabius Columna.  
 Contarenus Nicolaus.  
 Cord. in Dioſ. Cordus notis in Dioſcoridem.  
 Cord. hiſt. in ſua plantarum hiſtoria.  
 Cord. obſ. in ſylva obſervationum.  
 Cord. ſchol. Cordi ſcholiaſtes qui Æmilius cenſetur.  
 Cord. in diſp. in diſpenſatorio.  
 Corn. Janus Cornarus.  
 Cortefius Ferdinandus.  
 Cortuſus. Jacob. Antonius.  
 Coſt. in Meſ. Coſtæus in Meſuem.  
 Coſtin. Nicolaus Coſtinus.  
 Dal. Dalechampiſ.  
 Dal. in Plin. notis ad Plinium.

# EXPLICATIO NOMINUM

|  |   |
|--|---|
| Dalech. in Dios. figuris additis ad Dioscoridem Ruellianum.                                      | Hipp. Hippocrates.  |
| Dalech. Lugd. in historia universali Lugduni edita.  | Hon. Belli Honorius Belli in epistolis ad Clusium.                      |
| Diosc. Dioscorides.  | Imper. Ferrandes Imperatus in sua hist. naturali.                       |
| Dod. Dodonæus editione Latina in folio.  | Ind. occ. Indiæ Occidentalis historia.                                  |
| Dod. gal. Dodonæus in editione gallica Clusij.   | Ind. or. Ind. Orientalis historia.                                      |
| Dod. ur. Dodonæus in utraque tam Gallica quam Latina editione.                                   | Josephus Acosta in hist. Indiæ.   |
| Dod. ed. belg. editione Belgica & postrema.  | Lac. Lacun. And. Lacuna.  |
| Dod. fl. in historia florum in octavo cusa.  | Lang. Johannes Langius.   |
| Durantes Castor.   | Lem. Levinus Lemnius.   |
| Durerus Claudius.  | Leon. Nicolaus Leoniceus.   |
| Encelius Christophorus.  | Lerius in descript. Brasiliæ.   |
| Eyht. Eyfster. hortus Eyfstetensis.  | Linsc. Linscot. Linscotus in histor. Indiæ orientalis.                  |
| Eric. & Val. Cord. Ericius & Valerius Cordus, pater & filius.                                    | Lob. Lobelius in Observat.  |
| Fallop. Gabriel Fallopius.   | Lob. ob. Idem.  |
| Fabric. Georgius.  | Lob. ad par. alt. in Adversariorum parte altera.                        |
| Frag. Fragosus.  | Lob. Belg. editione lingua Belgica.                                     |
| Fracast. Fracastorius.   | Lob. ico. in Iconibus separatim editis.                                 |
| Franc. Francus in horto Lusatiæ.   | Lob. pharm. Rond. pharmacia Rondeletij restituta.                       |
| Fuch. Fuchsius in historia Latina in folio.  | Lon. Adamus Lonicerus.  |
| Fuch. ico. in iconibus seorsim editis.   | Lud. Rom. Ludovicus Romanus.  |
| Fuch. comp. de compositione medicamentorum.  | Lugd. Historia generalis Lugduni cusa.                                  |
| Gal. Galenus.  | Manard. Johan. Manardus.  |
| Gaza in versione Theophrasti.  | Marcel. Marcellus Virgilius.  |
| Gar. Garzias ab Orto.  | Marogna. Nicolaus Maronæus Veronensis.                                  |
| Ger. Johannes Gerardus Anglus.   | Matth. Matt. Matthiolus.  |
| Ges. h. hort. Gesnerus in libro de hortis Germaniæ: hor. ap. in appendice hujus libri de hortis. | Matth. comp. Matthioli compendium in 4.                                 |
| Ges. lun. libello de herbis noctu lucentibus.  | Matth. Ital. Matthioli editio lingua Italica cum magnis figuris, folio. |
| Ges. fra. in descriptione montis fræti.  | Matth. ico. si iconem perpendas.  |
| Ges. col. in libello de collectione stirpium.  | Mycon. Myconus hic à Lugdun. citatur.                                   |
| Ges. foss. de fossilibus.  | Myrepf. Nicolaus Myrepfius.   |
| Ges. cat. in plantarum Catalogo quadrilingui.  | Monach. Mes. Monachi in Mesuem.   |
| Ges. ad Cord. in corollario historiæ Cordi addito.   | Monard. Nicol. Monardes.  |
| Ges. in epist. in epistolis suis.  | Mund. Mundel. Aloysius Mundella.  |
| Gomara Franciscus.   | Nicander in Theriacis & Alexipharmacis.                                 |
| Guil. Guilandinus in Theone.   | Ovied. Ferdinandus Oviedus.   |
| Guil. the. in Theone.  | Oribas. Oribasius Græcus.   |
| Guil. pap. in commentario in Plinij capita de Papyro.  | Pallad. Palladius.  |
| Hariot in descriptione insulæ Virginæ.   | Palud. Bernhardus Paludanus notis in Linscottum.                        |
| Hermol. Hermolaus Barbarus in corol. ad Dioscorid.   | Pandest. Pandestarius.  |
|  | Pena. Petrus Pena in Adversariis.                                       |
|  | Phytopin. Phytopinax C. Bauhini.  |
|  | Pigafet. Pigafetta in descript. regni Congiani.                         |
|  | Plin. Plinius.  |

# AUTHORUM CITATORUM.

|   |   |
|---|---|
| Pon. Johannes Pona edit. Latina.                        | Schvvenck. Casparus Schvvenckfeldius.     |
| Pon. Ital. editione Italica montis Baldi.               | Serap. Serapio Arabs.                     |
| Portæ. Jo. Baptista Portus in sua villa.                | Sethi. Simeon Sethi Græcus.               |
| Prod. Prodromus C. Bauhini.                             | Solinand. Solinander in consilijs.        |
| Quad. Euangelista Quadramius.                           | Stad. Stadius in Brasiliæ descriptione.   |
| Rauvv. Leonhardus Rauvvolfius.                          | Svv. Svve. Svvert. Svvertius:             |
| Reg. Gregorius de Regio Capuccinus.                     | Tab. Taber. Tabernæmontanus. edit. folio. |
| Richer. Richerius de Belleval, Botanicus Monspelienfis. | Tab. ico. in iconibus separatim cufis.    |
| Röf. Eucharis Röslin.                                   | Th. Thal. Johannes Thalius.               |
| Rob. Joan. Robinus.                                     | Thevet. Andreas Thevetus.                 |
| Rondel. Rondelerius in sua praxi.                       | Tovar. Simon Tovar, Hispalensis Medicus.  |
| Ruel. Joan. Ruellius.                                   | Trag. Hieronymus Tragus.                  |
| Scalig. Scaliger in subtilitatibus.                     | Tur. Guilielmus Turnerus.                 |
| Scalig. in Arist. in Aristotelem de plantis.            | Valeran. Valerandus Donreus Pharmacopœus. |
|   | Vercell. Franciscus Vercellenfis.         |







A D A V T H O R E M

HERMANNUS vander Haghen / BELGA

Illust. Principis Auriaci & Reipubl. Arnemiensis  
in Geldria Med. ord.



*AVHINE Aonidum decus immortale sororum,  
Quas aeterna tui laudes monumenta merentur  
Ingenij, tum quanta tuis, quae nuper in auras  
Doctorum manibus passim vulgata teruntur,  
Gratia debetur cœptis, non prenderit acri  
Mente, aut facundo quis digno expresserit ore.*

*Non si Thebanus veniat redi-vivus ab Orco  
Maximus, aut vates Itale telluris alumnus,  
Atq; his Meonides socium se adjunxerit ipse.  
Tam dotes animi varia, tam multa relucet  
Omnibus in scriptis virtus præstantia tanta,  
Non modò ut aequales Medicorum scita sequuti,  
Seu vivam licuit vocem exaudire docentis,  
Seu scriptos oculis tantum evoluisse labores,  
Dicere nil dubitent, se terq; quaterq; beatos:  
Verùm etiam feri post secula longa nepotes,  
Egregias memori solvent tibi pectore grates.*

*Quis genera herbarum seclis ignota priorum  
Et fruticum plura & florum quis prodidit unus?  
Quæ dum sollicito nemorosos lumine saltus,  
Dum sylvas, montesq; feros vallesq; reductas  
Scrutaris, monstrante DEO, & tua Vota juvante,  
Eruis atq; oculis pulchrè spectanda dedisti:*

Gallia



*Gallia quicquid habet, quicquid Germania, quicquid  
Hesperia latis virgulti finibus extat,  
Marte tuo doctis viva sub imagine chartis  
Cernere cuiq; licet descriptum clare BAHINE.  
Prætereo quæ missa tibi non obvia nostris  
Multa locis libri concludis fasce sub uno.*

*Ergo Dioscorides ne tanta præmia laudis  
Prima ferat, ne Matthiolus sibi proxima poscat,  
Efficis, unus habes & prima & deinde secunda.  
Magnanimi sileant, qui vix dum singula Reges  
Invenere, suos fastus & nomina ponant.*

*Quid memorem innumeros, cum morbis ægra trahebant  
Corpora, vicina tua quos solertia morti  
Eripuit, miserisq; dedit producere vitam.  
Ut Dis non falso raptos è faucibus artis  
Arte tua sibi sexcentos perijsse queratur.*

*Nec minor incisos humani ob corporis artus  
Gloria percrebuit: qua dexteritate nec ulli  
Præscorum, nostri nec cuiquam cesseris ævi.*

*Multa Tibi forsân videor dixisse BAHINE  
Vix tamen hæc fuerint fastigia summa tuarum  
Virtutum Ingenij: at prohibet pudor addere plura.*



DE UTILITATE HVJVS OPERIS  
ANDREÆ LIBAVII D. & P. L.

*Carmen.*



Uli causas vires propria & discrimina rerum,  
Primi exercitijs exposuere suis.  
Inventis seros magnis juvare nepotes,  
Et cura populis consulere bona.  
Scilicet his ducibus ludentibus optima ceptum est  
Discerni & membris utiliora sequi.  
Quin etiam si quid natum foret intus acerbi,  
Sive parum cautis esset oborta lues:  
Querere praesidium morbumq, evellere membris  
Hinc soliti, poterant se reperare sibi.  
Idq, via facili. Nam nomine cognita quaq,  
Forma animis solita se exhibuere diu.  
Improbior donec successit patribus atas  
Contemtrixq, boni Gens, populusq, ferrox.  
Hinc rabieq, furens & martia castra secutus  
Rerum confudit notitiam atq, notas.  
Artibus hinc subtracta fides, viresq, negata  
Esse sub his, primi quas docuere senes.  
Postera gens igitur finxit nova nomina, resq,  
Spectatas alio protulit inde sono.  
Tu quoq, livor iners multum mutare solebas,  
Atq, peregrinis fingere verba notis.  
Scilicet ut raperes soli tibi turpiter usum  
Natura, medica notitiamq, rei.  
Sed tandem superavit amor studiumq, juvandi:  
Et cessit rabies invidiosa bono.  
Milliaq, in summam collecta vocabula, qua res  
Signentur passim spe meliore monent.  
Quicumq, ergo vagis erras autoribus, atq,  
Ambiguus traheris per dubitanda vjs.  
Huc propera: menti curas demturus inanes:  
Hic Ariadnai fila laboris habes.  
Magnus pæonijs Heros B A V I I N V S in ausis  
Errantes certo dirigit orbe pedes.  
Ille laborifer praeclarus in agmine Phæbi  
Herbarum titulos ut bona legit apīs:  
Inq, unum congescit opus, quod discere promptè  
Posis, quas habeat qualibet herba notas.  
Utitor hoc igitur gratus, tantumq, laborem  
Declara studio, non perijisse, tuo.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER PRIMUS.

## SECTIO PRIMA. DE GRAMINIBVS.

**G**RAMEN à gradiendo, quòd geniculatis ramis serpat Dio-  
scorides lib. 4. cap. 30. ἀρχωσι nominat: Ut & Theophrastus 1. hist. 10. 4. ejusd. 7.  
& 11. & caus. 16. cui 3. hist. 9. πᾶσι dicitur. Ἀρχωσι δὲ τῶν ἀρχῶν, quòd in agris  
proveniat: Πᾶσι, quòd omnium herbarum frequentissima.

Genera Dioscorid. quatuor facit: Primum ἀρχωσι, alterum καλαμάρχωσι, tertium  
quod in Parnasso, & quartum quod in Cilicia, cinna nominatum provenit: quæ à se invicem  
tum figura, tum facultate multum discrepat. Et Plinio l. 24. c. 19. Primum geniculatum, alte-  
rum Parnassi, tertium aculeatum, quod triplex: Primum cujus in cacumine plurimum quini  
aculei, daetylum, alterum quod Aizoo simile, tertium quod tenuius in parietinis & regulis, quar-  
tum denig, Babylonicum, quod juxta vias nascitur. At Theophrastus multas differentias pro-  
ponit: posteriores plures agnoscere. Verùm tantus in his Naturalis usus, ut præter varietates, à  
prisca & recentioribus propositas, longè plures enumeraturi simus, cùm in hanc classẽ Bromi,  
Phœnicis, Lolij & Avena sterilis species (nam & ipsa Graminci generis sunt) retulerimus: de  
quibus ordine, à Gramine canino, cùm ejus in Germania Officinis usus sit, initio factò.

## GRAMEN CANINUM.

Gramen vocamus ad imitationem Plinij, cui Canaria, quasi à canibus inventa, quæ fastidium deducunt,  
vomitum cum pituita rejicientes: hinc Cynagrostis aliis: & à foliorum primò producentium forma, qui-  
busdam Dens Canis dicitur.

I. Gramen caninum arvense, sive Gramen  
Dioscorid.

Gramen, Ruel. Dod. Cord. in Dioscor. Cast.

Gramen Dioscoridis, Gesner. hort.

Gramen canarium medicatum, Ad. Lob.

Gramen caninum. Tab. Ger.

Gramen vulgare, Lugd.

Gramin. primi fortè Diosc. species major, Thal.

II. Gramen caninum vineale: primum in  
Prodomo.

III. & IV. Gramen caninum longius radi-  
catum majus, & minus.

Gramen canarium longius radicatum latiore  
panícula, majus & minus, Lob. adv. part. alt.

V. Gramen caninum supinum paniculatum  
folio varians.

Graminis 1. Dioscor. species minima. Thal.

VI. Gramen caninum supinum panica-  
tum dulce: 2. in Prod.

Graminis dulcis nomine, D. Lobelius misit.

VII. Gramen caninum supinum minus.

Gramen caninum supinum. Lob. ico. Ger.

Gramen caninum supinum, 2. Tab.

IX. Gram. caninum maritimum spicatum.

Gramen geniculatum caninum marinum, Lo-  
bel. ico.

Gramen caninum tertium, Tab.

Gramen caninum marinum, Ger.

IX. Gramen caninum marit. spicâ foliaceâ.  
Gram. can. longius radicat. marin. 2. Lob. ico.  
Gramen caninum quartum, Thab.  
Gramen caninum marinum alterum, Ger.

2. a X. Gramen can. marit. spicâ echinatâ, quod  
Gramen caninum maritimum asperum, vel 3.  
in Prod.

Gramen caninum medicatum marinum spicâ  
echinatâ, C. Bauhini, Lob. ad part. alt.

XI. Gram. canin. marit. spicatum: 4. in Prod.

XII. Gram. muror. radice repente: 5. in Prod.

### GRAMEN NODOSUM,

à radicis forma.

I. Gramen nodosum avenaceâ paniculâ.  
an Ægilops bulbi genus, Plin. l. 19. c. 5.

Gramen, vel avenæ syl. genus, Ges. col.

Gramen bulbosum nodosum, Ad. Lob. Lugd.  
cui & Gramen nodosum, sub alia figura.

Gramen tuberosum, sive nodosum, Cam.

Gramen bulbosum, Tab.

Gramen caninum nodosum, Ger.

Agrostes alerum genus, Dod.

II. Gram. gemmeum seu nodosum secundum.  
Perlaro vulgò, & Oryza sylv. Cæs.  
an Coix Myconi, Lugd.

III. Gramen nodosum spicâ parvâ, sive no-  
dosum tertium: 6. in Prod.

IV. Gram. bulbosum aquaticum: 7. in Prod.

V. Gramen bulbosum ex Alepo: 8. in Prod.

### GRAMEN TREMULUM.

I. Gramen tremulum maximum.  
an Phalaris altera, Cæs.

Gram. amourettes majore paniculâ candican-  
te, Clus. cur. post.

Colore panicularum variat, est rufescentis,  
est albi coloris.

II. Gramen tremulum majus.  
Lolium 10. & Ægilops Plinij, Trag.  
Ægilops, Ges. hort. Lon.

Graminis 1. genus, Dalech. in Diosc. Ama.

Phalaris pratensis minor, Ad. Lob. ico.

Amourettes tremblantes, Clus. hist.

Phalaris pratensis, Ger.

Gramen polyanthos, Lugd.

Gramen leporinum & tremulum, Tab.

Gramen loliaceum 10. Tragi, Thal.

Variat paniculæ colore viridi, spadiceo.

III. Gram. tremulum min. paniculâ magnâ.  
Phalaris parva, Cæs.

Gramen amourett. alterum, Clus. cur. post.

Hoc aliquando in cacumine tres aut qua-  
tuor ramulosexiles fundit, semenque triangu- 2. b  
lum habet.

IV. Gramen tremul. minus pan. parvâ: 9. in  
Prod. Idem diceremus cum Graminis specie  
parva Thalij, si nostrum folia pilosâ haberet.

V. Gramen paniculis elegantissimis, sive  
ἐπὶ γῶγῆς, majus.

Gramen amourettes, quasi amatorium, Clus.

Gramen paniculosum phalaroides, Lob.

Gramen pratense sextum, Dod.

Gramen filiceum seu polyanthos 2. Lugd.

Gramen paniculatum sativum, Tab.

Gramen paniculatum, Ger.

VI. Gram. minimum paniculis elegantiss.

Gramen minimum Dalech. Lugd.

### GRAMEN PANICULATUM.

#### *Gramen pratense paniculatum.*

I. Gramen pratense paniculatum molle.

Gramen lanatum Dalechampij Lugd.

Gramen paniculatum molle, Lob. adv. part. alt.

Gramen equinum, sive Hippagrostis Gesneri  
cum hoc plurimum convenit.

Gramen albicans lanuginosum molle, Cam.

II. Gramen prat. paniculatum majus, latio-  
re folio: πῶς Theoph.

Gramen vulgò cognitum, Trag. ico.

Gramin. 2. genus Dalech. in Diosc.

Gramen pratens. majus vulgatius, Ad.

Gramen pratens. vulgatius, Lob. Lugd.

Gramen pratense primum, Dod.

Gramen, Lon. commune, Thal.

Gramen alterum & vulgare, Tab.

Gramen pratense, Ger.

an per Chulem Garzias hoc gramen intellexit?  
Clus. not. ad Garz.

III. Gramen pratense paniculatum majus  
angustiore folio: 10. in Prod.

Variat paniculâ & glumis longioribus.

IV. Gramen Ungaricum Busbequij in iti-  
nerario Constantinopolitano.

V. Gramen pratense paniculatum me lium.

Gramen minus, Ad. Lob. ico. Tab.

Gramen pratense secundum, Dod.

Gramen pratense minus, Ger.

Variat latiore & angustiore folio.

VI. Gramen pratense paniculatum minus.

Gra-

*Gramen paniculatum minus*, Tab.

*Gramen minimum album & rubrum*, Ger.

Variat hoc paniculâ & culmis purpurascen-  
tibus & albis.

3. a VII. *Gram. paniculâ multiplici*: 11. in Prod.  
Majus & minus reperitur Monspeßuli, &  
*Gramen minus duriusculum nominatur.*

*Gramen paniculatum arvense.*

I. *Gramen arvense paniculâ crispâ.*

*Gramen*, Matth. Lugd.

*Gramen minimum Xerampelinum*, Ad. Lob.  
ico. Lugd.

*Gramen minimum*, Lugd.

*Gramen bulbosum Dalech.* Lugd.

II. *Gramen paniculâ pendulâ aureâ.*

*Gramen aureum Dalech.* Lugd.

III. *Gramen segetum altiss. paniculâ sparsâ.*

*Gramen segetum paniculâ speciosâ latiore.*  
Lob. ico.

*Gramen segetale*, Tab. Ger.

an *Gram. caule geniculato*, Thal.

IV. *Gramen segetum paniculâ arundinaceâ.*

*Gramen loliaceum* 8. Tragi, Thal.

*Agrorum venti spica*, Lob. ico.

*Gramen pratense* 3. Dod.

*Gramen harundinaceum.* Ger.

Variat paniculâ flavescente & spadiceâ.

*Gramen paniculatum montanum*  
& sylvestre.

I. *Gram. montanum paniculâ spadiceâ de-*  
licatiore: 12. in Prod.

II. *Gram. paniculatum odoratum* 13. in Prod.

III. *Gramen paniculatum folio variegato.*

*Gramen sulcatum*, Ad. Lob. ico. Lugd.

*Gramen striatum*, Lon. Ger.

*Gramen pictum*, Cam. Tab.

Variat in colore foliorum.

IV. *Gram. sylvat. panic. altiss.* 14. in Prod.

*Gramen paniculat. aquaticum.*

I. *Gram. palustre paniculatum altissimum.*

*Gramen aquatic. harundin. paniculat.* Tab.

*Gramen majus aquaticum*, Ger.

II. *Gramen palustre paniculâ speciosâ*: 15.  
in Prod.

III. *Gram. palust. panic. minus*: 16. in Prod.

IV. *Gramen aquatic. paniculat. latifolium.*

*Lolij nonum genus*, Tragi.

*Gramen majus aquaticum*, Lob. ico.

*Graminis arundinacei alia species*, Thal.

*Gramen harundin. paniculatum*, Tab. Ger.

## GRAMEN SPICATUM.

3. b

*Gramen spicatum aquaticum.*

I. *Gramen aquatic. fluitans multiplici spica-*  
*Argem. notâmi.*

*Gramen anatum*, Tragi.

*Gramen aquis innatans*, Lob. ico.

*Gramen fluviatile*, Tab. Ger.

II. *Gramen aquat. geniculatum spicatum.*

*Gramen aquatic. spicatum*, Lob. ico.

*Gramen fluviatile album*, Tab.

*Gramen fluviatile spicatum*, Ger.

III. *Gramen maritim. fluitans cornutum*:  
17. in Prod.

*Gramen cristatum & spicatum pratense.*

I. *Gramen pratense cristatum*, live *Gramen*  
*spicâ cristatâ læve.*

*Gramen cristatum C. Bauhini*, Lob. ad part. 2.  
18. in Prod.

Variat florum colore, communiter ex pallido  
flavescentes, aliquando punicei coloris sunt.

II. *Gramen spicâ cristatâ subhirsutum*:  
19. in Prod.

III. *Gramen pratense spicâ flavescente.*

*Gramen anthoxanthum*, Lugd.

IV. *Gramen pratense spicâ purpureâ ex*  
*utriculo prodeunte*, vel *Gramen folio spicam*  
*amplexante.*

*Gramen pratense Dalech.* Lugd.

V. *Gramen spicatum folio aspero.*

*Gramen spicatum Dalech.* Lugd.

Variat folio nonnunquam articulado, & flo-  
ribus, qui apud nos pallide lutei, in pratis mon-  
tium frigidorum subrubci sunt.

VI *Gram. caryophyllatæ folijs spicâ divulsâ.*

*Gramen spicatum folijs Vetonicæ*, Lob. ico.

*Graminis loliacei octavi* 4. species, Thal.

*Gramen nigrum*, Lugd.

*Gramen caryophylleum*, Tab.

Reperitur majus in pratis humidis, minus  
in siccis.

VII. *Gramen caryophyllatæ folijs spica*  
*squamata.*

*Graminis loliacei* 8. alia perpusilla species,  
Thal.

Hujus figuram priori junxit Lobel. in icon.

*Gramen spicatum montanum & nemorosum.*

- I. Gramen spicatum angustifol. montanum: 20. in Prod.
- 4.a II. Gramen sylvatic. angustifol. spicâ albâ: 21. in Prod.
- III. Gramen caryophyllatum nemorosum spicâ multiplici: 22. in Prod.
- IV. Gramen caryophyllatum montanum spicâ variâ: 23. in Prod.
- V. Gramen caryophyllatum alpinum. Gramen alpinum Rabinum, Ges. hort. Gramen Rabinum, Ad. (vel Ravisum montanum,) Tab.
- VI. Gramen spicatum folijs & spicis hirsutis mollibus.

## GRAMEN TYPHOIDES.

Αἰχμωπὶς τυφοειδής.

- I. Gramen typhoid. maximum spicâ longissimâ: 25. in Prod.  
an Stelephuros Theophrasti, Ang.
- II. Gramen typhoides molle.  
Gramen alopecuroides, Lob. ico.  
Gramen alopecurinum 1. Tab.  
Gramen alopecuroides minus, Ger.
- III. Gramen typhoides asperum primum.  
Gramen typhoid. asperum majus, fortè Thaliij.  
Gramen typhinum 1. Tab.  
Gramen typhinum majus Ger.
- IV. Gramen typhoides asperum alterum.  
Gramen typhinum, Lob. Lugd.  
Gramen pratense 7. Dod.  
Gramen typhinum 2. Tab.  
Gramen typhinum minus, Ger.
- V. Gramen typhoid. spicâ angustiore.  
Gramen alopecuroides minus alterum, Lobel. icon.  
Gramen alopecurinum 2. Tab.  
Gramen alopecurinum minus, Ger.
- Variat spicâ longiore & brevior.
- VI. Gramen typhoides culmo reclinato.  
Gramen alopecuroides minus, Lob. ico.  
Gramen alopecurinum 3. Tab.  
Gramen alopecurinum majus, Ger.
- VII. Gramen typhoides spicâ multiplici.  
Calamagrostis prima, Trago descrip.  
Gramen typhinum 3. Tab.  
Cyperus typhinus, Ger.

## GRAMEN PHALAROIDES.

- I. Gramen phalaroides majus, sive Italicum.  
Gramen phalaroides 2. Lob. ico.  
Gramen phalaroides, Tab.  
Gramen alopecuroides majus, Ger.
- II. Gramen phalaroid. minus, sive Hispan. 26. in Prod.
- III. Gramen phalaroides spicâ molli, sive Germanicum: 27. in Prod.

## GRAMEN ALOPECUROIDES.

- I. Gramen Alopecuroides spicâ rotundiore: Αλοπέουρος Theoph. Cauda vulpina Plinij.  
Alopecuros Theoph. Ang.  
Cauda vulpis Monspelienf. speciosior, Ad.  
Alopecuros, Dod. Lugd. Tab. Cam. Ger.  
Alopecuros altera, Lob. ico.  
Cauda vulpina, Cæs.
- Variat: Creticum enim spicâ est majore, & ad tactum delicatior.
- II. Gram. Alopecuros minor spicâ longiore.  
Alopecuros longâ spicâ, Tur.  
Cauda vulpina Monspel. Ad. Lob. ico.  
Alopecuros major, Tab.
- Variat magnitudine & spicarum longitudine, quæ in altera longior, in altera brevior & rotundior.
- III. Gramen Alopecuros major spicâ longiore.  
Juncus marinus gramineus folijs schoenanthi, Ad. Lob. ico. Lugd.  
Schoenanthum adulterinum, Tab. Ger.
- IV. Gramen Alopecuroides Anglobritann. maximum.
- V. Gramen Alopecuroides Africum.  
Utriusq; iconem D. Lobelius ad me misit, & in Illustrat. plantarum descriprurum monuit.
- VI. Gramen Alopecuroides spicâ asperâ.  
Gramen echinatum Dalech. Lugd.

## GRAMEN TOMENTOSUM.

- I. Gramen tomentosum spicatum.  
Gram. tomentosum, Alopecuros vera Theoph. & Plinij, Lugd.  
Gramen sparteum 2. & Schoenanthinum, Tab.  
Juncus marinus gramineus, Ger. tit.
- II. Gram. pratens. tomentos. paniculâ sparsâ.  
Gnaphalium Diosc. Trag.  
Typha Diosc. Ang.  
Juncus bombycinus, Ad. Lob. ico.

Gramen eriophorum, Dod.  
 Linum pratense, Gef. col. Lon.  
 Gnaphalium Tragi, Lugd.  
 Pseudolinum, Cast. icon.  
 Gramen junceum lanigerum, Thal.  
 Gramen tomentosum, & Linagrostis, Tab.  
 Gramen tomentarium, Ger.

5.a. Nonnunquam contractis pediculis tanquam pappus conspicitur.

III. Gramen tomentosum alpinum & minus: 28. in Prod. ex Rhætia D. Burferus attulit.

### GRAMEN SPARTEUM.

Αἰνόμαρτον, Theoph. Spartium Plinio.

I. Gramen sparteum 1. paniculâ comosâ.

Spartum Plinij, Clus. Lob. Lugd.

Spartum herba, Dod.

Spartum Plinij 1. Tab. Ger.

Juncus Ibericus sive Hispan. Dalech. in Plin.

II. Gramen spart. 2. panicula brevi folliculo inclusâ.

Spartum herba alterum, Clus. hist.

Spartum alterum Plinij, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Sparti herbæ alia species, Dod.

III. Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis longioribus, vel spicâ fecalinâ.

Spartum tertium, Clus. Lugd.

Spartum herba 3. maritimum, Clus. hist.

Spartum nostras, Lob.

Spartum 5. & Plinianum 3. Tab.

Spartum Anglicanum, Ger.

IV. Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis brevioribus.

Gramen sparceum 1. Tab.

Spartum Anglicum 2. Ger. tit.

V. Gramen sparteum spicatum latifolium.

Spartum nostras alterum, Lob. ico.

Spartum 6. vel Plinianum 4. Tab.

Spartum herba 4. Batavicum, Clus. hist.

VI. Gramen sparteum juncifolium.

Spartum nostras parvum, Lob. ico.

Spartum 7. vel Plinianum 5. Tab.

VII. Gramen sparteum Basileense capillaceo folio: 29. in Prod.

VIII. Gramen sparteum minus, vel Hollandicum: 30. in Prod.

IX. Gramen sparteum Monspeliacum capillaceo folio minimum: 31. in Prod.

X. Gramen sparteum setas equinas referens: 32. in Prod.

Ex Java Insula allatum: cujus videtur mentio facta in Clusij curis posterioribus, sub herbâ, Sparto Hispanico, non absimili.

XI. Gramen sparteum pennatum.

Sparrum Austriacum, Clus. pan.

Gramen 9. vel junceum, Dod.

Gramen pinnarum, Dalech. Lugd.

5.b

Variat juba colore: est flavo, & etiam candido.

XII. Gram. spart. variegatum: sub 33. in Prod. Sparti nomine D. Jungermannus misit.

### GRAMEN JUNCEUM ET

Spicatum.

I. Gram. foliolis junceis oblongis, radic. alba Gramen junceum Dalech. Lugd.

II. Gramen foliolis junceis brevibus majus radice nigrâ: 34. in Prod.

III. Gram. foliolis junceis brevibus minus. Exile gramen durius, Lob.

Gramen exile, Lugd.

Gramen minus duriusculum, Tab. Ger.

IV. Gramen exile Nicæum: de quo paucis. Busbequius in suo Itinerario.

V. Gramen foliolis junceis radice jubatâ.

Gramen exile durius Norvegicum aut Danicum, Lob. ad par. 2.

VI. Gramen palustre junceum racemoso semine: 35. in Prod.

VII. Gramen junceum polystachion.

Gramen junceum 2. vel junceum aquaticum majus, Tab.

Gramen junceum aquaticum Ger.

VIII. Gramen junceum folio articulato sylvaticum.

Gramen junceum 1. vel sylvaticum nemorosum, Tab.

Gramen junceum sylvaticum, Ger.

IX. Gramen junceum folio articulato aquaticum.

Gramen aquat. alterum, Lob. ico.

Arundo minima, Lugd.

Gramen junceum polycarpon, Thal.

Gramen aquaticum, Tab. Ger.

Habetur majus & minus Thalio monente: in majore, post fœniscium, caulis novus palmis excrefcit, cui non amplius capitula corymbacea insident, sed urriculi unciales paleacei in capillamenta fissi, modo virides, modo purpurascetes: rarissimè cum corymbis utriculi reperiuntur.

X. Gramen junceum folijs & spicâ junci.



- Gramen junceum maritimum, Lob. ico. Ger.  
 Gramen junceum tertium, Tab.  
 XI. Gram. junceum folijs & spica junci minus.  
 Gramen junceum marinum dense stipatum,  
 Lob. ico.  
 6. a Gramen junceum s. vel aquaticum minus, Tab.  
 Gramen junceum marinum, Ger.  
 XII. Gramen junceum montanum capite  
 squamoso: 36. in Prod.  
 XIII. Gramen junceum minimum capi-  
 tulo squamoso: 37. in Prod.  
 XIV. Gramen junceum minimum alterum  
 38. in Prod.  
 XV. Gramen junceum minimum mariti-  
 mum: 39. in Prod.  
 XVI. Gram. junceum spicatum seu triglochin.  
 Calamagrostis 2. Trag. ico.  
 Calamagrostis 4. Lugd.  
 Carex minus, Lon. quoad 2. fig.  
 Gramen mixtum ex Junco & Gramine, Thal.  
 Gramen marinum spicatum alterum, Lob. ico.  
 majus, Cam.  
 Gramen marinum spicatum, Ger.  
 Gramen triglochin Dalech. Lugd.  
 Gramen junceum 4. vel spicatum, Tab.  
 XVII. Gramen spicatum alterum.  
 Gramen marinum spicatum, Lob. ico.  
 Gramini montano spicato simile in maritimis  
 Flandriæ, Clus. pan.  
 Gramen aquatic. spicatum, Tab. Ger.

## GRAMEN CYPEROIDES,

Spicatum &amp; paniculatum.

- I. Gramen cyperoides latifolium spicâ ru-  
 fa: sive caule triangulo.  
 Graminis 4 genus, Trag.  
 Gram. cyperoides, Lob. Lugd. Cam. Tab. Ger.  
 Gramen triangulum, Lugd.  
 Carex Tragi, Lugd.  
 II. Gramen cyperoides latifolium spicâ spa-  
 diceo viridi majus: 40. in Prod.  
 III. Gramen cyperoides angustifolium spi-  
 câ spadiceo viridi minus: 41. in Prod.  
 IV. Gramen cyperoides angustifol. spicis  
 longis erectis.  
 Gramen palustre majus, Lob. ico.  
 V. Gram. cyperoides spicâ pendulâ brevior.  
 Pseudocyperus, Gef. hort. Lob. ico. Dod.  
 Pseudocyperus *ὀλιγόκαρπ*, Thal.  
 Gramen aquaticum, Lugd.

Majus &amp; minus habetur.

- VI. Gramen cyperoides spicâ pendiculâ  
 longiore & angustiore: 42. in Prod.  
 VII. Gram. cyperoid. paniculâ sparsâ majus.  
 Gram. cyperoid. aquat. vulgaris, Lob. ico. Ger. 6. b  
 Gramen cyperinum majus, Tab.  
 Variat paniculâ, in altera compactiore & bre-  
 viore, in altera magis expansa & longiore.  
 II. X. Gramen cyperoides palust. majus spi-  
 câ compactâ.  
 Gramen palustre cyperoides, Lob. ico. Ger.  
 Gramen junceum triquerrum, Thal.  
 Gramen cyperinum palustre, Tab.  
 IX. Gramen cyperoides spicis minoribus,  
 minus compactis: 43. in Prod.  
 X. Gram. cyper palustre majus spicâ diversâ.  
 Gramen cyper. parvum aquatic. Lob. ico. Ger.  
 Gramen cyperinum palustre minus, Tab.  
 XI. Gramen cyperoides minus paniculâ  
 sparsâ subflavescente.  
 Juncus exiguus pratensis, Trag.  
 Calamagrostis 3. Trag. ico. Lugd.  
 Carex minus, Lon. quoad 1. fig.  
 Gramen marinum spicatum minus, Cam.  
 Gramen cyperoides minimum paniculâ sub-  
 flavâ C. Bauhini, Lobelio ad par. 2.  
 XII. Gramen cyperoides minus, paniculâ  
 sparsâ nigricante.  
 Gramen cyperoides minimum nigricante pa-  
 nicula, Lob. ad. par. 2.  
 XIII. Gramen cyperoides miliaceum.  
 Cyperus graminea, Ad. Lob. ico. Lugd.  
 Juncus latus, Lugd.  
 Pseudocyperus *πολύκαρπ*, Thal.  
 XIV. Gramen cyperoides maritimum.  
 Juncus maritimus, Ad. Lob. ico. Tab.  
 Juncus marinus alius Penæ, Lugd.  
 Gramen maritimum, Eidem.

## GRAMEN ARUNDINACEUM.

- I. Gramen arundinaceum spicâ multiplici.  
*καλαμίσκος* Dioscoridis.  
 Calamagrostis forte Babylonica, Ad.  
 Calamagrostis, Lob. Lugd.  
 Gramen arundinaceum, Lugd.  
 Gramen arundinaceum majus, Tab. Ger.  
 Variat ratione loci: nam quod in arenosis,  
 spicâ est crassiore: quod in montosis, dumetis  
 humidis, spicâ est tenuiore.  
 II. Gramen arundinaceum spicatum.

Gra-



*Gramen harundinaceum minus*, Tab. Ger.

III. *Gramen arundinaceum paniculâ molli spadiceâ majus*.

7. a *Gramen tomentosum*, Lob. ico.

*Graminis loliacei* 8. alia species, Thal.

IV. *Gramen arundinaceum panicula molli spadicea minus*.

*Graminis loliacei octavi tertia species*, Thal.

V. *Gramen arundinaceum ramosum, plumosum album*: 44. in Prod.

VI. *Gramen arundinaceum enode majus montanum*.

*Scirpi primum genus*, Trag.

*Juncus sylvestris*, Lon. ico.

*Juncus lychnanthemos major*, Thal.

*Gramen harundin. montanum*, Tab.

VII. *Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum*.

*Scirpi alterum genus*, Trag.

*Juncus lychnanthemos tenuis major*, Thal.

VIII. *Gramen arundinaceum maritimum acutissimum*.

*Oxygrostis maritima Dalech. Lugd.*

## GRAMEN NEMOROSUM,

*Gramen nemorosum glabrum.*

I. *Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio*: 45. in Prod.

II. *Gramen nemorosum spicâ subnigrâ recurvâ*.

*Gramen cyperinum nemorosum*, Tab. Ger.

III. *Gramen nemorosum spica rufescente molli*.

*Gramen nemorosum* 1. Tab.

*Gramen sylvaticum*, Ger.

IV. *Gram. nemorosum spicis parvis asperis*.

*Gramen sylvaticum* 3. Tab.

*Gramen sylvaticum minus*, Ger.

Variat latiore folio in dumeris, & angustiore in pratis.

V. *Gramen nemorosum caliculis paleaceis. Holostium*, Matth.

*Holostium Matthioli*, Lob. ico. Lugd.

*Gramen epigonatocaulon*, Thal.

*Gramen junceum* 6. vel *bufonium*, Tab.

*Gramen junceum*, Ger.

Duplex est repens: & erectum.

VI. *Gramen holost. alpinum minimum*: 64. in Prod.

*Gramen nemorosum hirsutum.*

I. *Gramen hirsutum latifolium majus*.

*Gramen hirsutum nemorosum*, Lob. ico. Ger. 7. b

*Gramen sylvaticum* 4. sive *pilosum*, Tab.

II. *Gramen hirsutum latifolium minus*.

Magnitudine potissimum differt: datur & hujus majus & minus.

III. *Gramen hirsutum capitulis Pfyllij*.

*Cyperella Cordi* & *Pseudocyperi species* pulmila, Gef. hor.

*Gramen exile hirsutum cyperoides*, Lob. ico.

*Gramen cyperinum pilosum*, Tab.

*Gramen nemorum Dalechampij*, Lugd.

*Gramen exile hirsutum*, Ger.

Variat folijs latioribus & angustioribus.

IV. *Gramen hirsutum capitulo globofo*.

*Combretum Plinij*, Ang.

*Herba Luziola vulgo*, Cæf.

*Gramen lucidum*, Tab.

*Gramen palustre echinatum*, Ger. icon.

V. *Gram. hirsut. angustif. majus*: 47. in Prod.

VI. *Gramen hirsutum angustifolium minus paniculis albis*.

*Gramen Leucanthemum Dalech. Lugd.*

## GRAMEN ECHINATUM

& aculeatum.

I. *Gramen spicâ subrotundâ echinatâ: vel Gramen echinato capitulo*.

*Gramen echinatum tribuloides*, Colum.

II. *Gram. spicâ planâ echinatâ*: 49. in Prod.

III. *Gram. album capitulis aculeatis Italicum*.

*Gramen aculeatum. Matth. Cast. Lugd.*

IV. *Gramen palustr. aculeatum Germanicum vel minus*.

*Gramen palustre echinatum*, Lob. ico.

*Gramen aculeatum*, Lugd.

Variat spicis longioribus, rotundioribus, sæpe in eadem planta.

V. *Gramen palustre aculeatum Italicum vel majus*.

## GRAMEN DACTYLOIDES

sive *Itchæmum*.

I. *Gramen dactylon Ægyptiacum*.

*Nejemelsalib, sive Gramen crucis, Ægyptijs, Alpino.*

II. *Gramen dactylon folio arundinaceo majus: aculeatum fortè Plinij*.

*Gramen*, Ang. Clus. Cæf.

*Gramen vulgare Dalech. Lugd.*

Gra-

Gramen canarium alterum, Lob.

8.2 Variat : nam Gallicum folijs est nonnihil villosis : Germanicum vero ; folijs est glabris & cauliculis minus erectis.

III. Gramen daſtylon folio arundinaceo minus cum appendice.

Gramen vulgare Dalechampij, Lugd.

Fortè cum ſecundo idem.

IV. Gramen daſtylon folio latiore.

Sanguinaria Nevenaræ, Trag.

Canaria Plinij, & Calli crus Apuleji, Ang.

Coronopus, Leoniceno.

Iſchæmon, Gef. cat. Cluſ. hiſt. Tab.

Iſchæmon vulgare, Ad. Lob. Ger.

Iſchæmon Plinij, Cluſ. hiſt. quoad iconem.

Gramen Iſchæmon Plinij, Lugd.

Variat ſpiciſ, plerumq; quiniſ & ſeniſ : raro quaterniſ : rariſſimè terniſ.

V. Gram. daſtylon anguſtiſol. ſpiciſ villoſiſ. Iſchæmon ſecundum, Tab.

Spiciſ tribuſ, 6. 7. & 10. variat.

VI. Gramen daſtylon ſcopariuſ.

Gramen ſcopariuſ iſchæmi paniculiſ Galli- cum, Lob. ad par. 2.

VII. Gramen daſtylon aquaticuſ.

Gramen aquaticuſ geniculatuſ, Tab. Ger.

IX. Gramen daſtylon eſculentuſ.

Gramen mannæ, Matth. Caſt.

Gramen aculeatuſ, Sanguinaria, Capriola, Leon. Ruel. Ama.

Frumentem, German. Schwaden / Oryzæ ſpe- cies, Cord. in Dioſc.

Gramen album ſeu hirsutuſ, Gef. hort.

Manna cœleſtiſ Germaniſ, Eidem.

Gramen Mannæ eſculentuſ, Ad. Lob. Ger.

Gramen Mannæ primuſ, Dod. Tab.

Gramen aculeatuſ 1. Plinij Thal.

Graminiſ genus quod in German. ſeritur, Cæſ.

Gramen Mannæ priuſ Matth. & priuſ Dod. Lugd.

## GRAMEN PANICEUM.

I. Gramen paniceuſ ſpicâ diviſâ.

Panicuſ ſylv. Matth. Ad. Caſt. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Panicuſ Herbarioruſ ſylveſtre, Lob.

Gramen Mannæ alteruſ, Dod. Lugd.

Miliuſ ſylveſt. & ſupinuſ, Cluſ. hiſt.

Panicæſtrellæ ſpecies, Cæſ.

an Miliuſ ſylveſtre Iſchæmuſ, Ang.

Spica ſubinde ſingulariſ, non raro multi- plex, eâque modò herbacei, modò atroruben- 8. b  
tiſ coloriſ eſt.

II. Gram. panic. ſpicâ ariſtiſ longiſ armatâ. Panici effigie gramen ariſtiſ circumvallatuſ, Lob. icon.

Gramen paniceuſ Ger. ſecundum, Tab.

III. Gramen paniceuſ ſpicâ ſimplici : Ε'λ- μέγωπιſ.

Loliuſ ſextuſ, Miliaria herba Plinij, Trag.

Panici effigie gramen ſimplici ſpicâ, Lob. ico.

Panicæſtrella, Cæſ.

Panicuſ ſylveſtre aliud, Dalech. Herba alba fortâſſe Plinij, Lugd.

Gramen paniceuſ primuſ, Tab.

Gramen cyperiodeſ ſpicatuſ, Ger. ico.

Variat : aliquando enim ſpicâ oblongâ : ali- quando brevi & rotundâ.

IV. Gramen paniceuſ ſpicâ aſperâ.

Loliuſ 7. Phalaris ſylv. Dioſc. Trag.

Gramen geniculatuſ, Tab. Ger.

Variat : Monſpeliſ palmo minus : apud noſ erectuſ & cubitale.

V. Gramen paniceuſ ſpiciſ nigriſ.

Panici effigie gramen 3. Lob.

Gramen paniceuſ, 3. Tab.

Gramen paniceuſ parvuſ, Ger.

## GRAMEN MILIACEUM.

I. Gramen ſylvaticuſ paniculâ miliacêâ ſparſâ.

Gramen miliaceuſ, Lob. ico. Cam. Tab. Ger.

Gramen pratenſe 4. Dod.

II. Gram. mont. panicula miliacêâ ſparſâ : 50. in Prod.

III. Gramen arundinaceuſ paniculâ mi- liacêâ : 51. in Prod.

## GRAMEN SORCHINUM.

I. Gramen Sorghi paniculâ erectuſ.

Gramen ſorghi effigie, Lob. ico.

Gramen ſorghinuſ, Tab. Ger.

Gramen pratenſe 5. Dod.

II. Gramen arundinaceuſ Sorghi paniculâ ſparſâ : 32. in Prod.

## GRAMEN SPICA TRITICEA

& Secalina.

I. Gramen latifoliuſ ſpicâ triticeâ latiore compactâ : 53. in Prod.

Variat latiore & anguſtiore folio.

II. Gra-

- II. Gramen latifol. spicâ triticeâ divulsâ : 54. in Prod.  
 III. Gramen angustifol. spicâ triticeâ compactâ : 55. in Prod.  
 IV. Gram. angustifolium spicâ tritici muricæ simili.  
 Gramen frumentarium segetalève, triticeum, sive triticea spicâ, C. Bauhini, Lob. ad. par. 2. 56. in Prod.  
 V. Gramen spicâ secalina : 57. in Prod.

**GRAMEN SPICA BRIZÆ.**

- I. Gramen spicâ brizæ majus : 58. in Prod.  
 II. Gramen spicâ brizæ minus : 59. in Prod.  
 III. Gramen spicâ geminâ millepedæ simil.  
 Gramen dystachyophoron, Colum.

**GRAMEN HORDEACEUM.**

- I. Gramen hordeaceum montanum sive majus.  
 Graminis loliacei 3. genus majus, Thal.  
 II. Gram. hordeaceum minus & vulgare.  
 Lolium tertium, Trago.  
 Holcus Plinij, Aristida aliis, Ang.  
 Hordeum murinum, Tur. & Cæs.  
 Hordeum spontaneum spurium, Ad. Lob.  
 Hordeum sive triticum murinum, Dod.  
 Hordeum spurium, Tab. Ger.  
 Graminis loliacei 3. genus, Thal.  
 Gramen hordeaceum, Lugd.  
 III. Gramen hordeo disticho simil.  
 Gramen hordeaceum pumilum, Clus. cur. post.

**GRAMEN LOLIACEUM.**

- I. Gramen loliaceum spicâ longiore.  
 Ἀίρα Diosc. Arist. Theoph. Gal. Orib. Ægin. Aët. Ζίζανιον Constan. Zinzania Arabum.  
 Lolium & Æra, Plinio.  
 Lolium, Rucl. Matth. Ges. cat. Ama. Cord. in Diosc. Tur. Dod. Cæs. Cast. Lugd. Tab.  
 Lolium & triticum remulentum, Ad. Lob.  
 Lolium verum, Ges. hor.  
 Lolium album, Ger.  
 Frumentum sativum, Lon.  
 Variat : communiter aristas habet, sed sine aristis quoque Bononiæ observatum.  
 II. Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore : 60. in Prod.  
 III. Gram. loliac. angustiore folio & spicâ.  
 φείρις Dioscoridi, à feminis colore phœniceo.

Herba Phœnicea Græcis, hordeum murinum nostris, Plin.  
 Lolium quartum, Trago.  
 Phœnix, Matth. Tur. Lacun. Dod. [cui & Lolium murinum.] Cast. Ang. Cord. Lon. Cæs. Lugd.  
 Hordeum murinum, Guil. Lob. Tab.  
 Graminis loliacei 4. genus Tragi, Thal.  
 Lolium rubrum, Ger.

- IV. Gramen loliac. minus spicâ simplici : 63. in Prod.  
 V. Gramen loliaceum minus supinum multiplici spicâ : 62. in Prod.  
 VI. Gramen loliaceum supinum.  
 Gram. phalaroides exile supinum humi sparsum Danicum, Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.  
 VII. Gramen maritimum paniculâ loliaceâ : 63. in Prod.

**GRAMEN FESTUCÆ, SEV**

Ægilops & Bromes herba.

- I. Festuca graminea glumis hirsutis.  
 Lolium 2. Trag. at 1. iconē.  
 Ægilops & Festuca, Dod. gal. Ges. hort.  
 Bromos, Lac. altera, Ger.  
 Bromos sterilis altera, Lob. Lugd.  
 Lolium, Lon.  
 Festuca altera, Dod.  
 Gramen murorum Dalech. Lugd.  
 Festuca graminea, Thal.  
 Phœnicis altera species, Eid.  
 Syphonium, Bromos herba, Tab.  
 Variat spicis, quæ aliquando quasi in fasciculum comprehensæ, & Phœnix altera est Thalij : aliquando dispersis : sic aliquando glabris, aliquando hirsutis : & propriè Secales vitium est.  
 II. Festuca graminis glumis vacuis : 64. in Prod.  
 Variat : aliquando aristis oblongis incurvis armata Monspeßuli reperitur.  
 III. Festuca graminea effusâ jubâ : 66. in Prod.  
 IV. Festuca graminea nemoral. latifolia mollis.  
 Festuca quarta, Thal.  
 V. Festuca junceo folio : 66. in Prod.  
 an Festuca nemoral. quarta & tenuifolia, Thal.  
 VI. Festuca junceo folio spicâ geminâ : 67. in Prod.  
 VII. Festuca avenacea sterilis elatior.

*ἑρῖμος* Diosc. aliis. *βρώμος πέν*, ad differentiam avenæ.

Festugago, Gazæ.

Lolij primum genus, Trag. def.

Ægilops prima, Matth. altera, in comp.

Ægilops, Lac. vera, Gesl. hort.

Bromos & avena herba, Dod. gal.

Festuca & avena Græca, Lon.

Avena sterilis, Ad. Thal.

Bromos sterilis, Lob. ico. Ger.

Bromos herba, Dod. Lugd.

Avena Græca, Cæs.

Ægilops 1. & Avena fatua, Tab.

VIII. Festuca avenacea sterilis humilior.

Lolij quintum genus, Trag.

Bromos herba graminei generis, Thal.

IX. Festuca graminea arvensis minor.

Festuca sexta, Thallio.

X. Festuca pratensis lanuginosa: 68. in Prod.

XI. Festuca dumetorum: 69. in Prod.

XII. Festuca dumetorum foliis angustissimis pilosis: 70. in Prod.

XIII. Festuca utriculis lanugine flavescens.

*Ἀγίλωφ* Diosc. Theoph. [ ubi Gaza Avenam vertit, ] Gal. Oribas. Ægin.

Hordeum festuca, seu Ægilops, Plinio.

Ægilops Bromoides Belgarum, Lob.

Festuca prior, Dod.

Avenæ tertium genus syl. Cæs.

Avena sylvest. seu nigra, Thal.

Ægilops Dodonæi, inter Ægilopen & Bromum media, Lugd.

Ægilops sexta, Bromoides 2. Tab.

XIV. Festuca altera capitulis duris.

Ægilops, Ang. Matth. comp. Ad. Dod.

Ægilops secunda, Matth. Lugd.

Festuca sive Ægilops Narbonensis, Lob.

Triticum sylvest. in Sicilia, Cæs.

Fruentum syl. Cast. ap.

Ægilops Lobelij & Penæ, Lugd.

Ægilops peregrina, Tab.

Festuca Italica, Ger.

Spica communiter ex duobus aut tribus capitulis duris composita est: nonnunquam ex plurib. compacta, spicam triuncialem obtinet.

XV. Festuca longissimis aristis glumis vacuis spadicei coloris.

Ægilops 4. Bromoides 1. Tab.

Ægilops Bromoides, Ger.

## GRAMEN AVENACEUM.

I. Gram. montanum avenaceum spicatum.

Gramen montan. spicatum. Clus. pan. & hist.

Gramen sylvaticum secundum, Tab.

Gramen marinum spicatum alterum, Ger.

II. Gramen mont. avenaceum locustis rubris: 71. in Prod.

Variat caule, lævi in montosis: in dumeris humidis, foliis cauleque subasperis.

III. Gramen avenaceum locustis rariorib.

Gramen avenaceum rariore grano Danicum, Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.

IV. Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis.

Gramen Anglo-Britannicum avenaceum, Danico nemorali simile: Hoc nomine à D. Lobelio accepimus.

Gramen nemorale avenaceum alterum ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum, Eid. ad. par. 2. cujus etiam varietatem notat.

V. Gramen avenaceum montanum lanuginosum.

Gram. monta. avenæ semine, Clus. pan. & hist.

Gramen avenaceum, Tab.

Hordeum distichon, Ger. ico.

VI. Gramen avenaceum lanuginosum glumis rarioribus: 72. in Prod.

VII. Gram. avenac. lanuginosum ramosum.

Gramen glumosum Dalech. Lugd.

VIII. Gramen glumis variis: 73. in Prod.

IX. Gramini affinis planta ad gutturis inflammationes utilis.

Planta in planis nascens graminis modo, Petri de Osma in epist. ad Manardem. sed quid?



## SECTIO SECUNDA.

JUNCUS, NARDUS, CYPERUS, SPARGANIUM,  
Uva marina & Equisetum.

## DE JUNCO.

**JUNCUS** à jungendo, Græcis *ῥῆιν* & à loris & funibus dicitur. Dioscorides, in odoratum & inodorum divisisse videtur. Nam l. 1. de funco odorato, quem simpliciter *ῥῆιν* per excellentiam nominavit: at l. 4. c. 52. de inodoro egit: hunc duplicem fecit, unum lævem, alterum acutum: hunc sterilem, & alterum semine nigro & crassiore calamo, & tertium ἐλέγχων prioribus carnosiore. Sic Theoph. 4. hist. 13. tria sunt genera, ὄξυς & ἄκαρπ & ἀκέρπ, acutus & sterilis, qui mas: ἀκέρπ, frugifer, quem μελαγκράνον, artiferum vocitat: tertius ἐλέγχων dicitur: at de odorato 9. hist. 7. egit. Plinius l. 21. c. 18. quinq. fecit, 1. Mariscus appellatum, 2. marinum, oxy-schænum, & hujus tria genera: acutum, sterilem, quem marem & oxym. alterum semen ferentis, quem Melancranin vocant, & fructuosior: magis tertius, qui Holo-schænos nominatur. Quare Juncus alius est odoratus, indorus alter; vel alius locis aridis, alius aquosis provenit: hic, vel in aquis dulcibus, vel maritimis. Rursum utriusq. generis alij ἀπὸ ξηρῶν ἐπ' ἄκρῃ, in mucronem pungentem desinunt, alij in fastigium obtusius: & sic alius λῆ, lævis: alius τεράχνης, asper: alius fastigio acutius alius, obtusiore. Juncus lævis & in fastigio acutus, alius est oxy-schænos, alius holo-schænos. Oxy-schænos alter mas, ἄκαρπ, nullo semine facundus: alter femina, μελαγκράνης, nigrum semen ferens: sic ad facundum, clavatus: petrosus verò, ad lapides referendus est.

## I. Juncus odoratus five aromaticus.

*ῥῆιν* & ἰδιόσμη & καὶ ὄνισμα & καὶ σινέδρις, Hipp.

Ἀρωματίνος καὶ μυρεφίνος, Græcis posterioribus.

*ῥῆιν*, Diosc. & Galeno.

Juncus odoratus, Plinio, Hermol. Ruel. Matth. Tur. Lac. Ad. Lobel. Clus. in Garz. Cæsalp. Cast. Lugd.

Juncus rotundus, Celso.

Juncus rotundus odoratus, Marcell. Ama. Corn.

Schœnus & Juncus odoratus teres ac rotundus Cord.

Schœnanthum, Mesuæo, Lon. (cui & Cyperus rotundus.) Tab. (& Juncus aromaticus.) Cam. (& Juncus floridus five aromaticus) Acoftæ.

Squinanthum, Varroni, Ang. Gail. & Officinis, quasi *ῥῆιν* αὐτῶ, junci flos.

Adhar & Adhir, Arabibus. Sachbar, Arabia incolis.

Palea de Mecha & Pafus camelorum, vulgo.

## JUNCUS ACUTUS.

I. Junc. acut. capitulis forghi: ὄξυς & ἄκαρπ Diosc.

Juncus acutus, Ang. Cord. in Diosc. Cast. acuto cacumine, Gef. cat.

Juncus maritimus primus, Ad.

Juncus rotundus alter, Cæf.

Huc referri potest

Uva palustris & inusitatum Caricis genus, cujus folia peracuta crura & pedes sauciant: par. 6. Ind. occid. expedit in Floridam.

II. Juncus acut. marit. capitulis rotundis.

Juncus acuminatus, Ama.

Juncus acutus maritimus alter, Ad.

Holo-schænos major, Lugd.

III. Juncus acutus maritimus caule triangulo: 1. in Prod.

an Juncus exiguus maritimus, Cæf.

IV. Juncus acutus paniculâ sparsâ.

Juncus tertius, Dod. gal. acutus, Dod. Cast.

Juncus acutus vulgar. Lob. ico.

Juncus oxy-schænos Dodonæi, Lugd.

## JUNCUS LÆVIS

ὁ λόγος αὐτοῦ.

## I. Juncus seu Scirpus Indicus.

Juncus Indicus porosus; Clus. eur. post.  
an ex hoc Junco parantur tapetia in Guinea:  
Linsc. part. 2. Ind. or. c. 4. & ex hoc Scirpōve vi-  
ridi, sportulas, floreas, stragula & pileos in  
Guinea puellæ conficiunt: par. 6. Ind. or. c. 7.  
& apud Bantanos, pilæ lusoriæ: par. 5. Ind. or.  
fig undecima.

II. Juncus maximus, sive Scirpus major  
quamvis veteres Scirpum à Junco distinxisse  
videantur.

Mariscus Plinij.

Juncus palustris major, Trag. Tab.

Juncus grandis Holoschænos, Cord. in Diosc.  
Gef. cat. Dod.

Scirpus, Junci tertia species, Lac.

Juncus tertius holoschænos, Ang. Cast.

Juncus & Scirpus, Lon.

Juncus aquaticus maximus, Ad. Lob. ico. Ger.

Juncus lævis aquaticus maximus, Thal.

Juncus rotundus 3. Cæs.

Juncus lævis, Ger. ico.

Holoschænos Theophrasti, Lugd. desc.

## III. Juncus sive Scirpus medius.

Juncus sylvaticus, Tab.

Juncus aquaticus maximus, Ger. ico.

## IV. Juncus lævis paniculâ sparsâ major.

Juncus vulgaris alter, Trag.

Juncus oxyschænos, Ang.

Juncus lævis (seu lenis.) Cord. in Diosc. Dod.

Lugd. sive Oxyschænos vulgaris.

Juncus lævis vulgar. Ad. Thal. paniculâ sparsâ,  
Lob. ico.

## V. Juncus lævis alter.

Junci lævis aliud genus, Lugd.

Ex hoc, medulla prorsus nivea ad lucerna-  
rum lumina extrahitur.

## VI. Juncus lævis paniculâ sparsâ minor.

## VII. Juncus lævis paniculâ non sparsâ.

Juncus, Marth. Lac. Cast.

Juncus lævis, Lugd.

Juncus lævis glomerato flore, Lob. ico.

Juncus palustris minor, Tab.

an Juncus rotundus primus, Cæs.

VIII. Juncus exiguus montanus mucrone  
carens: 2. in Prod.

an Juncus lychnanthes tenuis, Thal.

## IX. Juncellus inutilis: 3. in Prod.

Chamæschænos, Gef.

Huc referendus est

Juncellus omnium minimus, Ad.

## JUNCUS ACUMINE REFLEXO.

## I. Juncus acumine reflexo major.

Juncus lævis, Gef. cat. Tab.

Juncus melancranis, & Juncus oxyschænos  
fœmina, Lugd.

an Juncus lychnanth. tenuis major, Thal.

## II. Juncus acumine reflexo alter: 4. in Prod.

III. Juncus acumine reflexo minus vel tri-  
fidus: 5. in Prod.

## JUNCUS CAPITULIS

Equiseti.

## I. Juncus capitulis equiseti major.

Juncus aquaticus min. capitulis equiseti, Lob.

Juncus clavatus, Dalech. Lugd.

Juncus alius fecundus, Eid.

Variat scirpis latioribus & triplo angustio-  
ribus.

II. Juncellus capitulis equiseti minor &  
fluitans: 6. in Prod.

## JUNCUS CAPITULO LANU-

ginoso & bombycino.

I. Juncus capitulo lanuginoso: sive Schœ-  
nolaguros: 7. in Prod.

## II. Juncus alpinus bombycinus: 8. in Prod.

## JUNCUS FLORIDUS.

## I. Juncus floridus major.

Calamagrostis 2. Trag. prima, Lugd. cui etiam  
Calamagrostis leucanthemos.

Sparganium, Dod. gal.

Juncus floridus, Marth. Cast. Lugd.

Gladiolus palustris, Cord. hist. & Ger.

Gladiolus aquaticus, Gef. cat. Dod.

Carex alterum, Lon.

Juncus cyperoides floridus paludosus, Lob.  
Ad. &

Juncus cyperoides paludosus, Eyst.

Juncus cyperinus floridus, Tab.

Butomos Theoph. Cæs.

Quibusdam Butomos Theoph. 1. hist. 8. & 4.

hist. 9. 11. 12. alijs Gladiolus Ejusdem 1. hist. 8.

& 16. Item 4. hist. 9. 10. 11. nonnullis Spargani-

um Dioscorid. 1. 4. c. 21. Flos colore est in pur-  
pura diluto: ar Tragus candido notat.

## II. Juncus floridus minor: 9. in Prod.

NAR-

## N A R D U S.

**N**ardus Diosc. l. i. forte à Naardo urbe Syriaca, Euphrati contermina: aliis Ναρδὸς καὶ χυός, quam inter aromata Dioscorides: inter odorata ad unguenta, Theoph. hist. 7. recensuit.

Genera Dioscorides plura fecit, & cap. 6. differentias multas, loco natali solùm differentes, proposuit, omnibus in uno monte nascentibus: ut Syriacam, Occidentem versus Syriam respiciente: Indicam, Orientem versus ad Judæam vergente: hæc duplex, una in monte, altera ad radicem montis, non procul à præterfluente Gange, qua Gangitica, quæq; omnes simul adferuntur: addit & Samphariticam: de reliquis speciebus infra l. 4. agemus. Plinius de Nardo & ejus differentiis l. & cap. 12. verba fecit.

I. Nardus Indica, quæ spica, Spica nardi, & vel ternarum spithamarum altitudinem ex-  
Spica Indica Officinis. crescere scribunt: in 4. part. hist. Ind. Orient.  
Nardus, Rucl. Cord. in Diosc. Gef. cat Lac. cap. 39.

Tur. Lob. Hæc à Syriaca & Gangetica, tantum natali-  
Nardus Indica, Matth. Cord. hist. Lon. Cast. bus differre videtur.

Lugd. Tab. Ger. II. Nardus spuria Narbonensis.

Spica Nardi, Ang. (cui Nardus Gangitis Diosc.) Nardus Gangitis spuria Narbonæ, quæ Gan-  
Mundel. Amat. (& Indica spica.) Ad. Lob. ico. gitidi Dioscoridis prorsus quadrare videtur,  
Acoft. Cæf. (qui ex Algarum genere esse sta- Ad. Lob. ico.

ruit,) Lugd. Nardus spuria Narbonensis, Lugd.

Spicæ nardus, quam frumenti more ad duarum Nardus Narbonensis, Ger. adulterina, Tab.

C Y P E R U S E T E J U S  
Species.

**K**ύπερος ♂ aut Κύπερις, à radice effigie, quæ pyxidulam aut vasculum pusillum imita-  
tur, nomen accepisse videtur.

Genera duo Dioscorides l. i. recensuit: alterum radice rotundâ, quod Officinarum Cy-  
perus est: alterum Gingiberis effigie, quod in Officinis Curcuma dicitur. Theoph. 4. hist. 11. Cy-  
perum (Gladiolum Gaza vertit) radice inequali esse scribit, partim crassi carnosæq; partim  
gracili & furculosa. Plin. l. 21. c. 18. Cyperoradicem olivæ nigre similem tribuit, & cum ob-  
longa sit, Cyperidem vocari.

Cyperus alius amarus, alius dulcis est: amarus, vel odoratus, vel indorus: uterque vel  
rotundus, vel longus: dulcis verò vel angustifolius, vel latifolius est.

C Y P E R U S R O T U N D U S  
odoratus.

Κύπερος ♂ στεγανός ♂.

I. Cyperus rotundus Orient. major.

Cyperus rotund. Hodueg Ægyptijs, Alpino.

Cyperus Diosc. major rotundus, Ad.

Cyperus rot Orient. maj. vel Babylonic. Rauv.

Cyperus major Syriacus, Cam. in Matth.

Cypero rotundo similis, Cæf.

II. Cyperus rotundus Orientalis minor.

Cyperus rotundus minor, Ad.

Cyperus minor Creticus, Cam. ad Matth.

Orientalis coriice est fusco; Creticus verò  
nigro.

III. Cyperus rotundus vulgaris.

Cyperus, Trag. Lob. ob. cui & Juncus qua-  
drat. Celsi.

Juncus angulosus & triangularis, Plinio.

Cyperus prima species, Ama.

Cyperus rotundus, Cord. in Diosc. Gef. hort.

Dod. Lob. ico. Lon. Tab. Ger.

Cyperus alter radice olivari, Cæf.



IV. *Cyperus rotund. minimus Hispanicus.*  
*Cyperus rotundus pumilus*, Clus. cur. post.

### CYPERUS ROTUNDUS

inodorus.

I. *Cyperus rotundus inodorus ex Florida.*  
*Radix S. Helenæ*, Monar. Clus. exot.  
*Pater noster S. Helenæ*, Cast.  
*Pater nost. vel radix S. Helenæ Monardi*, Lug.  
*Galangæ similis radix ex Florida*, Frag.

II. *Cyperus rotundus inodorus Anglicus.*  
*Cyperus rotundus inod. littoreus*, Lob. Lugd.  
*Pseudocyperus*, cujus herbam *Nocum* in *Hetruria* vocant, Cæs.

III. *Cyperus rotundus inod. Germanicus.*  
*Cyperus aquaticus septentrionalis*, Lob.  
*Cyperus aquaticus*, Lugd.  
*Cyperus rotundus*, nigras inodoras radices habens, Cam.

### CYPERUS LONGUS

odoratus.

I. *Cyperus odoratus. radice longâ : sive Cyperus Officin.*

*Cyperus radice gracili & furculosa*, Theoph.  
*Cyperida*, Plinio.  
*Cyperus*, Matth. (qui & longum & rotundum vulgarem una fig. exprimit, ut & Lugd.) Ang.  
*Fuch. Tur. Lac. Gef. cat.* (cui & *Juncus angulosus*) Cast.

*Cyperus Romanus*, sive longus, Cord. in Diosc.  
*Cyperus longus habitior*, Ad.  
*Cyperus longus odoratior*, Lob. Lugd.  
*Cyperus longus*, Cord. Gef. hor. Dod. Cam.  
 Tab. Ger.

*Cyperus secunda species*, Ama.  
*Cyperus primus & major*, Cæs.  
*Galanga syl. longa*, Germanis.

II. *Cyperus longus odor Peruanus.*  
*Radix contra yerva*, id est, venenis adversans, Monardi.

*Radix contra venena*, Lugd.

### CYPERUS LONGUS IN-

odorus.

I. *Cyperus longus inodorus Peruanus.*

*Drakena radix*, Clus. ex. Lugd.  
*Bezoardica radix*, Tab.

II. *Cyperus longus inodorus Orientalis.*  
*Radix Drakenæ affinis*, Clus. ex.

III. *Radix contra venenatas sagittas.*  
*Tarvpara radix in Guiana* cujus succo vulnerati sanantur: par. 8. Ind. Occid.

IV. *Cyperus longus inodorus Germanicus.*  
*Cyperus longus inodorus syl. Lob. ico.*

V. *Cyperus longus inodorus sylvaticus*, vel montanus: hic in *Prodromo* describitur.

### CYPERUS ESCULENTUS.

I. *Cyperus rot. esculentus angustifolius.*

*αἰνονάριον*, Gef. hor.  
*Trafi*, Matth. Cast. Cæs. Lugd. Frag.  
*Herba radice magnitudine avellanæ*, Cord. ob.  
*Juncus avellana*, Ama.

*Trafi Veronensium*, Ad. Lob.

*Dulcichinum*, Gef. hor. Guil. Dod.

*Holoconltis Hippocratis*, Fabric.

*Cyperus dulcis*, Theoph. Cam. Tab.

*Cyperus esculentus*, Ger.

*Malinathalla* [quasi valdè regerminans] Theophrasti, Ægyptiorum, & Anthalium Plinij, Dalech. in Plin. Cæs. Colum.

*Margaritæ Ægyptiæ*, Autori libri Aristotelis, de plantis, Dalech. in Plin.

*Trafi folio cyperi*, Clus. in Garz.

*Habaziz*, Portæ.

*Habel afsis Tripolitanis*, sive *Granum alzellen Arabum*, Rauvvolf.

Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec semen producere, sed sola radicum propagatione conservari, Gesnerus libr. de hor. & Po- na in suo Baldo, affirmant. Contrà, Matth. Dodonæus Lob. Columna, cum flore pingunt: & Cæsalpinus, caules, folia, & semen Cyperi, & Fragosus flores spicatos aliquantum flavos, tribuit.

II. *Cyperus rotundus esculentus latifolius.*  
*Caceras*, Garziæ: addit Clus. in notis, an *μαλινάριον* Theophrasti.

*Caceras in Goa*, Frag.





## SPARGANIUM.

Σ Παράγειν ἀπὸ τῶν παργάνων, fasciis, quòd foliis ejus latis & vitilium modo lentis, pro fasciis nutrices utantur : cujus Dioscorides l. 4. meminit : Βάπμ. Theoph. 4. hist. 8. cui mas & fœmina, & hac sterilis.

## I. Sparganium ramosum.

Sparganium, Trag. Matth. Ang. Tur. Cord. in Diosc. Gef. cat. Lac. Ad. Cæs. Cast. Cam. Tab.

[ cui & Gladiolus palustris. ] Ger. Eyst.

Butomos Theoph. Ang.

Butomon, Ruel. Dod. gal. Gef. cat.

Platanaria, Dod. Thal.

Sparganium & Butomos Theoph. Lob.

Carex, Lon.

Phleos fœmina, Lugd.

Calamagrostis secunda, Eidem.

## II. Sparganium non ramosum.

Sparganium alterum, Lob. Cæs. Lug. Tab.

Platanaria altera, Dod.

Sparganium latifolium, Ger.

II. Sparganium minimum, in Prodromo descriptum, à Dom. Furero missum.

## POLYGONUM BACCIFERUM.

sive Uva maritima.

## I. Polygonum bacciferum scandens.

Caucon & Ephedra, Plinio.

Ephedra sive Anabasis, Bellonio & Dod.

Ephedra Plinij fortè, Rauvvolf.

II. Polygonum bacciferum maritimum majus, sive Uva maritima major.

Polygonum quartum Plinij majus, Clus. hist.

Tragos, sive Uva marina major, Lob.

Uva marina, Dod. quoad icon. & Ger.

Polygonum marinum i. sive cocciferum i. Tab.

III. Polygonum bacciferum maritimum min.

Tragos, Ruel. Tragium, Gef. hor.

Equisetum quartum, Matth. Lugd.

Croton Nicandri, Ang.

an Androface, Bellonij.

Equiseti facie recemosa planta, Ad.

Uva marina Monspel. Lob. Tab.

Polygonum quartum Plinij minus, Androface fortè Bellonij, Clus. hist.

Polygonum marinum secundum, Tab.

Tragus, sive Scorpius maritimus Dalech. Lugd.

Tragum, Uva marina, Dod. desc. Cam.

Uva marina quarta, vel minor, Ger.

an Ostracollon, Hieroclis & Absyrtij, Lugd.

## EQUISETUM.

Ἰππῆρις Dioscoridi l. 4. c. 46. sive Cauda equina, quòd folia setis equinis respondeant. Hinc Plinio l. 26. c. 13. Equisetum, Hippuris à Græcis dicta, est pilus terre, equina seta similis; cui l. 18. c. 28. Equisetis, & Equiselis dicitur,

Genera duo Dioscoridi, alterum vicinos arborum caudices scandens: alterum caule cubito majore, & comis brevioribus, &c. Plinius & tertium agnovit, quod pini foliis assimilavit.

I. Equisetum palustre linearæ scopariæ folio: i. in Prod.

II. Equisetum palustre longioribus setis.

Hippuris major, Brunf. Dod.

Equisetum i. Matth. Lac. Ang. Cæs. Lugd. qui etiam sub Equiseti primi Asparago Dodon. pinxit.

Caucon Plinij, Ang.

Equisetum majus, Dod. gal. Lob. ob. Ger.

Hippuris, Ama. Ad. Lob. ico.

Equisetum 2. & Hippuris i. Diosc. Tab.

III. Equisetum palustre brevioribus setis.

Equisetum palustre, Lob. ico.

IV. Equisetum palustre brevioribus foliis

polypermon: πολύπερον ἕλδν. Sanguinariam fœminam quidam vertunt.

Polygonum fœmina, Dioscoridi.

Polygoni tertium genus, quod Oreon, Plin.

Polygonum fœmina, Matth. Eric. Cord. Bra-

sav. qui Equiseti speciem esse negat. Gef.

cat. & hort. Dod. Ama. Ang. Lac. Cast. Lugd. Tab.  
 Sanguinalis fœmina, Cord. in Diosc.  
 Limnœpeuce, Cord. hist.  
 Polygonum fœmina femine vidua, Ad. Lob. ico.  
 Polygonum fœmineum, Thal.  
 Equisetum tertium, Cæs.  
 Cauda equina fœmina, Ger.

Hoc communiter sine semine reperitur, aliquando ad singulas articularum commissuras dena & plura semina [ hinc polyspermon ] adnascuntur.

V. Equisetum pal. minus, polytachion: 2. in Prod.

VI. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis: 3. in Prod.

VII. Equisetum sylvaticum tenuissimis setis. Hippuris minor altera, Trag.  
 Equisetum sylvaticum, Tab. Ger.

VIII. Equisetum pratense longissimis setis. Equisetum alterum, Matth. Lac. Cæs. Lugd.  
 Equisetum alterum, Diosc.  
 Equisetis, Plin.

Hippuris altera, Trag. Ama.

Hippuris & Equisetum, Ges. cat.

Equisetum, Fuch. ico. Cord. in Diosc.

Equisetum longius, Dod. gal. [ figurâ transpositâ. ] Fuch.

Hippuris major, Thal. prima, Lon.

Hippuris fontalis, Ad. & Equiset. 2. Diosc. Lob.

Hippuris minor fontalis, Ad.

Hippuris minor, Lob. ico. figurâ 2.

Equisetum palustre majus, Tab. palustre, Ger.

IX. Equisetum arvense longioribus setis.

Hippuris minor, Trag. Dod. Thal.

Hippuris altera, Ges. cat. Cornar.

Equisetum, Er. Cordo, minus, Fuch. figurâ transpositâ: minus vel 3. & 4. Lon.

Polygonum fœmina, Fuch. ico.

Equisetum alterum, Ang. Bras. Cord. in Diosc. Lob. ico.

Hippuris arvensis major, & Corfanda Tab.

Equisetum segetale, Ger.

X. Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum, ἵππυρις ἄφυλλος.

Hippuris major, Trag. major altera, Lon.

Sanguinali fœminæ similis, Cordo in Diosc.

Polygonum fœmineum ἀφυλλόκλαυλον, Thal.

Equisetum Junceum, Tragi. Lugd.

Hippuris prima Cornar.

Hippuris sine foliis & nuda, Tab.

Equisetum nudum, Ger.

XI. Equisetum foliis nudum ramosum.

Equisetum 3. Matth. Lugd.

Hippuris minor, Lob. ico. & Dodon. sed utriusque ad primam figuram.

XII. Equisetum nudum minus variegatum Basileense.

an Hippuris lacustris, foliis mansu arenosis, Ges. coll. quod in Prod. 4. est.

XIII. Equisetum fœtidum sub aqua repens, 5. in Prod.

Equisetum pini foliis simile apud Plinium: & Hippuris minima à Diosc. non descripta, Dal. in Plin.

Equiseti quintum genus minimum, Lugd.

## SECTIO TERTIA.

### DE ARUNDINE, PAPYRO, ET Typha.

#### ARUNDO.

**A**RUNDO ( quæ Græcis κάλαμος, παρὰ τὸ καλῶς ἀμᾶσθαι, ut vult Etymologus ) in odoratam & inodoram dividitur. Odoratam sive Aromaticam, Diosc. l. 1. c. 17. at inodoram c. 115. proposuit, & genera quinque agnovit.

Est enim vasos, θήλυ, συριγγίας, δόναξ & Φραγμίτης: solida, fœmina, fistulis dicata, crassa & sepiaria. Verùm Theoph. 4. hist. 12. duo summa genera, τὸν αὐλητικὸν, καὶ τὸν ἐτέρον, ribialem & reliquam constituit, & inde in plures species subdividit. At Plinius l. 16. c. 36. multo plures differentias agnovit: quare l. 24. c. 11. viginti novem genera se demonstrasse monet, ubi & odorata mentio fit.

ARUN-

## ARUNDO ODORATA.

## I. Calamus Aromaticus Indicus.

Κάλαμος, & Κάλαμος μυρσινός, Hipp. & Gal.  
Κάλαμος ἐνὶ ὠδίοις, Theoph.

Κάλαμος ἀρωματιστός, Diosc. Orib. Ægin. Aëtio.

Κάλαμος ἐρύθρειος, Dionysio de situ Orbis.

Calamus Arabicus, Plutarchus Alexandrinus, Cels.

Calamus odoratus, Plin. Hermol. Ruel.

Calamus aromatites, Manardo.

Calamus aromaticus, Cord. in Dioscor. Fuch. comp. Guil. pap. Garz. Lob. ob. Clus. ad Garz.

Acost. Cæf. & in 4. parte Ind. Orient. fig. 20. & Diringo Malays, & Deringo, par. 3. Indic. Orient. 39.

Diringuo, 4. parte Ind. Orient. fig. 20.

## II. Calamus aromaticus Syriacus.

Calamus aromaticus à Syriaco diversus Guil. pap.

Calamus odoratus Libani, Lob. ico. Cam. ad Matth.

Solius Calami figuram proponunt, qualem à Doct. Paludano, anno 1579. ex Ægypto allatum, Patavij accepimus, qui 1. in Prod.

III. Calamum odoratum Matthiolum pingit, & ex eo Lacuna, Lonicerus, Acosta, Durantes, Lugd. hist. Tabernæm & Gerard. Calamum aromaticum nominantes, quem fictitium suspicamus.

## ARUNDO INODORA.

## I. Arundo vulgaris sive φραγμίτης Diosc.

Κάλαμος φραγμίτης, Theoph.

Harundinis quinquaginta genus, Trag.

Harundo phragmitis, Ruel. Corn. Dod.

Arundo aut Calamus, Tur. Gesf. Lon.

Harundo vallaris. Ama.

Harundo vallatoria, Dod. gal. Lob. Lugd. Thal. Ger.

Arundo palustris, Marth. Lugd. Tab.

Calamus vulgaris, Cord. in Diosc.

Canna secunda, quæ fœmina Diosc. Ang.

Calamus sive harundo alia gracilis. Cæf.

II. Arundo sativa, quæ δόναξ Dioscor. & Theoph.

Atundo, Marth. Lac. Cast. Amnica, Ruel.

Arundo domestica, Marth. Lugd. Tab.

Arundo cypria, Dod. gal. Ama. Ger.

Canna quarta, quæ Donax, Ang.

Arundo magna, Gesf. hor. Italica major, Cam.

Arundo donax sive cypria, Dod.

Arundo donax sativa, Lob.

Calamus, sive harundo crassa, Cæf.

III. Arundo Anglica foliis in summitate dissectis: 2. in Prod.

IV. Arundo scriptoria atrorubens.

Κάλαμος συγγίαις, Diosc. Σύριξ, Theoph.

Syringias fistularis arundo 3. Dod. gal.

Canna tertia, Calamus scriptoria, Ang.

Harundo fistularis, Ama.

Fistula vel Syringa, & Arundo scriptoria, Ad. Lob. ico.

Canna fistularis, Tab. Ger.

Sic in China ex Arundinibus pennæ scriptoriæ fiunt [an ex hac?] in quas penicilli more pictorum nostratium indunt: in hist. Ind. Orient. par. 2. c. 26.

V. Arundo farcta maxima atrorubens, quæ Principes pro scipionibus utuntur.

Κάλαμος νέσος, Dioscoridi.

Κάλαμος τοξικός, Theophrasto.

Canna Indica, aliquibus Papyrus, Matth. Ital.

Cannæ prima species Diosc. Ang.

Arundo Indica & septima, Dod. gal.

Arundo Indica, cum teres sit, Papyrus antiquorum non rectè statuitur, Guiland. pap.

Juncus, papyri Ægyptiæ genus, Ama.

Nastos vel farcta, Ad. Lob. ico. tertia, Tab.

Nastos Clusij, Ger.

VI. Arundo farcta geniculata sive sagittalis.

Nastos & Arundo prima, Dod. gal.

Nastos sive farcta altera toxica, Lob. ico.

Arundo farcta seu Nastos 1. Tab.

Calamus sagittalis, Ger.

In Bali Insula, gestant Cannas sagittivomas, ex quibus teretes exilesque sagittulas ex Arundine fabrefactas [an ex prædicta Arundine?] in apice verò intoxicatas, effiant: in hist. Ind. Orient. part. 3. c. 39.

VII. Arundo farcta flava.

Ζευγίτης καὶ ἐνὸς χιῶς, Theophrasto.

Arundo fœmina & secunda, Dod. gal.

Nastos, seu farcta, sive toxica gracilis & plicatilis, Lob. ico.

Nastos secunda, Tab.

Arundo farcta, Ger.

VIII. Arundo repens vel Chamæcalamus.

Arundo humilis, Gesf. hor.

Arundo tertia in maritimis, Cæf.

Arundo epigejos, Lugd.

## ARUNDO INDICA.

I. Arundo arbor: in qua humor lacteus gignitur, qui Tabaxir, Avic. & Arabibus dicitur. Mambu Indorum, in cujus arundinibus Tabaxir sive Saccar. Mambu, Garziæ. Mambu sive arbor Tabaxir, Lugd. Frag. Spodium aut Tabaxir Persianorum, Acoft. Spodium, Cast. Frag.

Hi duo secuti errorem Gerardi Cremonensis, qui in Rhafi Tabaxir Arabum per Spodium reddit: cum *σποδός* sive Spodium, sit Tutia Arabum, cujus in externis remedijs solum usus est. Tabaxir verò in Arabum compositionibus, intra corpus sumatur.

Est autem Tabaxir (ut habetur in 4. part. Ind. Orient. c. 14.) medulla arundinis Mambu sive Bambus, & vocatur Saccar Mambu, id est, Saccharum de Mambu, quod propter insignem vim medicamentosam magni fit, & ab Arabibus, Persis, & Aethiopibus, qui illud Tabaxir vocant, avidè coëmitur.

Harundo Indica, Clus. exor.

Bambus sive Iunc. Indic. 4. p. Ind. or. c. 14 fig. 12. Bambu, Mambu, ex qua Tabaxir, part. 4. Ind. Orient. cap. 3.

Canna Tabaxir & Arundo, quam Indi Bambus vocant, Idem.

Sunt arundines aspectu gratissimæ, præaltæ, nigrae, rotundæ, crassæ, ita ut utraq; manu vix junctim includas, imò femoris crassitie. Crescunt sponte in Norsingæ Regno ad litus, & universo littore Malabar, præcipuè juxta Choromandel. Indi ex ijs domos suas ædificant, ut in Terenate, quas findunt, & singulari industria intorquent: part. 5. Ind. Orient. Sic in Pegu etiam, & stramine reguntur: par. 7. Ind. Or. c. 35. & 37. & in civitate Bantam, cuncta ædium sublicia ex his arundinibus assulatim dissectis constant: 3. part. Ind. Orient. cap. 22. Imò ad lecticas Pallankyns dictas vulgò, utuntur, in quibus mulieres per publicum deferunt. Sic & naviculas, duobus viris capiendis aptas faciunt: par. 2. Ind. Orient. 17. & par. 4. c. 14. Hac adversarij, quem vitâ omnino exuere nolunt, dorsum contundunt: par. 2. Ind. Orient. cap. 32.

Arundines in Indiæ Occident. sylvis (an eadem cum priore?) non raro nascuntur, crassitudine cruris humani, quæ adeò teneræ, ut singulæ stantes uno ictu gladij secantur: aridæ ve-

rò tanta duritie, ut fissis illis, & in modum Chirurgicorum scalprorum efformatis, sagittas suas ita arment Barbari in Brasilia, ut uno ictu feras humi fundant, &c. in Ind. Occident. hist. part. 3. c. 12.

Cannæ seu arundines editissimæ nascuntur, quarum quodlibet interseptum mensuræ Hispanicæ capax est: hæ structuris ædium etiam adhibentur: in hist. Ind. Occident. l. 4. c. 30.

Cannarum Hierosolymitanarum nomen quoq; occurrit in hist. Ind. Orient. part. 4. c. 6.

## II. Arundo Saccharifera.

Arundo octava, vel saccharata, Dod. gal.

Harundo ex quo Saccharum.

Melicalamus, Cord. hist.

Mel arundinis quibusdam Saccharum, Lon.

Arundo Saccharata, Dalech. in Diosc.

Sacchari canna, Gesl. hor.

Arundo saccharina Indica, Ad. Lob. ico. Lugd.

Canna mellea, Cæs.

Arundo & calamus saccharinus, Tab.

Calamus Indicus, par. 6. Ind. Or. c. 19.

Calamus Indicus Saccharites, & Canna Saccharina, in hist. Ind. Orient. par. 4. 5. & 6. c. 38.

& hist. Occid. Ind. part. 3. 4. 8. & 9.

De Sacchari differentijs, & conficiendi modo, in nostris in Matthiolum notis, & lib. de compositione Medicam. egimus: Vide & Munsteri cosmograph l. 2. c. 91.

## III. Arundo Indica versicolor.

Canna de Bengala Lusitanis: in Regno Bengala crescunt Arundines versicolores, medulla plenæ, crassitie arundinibus Hispanicis similes, paulò tamen tenuiores: virides adhuc, lentæ inflectuntur, ad stanni modum, aut instar Salicis, foris punctis versicoloribus notatæ sunt, haud fecus ac si arte ita pictæ forent. Utuntur ijs in Lusitania mulieres vetulæ pro scipionibus, quibus gressus titubantes sustinent, quarum varia genera apud Doct. Paludanum videre est: in hist. Ind. Orient. p. 2. c. 18.

## IV. Arundo Indica versicolor flexilis.

Rota vocât in Bengala, aliud genus ejusdem arundinis, quod gracilius & succinctius est, viminis ad modum flexile, ex quo Calarhi & alia multa pulcherrima conficiuntur: ex hist. Ind. Orient. part. 2. cap. 18.

## V. Arundo Indica punicea mollis.

Arundo vel Scirpi potius genus punicei coloris & mollis, quam parumper contortam, arcui pro

pro nervo adaptant: nascitur in Regno Congiano, & in regno Bengala ad Gangen fluvium, hist. Ind. Orient. part. 1. c. 5.

VI. Arundo Indica volubilis.

Arundo Indica in Insula Sumatra, variè se circa arbores vinciens, centum, ducentarum, imò trecentarum, & plutium Orgyarum longitudine, ita ut vix ejus origo finisve deprehendi possit, circulis vasariis conficiendis, valde accommoda: ad Clusij curas posteriores.

VII. Arundo Indica fluitans.

Trombas sive arundineta fluctuantia in Bali Insula: in hist. Orient. Ind. part. 3. c. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. pingitur.

Arundines longæ seu Algæ in salo fluctuantes, par. 5. Ind. Orient.

VIII. Tubuli arundinacei ad Asthma.

Refert Manardis, & ex eo Lugd. hist. ex Hispaniola adferri tubulos cannarum, qui extrinsecus & intrinsecus, gummi illiti sunt, quod Tabaci succum esse putant. Addit Clus. incolas

Virginæ frequenter uti tubulis quibusdam ex argilla factis, ad Tabaci fumum hauriendum: quales apud Anglos in frequenti usu.

IX. Arundo Indica latifolia.

Canna Indica, Ges. hor. Clus. hisp. [cui & flos cancri nonnullis,] Cam. [cui & Xiphium Indicum,] Cæs. rubra, Eyst.

Arundo Indica florida, Ad. Lob. & Canacorus quorundam, quod inter Cannam & Aconem ambiguae naturæ sit, quare & Calamacorus.

Papyrus, Cast.

Gladiolus Indicus, Cam. ad Matth.

Arundo seu Canna Indica, Lugd. cum duplici figura.

Arundo Indica latifolia sive florida, & Harundo liliiflora Tab.

Harundo florida, Ger.

X. Arundo Indica latifolia, flore luteo punctato: quæ 3. in Prod.

Canna Indica lutea rubris maculis punctata, vel flore croceo guttato, Eyst.

## PAPYRUS ET QUÆ

pro Papyro usurpantur.

**C**UM Papyrus in Aegypto res sit cognata Arundini, secundum Plin. l. 24. c. 11. imò & Calami chartis serviant, eodem, lib. 16. c. 36. autore: idcirco papyrum, & ea quæ in novo Orbe Papyri vicem præbent, subjiciamus.

I. Papyrus Nilotica sive Ægyptiaca. *πάπυρος*, Diosc. & Theophrasto.

Papyrus, Plinio & Alpino.

Papyrus Ægyptia sive Biblus Ægyptia Eustachio, Guil. pap.

II. Papyrus Syriaca vel Siciliana.

Sari, Theophrasto.

Biblos secunda, Eustachio.

Papyri altera species, quæ Paperus in Sicilia, Guiland.

Papyrus, Cæs. Nilotica, Ad. Tab. Ger.

Papyrus Ægyptia, Penæ, Lugd.

Cum in novo Orbe diversarum arborum foliis & corticibus pro papyro urantur, sequentia nominare tantum lubet, siquidem ad arbores pertineant.

I. Palmera humilia, Scalig. Lugd.

II. Guaiabara in Insula Hispaniola, ex Oviedo, Lugd.

III. Copey, ibidem apud eundem.

IV. Tal, in provincia Mangi, Lugd.

V. Lantor, palmæ Indicæ genus, cujus folia

viri longitudinem æquant: hist. Ind. Orient. part. 4. c. 3. & 6. & pingitur fig. 15.

VI. Ficus Indicæ foliis & Turcæ utuntur, hist. Ind. Orient. part. 6. c. 38.

VII. Palmæ, nuces Indicas Cocos gignentis, arboris substantiam plicabilem usurpant. hist. Ind. Orient. par. 4. c. 12.

VIII. Arboris foliis sex brachiorum longis, cujus folio extenso, tres, quatuorve viri, in itinere operiuntur, ut pluvias non metuant: ex Nicolai Costini itinerario, Lugd. histor. refert.

IX. Papyrus ex lava, est liber arboris tenuissimæ membranæ instar, ut ex Clusij notis, Lugd. hist. proponit.

Papyrifera arbor libro tenuissimæ membranæ instar candido, Clus. exor. l. 1. c. 4.

an Pannus è libro arboris quo in Insula Tidoræ fœminæ pudenda tegunt, Pigafettæ.

X. Arboris liber subpunice coloris, Clus. l. cit. qui & Filorum tenuissim. ex arboris

cortice confectorum ibidem meminit.

ixicani papyrum & pergamenum conficiunt :

XI. Melt five Magnei, ex hujus folijs, Me- | Duretus de admirabilibus plantis.

## TYPHA EIUSQUE SPECIES.

**T**ΥΦΗ Diosc. l. 3. c. 133. meminit, cui florum effigies turbinata, quasi typhonis sese gyantis turbinem, aut gigantis staturam minacem signaret, nomen dedisse videtur : vel potius τίφη à τίφη quod locum palustrem notat.

Duplex est, palustris & cerealis. Theophrast. utriusque meminit : alterius 4. hist. 11. in lacu Orchomenio nascentis : alterius, inter frumentacea, 2. hist. 4. & 4. caussas plant. 6. At Dioscorides de prima, de qua Plinius l. 16. c. 36. inter aquaticos Culamos egit.

### I. Typha palustris major.

τίφη, Dioscorid. & Theophrasto.

Typha aquatica, Trag. Lugd.

Typha, Matth. Fuch. Ama. Lac. Tur. Cord. in

Diosc. Lon. Ad. Lob. Cast. Tab. Ger.

Typha palustris, Ruel. Cæs. aquatica, Cestrum morionis, Dod.

Papyri species, Dod. gal.

Ulvæ, Ang.

Juncus asper Dod. Lugd.

### II. Typha palustris clavâ gracili.

Typha media, Clus. pann.

### III. Typha palustris minor.

Typha minor, Ad. Lob. ico. Lugd. minima, Clus. pann.

Typha minor sive Typhula, Tab.



## SECTIO QUARTA.

### DE FRUMENTO.

Triticum, Zea, Hordeum, Secale, Avena, Ustilago, Oryza, Milium, Panicum, Phalaris.

**F**RUMENTACEA dicuntur, quaecunque geniculato culmo, & foliis harundinaceis constant, semeng, panificio & pultibus aptum, in spicis aut jubis producant, ceu Triticum, Hordeum, Milium, Panicum, & his similia.

Genera prima duo sunt, per tempora satûs divisa: Hyberna, quæ circa Vergiliarum occasum sata, terrâ per hyemem nutriuntur, ut Triticum, Hordeum: Aestiva, quæ ante aestatem, Vergiliarum exortu seruntur, ut Milium, Panicum. Verum in Græcia & Asia, omnia Vergiliarum occasu feri, Plinius testis est: quedam autem utroq; tempore in Italia: ex his quadam & tertio, Veris scilicet: aliqui æm Verna appellant, Milium, Panicum, Alicam seu Siliginem.

### DE TRITICO.

**TRITICUM**, quamvis generaliter omne frumentum, quod ex spicis tritum, ac trituratione repurgatum est, significet, ut ex Varrone colligere est; posteriores tamen, peculiari frumenti speciei Tritici nomen tribuunt, de quo priori loco, Dioscoridem imitati, qui l. 2. c. 107. περί πυρῶν primò egit. Πυρὸς dicitur Græcis, quasi σπυρὸς, pro σπυρὸς, ἀπὸ τῆς σπέρων, secundum Etymologicum.

Genera duo fecit Dioscorides: at Theoph. 8. hist. 4. plura ratione regionum, quæ ex locis cognomina sortita sunt: quæ etiam colore & specie, & proprietate inter se differunt: quæ Plinius l. 18. c. 7. sequitur. Sic in Lyma Ind. Occident. una Tritici spica, duplò plus Hispaniis spicis fundit: in hist. Ind. Occident. part. 9. additamento.

I. Triti-

**I. Triticum hybernum aristis carens.**  
Triticum, Brunf. 4. Gef. hor. Cord. in Diosc. Cui  
& Triticum semestire Dod. Tab. five Robus,  
Colum. Dod. gal.

Tritici primum genus, Trag. Fuch. Lon.  
Siligo spica mutica, Ad. & Lob.  
Triticum spica mutica, Lugd. Ger.  
Triticum aristis carens, Cæf.  
Siligo veterum videtur, quam Plinius Tritici  
delicias vocavit.

**II. Triticum siligineum.**  
Triticum candidum, Græcorum & Galeni,  
Σιλιγινος & τριχίτης Hippocr. aut ejus interpreti  
Trago: five Olyro.  
Siligo Varroni, Columellæ & Plinio, cui &  
Sandalum.  
Tritici genus candidistrimum, Cæsalp. 1. 13.  
vocavit.

**III. Triticum æstivum.**  
Trimestre triticum Græcis τριμηνιον Theoph. &  
Dioscor.  
Seranium, Galen.  
Siliginis & tritici tertia species, Columell.  
Triticum trimestre, Portæ.  
Triticum aliud quod Vernellum vocant,  
Cæsalp.

**IV. Triticum rufum grano maximo.**  
Far five Adoreum veterum, Lugd.

**V. Triticum rufum hexastychon.**  
Tritici rufi genus aliud, Lugd.

**VI. Triticum spicâ multiplici.**  
Triticum ramosum Plinij, spicâ ramosâ, Cæf.  
Tritici quinta species, & Gran del graspo, id  
est, frumentum racemosum, Ang.  
Triticum multiplici spica, Lob. ico. Ger.  
Ble qui truche, Lugd.  
Triticum typhinum multiplici spicâ Tab.  
Triticum racemosum, Portæ.  
Spicis modo paucioribus, modo pluribus, ita

ut Matthiolus 24. spicas viderit.

**VII. Triticum semine oblongo.**  
Long gran Matisconensium, ad βελίαν Thraciâ  
Galenî accedere videtur, Lugd.

Huic congener Frumentū Scourgeon, Ruellij.  
**VIII. Triticum aristis longioribus spicâ**  
cæruleâ.

Triticum Loca vocatum alterum, & triticum  
lucidum Gallo-belgarum, Lob. ico.  
Tragus frumenti genus spicâ cæruleâ, Lugd.  
Triticum nigrum peregrinum 2. Tab.  
Triticum lucidum, Ger.

**IX. Triticum aristis longioribus spicâ albâ.**  
an Far Gallicum five barbati genus, Ruel.  
Robus five Triticum, Insularis Gallo-belgis.  
Loca vocatum, Lob. ico.

Triticum typhinum, Ger. quartum, Tab.  
**X. Triticum typhinum five Typha cerealis**  
multiplici folliculo.

Typha inter frumentacea, Theoph. Typha,  
Galeno: Typhe, Plinio.

**XI. Triticum typhinum simplici folliculo.**  
Tritici tertium genus, Trag. Fuch. Lon.  
Triticum, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Triticum Romanum Tragi, Eid.  
Typha cerealis, Ruel. Dod. gal.  
Typha Dodonæi, & Typha Fuchsi, Lugd.  
Triticum aristis circumvallatum, Ger.

Triticum typhinum, Tab. aristis munitū, Cæf.  
**XII. Triticum typhinum simplici folliculo**  
Hispanicum.

Triticum typhinum, Dod. Lugd.  
Triticum aristis circumvallatum, Lob.

**XIII. Triticum sylvestre Creticum.**  
Agriostari, id est, Triticum sylvestre grano mi-  
nore tritico sarivo, in Creta frequentis: Honor.  
Belli epist. 5. ad Clossum.

Agriostari, five Frumentum syl. Creticum,  
Pon. in Bald: Ital.

## ZEA EIUSQUE SPECIES.

**Z**EA, Ζέα, ἢ ζέα, quibusdam idem cum ἄλυσ: alii frumenti peculiaris species, quæ Latinorum  
Semen est: nam & Plinio Zea, Semen dicitur l. 18. c. 8.  
Duum generum est Dioscoridi l. 2. c. 111. ἀπλὴ ἢ σύνθετος.

**I. Zea Brizadiæta, vel Monococcus German.**  
Ζέα απλὴ, quod simplicis grani sit, Diosc.  
Spelta prima, Trag. ico. secunda, Eid. descript.  
Zea, Ang.  
Zea simplex, Matth. Lac. Cord. in Diosc.  
Zea alterum genus, Fuch.

Frumentum locale: Ruel.  
Siligo, & Zea alterum genus, Tur.  
Briza, Dod. gal. Ad. Lugdun. Monococcus,  
Lob. Ger.  
Monococcon, frumentū barbatum. Far venni-  
culum rubrum, Col. Zea. Mnesitheï fortè, Dod.



Spelta vulgò, Cæf.

Zeæ species prima, Cast.

Zea monococcus, Tab. minor & monococcus, Lugd.

II. Zea dicoccus vel major.

*Zeā dinonnes*, [quodd grana bina juncta habeat,]

Zea Diofc.

Zea, Theoph. & Galeno.

Zea, Brunf. Cord. in Diofc. Lon. Ger.

Spelta prima, Trag. descript. secunda, Eid. ico.

Zea dicoccus, Matth.

Zea altera, Matth. Lac. Cast.

Zeæ primum genus, Fuch. Tur.

Zea, Romanis veteribus Semen, nunc Spelta, Dod. gal.

Zea, vulgò Spelta, Far antiquis: Ador posterioribus, & Semen Adoreum, Dod.

Typha, Ang.

Far primum, Cæf.

Zea major seu dicoccus, Lugd.

Zea ador, Tab.

III. Zea Amylea, vel Zeopyrum Amylæum. an Far. Olyra Diofc. halic astrum trimestre cognominatum, Col.

Triticum secundum, Trag. Fuch. Lon.

Olyra, Dod. gal. Lugd.

Triticum trimestre, Cord.

Amylæum frumentum & Far halic astrū, Dod.

Frumentum vel Triticum Amylæum, Tab.

Triticum amylæum, Ger.

IV. Zeopyrum seu Triticospeltum, quodd naturam habeat *Zeias h purē*.

*Zeopyron h zymōkriton*, Galeno.

Speltæ species tertia, Trag.

Hordeum alterum, Ang.

Zeopyron, Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab.

Hordeum glabrum, Cord. hist. hexastichon, hodie hordeum sine tunica, Cord. in Diofc.

Hordeum nudum, Gef. hor. Ger. mundum, Cæf.

Hordeum *zymōkriton*, Cam.

V. Zeocryton seu Oryza Germanica.

Oryza Germanica, Trag. [cui & Tragum cereale, & candidum far,] Dod. cui & Far Gallicum, & frumenti barbatigenus Ruel. videtur.

Olyra, Ad.

Far, *Zeutscher Keiß* / Cast.

Thypha Theophrasti, Tab.

an Far Clusianum, Lugd.

Spelta in Regno Congiano, omnium frumentorum, quæ habent, vilissimum, quo porcos alunt: in hist. Ind. Orient. part. 1. lib. 2. c. 1.

Siligine abundat ex se Cambaię Regnum: hist. Ind. Orient. par. 1. lib. 2. c. 1. & Chinæ tellus feracissima est Siliginis, ibid. c. 25. & Japonensis terra siliginem fert, ibid. c. 28.

Siliginis Turcicæ, quæ Milie Abraïn dicitur, promontorium Viride perfelix: Ind. Orient. part. 3. c. 40.

## HORDEUM EIUSQUE SPECIES.

**H**ORDEUM, *Κριθὴ ἀπὸ τῆ διακριθῆναι*, quodd eo reperto & in usum recepto, glandibus spretis, à brutis homines distincti sunt: antiquissimum enim in cibis hordeum, sicuti Atheniensium ritu, Menandro autore, apparet, & gladiatorum cognomine. (ut Plin. l. 18. c. 7. loquitur,) qui Hordearij vocabantur: nunc studiosos, idiotæ sic appellare solent.

Unius Dioscorid. l. 2. c. 108. meminit: at Theoph. 8. hist. 4. Hordeum aliud rotundius minusq, aliud oblongius majusq: Item aliud candidum, aliud ad purpuram accedens. Hoc, ut & Triticum, in India Occid. semine ex Hispania delato, sæcundius & uberius enascitur, ut habetur in hist. Ind. Occid. par. 9. c. 31.

I. Hordeum polystichum hybernium.

Hordeum, Brunf. Matth. Lac. Gef. hor. Lob.

[cui & Hordeum polystichon autumnale Ad. part. alt.] Dod.

Lon. Cast. Cæf. Ger.

Hordeum majus, Trag.

Hordeum polystichum, Fuch. Tur. Dod. gal.

[cui & Hordeum Cantherinum,] Lugd. Tab.

Hordeum primum, Ang.

Hordeum secundum hyemale, Cord. in Diofc.

Polytichum dicitur quia in multos versus

spicatur: est enim differentia in spicarum forma, magnitudine & granorum numero: quoddam binos, quoddam ternos quater-nos, quinos, cumque plurimum senos versus habet: sic aliud rotundius & minus, aliud oblongius & majus, aliud candidius, aliud nigrius.

II. Hordeum polystichum vernum.

Hordeum senis versibus, Marth. Cam.

Hordeum Septentrioni notissimum *πολύσυχον*, Lob. ob.

Hor-



*Hordeum polystichon vernum*, Lob. ico. & Ad. port. alt.

*Hordeum polystichum æstivum*, & *Hordeum trimest*re polystichum, Tab.

III. *Hordeum distichon*: quoddam spicâ binos ordines habeat, Plinio.

*Hordeum αὐτὶχον* Galaticum, Columellæ.

*Hordeum Cantherinum*, Ruellio.

*Hordeum minus*, Trag.

*Hordeum distichum*, Fuch. Tur. Dod. Cord.

in Diosc. Lob. Lugd. Tab. cui & æstivum & trimestre minus.

*Hordeum binis versibus*, Matth. Cam.

*Hordei alterum genus*, Cæf.

IV. *Hordeum Causticum*.

Orzada ex Hispania nova, Monardi, Cast.

*Hordeolum* Monardis, Lugd.

Cevadilla, id est, *Hordeolum*, Monardi & Frag.

Causticum est, solum propter similitudinem huc relatum.

## SECALE SIVE ROGGA

ejusque species.

*SECALE*, moxente Plinio l. 18. c. 16. etiam *Farrago* appellatur: nonnullis *Rogga*: & duplex est, sationis tempore & magnitudine distinctum.

I. *Secale latifolium*, in Prod. descriptum.

II. *Secale hybernium vel majus*.

*Siligo*, Brunf. Ruel. Lon. veterum & *secale*, Tra.

*Secale*, Matth. Dod. gal. (quibusdam *Farrago*, non tamen est vera *Farrago*, quæ nil aliud est quam *Hordeum*,) Fuch. Lob. Tab. Ger.

*Secale* & *Farrago* Plinij, Lugd. Cast.

*Olyra*, Cord. in Diosc.

*Rogga* sive *secale* Plinij, Dod.

*Tipha cerealis* & *Tipha Theophrasti*, Portæ.

III. *Secale vernum vel minus*.

*Siligo æstiva*, Trag.

*Secale alterum*, Lugd.

*Rogga* sive *secale æstivum*, Dod.

Illud lætius, hoc gracilius, culmis paucioribus, spicâ brevior & tenuiore.

IV. *Secale luxurians*.

Clavi filiginis, Lon.

*Secalis mater*, Thal. tit. de Gramine.

An Plin. l. 18. c. 17. de hoc intelligendus, dum scribit: Inter vitia segetum & luxuria est, cum onerata fertilitate procumbunt: alij volunt Plinium intelligere id, quod Theophr. 8 hist. φυλλομαρία, insanam foliorum luxuriam, vocavit.

V. *Secale affinis peregrina*.

Nuchani, Garziæ.

*Secales* peregrinum genus, Lugd.

## AVENA EIUSQUE SPECIES.

*AVENA*, βρώμη Dioscoridi l. 2. c. 116. forsan à βρῶμα, quod cibum significat: nam ut auctor est Plin. l. 18. c. 17. Germaniæ populi hujus pulte vivunt. Theophr. 4 hist. 6. ex Zea *Avena* fieri scribit: at Plin. l. c. *Avena* primum frumenti vitium esse, & *Hordeum* in eam degenerare, refert.

I. *Avena vulgaris seu alba*.

*Avena*, Brunf. Matth. Fuch. Dod. Tur. Ama.

Lac. Lon. Ad. Cast. Tab. Lugd.

*Avena sativa* & prima, Trag.

*Avena vesca*, Ad. Lob. Ger.

*Avena frumentum*, Cord. in Diosc.

*Avenæ prima species*, Ang.

*Avena mitior & sativa*, Cæf.

II. *Avena nigra*.

*Avena altera*, Ang.

*Bromos*, Ama.

*Avena sylvestrior nigra*, Cæf.

III. *Avena nuda*.

*Avena nuda*, Ad. Lob. Dod. Tab. Ger.

## USTILAGO.

*USTILAGO*, frugum, præsertim spicarum, maximè *Avena* & *Secales*, morbus est. Theophr. 8 hist. 10. de frugum vitis agens, scribit, quadam communia esse omnibus seminibus, ut ἐξὸν, id est, Rubigo, sicut Gaza vertit: quadam verò propria quibusdam, ut Tabitudo radicis, Ciceri & Erucarum infestatio. Sic & 3. causar. 27. Rubiginis, & Plin. l. 18. c. 17. meminere.

I. *Ustila-*

## I. Vstilago fecales.

Vstilago, Trag. Dod. (cui Avenæ ac Triticici propriè morbus) Lon. Lob. Lugd. (cui præfertim Avenæ pestis est.)

Vstilago secalina, Tab.

## II. Vstilago hordei.

Vstilago polystichi, & Vstilago hordei dystichi, Lob. ico.

Vstilago hordeacea, Tab.

## III. Vstilago Avenæ: &amp; Lob. ico.

Vstilago Avenacea, Tab.

## O R Y Z A.

**O** R Y Z A Dioscoridi l. 2. cap. 117. ὄρυζον Theoph. 4. hist. 5. Oryza Plin. l. 8. cap. 7. ex qua Ptisanam fieri scribit. Per Ptisanam aliqui intelligunt Oryzam, quæ vulgo cortice nudata venalis habetur.

## I. Oryza Italica, ad differentiam Germanicæ, de qua inter Zeas.

Oryza, Brunf. Matth. Ang. Tur. Cord. in Diosc. Lac. Dod. Lob. Lon. Cæs. Cast. Cam. Tab. Oryza peregrina, Trago.

Oryzam, frumentacearum generi, Diosc. inter legumina, Galenus recenset, Lugd.

Hordeum Galaticum Columellæ, Hermolaus, Ruel. Ama. & Tab. censuere.

## II. Oryza Indiæ Orientali peculiaris.

Oryzæ peculiare genus, Regina Patensis, Hollandis obtulit, ut habetur in Ind. Or. par. 8. sed quid? Oryzam ex India originem traxisse, & per universum ferè orbem disseminatam esse, in 6. part. Ind. Orient. scribitur. Hæc præcipua omnium Indiæ Orientalis locorum annona est, part. 3. Ind. Orient. c. 39. Hinc Indis loco panis est, ex ea placentas parantibus; ex

qua in China potum faciunt, quem in Peru Aquam vocant: in Iaponia vinum, quod Iavenas Aracle nominant: & in Pegu, Aquam extrahunt, quæ cum aqua vitæ certat: part. 7. Ind. Orient. c. 36.

Distinguunt in Oryzam optimam, quam Girasol, & in viliores, quam Chambasol Indi vocant. Linscot. par. 2. Ind. Or. c. 37. & par. 4. c. 6. In summa, Oryzæ usus, universis propè nationibus, non minus quam frumentum familiaris est: ut de China, Iaponia, Philippinis, & maxima Indiæ Orientalis parte sileam, etiâ per Africam & Aethiopiam universam, Indiæ amque Occidentalem, cibus fructuosissimus est. Sic & Europæi, qui panes ex frumento habent, Oryza, obsonij vice, cum lacte aut aqua decoctâ, utuntur.

## F R U M E N T U M I N D I C U M.

**E** T S I in Canariâ frumenti varia genera habeantur: attamen potissimum apud Indos quadruplex est: Primum, Milium Indicum: secundum Mays, quod Triticum ipsorum est: tertium, quod Manigette indigetant: quartum est Oryza, quæ in Regno Congiano Mazza di Manpato, id est, semen Lusitanicum, at Malaicensis Bras appellant: & tres posteriores species delineatæ in 6. parte historiæ Indiæ Orientalis figura 14. proponuntur.

I. Frumentum Indicum, seu Milium Indic. Milium hoc spicas habet oblongas, ex granulis colore semen Cannabis æmulantibus, compositas, formâ nonnihil oblongis, utriculis sive folliculis aristis carentibus inclusis instar Dissolaci herbæ, quod trium mensium spacio succrescit: dein abscinditur, in terram mensis spacio deponitur, ut Solis calore probè exiccetur

& percoquatur: tandem spicæ à culmis refecantur, in fasciculos collectæ domum deportantur, stramine operiendis, vel muniendis ædificijs, destinato. Hoc frumenti genus optimum est, quod fractum & comminutum, candidissimum apparet, ex quo facili labore panis pinsitur, cum admodum mollescit, & attritu statim, massam conficiendis panibus aptam, præbeat. Et hoc fru-

hoc frumenti genus, semper habuerunt, etiam ante Lusitanorum adventum: hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 30.

An semen, quod Congiani Lucum vocant, canabis grana, nisi quod paulo sit majus, referens, quod molâ manuariâ, subactum & pistum, panem præbet candidum, tritico non inferiorem, hist. Ind. Orient. part. 1. l. 2. cap. 1.

an Arundinis genus granum ferens, nostro Secali aut frumento simile, quod decoctum esui est aptum: Insulæ Virgineæ historia.

II. Frumentum Indicum grano avellanæ magnitudine.

Folia habet angusta & tenuia, sed in tantam altitudinem, quemadmodum tertium, non exurgit: ex ramis frumentum illud instar nucum avellanarum dependet, quod aristas habet cum Tritico sive Mays convenientes, colore rubicundo: grana cute tenella involuta, putaminibus includuntur, & peculiaribus quasi loculis, ad modum granorum in malo Punico, ab invicem distincta: seminatur in agris, quemadmodum frumentum verum, potissimum in Africa, & quidē in peculiari quodam loco, qui nomen etiam suum inde obtinuit: & Æthiopibus, Manigette: Batavis, Grain dicitur: part. 6. Indic. Or. cap. 38.

III. Frumentum Indicum Mays dictum.

an Triticum Bactrianum Plin. l. 18. c. 7.

Frumentum Arabicum, quod Mays nominant, in hist. Ind. Orient. part. 8.

Frumentum ex Guinea, ibid.

Triticum Indicum sive Mays, quod Lusitani apud Nigritas primò seminarunt: in hist. Ind. Orient. part. 6. c. 31.

Pagatovvr, Virgineæ indigenis.

Avati fructus, ex quo Brasiliiani potum Kaavvy coquunt: Stad. par. 3. Amer. c. 7.

Milium amplum, Triticum Sarracenicum, barbaris Avati, quod idem cum Indorum Mays & Triticum Peruanum, Lerio part. 3. Amer. c. 8.

Milium Abayn, id est, Siligo Turcica in Baly. par. 3. Ind. Or. c. 40.

Frumentum Asiaticum: par. 7. Ind. Occid.

Milium Brasilianum: par. 3. Amer.

Milium in florida: par. 6. Ind. Occid.

Differentia notanda, cum duo genera, ad sex vel septem pedes, tertium ad decem in Virginea excreseat. Sic alterum crassius & rotundi-

us, ut quodè Lucanis tollitur: alterum subtilius & aridius, quod Morochen appellant.

Granum hoc magni proventus est (bis enim Martio & Junio serunt: part. 2. Ind. Occid.) cum in Peru ex uno grano 600. gignantur: at in Virginea mille & quinquaginta, & interdum bina millia reddat. Siquidem spica vel una, vel binæ, ternæ, vel quaternæ, & singulæ spicæ quinquies, sexies, & septies centena grana in Virginea contineant: apud Americanos, singuli culmi tribus quatuorve spicis onusti adolefcunt, quarum singulæ, grana centum & amplius pendunt. Sic grana alba, rubra, flava, cærulea, in Virginea sunt.

Frugum omnium communissimum Indiæ Occidentalis locis, in Peru, nova Hispania, Guatimala, Chile, & universa terra firma, in Insulis verò non item: sic & in Indiæ Orientalis aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo commiscunt: & ex hoc solo panem Arepas nominatum, & potum Chicha (potus subacidulus Cici dictus: par. 9. Ind. Occid. addit.) Indis vocatum; ut fortissimum, quod in Peru Sora dicitur.

an hæc herba quâ in Brasilia aliquando senes virilia contegunt, cujus folia duorum digitorum latitudine, paulum incurva, in longitudinem excrefcencia, veluti calamus qui spicam Milij sive Triticici Sarracenicici contegit: Lerio in Brasil. cap. 7.

Hactenus ex hist. Indica: subjiciamus recentiorum nomina.

Turcicum frumentum, Trag. (cui & Typhamagna) Fuch.

Frumentum Indicum, perperam Turcicum, Matth. Lon. Cast.

Milium Indicum Plinianum, Ruell. Gef. Ad. Lob. cui & Mays Occidentalium.

Milium Indicum, Dod. Gal. (cui & frumentum Asiaticum,) Tur. Lac. Gef. cat.

Frumenti octava species Turcic. dictum, Ang. Triticum Bactrianum sive Indicum, Cord. hist. Gef. hort.

Frumentum Turcicum, Ang. Dod. Gef. hor. (cui & Panicum peregrinum rectius,) Tab. Ger.

Triticum Indicum Fuch. & Matth. Lugd. Portę. Maizum, Monardi.

Maiz, triticum Indicum potius, quàm frumentum Turcicum dicendum, cum non ex Asia,

sed India primum sit allatum, Cam.

Maiz Indorum, Panicum Indicum, Cæs.

Mays, quod nulla specie cum Milio, quod Plinius ex India in Italiam importari scribit, convenit, Joseph. Acofta hist. Ind. l. 4. c. 16.

Variat apud nos floris colore, purpureo, rubeo, luteo, aliquando pro ratione fructus futuri: granorum in colore quatuor præcipue genera: habetur enim granis rufescentibus, nigricantibus, crocantibus, & subalbicantibus.

I V. Frumentum Ind. Mays dictum alterum.

Milium Indicum magnum aliud, Lob. ico.

Milium Indicum, Cast.

Frumentum Indicum, Tab.

Frumentum Asiaticum, Ger.

Hoc cum spicarum colore variet, idcirco Tabernæmontanus spicas sedecim, Gerardus ve-

ro 12. pingit: quæ colore sunt vel simplici, vel mixto: simplici, albo, luteo, aureo, violaceo, spadiceo, nigro: mixtis coloribus, albo, spadiceo: & cæruleo: cæruleo, albo, nigro, partimque punctis spadiceis mixto: albo, violaceo, luteo cum punctis spadiceis: rubro, nigro & spadiceo: luteo albo, aliquando cæruleo & violaceo, aliquando luteo & albo, violaceis & cæruleis punctis aspersis: rubro & spadiceo: aureo & albo: cæruleo, luteo, albo, & punctis cæruleis aspersis: denique cæruleo, luteo, violaceo & albo.

V. Frumentum Indic. Mays dictum minus. Hujus Tabern. meminit, quod prioris altitudinem tantum mediam attingat, cujus spicæ non ad culmorum latera, sed floribus succedant, colore albo, rubeo, spadiceo, luteo, atrorubente, & aliquando mixto.

## MILIUM EJUSQUE SPECIES.

**M**ilium, à miliari summa Festo, quasi millesimum granum ferat. Κέγγη Dioscor. lib. 2. cap. 119. & Theoph. 8. hist. 3. à numerosissimis & minutis granis ficuum, quæ Κέγγη αμίδες vocantur. Hippocrati secundum Galenum πένταλ. Milium, Plin. lib. 18. c. 7.

I. Milium semine luteo vel albo.

Milium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Dod.

Cord. in Diosc. Lac. Lon. Lob. Cast. Tab. Lugd.

Milium Dioscoridis, Theophrasti & Plin. Cæs.

Milium vulgare, Gef. hor. Ad. commune, Ang.

Milium aureum & album, Cam.

II. Milium semine nigro.

Milij nigri species apud Oribasium, Ang.

Milium semine nigro & latiore juba, Lob. obs.

Milij alterum genus è colore nigro deterius, Cæs. alp.

Milium jubâ subinde coloris nigricantis, Dod.

Milium nigrum, Tab. Cam. Ger.

Hoc quod in Argovia Bernatum frequenter feritur, à vulgato differt folijs latioribus, caule non adeo alto, jubâ sparsâ & minore, semine aliquantum majore & rotundiore, & ad pulres conficiendas altero longè utiliore.

III. Milium Sabæum.

Millo, frumentum in Guinea parvum, Milij forma sed dulcius, ex quo panem & vinum conficiunt in Regno Sabo: ad Clus. curas post.

IV. Milium arundinaceum subrotundo semine, Sorgo nominatum.

Milium quod ex India in Italiam in vectum nigro colore, Plinio.

Panicum Dioscoridis & Plinij, Trag.

Milium Indicum, Matth. Fuch. ico. (cui & Sarracenicum,) Gef. hor. Cord. hist. Guiland. Lugd. Cast. def.

Milium Indicum Plinij, Ang. Cam.

Milium aliud, Ama.

Panicum Indicum, Gef. hor.

Sorghij, Fuch. Dod. gal. (cui Panici species videtur,) Lon.

Sorgum, Gef. hor. Tab. (cui & Panicum loculare,) Ger.

Sorgo, Melica Italicorum, Lob. Sorgo Insubrum, Bellonio.

Melica sive Sorgum, Dod.

Melica, fortè à Meline: Sagina alijs à saginando, Calamagrostis Dioscoridis ex hoc genere videtur, Cæs.

Variat seminis colore, quod aliàs rufum, aliàs plenius nigricat: habetur & album & luteum, quod

Sorgum fructu rubro & fructu albo, Eyst.

V. Milium arundinac. plano alboque semine. Sorgo simile granum, Hæreomen Arabum, Bellonio.

Dora, Rauvvolfio.

Milium Æthiopicum, Portæ.

an Miliū album in Regno Congi, quod vocant, hist. Ind. Orient. part. prim. libro se-  
Mazza di Congo, id est, semen Congianum, cundo, cap. primo.

## PANICUM EIUSQUE SPECIES.

Εἴλυμ & μέλιν Dioscoridi lib. 2. cap. 120. Theoph. 8. hist. cap. 1. 3, 7. & 10. μέλιν & Εἴλυμ, *forſan ab ἐλύω involuo. Plin. lib. 18. cap. 7. Panicum, à paniculis quibus ſemen incēſt. Mel frugum Dioclis, eidem lib. 22. cap. 25. μελύνη, quaſi melleum quidpiam.*

I. Panicum Germanicum, ſive paniculā minore.

Miliū agreſte ſive exiguum, Trag.

Panicum, Fuch. Tur. Dod. Cord. Gefner. hor. Lon. Lob. Cæſalp. Cam. Tab. Ger.

Variat paniculis albis, flavis & purpureis: ſemen album, luteum, ruſcens: Dioſcorides frumentaceis, Gal. leguminibus jungit.

II. Panicum Italicum, ſive paniculā majore. Panicum Marcello, Herimolao, Ruellio, Marthiolo, cui & domeſticum: Anguil. Cæſalp. Portæ.

Panicum ſatium, Lugdunenſi.

Panicum vulgare, Cluſ. hiſt.

Panicum aliud Indicum, paniculā villoſā, Lob.

Panici Indici ſpica, Dodon.

Panicum Indicum, Tab. Ger.

III. Panicum Indicum ſpica obtuſa cærulea.

Panicum cæruleum Indic. Ad. Lob. ico. Cam. Tab.

Panicum Indicum, Dod. Ger. ſive peregrinum, Lugd.

Panicum Americanum, Cluſ. hiſt.

Paniculā eſt ſubcærulea, in calidioribus regionibus magis ſatura.

IV. Panicum Indicum ſpicā longiſſimā. Panici Americani ſpica grandis vel leſquipedalis, Cluſ. hiſt.

Panicum Æthiopicum ex Guinea, Cluſ. hiſt. ap. ad lib. 6.

## DE SESAMO ET ERYSIMO CEREALI.

CUM Dioſcorides & Theophrastus Sefamum inter fruges retulerint: & Plin. lib. 18. cap. 10. frumenta aſtiua dixerit, Sefama, milium, panicum: ſic & Eryſimum in Aſia & Græcia, Sefamo ſimile aſſerat: & Theophrastus 2. cauſ. plant. 17. ſemina hæc, milium, ſefamum, eryſimum inter fruges repoſuerit: & 6. cauſ. plant. 19. Sefama & Eryſimum ſicca cibo idonea, non verò viridia ſcripſerit, de utroque nunc.

Sefamum & Sefama ſimiliter Dioſcoridi lib. 2. cap. 121. Theoph. pluribus locis σῖσαμον, aliis σῖσαμη dicitur. Duplex Theophrastus agnoviſſe videtur, dum 8. hiſt. 5. inquit, Et Sefami genus quoddam candidum datur.

### SESAMUM VETERUM.

Sefamum, Matth. Ang. Tur. Lob. Dod. Caſt. Tab. Portæ.

Sefamum verum, Cord. in Dioſc. Gef. hor. Lugd. Cam.

Sefama, Cæſalp.

Sempſem, Alpino.

Semen ex Alexandria, Creta, Sicilia aſſertur.

### ERYSIMUM.

Theophrasti folio hederaceo, τραγόφυρον & φυγόφυρον, hirco-triticum & fagi-triticum, quod fagineam glandem forma triquetra & colore fordido quodammodo referat, licet multo minus ſit.

Ocymum veterum, Trago.

Frumentum Sarracenicum, Matth. Lugd. Caſt.

Tragotrophon & Fago-triticum, Dod. gal.

Eryſimi alterum genus Theoph. Cord. in Dioſc.

Irion cerealis ſive Eryſimum Ruel.

Eryſimum cereale, Gef. cat. Portæ.

Frumenti genus folio hederaceo, Eid.

Formentone, Ang. (cui Ocymum eſt Varonis) Cæſalp.

Frumentum vaccinum, Lon.

Eryſimum Theophrasti, Lob.

Fegopyron, Dodonæo, Fagopyrum, Ad. (an

Eryſimum Theoph.) Lob. ob. (& Lampſana vera quorundam,) Franco.

Ocymum cereale, Cluſ. pan. Tab.

Tragopyron, Gerard.

Polygonum hederaceum, Col.

Sarracenicum dicitur, quia ex Africa primum

delatum credatur: nam veteribus vel non cognitum, vel non usitatum, vel neglectum, Dodonæus asserit.

## PHALARIS.

**P**HALARIS Plinio lib. 27. cap. 12. *Φάλαρις* Dioscoridi lib. 3. cap. 159. an *Melia altera* Theophrasti.

I. Phalaris major semine albo.

Phalaris Dioscoridis, Trag. ico.

Phalaris, Matth. Ang. Tur. Dod. Cord. Gef.

hor. [ cui & Canariense semen, ] Lon. Lob.

Cæsalp. Cast. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Phalaris herba, Gef. car.

Milium alterum Theoph. Dalech. in Plin.

II. Phalaris major semine nigro.

Cuneno, Melitenium incolis.

Granum hoc in Melita frequens, Canariis

insulis familiare, Mafsiliæ notum, nigrum,

oblongum, milio simile, quo Canarios passe-

res præcipuè nutriunt: ex grano aliquando à

Dalechambio sato, Phalaris prodiit.



## SECTIO QUINTA.

### ASPHODELUS, PHALANGIUM.

**A**SPHODELUS sive *Hastula Regia*, quod regij sceptri effigiem, dum floret, referat. *Ἀσφοδέλης* unius Dioscor. lib. 2. c. 199. meminit, cujus florem *ἀνθεράκων* appellant: & Theophrast. 1. hist. 10. & 7. ejusd. 11. & 12. qui 1. hist. 7. *ἀνθεράκων*, pro tota planta usurpat. *Asphodelum* aliquos Heroïn appellasse, Dionysium marem ac fœminam fecisse, & aliquos *Halymon* Hesiodi existimasse, Plin. lib. 22. cap. 12. scribit. Sic lib. 21. cap. 17. testatur, Theoph. & ferè Græcos & Pythagoram, caulem *Anthericon*, radicem verò, quæ ex octuaginta simul acervatis bulbis constat, *Asphodelum* nominasse: cujus genera duo faciunt: quod etiam lib. & cap. 22. ostendit.

I. Asphodelus albus ramosus mas.

Asphodelus primus, Ang. Clus. hist.

Asphodelus major, Clus. hisp. albus, Eyft.

Asphodelus ramosus, Lob. ico. Ger.

Asphodelus caule ramoso maritimus & mas, Cæf.

Hic sæpè radicibus ducentis, aut pluribus ab uno capite dependentibus reperitur.

II. Asphodelus albus non ramosus.

Asphodelus, Marcel. Ruel. Matth. Ama. Gef. car. Lon. Cast. verus, Cord. in Dioscorid.

Asphodelus mas, Dod. gal.

Asphodelus alter, Ang. Clus. hist.

*Hastula regia*, Trag. lat. Lon. Lac. Gef. hor. Lugd.

Asphodelus albus, Gef. hor. ap. Clus. hisp.

Dod. Tab. Cam. major, albus, Lob.

Asphodelus caule simplici, Cæf.

Asphodelus non ramosus, Ger.

III. Asphodelus autumnalis.

Asphodelus autumnalis sive major, Cam.

IV. Asphodelus purpurascens foliis maculatis.

Asphodelus flore incarnato pallido, Dod. gal.

Asphodelus flore suave rubente, Lob. ico.

Asphodelus flore rubente, Tab. Ger.

V. Asphodelus luteus & flore & radice.

Asphodelus flore melino, Matth. ico.

Asphodelus luteus, Gesner. hor. Dod. Cæsalp. Lugd.

Asphodel. luteus minor, Ad. & Lob. (& *Eri-zambac* Arabum,) Tab. Lugd. Gerar.

*Iphyon* Theoph. videtur, Ang.

Asphodelus fœmina sive luteus, Cam. epit.

*Hastula*

*Hastula regia minor, & Asphodel. minor, Cast.*  
*Asphodelus luteo flore & radice, Cam.*  
*Meminere Tabern. & Gerar. Asphodeli lutei,*  
*qui albo, radicibus & floribus sic similis, sed*  
*foliis brevioribus, cauleque latis foliis cincto,*  
*quem Asphodelum luteum nominant.*

VI. *Asphodelus albus minimus.*

*Asphodelus minimus, Clus. hist.*

VII. *Asphodelus foliis fistulosis.*

*Asphodelus tertius aliquibus maritimus, Gef.*  
*hort. ap.*

*Asphodelus minor, Clus. Dod. Lugd. Cam.*

*Phalangium Cretæ Salonensis, Ad. Lob. Lugd.*  
*Ger.*

*Phalangij alterum genus, Cæs.*

*Phalangium Narbonense, Tab.*

VIII. *Pseudoasphodelus palustris Anglicus.*

*Asphodelus luteus palustris, Dod. Tab.*

*Asphodelus palustris, Lugd.*

*Asphodelus minimus luteus acori fol. palust.*  
*Lob.*

*Asphodelus acorifolius palustris luteus, Ad.*

*Asphodelus Belgicus palustris luteus, Lob. ad.*  
*part. alt.*

*Pseudoasphodelus primus vel major, Clus.*  
*hist.*

IX. *Pseudoasphodelus palustris Scoticus.*

*Asphodelus minimus Noruegicus luteus palu-*  
*stris Scoticus & Lancastriensis, Lob. advers.*  
*parte secunda.*

*Asphodelus Lancastriæ, Gerar.*

X. *Pseudoasphodelus alpinus.*

*Pseudoasphodelus pumilio foliis Iridis, Clus.*  
*pan. vel secundus, Eid. hist.*

## PHALANGIUM EIUSQUE

Species.

**Φ**αλαγγίς *Diosc. lib. 3. cap. 122. meminit : sic dictum Galeno, 8. simpl. facult. quòd de-*  
*morſis à Phalangis auxilietur, cui Φαλαγγίτης, & Plin. lib. 27. cap. 12. Phalangites,*  
*à quibusdam Phalangium, ab aliis Leucanthemum vocatum.*

I. *Phalangium magno flore.*

*Phalangium, Matth. Cast. majus, Gef. hor.*

*Phalangium Matthioli, Lugd. Tab.*

*Phalangium Allobrogicum majus, Clus. hist.*  
*ap. 2. Eyst.*

*Phalangium Dalechampij, Lugd.*

*Lilium polyrhizon Myconi, Lugd.*

II. *Phalangium parvo flore non ramosum.*

*Phalangites quorundam, Cord. in Diosc.*

*Liliago, Cord. hist. ejus Scholiaſti, Asphodelus*  
*Germanicus.*

*Liliago Cordi, Asphodeli ſyl. ſpecies, Thal.*

*Phalangium non ramosum, Lob. Dod. Tab.*  
*Ger.*

*Phalangium cauliculis ſimplicibus, Cæſalp.*

*Liliaſphodelus albo flore quibusdam.*

*Phalangio Allobrogico congener, vel Phalan-*  
*gium montanum, Clus. cur. poſt.*

*Eſt majus folio longiore, & latiore, ſemi-*  
*ne majore : eſt alterum in quo omnia mino-*  
*ra, & folia anguſtiora, in monte Waſſerfall:*  
*cujus radices ſæpè pro Ruſci veri radicibus,*  
*magno errore divenduntur.*

III. *Phalangium parvo flore ramosum.*

*Moly alterum Plinij, Dod. gal.*

*Phalangites ſive Palangium herba, Gefner.*  
*hor.*

*Phalangium ramosum, Lob. Dod. Lugd. Tab.*  
*Ger Eyst.*

*Phalangium, Asphodelus parvus dici poſſet,*  
*Cæſalp.*

*Phalangium majus, Cam.*







## S E C T I O S E X T A.

XYRIS, IRIS, ACORUS, GALANGA, ZIN-  
ZIBER, ZEDOARIA, COSTUS, CURCUMA  
ET CROCUS INDICUS.

### X Y R I S.

**ΞΥΡΙΣ** ob folij similitudinem, quasi rasorium cultrum dicitur, de qua Diosc. lib. 4. cap. 22. *Ἰρις ἀγρία*, Iris sylvestris Theophrasto : Plin. lib. 21. cap. 20. Iris sylvestris, à quibusdam Xyrin vocata. Spatula fetida, tum ob figuram folij gladiolum referentis, tum quod gravem odorem exhalet, vulgò dicitur.

#### I. Gladiolus foetidus.

Xyris five Iris sylvest. Dioscoridi.

Sparganium five Xiphidion, Offic. spatula foetida, Ruel. Ama.

Spatula foetida, Trag. (cui & Gladiolus Italic.)

Fuch. Lon. Gef. hor. Ang. Cæf. Tab. Dod.

Xyris, Matth. Lac. Tur. Cord. Cornaro, Lob.

Cast. Cam. & Ger.

Xyris vel Iris agria Theo. Dod. gal. Ad. Lob. ico.

Xyris Matthioli & Lobeli, Lugd.

Cum Matthioli & Lobeli figura, radice forma differant, idcirco in historia Lugdunensi duæ figuræ positæ : dum enim adhuc juvenca est, radicem habet fibrosam seu capillarem : ubi verò adolevit, crassa est. Flos communiter obsoletè purpureus : aliquando saturata purpura arridet, rariùs rubet.

#### II. Gladiolus foetidus maritimus.

Xyris maritima, quam fluctus in littora, cum aliis purgamentis rejiciunt, Lugd.

### IRIS ET EIUS DIFFERENTIÆ.

**IRIS**, Ἰρις Diosc. l. i. c. 1. à cælestis arcus similitudine nomen accepit. Species complures esse, colore floris differentes, idem ostendit, nempe candido, pallente, luteo, (alii nigros legunt,) purpureo, cæruleo, seu cyaneo. Quam colorum diversitatem non in uno flore reperiri, videtur Dioscorides, (ut aliqui credunt,) voluisse : siquidem de Illyrica maxime loquatur, quam Brassavolus in Illyrico plerumq; candidis, aliàs pallidis, nonnunquam luteis & etiam purpureis conspexit. Theo. 6. caus. 13. Iris odorata est, & à gratia palati nomen accepit, quæ in Illyride (6. caus. 28.) melior quàm in Macedonia : in Thrasia verò, locisq; frigidioribus odore penitus caret. Gaza Iridis vocem Consecratricem vertit. Plin. l. 21. c. 7. Iris diversicolor specie floret, sicut & arcus cælestis, unde & nomen : laudatissima in Illyrico ; proxima in Macedonia, quæ longissima, candicans, & exilis : tertium locum habet Africana, quæ amplissima & gustu amarissima. Illyrica quoq; duum generum : Raphanitis, à similitudine, (sortè Astragalites Gal. & Aëtij,) quæ & melior : Rhizotomos subrufa : non improbat & Pisidica.

Recentiores multas differentias agnoscunt : quare dividemus in eam, quæ radice est geniculata, & eam quæ radice est bulbosa : hæc enim & foliorum latitudine angustia, florisq; colore, & ratione loci natalis variant.

#### IRIS LATIFOLIA.

##### I. Iris vulgaris Germanica five sylvestris.

Iris, Brunf. Gesner. cat. sylvestris, Matth. Lac.

Cord. hist. Cast. Lugd. Tab. syl. prima, Advers.

Iris syl. major, Matth. ep. Gef. hor.

Iris Germanica, Fuch. cærulea, Dod.

Gladiolus cæruleus major, Trag.

Iris latifolia major vulgaris, Clus. hist.

Iris biflora, Ger. ico.

Hæc est, quam in tectorum culminibus, vixnearum



nearum macerij & muris plantare consueverunt, quæ in hortis translata, cultura speciosior redditur.

## II. Iris hortensis latifolia.

Iris Germanica, Trag. Domestica, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Iris, Tur. Ang. Dod. Cord. in Diosc. Lon. Tab.

Iris communis, Gef. hor. vulgaris, Lob. Ger.

Iris nostra sativa, Cord. hist.

Iris, Hyacinthus Virgilij, Columellæ & Palladij, Ang. Cam.

Iris major cærulea, vel purpurea, Cam.

Iris latifolia vulgaris cærulea, Eyf.

## III. Iris hortensis pallidè cærulea.

Iris cujus flores aquæ cyaneum colorem referunt, Dod.

Iris dilutè cærulea involucri albo, Tab.

Iris Chalcedonica, Ger. ico.

Iris latifolia major obsoleta, Clus. hist.

## IV. Iris hortensis alba Germanica.

Iris albo flore, Gef. hor. alba, Tab. Ger.

Iris vulgaris candidis floribus, Lob. ico. Lugd.

Iris candida, Dod. sub Iride altera.

## V. Iris alba Florentina.

an Iris Africana Dioscoridis?

Iris sativa floribus nivei coloris, Matth.

Iris Florentina seu fœmina, Gef. hor.

Iris Florentina, Ireos officin. Dod. gal. Lon. Ad.

Tab. Ger. Franco, Eyf.

Iris Illyrica, Cord. in Diosc.

Iris flore ex toto candido, Cæs. alp.

Iris major alba, Illyrica vulgo vel potius Florentina, Cam.

Iris latifolia major alba, Clus. hist.

Hæc Florentina à Germanica differt, quòd hujus radix siccata: non secus ac vulgaris cærulea, corrugatur: illius verò non, quæ etiam radice minor est: in officinis nostris Illyrica habetur, quæ Venetijs adfertur, quæ rufescit, minus nitida est, at odore est suaviore.

## VI. Iris Illyrica.

Iris Illyrica, Eyf. quæ à Florentina aliquantum differt, quòd hujus flos candidissimus sit, cum Illyricæ sit coloris dilutè cærulei pallentis & odore remissiore.

## IRIS LATIFOLIA PERE-

grina major.

I. Iris Sufiana flore maximo ex albo nigricante.

Iris Sufiana, Clus. pan.

Iris Chalcedonica variegata, Lob. Tab.

Iridi luteæ variegatæ in Lugd. hist. jungitur.

Iris Camerarij, Ger. ico.

Iris latifolia major prima, Clus. hist.

Iris Chalcedonica latifolia, Eyf.

Iris Pharaonis, vel nigra Cretica quibusdam.

## I I. Iris Asiatica cærulea polyanthos.

Iris Asiatica cærulea, Clus. pan. sive latifolia major 2. Eid. hist.

Iris Dalmatica major, Lob. ico. Lugd. Tab. Ger. ico.

## III. Iris Asiatica purpurea.

Iris Asiatica purpurea vel 3. Clus. pan.

Iris latifolia major 5. Eid. hist.

Huc referantur

Iris latifolia violaceo colore major, &

Iris latifolia major variegata, Eyf.

## IV. Iris peregrina subrubens inodora.

Iris major latifolia sexta, Clus. hist.

## V. Iris peregrina odore oxyacanthæ.

## VI. Iris major latifolia 24. Clus. hist.

## VI. Iris Dalmatica major,

Iris Dalmatica major, Clus. hisp. ut Lob. Lugd. desc. Cam. Tab. Ger. & Chalcedonica 2. Tab. icon.

Iris major latifolia 3. Clus. hist.

an Iris Lusitanica verna, Lob.

## VII. Iris Byzantina purpureo cærulea.

Iris major latifolia 18. Clus. hist.

## VIII. Iris Damascena polyanthos.

Iris major latifolia 4. sive Damascena, Clus. hist.

## IRIS LATIFOLIA GERMA-

nica & Pannonica.

## I. Iris latifolia Germanica odore suavi.

Iris major latifolia 7. Clus. hist.

## II. Iris latifolia Germanica odore Sambuci.

Iris major latifolia 8. Clus. hist.

## III. Iris latifolia Germanica ochroleucos.

Iris major latifolia 28. Clus. hist.

IV. Iris latifolia Germanica candido purpurea.

Iris major latifolia 21. Clus. hist.

## V. Iris latifolia odore oxyacanthæ.

Iris exotica, Camer. vel Iris 5. Clus. pan.

Iris major latifolia 14. Clus. hist.

VI. Iris latifolia Pannonica colore multiplici,

Iris

*Iris varia caulifera*, vel *Iris* 4. Clus. pan.

*Iris major latifolia* 15. Clus. hist.

*Iris Pannonica* 4. Clusij, Tab.

*Iris lutea variegata*, Ger. icon.

VII. *Iris latifolia alba viridis*.

*Iris major latifolia* 16. Clus. hist.

VIII. *Iris latifolia caule aphylo*.

*Iris* 7. & *Iris caulifera purpurea* 1. & 2. Clus. pan.

*Iris major latifolia* 25. & 26. Clus. hist.

Variat: in illa, folia circa caulem minus, in hac, magis purpurascunt.

IX. *Iris latifolia candida*, purpureis venis distincta.

*Iris major latifolia* 27. Clus. hist.

*Iris Portugalica*, Eyfset.

### IRIS LATIFOLIA

Belgica.

I. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci.

*Iris Lusitanica verna*, Lob. quoad icon.

*Iris latifolia major* 9. Clus. hist.

II. *Iris latifolia Belgica versicolor* odore Sambuci.

*Iris major latifolia decima*, Clus. hist. def. Eyfset.

III. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci altera.

*Iris latifolia major* 11. Clus. hist.

IV. *Iris latifolia Belgica variegata*.

*Iris major latifolia* 12. Clus. hist.

V. *Iris latifolia Belgica cærulea versicolor*.

*Iris major latifolia* 13. Clus. hist.

VI. *Iris latifolia ex albo pallescens striata*.

*Iris major latifolia* 17. Clus. hist.

VII. *Iris latifolia humilior purpurea*.

*Iris major latifolia* 19. Clus. hist.

VIII. *Iris latifolia humilior versicolor*.

*Iris major latifolia* 20. Clus. hist.

### IRIS BIFLORA.

I. *Iris biflora* flore minore, odore lilij convallij.

an *Raphanitis* Plinij: & *Astragalites* Aëtio.

*Iris biflora*, Clus. hisp. Lugd.

*Iris biflora Lusitanica*, Lob. Dod.

*Iris latifolia major* 22. Clus. hist.

II. *Iridi bifloræ affinis* flore majore.

*Iris Illyrica*, vel *Iris* 6. Clus. pan.

*Iris major latifolia* 23. Clus. hist.

an *Iris Byzantina*, Camerarij huic similis?

III. *Iridi bifloræ affinis* minor.

*Iris Dalmatica minor*, Clus. hisp. Lob. Lugd.

*Iris latifolia major* 18. Clus. hist. quoad icon.

### IRIS LATIFOLIA

Lutea.

I. *Iris lutea sativa*.

*Iris sativa floribus aureis*, Matth.

II. *Iris lutea variegata* Lobelij.

*Iris lutea variegata*, Lob. Lugd.

III. *Iris lutea variegata* Camerarij.

*Iris variegata* è luteo & purpureo, Cam.

Duplicem habet, aliam folijs languidis, aliam erectis.

*Huc referenda.*

*Iris Pannonica variegata*, Eyfset.

Flores purpurea flavescit, & lineis purpurascens, tibus distinguitur.

IV. *Iris media longissimis folijs lutea*.

*Iris Tripolitana* mediam inter latifolias & angustifolias, Clus. hist.

### IRIS ANGUSTIFOLIA.

I. *Iris pratensis angustifolia folio foetido*.

*Iris angustifolia media*, Clus. hisp.

*Iris angustifolia major*, sive prima, Clus. hist.

*Iris folijs angustis prima* Clusij, Eyfset.

II. *Iris pratensis angustifolia non foetida altior*.

*Iris angustifolia media*, sive *Iris angustifolia Pannonica* vario flore, & *Iridis undecimæ species prior*, Clus. pan.

*Iris sylvestris Byzantina peramœna*, Lob. ico. & Ger.

*Iris syl. angustifolia major*, Tab.

*Iris undecima* Clusij, Camer.

*Iris tenuifolia*, Thal.

*Iris angustifolia altera*, Clus. hist.

*Iris pratensis major*, Eyfset.

III. *Iris pratensis angustifolia humilior*.

*Xiphion*, seu *Gladiolus cæruleus minor*, Trag.

*Iris tenuifolia*, Cord. hist. Gef. hor.

*Iris minor seu tenuifolia*, Dod.

*Pseudoacorus cæruleus* Tragi, Lugd.

*Iridis undecimæ altera species*, Clus. pan.

*Iridis angustifoliæ secundæ species altera*, Eidem hist.

*Xyris minor*, Camer.

IV. *Iris angustifolia maritima major*.

*Iris maritima Narbonensis*, Advers.

*Iris sylv. maritima Narbonensis*, Lob. ico.  
*Iris angustifolia media*, vel ejus prima species, Clus. hisp.  
*Iris sylv. altera*, Penæ, Lugd.  
*Iris maritima*, Camer.  
*Iris angustifolia* 3. Clus. hist. at 1. quoad icon.  
 V. *Iris angustifolia maritima minor*.  
*Iridis angustifoliæ mediæ altera species*, Clus. hisp.  
*Iris angustifolia quarta*, Clus. hist.  
 VI. *Iris angustifolia hortensis versicolor*.  
*Iridis angustifoliæ tertiæ species*, Clus. hisp.  
*Iris angustifolia quinta*, Clus. hist.  
 VII. *Iris angustifolia candida lineis rubentibus notata*.  
*Iris candidis floribus angustifolia*, Lobel. ad. part. 2.  
 VIII. *Iris angustifolia bicolor*.  
*Iris flore cæruleo obsoleto cinereoque polyflora*, Lob.  
*Iris flore cæruleo polyanthos*, Lugd.  
 IX. *Iris angustifolia prunum redolens minor*.  
*An Rhizoromos* Plinij.  
*Iridis Illyricæ nomine ostensa* Hermolao.  
*Iris perpusilla sylv. angustifolia*, Lob. observ.  
*Chamæiris angustifolia*, Eid. ico. minor, Tab. Eyfster.  
*Chamæiris*, Dod. & Lugd. odoratissima, Cam.  
*Iris angustifolia humilior*, Clus. hisp.  
*Iris angustifolia minor*, vel 12. Eid. pan.  
*Iris peregrina*, Illyrica vulgo, Cæsalp.  
*Chamæiris* vel *Iris humilis*, Cam. in Marth.  
*Chamæiris tenuifolia*, Ger.  
*Iridis angustifoliæ sextæ species altera*, Clus. hist.  
 X. *Iris angustifolia prunum redolens major*.  
*Iris sylvestris minor*, Marth. Cast.  
*Iris sylv. altera*, Ges. hor. Lugd.  
*Chamæiris angustifolia*, Tab. Ger.  
*Iridis angustifoliæ sextæ species prima*, Clus. hist.  
*Chamæiris odore carens*, Cam.

C H A M Æ I R I S.

I. *Chamæiris major saturatè purpurea biflora*.  
*Chamæiris latifolia biflora*, Eyfster.  
 II. *Chamæiris variegata*.  
*Iris perpusilla latifolia*, Lob. observ.

*Iridis perpusillæ latifoliæ varietas*, Eid. ico.  
*Irid. humili latifoliæ similis*, Clus. hisp.  
*Chamæiris seu alia perpusilla Iris latifolia*, Lugd.  
*Iris sylv. minor latifolia*, Tab.  
*Iris violacea*, Ger. ico.  
*Chamæiridis latifoliæ genus 1. cum icone Chamæiridis niveæ Lobelij*, Clus. hist.  
 Flos ex cæruleo dilurus aut candidus, aut pallens, aut purpureus, aut violaceus: huc pertinet.  
*Chamæiris cæruleo & violaceo colore*, Eyfster.  
 III. *Chamæiris flore saturo violaceo*.  
*Chamæiris latifolia Pannonica major*, vel *Iris octava*, Clus. pan.  
*Chamæiris latifolia major*, addida figura *Chamæiridis latifoliæ flore rubello Lobelij*, Clus. hist.  
 Flos hujus aliquando purpureus, aliquando eleganter cæruleus est.  
 IV. *Chamæiris minor, flore purpureo*.  
*Iris minor*, Dodon.  
*Iris violacea parva*, Lob. ico.  
*Chamæiris latifolia minor purpurea*, vel *Iridis 9. species prima*, Clus. pan.  
*Chamæiris latifolia minor prima*, Clus. hist.  
 Flos saturationis purpuræ, odoratus: interdum dilurior & inodorus.  
 V. *Chamæiris minor flore purpureo cæruleo*.  
*Chamæiris latifolia minor cærulea*, vel *Iridis 9. species altera*, Clus. pan.  
*Chamæiris latifolia minor 2. Clus. hist.*  
 VI. *Chamæiris minor flore rubello*.  
*Chamæiris latifolia flore rubello*, Lob.  
*Chamæiris latifolia minor rubescens*, vel *Iridis 9. species tertia*, Clus. pan.  
*Chamæiris latifolia minor tertia*, Clus. hist.  
 Floris colore variat purpureo, cæruleo, rubescente, pallido, albo & vario: est flore odoro & inodoro.  
 VII. *Chamæiris minor flore variè picto*.  
*Chamæiris latifolia minor septima*, Clus. hist.  
 VIII. *Chamæiris flore purpureo flavescente*.  
*Chamæiris latifolia minor octava*, Clus. hist. Eyfster.  
 Huc referri debet  
*Chamæiris flavo & purpurascens flore*, Eyfster.  
 IX. *Chamæiris flore pallido & albo*.  
*Chamæiris latifolia minor*, vel *Iridis 9. species 4. Clus. pan.*

*Chamæiris latifolia minor* 4. Eid. hist.

Huic similis est.

*Chamæiris latifolia minima*, Eyf.

X. *Chamæiris minor* flore variegato.

*Chamæiris latifolia minor varia*, vel *Iridis* 9. species 5. Cluf. pan.

*Chamæiris latifolia minor* 5. Eid. hist.

XI. *Chamæiris* flore luteo, vel candido.

*Iris minor lutea*, Dod.

*Chamæiris lutea altera*, Lob. ico.

*Chameiris nivea*, aut candida, Eidem. & Eyf.

Huc pertinet,

*Chamæiris* flore argenteo & flore candido, Eyf.

XII. *Chamæiris* flore obsoleto pallido.

*Chamæiris latifolia minor sexta*, Cluf. hist.

XIII. *Chamæiris* flore pallidè luteo, vel

*Chamæiris minor* ὡχρόδουν.

*Chamæiris latifolia minor nona*, hist.

XIV. *Chamæiris minor* flore purpureo.

*Chamæiris latifolia minor* 10. Cluf. hist. Eyf.

XV. *Chamæiris* candicans venis variis distincta.

*Chamæiris latifolia minor* 11. Cluf. hist.

XVI. *Chamæiris saxatilis* Gallica.

*Iris perpusilla saxatilis latifolia acaulos* fermè, Adver. & Lob. ico.

*Iris pusilla sylvestris*, Cæsalp.

*Iris perpusilla* & *saxatilis*, Lugd.

an *Iris ἀνὰλ*, Cam.

Variat: altera flore est purpureo & radice odorata: altera flore pallido, radice inodora.

XVII. *Chamæiris latifolia saxatilis* Lulitanica.

*Iris humilis latifolia*, Cluf. hisp.

*Iridis* aliud genus humilius, Eid. hist.

## A C O R U S.

**A**ΚΟΡΟΣ, quia τῶς κόραις, id est, pupillis sive aciei oculorum caliginosæ medetur, dicitur, de quo Dioscorid. lib. 1. cap. 2. Meminit Plin. lib. 25. cap. 13. *Acori Iridis folijs*, radicibus nigris: quare cum & Dioscoridis & nostra, sit radicibus albicantibus, candida, commendetur, de hac Plinius intelligendus non est.

I. *Acorus verus*, sive *Calam. aromat. Officinarum*.

*Acorus*, perperam *Calamus aromaticus officinarum*, Manardo, Trag. Matth. Cord. Gesner.

Dod. Ad. Lob.

*Calamus aromaticus vulgo*, Amato, Mundellæ, Cæsalp.

*Acorum*, Lon. Cam. Tab. Ger. Eyf.

*Acorum legitimum*, Cluf. hisp. verum, Lugd.

*Calamus noster*, *Iridis* species, Ang.

II. *Acorus adulterinus*.

*Iris* in maritimis nascens, à Theophrasto & Plinio improbata.

*Acorus*, Brunf. Cord. hist. Lac. Cæsalp. Cam. Cast. Lob.

*Acorus falsa*, Cord. in Diosc. Ges. hor. vulgo, Cæsalp.

*Acorum adulterinum*, Trag. falsum, Matth. Cast.

*Gladiolus luteis lilijs*, Er. Cord. luteus, Fuch. ico. Lon.

*Acorum officinarum*, Fuch.

*Acorus nostras*, Ruel. palustris, Ad. Lob.

*Acorus luteus falsus*, Lugd.

*Gladiolus aut Acorus falsus*, Tur.

*Gladiolus aquaticus*, Ama.

*Iris lutea*, Dod. gal. Cord. hist.

*Iris palustris lutea*, Tab. Ger.

*Iris agrestis*, Ges. cat.

*Pseudoiris*, Dod. palustris, Eyf.

*Butomon*, Cluf. hist.

III. *Acorus adulterinus Aquitanicus*.

*Acorus Aquitanicus*, Ad.

*China spuria*, *Acori effigie*, Lob. ico.

## G A L A N G A.

**C**UM *Galanga*, quibusdam *Acori*, nonnullis *Iridis* species videatur, & minor à recentioribus *Gracis Cyperus Babylonica* nominetur, huc omnium optimè referri possè censuimus. *Gracis* recentioribus γάλαγγα, *Arabibus* Galingian dicitur.

I. *Galan-*

I. Galanga major, Matth. Cord. hist. Ad. Lon. Lob. Cæs. Lugd. Tab. Galanga crassa, Ama. Galangam, Schoenanthi radicem, volunt Monachi in Mesuem. Acorus veterum, Leoniceno & Brassau. Acorus seu Galanga major, Fuch. comp. Corn. Galanga crassior, Costæo. Lancuaz Javanensibus, apud quos crescit, Linsc. par. 4. Ind. Orient. cap. 39. & Tab. 18. Iridis genus, Clusio in Acoftam.

Galangam Garzias ab Orto & Acofta proponunt: quos securi sunt Durantes & Lugd. historia: an eadem sit cum nostra Galanga

maiore, Clusius dubitat.

II. Galanga, & Galanga minor officinarum. Galanga, Ruel. Brassav. Mund. Ges. cat. Officin. Cæsalp.

Galanga minor, Matth. Cord. hist. Fuch. comp. Corn. (cui & Cyperus Babylonica,) Ad. Lon. Lob. Acoftæ. Lugd. Tab. Ger. Linsc. part. 4. Ind. Orient. cap. 39.

Galanga Indica, Ama.

Galanga tenuis, Costæo.

Lavandou Chinenfibus, apud quos nascitur, Linsc. lib. cap.

An Dioscorid. lib. 2. cap. 189. per Piperis radicem intellexit?

## Z I N Z I B E R E I U S Q U E

Species.

**Z** I N G I B E R, cum folia Iridis & siliquam aliquatenus Xyridi similem habeat, de eo hic agendum: quod Diosc. lib. 2. cap. 190.  $\Sigma\gamma\gamma\iota\beta\epsilon\rho\iota\varsigma$ ; Galeno & Oribasio  $\Sigma\gamma\gamma\iota\beta\epsilon\rho$  dicitur: Plin. lib. 12. cap. 7. Zimpiberi, & Zingiberi habet.

I. Zingiber.

Gingiber & Zingiber, Herbariis.

Zingiber, cypero cognata herba, Cordo.

Acofta pingit latissimis foliis, cum tamen ei Lacrymæ Jobi folia tribuat, ut & Monardes: at Adversaria, arundinaceis foliis, & rectius Lobelius in suo de Balsamo libello: hæc fecere, ut dubius essem, diversa ne forent. Accedit, quod Autor. 6. part. hist. Ind. Orient. cap. 38. scribat, primò tenuioris arundinis speciem præ se ferre: & mox subjungit, crescere etiam velut Gladiolus: sic Sverterius in suo Florilegio, foliis & flore Iridis pingit.

Zinziber flore albo facie Iridis nominans.

Radices conditæ ex India Orient. adferuntur, Monarde monente; in nova Hispania & in

Cuba copiosè provenit, ut Joseph. Acoft. lib. 3. cap. 23. scrib.

Reperiuntur apud Aromatarios, radices albæ & rubentes: hæ rubricâ, illæ sæpè cretâ infectæ, quò à teredinibus, cui candidiores & molliores magis obnoxia, præserventur: hæ Zingiberis albi, illæ rubri nomine, ab Amato donantur.

II. Zingiber fuscum.

Zingiber intus fuscum, Cord. hist.

Mechin & Zingiber fuscum Officinis, Ad.

Zingiber fuscum, Lugd.

III. Zingiberi affinis cortice squamato.

Mechini rara varietas, Ad. Lob. ico.

Mechinum Penæ, vel Mechinum rarius, Lugd. Doronicum Arabum, Ponæ.

## Z E D O A R I A E I U S Q U E

Species.

**Z** E D O A R I A subjungitur, quia foliis & Gingiberis, sed majoribus, longioribus, & latioribus, ut & radice, & in Calecut Gingiber sylvestre dicitur, Garzia autore: à Javanensibus, apud quos in Sunda copiosè provenit, Canior nuncupatur. 4. part. Ind. Or. cap. 7. Sunt qui veterum Arnabo, & Zarnabum, & Zurumbet Arabum esse velint: recentioribus Græcis,  $\text{Zedæa}$ , quam duplicem faciunt, longam & rotundam. Costus Syriacus Dioscoridis videtur.

I. Zedoaria longa.

Zedoaria & Veterum Arnabi altera species longa radice, Cord. hist.

Zedoaria radice longa, Clus. in coroll.  
 Zedoaria Officin. Zerumbeth sive Zurumbeth,  
 Avicennæ & Serapionis, Dod.  
 Zedoaria seu Costus Arabicus, Ang.  
 Zadura sive Zadura herba, Ad.  
 Zedoaria, Bras. Lon. Lugd.  
 Zadura vel Zaduar, Ges. cat. Ruel. Fuch comp.  
 Zeduaria vulgaris, Guil.  
 Zedoaria Officin. Lob. vulgò appellata, Cæs.  
 Zedoaria Arab. Zurumbeth, aroma Zingiberi  
 simile, Græcis prætermisum, Ama.  
 Zedoaria, aliquibus Costi species, Diosc. Frag.

II. Zedoaria rotunda.  
 Zurumbethum, Cord. hist.  
 Zedoaria Arabum, Guil.  
 Zedoaria quæ rotunda est, Clus. in coroll.  
 Zedoaria loripes, Costæo in Mesuem.  
 Zerumbeth & Zedoaria rotun. Ang. Fuch. com.  
 Zedoaria rotunda, quæ Avicennæ Antora, Lon.  
 Zerumbeth Serapionis, Lob.

Zerumbeth Javanensibus canior, Linsc. par. 4.  
 Ind. Or. fig. 20.

Hæc à priori alia ratione non differt, quam  
 forma, & ejusdem radices partes esse dicimus,  
 quemadmodum Lobelius, & hist. Lugd. figura  
 proponunt: quare utraq; indifferenter uti pos-  
 sumus, Conditur etiam Saccharo, & Zingiberi  
 præfertur.

II. Zedoaria tuberosa nigricans.  
 Zerumbeth Serapionis, Clus. in Garz. Lob.  
 (quod cum rotunda junxit,) & Lugd.  
 Zadura & Zedoaria, Cast.

IV. Zedoaria Geiduar dicta.  
 Geiduar Avicennæ Garziæ & Lugd.  
 Gedvvar Clus. in exor. auctario.  
 Zedoaria vera, Garziæ, Cæs.  
 Sambaya Malays, Geiduar Chinenfibus, part.  
 4. Ind. Or. c. 8.

Hanc Veronâ à Johanne Ponâ insigni Phar-  
 macopæo accepimus.

## COSTUS EJUSQUE SPECIES.

**C**ostus sequitur, cum ejus species una Zingiberi similis sit, & initio Zingiberis sylvestris  
 nomine vendiderint, Adversar. autoribus monentibus.

Tæ Rê 58 species tres Diosc. l. 1. c. 15. proposuit: Arabicum, qui albus est: Indicum, qui  
 niger & levis: Syriacum, qui gravis buxi colore. At Plin. lib. & cap. 12. duo fecit genera: ni-  
 grum, & quod melius, candicans. Theoph. 9. hist. 7. Costum solum nominat, & quidem inter ea,  
 quæ ad unguenta apta sunt. Officinæ, in dulcem & amarum dividunt, cum tamen Galeno  
 omnis Costus amarus sit: at Actuaricus, Arabes secutus, Costi dulcis meminit. Verum hæc ra-  
 dix cum recens est, nullius amaritudinis particeps est, candidiorq; persistit: cum autem veru-  
 state corrumpi incipit, amaritudinem & nigredinem contrahit.

I. Costus Arabicus Dioscoridis.  
 Costus albus seu Arabicus, Cord. hist.  
 Costus verus, Valerando.  
 Zingiberis effigie Costus Arabicus & Syriacus:  
 non tamen genuinus costus est, Ad.  
 Costi quoddam genus, Zingiberis radicibus si-  
 mile, Clus. in Garz.  
 Costus Arabicus, Cam. in Matth.  
 Costus Arab. & Syriacus, Lugd.  
 Cyperi Indi potius, quam Costi species, Co-  
 stæo in Mes. At Paludanus notis in 4. part. In-  
 diæ Or. c. 39. Syriacum ab Arabico distinguit,  
 quatuor sibi esse genera scribens, Indicum ni-  
 grim, Arabicum & Syriacum, cum genere  
 quarto alio, quod Zingiberi simile sit.

II. Costus Iridem redolens.  
 Costus Garziæ, Acoftæ. Fragofo.  
 Costus Indicus, Ama. Clus. in Garz. Tab.  
 Lugd.  
 Costus facie radices centaurij majoris, Lob.  
 Costus Lusitanicus, Cam. in Matth.  
 Costus Indicus, Malays Pucho dictus, quo no-  
 mine pingitur in 4. par. hist. Ind Or. tab. 20.

III. Costus corricofus.  
 Costus Molucensis corricofus rugosus, Ad. Lob.  
 ico. Lugd. historia sub uno titulo & hunc, & se-  
 quentes 4. & 5. posuit.

IV. Costus lignosus.  
 Costus Molucensis lignosus fervidior, Ad. Lo-  
 bel. ico.

Costus Molucanus, Tab.

V. Costus effigie radice Solani furiosi, Ad. Lob. ico.

Costus alter peregrinus, Tab.

VI. Costus amarus Officinarum, seu Helenium, & Comagenium Discoridis.

Helenij Comagenij radix, Cord. in Diosc.

Inula Comagenia, Eid. hist.

Costus officin. Ad.

Costus amarus Pharmacop. Cam. ep. Matth.

Costus Comagenius adulterinus officin. Lobel. icon.

Costus officin. amarus Costæo, Lon. Cast. Tab.

Costus Officin. adulterinus, Lugd.

VII. Costus dulcis officin. centaurio magno cognatus.

Costus dulcis officin. Lon. sed adulterin. Tab.

Costi Pharmacopolarum species major, Cam.

in Matth. lit. D.

Costus dulcis, Cast.

VIII. Costus adulterinus insipidus.

Costus alter litera B. notatus, Cam. in Matth.

IX. Costus Officinarum ingratus, sive Thapsiæ species.

Costi vice sæpè venditur & alia radix, per transversum in taleolas secta, crassitudine plerumque manum implens, foris fusca, intus candicans, cortice crasso, substantia rara, gustu acri admodum, & nauseosam salivam ciens, & quasi strangulans; & cum reritur, rancidam pinguedinem olens. Quare non Costus, sed Thapsiæ majoris, montis Gargani radix est, quæ non sine periculo intra corpus sumitur, quam Agyræ corrupto nomine cum Italis Costones, quasi Costum amarum vocant. At Cæsalpino Ferulæ cujusdam radix est.

## CURCUMA.

**K** *ῥαζέρις ἰνδική* Dioscoridi: Indica herba, quæ Cyperis vocatur, Zingiberis effigie, Plin. lib. 21. cap. 18.

I. Cyperi genus ex India, Matth. Fuch. comp.

Cyperus Indicus Dioscor. & Curcuma officin.

Cord. hist. Clus. corol. Lon. Lob. Cæs. Tab.

Cyperum Indicum Brasau. & Cortæus suspirantur.

Cyperii tertia species, vel Indus, Ama.

Curcuma longa & rotunda, Cord. hist.

Cyperis Indica, Ges. car.

Cyperus altera, radice lutea, Cast.

Terra merita, Ruel. Ad. Lob. ico. Lugd.

Duplex est, radice communiter longa, aliquando rotunda: hæc multò acrior existit, & cum Zingibere sæpè adfertur.

II. Crocum Indicum proposuit Garzias, folijs milij majoribus: & Acosta, folijs Orchidis Serapiæ dictæ majoribus latioribusque.

Croci Indici, Acostæ nomine, cum ejusdem figura, in Lugd. hist. proponitur.

Radix Zinziberis facie intus flava, Malaix, Cunhet. Linscot. par. 3. Ind. Or. c. 14.

Crocus Indicus, Lusitanis Saffran da Terra, planta lilio albo similis. Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 3. & 7. cujus figura tab. 13. exhibetur: cui & Curcuma, cap. 8.

III. Ganti radix ac Zinziber ex China, quæ Indi corpora sua fucant: part. 4. Ind. Orient. cap. 8.

IV. Tomon pute, radix Galangæ seu Curcumæ similis est, albicat, & ad illinenda corpora facit. l. c.

V. Caxumba, in Bantam Floers, quo in cibis condiendis & vestibis gossypinis tingendis utuntur; part. 4. Ind. Or. 7.





CASPARI BAUHINI  
PINACIS THEATRI BOTANICI  
LIBER SECVNDVS.  
DE BULBOSIS.  
SECTIO PRIMA.

IRIS BULBOSA: IRIS TUBEROSA: SISYRIN-  
CHIUM: GLADIOLUS ET HYACINTHUS.

IRIS BULBOSA  
latifolia.

Iris bulbosa latifolia acaulos odora.  
Iris bulbosa latifolia, Clus. hisp. Dod. Lug. Cam.  
Iris bulbosa latifolia purpurea, Svvert.  
Hyacinthus poetarum latifolius, Lob.

Flos vel purpureus, vel cæruleus: interdum  
lacteï coloris.

II. Iris bulbosa latifolia caule donata.

Hæc variat floris colore, cæruleo, atro pur-  
purante: est & cærulea lineis & violaceis, vel  
purpureis, sic & cinerea violaceis strijs distin-  
cta, quas Svvertius pinxit, nomine  
Iridis Anglicæ majoris bulbosæ latifoliæ: quæ  
Iris bulb. Anglica fl. cæruleo, &  
Iris Anglicana major, flore violaceo, Eyft.  
Iridis bulbosæ latifoliæ flore atro purpurante.  
Iridis majoris Franciæ cæruleæ lineis violaceis  
crassioribus ornata, quæ etiam variat.

III. Iris bulbosa latifolia candida.

Iris bulbosa Anglicana major fl. candido, Eyft.  
Iris bulb. Anglic. latifolia flore albo, Svvert.

IV. Iris bulbosa folijs cepaceis maculatis  
flore purpureo inodoro.

Iris bulbosa, Dodon. Ger.

Iris bulbosa angustifolia fl. purpureo, Clus. hisp.  
Iris bulbosa violaceo flore, Clus. hist.

Hyacinthus flore Iridis Theocriti & Poëta-  
rum, Lob.

Hyacinthus poeticus Lobelij Lugd.

Est & flore violaceo, interdum elegantissi-  
mi, interdum dilutioris coloris: est & atroru-  
bens in summo albo: niveo flore in Pyræneis:

aliquando macula flava albo flori aspergitur,  
Clusio in append. altera monente; qui in cu-  
ris posterioribus longè majorem varietatem  
recenset, cum etiam rubro & purpurascente flo-  
re reperiatur.

Huc referendæ quatuor species ex Svvertio.  
Iris bulbosa flore cæruleo, quæ Iris bulbosa an-  
gustifolia cærulea, Eystettenfi.

Iris bulbosa flore atro purpurascente.

Iris bulbosa flore albo.

Iris bulbosa flore cinericeo.

IRIS BULBOSA ANGUSTI-  
folia verticolor.

I. Iris bulbosa angustifolia tricolor odore  
coriandri.

Iris bulbosa angustifolia flore vario, Clus. hisp.  
Lugd.

Iris bulbosa Lusitanica, Dodon.

Hyacinthus Poëtarum Hispanicus, Lob.

Iris bulbosa flore vario, Cam. Ger.

Iris bulbosa 3. sive verticolor, Clus. hist.

Variat flore latiore & radice brevi binis ple-  
rumque floribus: altera flore angustiore radi-  
ce oblonga: utraque dilutioris aut saturatio-  
ris coloris.

II. Iris bulbosa angustifolia tricolor.

Iris bulbosa varicolor, Clus. hist. qui sub classe  
secunda species quinque floris colore varian-  
tes proponit.

I. Trium foliorum inclinorum labra flava  
sunt, maculâ aureâ magnâ in labro reflexo in-  
signita, ad quam venæ purpurascentes excur-  
runt:



runt: at trium incumbentium dorsum & alæ pallent, latera candicant: tria erecta albicant, venis subcæruleis saturatoribus vel dilutioribus distincta.

2. Tria inflexa pallent labro flavâ maculâ notato, internè quibusdam venulis purpurascens distincta: tria ligulam regentia albicant, vel Ochri colore sunt: tria surrecta exalbida, nervo flavo excurrente.

3. Flore est latiore, brevior, ternis folijs inflexis latis, & propendente labro, aureâ maculâ insignito, & alio orbe cincto, per oras crispo, cærulei coloris, nervo extrinsecus virente, intrinsecus pallente, venis purpureis in latera excurrentibus: at tria gibba purpurea sunt, gibba albicante, alis cæruleis: tria erecta ex cæruleo purpurascunt.

4. Tria reflexa flava sunt, maculâ aureâ in labro, à qua venæ dilutius purpurascens sparguntur: folia incumbentia exalbida, nervo pallido divisa: tria surrecta inferius cæruleo purpurascens venis distincta, supernè candicant.

5. Terna inflexa lactei coloris, aureâ maculâ labro impressâ: folia incumbentia, & terna erecta alba, & circa ungues subcærulea.

III. Iris bulbosa versicolor ramosa.  
Iris bulbosa versicolor *πελιδαν*, Clus. hist.

Variat binis, ternis, quaternis floribus.

### IRIS BULBOSA LUTEA

inodora.

I. Iris bulbosa lutea inodora major.

Iris bulbosa angustifolia luteo flore, Clus. hisp. Lugd. Eyfster.

Iris bulbosa 3. luteo flore, Dod. 4. sive lutea, Clus. hist.

Hyacinthus poetarum luteus, Lob. Lugd.

Lirium mas, aut Lirium verum Dodonæi, Lug.

Iris bulbosa lutea, Tab. Cam. Svvert.

Iris bulbosa flore pallido, Ger.

Invenitur latiore aliquantulum, saturatiore & magis rutilante aureo colore, radice item brevior & crassior, vaginula sanguineo colore infecta: alia dilutioris flavi coloris, vaginula sanguineo colore carente: & aliæ adhuc differentię occurrunt, Clusio notante.

Huc pertinent

Iris bulbosa pallido colore, sive luteo pallescente, Eyfster.

Iris bulbosa lutea mixta, Ejusdem.

Iris bulbosa lutea varietates quatuor, Lobelius advers. parte altera recenset.

II. Iris bulbosa lutea inodora minor.

Iris Mauritanica, Clus. cur. post.

### IRIS BULBOSA LUTEA

versicolor.

I. Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior. Iris bulbosa versicoloris, vel flavivariæ classis tertiæ prima, Clus. hist.

Iris bulbosa lutea varia, Lob. ad. par. 2.

II. Iris bulbosa lutea versicolor latiflora elatior.

Iris bulbosa flava varia septima, Clus. hist.

III. Iris bulbosa lutea versicolor latiflora humilior quadruplex.

Iris bulbosa flavivaria classis tertiæ 2. 3. 4. & 8. Clus. hist.

Primæ, terna folia inflexa flava sunt maculâ aureâ insignita, purpureis venis internè distincta: folia gibba purpurascunt: hæc 2. est Clusio.

Alterius folia reflexa flava sunt cum aureâ maculâ, & qua parte gibbosis integuntur venis obsoletè purpureis distincta: tria surrecta ex cæruleo purpurascunt, nervo flavo per longum excurrente: tria incumbentia obsoleta, quibus flammei quid permixtum est: hæc 3. Clusio.

Tertiæ, folia inflexa pallida, aureâ maculâ insignita, quæ camerato folio integuntur, venis purpurascensibus distinguuntur, folia gibba purpurascunt, tria erecta cærulea sunt: hæc 4. est Clusio.

Quartæ, folia recurva flava sunt, aureâ maculâ notata, internè purpurascensibus radijs distincta: folia gibba purpureo cærulea, gibbo ex purpura flavescente: folia erecta, cærulei purpureæ permixti coloris: hæc 8. est Clusio.

IV. Iris bulbosa lutea versicolor angustiflora elatior, quæ duplex est.

Iris bulbosa flavivaria classis tertiæ 5. & 6. Clus. hist.

Primæ, folia reflexa flavescent, maculâ aureâ labro insignita, at incumbentia candicant, nervo eminentiore *ωχρολόγω*: folia erecta exalbida internè subcæruleis venis distincta. Altera media est inter 2. & 3.

Huc referatur

Iris bulbosa angustifolia lutea mixta, quæ flore est pallidè flavescente, venulis purpureis disseminatis, Eyfster.

V. Iris

V. *Iris bulbosa lutea versicolor angustiflora humilior triplex.*

*Iris bulbosa flavovaria, classis tertiæ 9. 10. & 11. Clus. hist.*

Primæ folia reflexa labris sunt longioribus & pallidioribus, oris purpurascens, macula aurea longiore insignita, incumbentibus internè purpurascens: nervo carnei coloris externè ex viridi pallescens: & folia gibba purpurea, gibbo dilutiore: foliis surrectis purpura saturatiore nitentibus.

Alterius folia reflexa labro sunt pallescente, flava macula in radios desinente infecta: parre angustiore foris virescente, internè venis viridibus prædita: folia bifida, exalbidâ, gibbus pallescens: folia erecta alba, nervo circa unguem pallescente.

Tertiæ folia inflexa alba, flava macula insignita, incumbentia purpurascunt: tria erecta purpurei sive violacei coloris sunt.

VI. *Iris bulbosa lutea versicolor, inter latifloram & angustifloram media.*

*Iris bulbosa flavovaria 12. Clus. hist.*

#### IRIS BULBOSA CÆRULEA:

cæruleo varia: violacea alba.

I. *Iris bulbosa angustifolia cærulea tiliæ odore.*

*Iris bulbosa 5. sive cærulea, Clus. hist.*

*Iris bulbosa angustifolia odorata Eyst.*

II. *Iris bulbosa cærulea minor.*

*Iris Hispanica cæruleo purpurea, Svvert.*

III. *Iris bulbosa cæruleo purpurascens vario flore.*

*Iridis bulbosæ versicoloris 13. genus, Clus. hist.*

IV. *Iris bulbosa cæruleo violacea.*

*Iris bulbosa flore cæruleo & purpureo, Eyst.*

Huc pertinent ex horto Eystettensi

*Iris bulbosa variegata.*

*Iris bulbosa mixta.*

Illi flos purpuroviolaceus, medio luteus: huic è cæruleo albicans, aureus & ex albo pallescens.

V. *Iris bulbosa angustifolia violacea.*

*Iris bulbosa violacea Pyrænea, Lob. ad. part. 2.*

*Iris Anglicana violaceo flore, Eyst.*

Huc referatur,

*Iris bulbosa violacea colore mixto, Eyst.*

VI. *Iris bulbosa angustifolia alba.*

*Iris bulbosa alba, Lob. ad. part. alt.*

Refert Clusius in altera appendice, se à Joachimo Venerio admonitum, se in Pyræneis Iridis bulbosæ varia genera observasse, & viginti sex generum descriptionem fecisse, & Iridem quæ flauum aut rubrum florem haberet, in illis montibus non reperisse: sed inter multas myriades, eam quæ cæruleum sive violaceum florem gerit, unicam plantam reperisse, quæ florem prorsus niveum haberet.

#### IRIS TUBEROSA.

*Iris tuberosa folio anguloso.*

*Hermodaetylus verus, Matth. Lugd. Tab. Cam. Ger.*

*Iris tuberosa, Dod. gal. Lugd. Lob. Eyst.*

*Iris bulbosa præcox, Clus. hist.*

*Lonchitis major, Cast.*

*Lonchitis prior Diosc. Aldrouando.*

*Satyrium, Cæsalp.*

*Iris tuberosa obscurè viridi colore, Svvert.*

### SISYRINCHIUM.

**Σ** *loveγγον Theoph. lib. 7. hist. 13. hoc peculiare habet, ut una radix, primo augeatur hyeme, tum ineunte vere, quod in imo excreverit, contrahatur, supremumq; crescat, quod manditur. Sic quoque Plin. lib. 19. cap. 5. sisyrrichio hoc mirum, imas ejus radices crescere hyeme, verno autem tempore minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere: Non solum suillo pabulo bulbosæ atque carnosæ radicis aptitudo, sed planta hujus, rostro forma rostrata, suillo similis nominis (ut rectè docuimus Fab. Columna) causa fuit.*

I. *Sisyrrinchium majus flore lutea macula notato.*

*Sisyrrichion majus vel primum, Nofelha Hispanis, quasi nucula auellana, Clus. hisp.*

*Sisyrrichium majus, Dod. flore cæruleo, Schvver.*

*Hyacinthus Poëticus Hispanicus gemino gladiolo reticulato bulbo, Lob. observ.*

*Sisyrrichium Cordi & Clusij, Lob. ico.*

*Sisyrrichium, bulbi esculenti genus, Lugd.*

*Flos coloris est cærul. luteis macul. aspersis.*

II. *Sisy-*

II. Sifyrinchium flore albâ maculâ notato. Sifyrinchium Mauritanicum, Clus. in app. 1. & cur. post.

Flos purpureæ dilutioris albâ maculâ insignitus.

III. Sifyrinchium medium.

Sifyrinchium minus, Dod. Clus. hisp. Lugd. Svvert. Eyf.

Sifyrinchion Theoph. & parva Nofelha, Lob.

IV. Sifyrinchium minus latifolium.

Sifyrinchium alterum latifolium, Colum.

V. Sifyrinchium minus angustifolium flore majore variegato.

Sifyrinchium Asprensium angustifolium alterum, Colum.

VI. Sifyrinchium minus angustifolium.

Sifyrinchium Theoph. Colum.

VII. Sifyrinchium Persianum.

Flos Persicus Sifyrinchio congener, Clus. hist.

## GLADIOLUS.

**G**ladiolus, à foliorum forma, Dioscoridi l. 4. c. 20. *Ξιφίον & Φάσγανον* dicitur: & Gaza apud Theoph. 7. hist. 11. & 12. Ensem vertit. Plin. l. 25. c. 11. & 26. c. 8. *Xiphion & Phasgation* nominat.

I. Gladiolus maximus Indicus.

Gladiolus maximus promontorij Bonæ spei flore rubro incarnato, Svvert.

II. Gladiolus major Byzantinus.

Gladiolus Byzantinus atropurpureus, Svvert.

III. Gladiolus floribus uno versu dispositis major.

Xiphion, Spitha seu Gladiolus segetalis Ruel.

Victoralis fœmina, vel Gladiolus sylvestris Cord. hist.

Victoralis rotunda & Gladiolus verus, Ges. hort.

Victoralis herba, Lon. rotunda, Eyf.

Gladiolus, Dod. Narbonensis, Lob.

Xiphion minus, Clus. hist. pan. & rar.

Gladiolus nostras, Cam. Germanicus, Tab.

Variat magnitudine, quibusdam locis major ac procerior: alijs minor & humilior: floris colore purpureo rubente, aliquando candicante, qui

Gladiolus flore albo, Lob. adv. part. 2. & Svvert.

Gladiolus Narbon. flore incarnato & flore purpureo, Eyf.

Gladiolus carnei coloris, Svvert.

Gladiolus Hispanicus flore albo, Eyf.

Sic in Narbonensi & Germanico, flores adunam caulis partem digesti.

IV. Gladiolus utrinque floridus.

Gladiolus, Matth. Dod. gal. (cui & Gladiolus segetalis, & Lingua cervina Apuleij) Ges. col.

Ang. Lac. Cast. Cæs. Lugd. peregrinus, Cam.

Xiphion, Diosc. Ges. ap.

Gladiolus utrinque floriferus, Dod.

Gladiolus Italicus binis floribus ordinibus cinctus, Lob.

Gladiolus Italicus, Tab.

Gladiolus flore pallido, Ger.

Gladiolus purpureo violaceus, Svvert.

Variat flore rubro & incarnato, qui

Gladiolus Italicus fl. rubro, Eyf.

V. Gladiolus angusto gramineo folio: in Prod. descript.

VI. Gladiolus floribus uno versu dispositis minor.

Gladiolus minimus, Lob. adv. part. 2.

VII. Gladiolus palustris.

Gladiolus lacustris aut stagnalis Dortmanni, Clus. cur. post.

## HYACINTHUS ET EJUS Species.

**Y**'AKINΘOΣ unus est Dioscoridi l. 4. c. 63. at Theoph. 6. hist. 7. duplex, sativus & sylvestris: & ut Plin. l. 21. c. 11. *Hyacinthum fabula duplex comitatur, luctum præferens ejus quem Appollo dilexerat (Hyacinthum vocatum) aut ex Ajacis cruore editi, ita discurren-*

*ribus venis, ut Gracarum litterarum figura A. I. inscripta legatur. Duplicis Veteres meminere, alter Poëticus, alter Medicus est: illum, aliqui fabulosum vel Poëticum: hunc, historicum seu Medicum vocant: rursus alius Gracorum, alius Latinorum est; Gracorum esse Hemerocallida Diosc. seu Lilium rubrum Plinij; Latinorum, Iridem radice tuberosa, censent; Medicorum verò ab utroque variat, de quo in præsens.*

### HYACINTHUS COMOSUS.

#### I. Hyacinthus comosus major purpureus.

Hyacinthus, Dioscoridi.

Bulbine prima, Plinij, forte alijs Pericarpus bulbus, Ejusd.

Hyacinthus quartus & major, & Hyacinthus rubens Virgilij, Trag.

Hyacinthus, Ruel. Matth. Cord. in Diosc. Gef. cat. Port. Cast.

Hyacinthus maximus, Tur. major, Lugd. Tab.

Hyacinthus primus, Ama. Fuch. Gef. hor.

Hyacinthus cæruleus maximus, Fuch. fol.

Hyacinthus cæruleus major mas, Fuch. ico.

Hyacinthus sylvestris, Cord. hist.

Pancratium, Gef. hor. Lac.

Bulbus, Ang.

Bulbi esculenti genus, Dod. gal. Lugd.

Bulbi sylvest. primum genus, quem Pothos Theophrasti, suspicatur, Cæs.

Hyacinth. magnus, & Bulb. Vomitorius, Lon.

Hyacinthus primus Matthioli, Clus. hist.

Hyacinthus Neotericorum sive comosus spurius tertius, Dod.

Hyacinthus comosus, Diosc. Ad. major, Lob. Cam. Lugd.

Hyacinthus comosus, Ger. spurius, Eyf.

Variat: alter præcox, latiore folio, coma crassiore, majoreq; bulbo: alter serotinus, angustiore folio, coma tenuiore, laxiore tamen & elegantiore, minoreq; bulbo: Hinc apud Cam.

Hyacinthus comosus major sive serotinus & minor sive præcox, & flore communiter purpureo, vel cæruleo purpureo (rarius albo) qui Hyacinthus comosus purpureus, Svvert.

#### II. Hyacinthus comosus albus Belgicus.

Hyacinthus comosus albus, Lob. Lugd. albo flore, Clus. hist.

Hyacinthus comosus leucanthemos, Cam.

Huc referatur

Hyacinthus comosus fl. albo obsoletiore Clus. pan.

#### III. Hyacinth comosus albus Byzantinus.

Hyacinthus comosus Byzantinus, Clus. pan. & hist. Eyf.

Flores initio candicantes, cum marcescunt fusci: vel exterius subfusco obsoleto colore, intus albicantes, ad fundum capillis nigricantibus.

#### IV. Hyacinthus comosus Hispanicus.

Hyacinthus comosus major Hispanico semine natus, Clus. pan. & hist.

#### V. Hyacinthus paniculâ cæruleâ.

Hyacinthus Sannesijs comâ panniculosâ, Column.

Hyacinthus comosus ramosus nondum descriptus purpuroviolaceus, du Bry.

### HYACINTHUS RACEMOSUS.

#### I. Hyacinthus racemosus cæruleus major.

Hyacinth. botryoides cærul. amœnus, Lob. ico.

Hyacinth. botryoid. cæruleus major, Tab. Ger.

Hyacinthus botryodes cæruleus, Clus. pan.

Hyacinthus botryoides odoratus, Cam.

Hyacinthus botryoides major, Eyf.

Hyacinthus botryoides major Hispanicus, Svvert.

#### II. Hyacinthus racemosus latif. speciosior.

Hyacinthus botryodes cæruleus, vel 3. genus, Clus. pan. vel purpureus 3. Eid. hist.

Hyacinthus botryoides incarnatus, Tab. Eyf.

Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus, Ger. ico.

Flos dilutioris purpuræ etiam in cæruleum tendens.

#### III. Hyacinthus racemosus albus.

Dipcadi candidis floribus, Lob. Lugd.

Hyacinthus botryodes lacteus, Clus. pan. Tab.

Ger. albo flore, Clus. hist. Eyf.

Variat floris colore lacteo, niveo, cui dilutissima purpura perfusa: est & tertius floribus ex cæruleo virefcentibus: Svvertius carneo, albo & cæruleo botryoides nomine pingit.

#### IV. Hyacinthus uvâ ramosâ major.

Hyacinthus ramosus botryoides cæruleus, Casp. Bauhini: in florilegio du Bry.

#### V. Hyacinthus uvâ ramosâ minor.

Hyacinth. botryodes ramosus, Clus. pan. vel 3. uvâ ramosâ, Læm. hist.

#### VI. Hy-

**VI. Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius.**

Bulbina Plinij videtur.

Bulbi esculenti genus minus, Dodonæo gal. Lugd.

Hyacinthus cæruleus major, Fuch. Tur. Lugd. fœmina, Fuch. ico.

Hyacinthus 2. Fuchij, Gef. hort.

Hyacinthus minor, Lon.

Hyacinthus botryodes primus & major, Clus. pan, & hist.

Hyacinthus botryoides cæruleus, Eyft.

**VII. Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius.**

Hyacinthus primus, vel Hyacinthus vernus exiguus, Trag.

Allium caninum exiguum, Eidem.

Hyacinthus Cord. in Diosc. minor, Eidem observ.

Hyacinthus neotericorum primus, Dod. flor.

Hyacinthus racemosus, Dod.

Hyacinthus comosus minor, Lob. obs. Lugd.

Hyacinthus botryoides vulgaris, Lob. ico.

Hyacinthus botryoides 1. & minor, Clus. hist.

Hyacinthus botryoides odoratus, Cam.

Hyacinthus botryoides cæruleus, Ger.

Hyacinthus cæruleus minor, vel sextus, Tab.

Pancratium alterum Dodonæi, Gef. cat.

Bulbine flore cæruleo, Gef. hor. minor, Eid. color.

Bulbus sylvest. & Bulbus coronarius Theoph. Cæsalp.

Variat floris colore cæruleo, aliàs saturato, aliàs dilutè exalbido, dilutè purpurascēte; odore apud nos est pruni: at Tragus inodorum asserit.

**VIII. Hyacinthus racemosus moschatus.**

Bulbus vomitorius, Matth. Cast. Lugd.

Muscari, Clus. hisp. & pan. Ger. Turcarum, Camer.

Dipcadi Chalcedonicum & Italarum, Lob. Lugd.

Hyacinthus spurius recentiorum alter, Dod.

Hyacinthus botryoides Chalcedonicus moschatus, & Hyacinthus purpureus magnus peregrin. Tab.

Hyacinthus neotericorum alter, Lugd.

Muscari obsoletiore flore, Clus. hist.

Muscari majus obsoleto albo flore, Eyft.

Flos initio interdum purpurascens, aut viridis: dein ex purpura virens, aut cum viriditate albicans: nonnunquam subcæruleus: aliquando initio nigricans, sive saturatè purpurascens, dein pallidus, vel flavescens; vel ab initio pallidus, postea flauus, postremo pallescens, nigricans, aut pullus; hic & niveo, & egregiè rubente, & carneo reperitur; hinc quatuor figuræ apud Svvertium; & in hort. Eyft.

Muscari flore obsoleto albo & obsoleto nigro.

**IX. Hyacinthus racemosus moschatus luteus.**

Dipcadi flavum, sive Muscari Constantinopolitanum, sive Chalcedonicum, Lob. ico.

Muscari flavo colore, Clus. hist. flavum, Ger. luteo flore, Eyft.

Muscari Turcarum flore luteo, Cam.

Hyacinthus botryoides Chalcedonicus luteus, Tab.

Nonnunquam flore dilutè purpureo, aliquando cæruleo virente reperitur; ex viridi flavescēte, Clus. in ap. alt. notavit.

**X. Hyacinthus racemosus luteus præcox.**

Tipcadi lutei varietas, sive Muscari luteum præcox, Lob. ad part. 2.

Flores initio subcærulei, postea aurei.

## HYACINTHUS OBLONGO go flore.

**I. Hyacinthus oblongo flore cæruleus major,**

Hyacinthus, Dod. gal. Lugd.

Hyacinthus Anglicus, Ad. Ger. Eyft. & Belgicus, Lob.

Hyacinthus non scriptus, Hyacinthus Dioscoridis, Dod. Lugd.

Hyacinthus Belgicus non scriptus, Cam.

Hyacinth. Hispanicus, Clus. hist. addit. Svvert. flore cæruleo & albo.

Variat floris colore ut plurimum cæruleo, cæsiouè: aliquando amethystino vel violæ, nigræ dilutam purpuram refert: aliquando carneo, hinc

Hyacinthus Anglicus colore amethystino: & aliàs colore violaceo, Eyft. &

Hyacinthus Anglicus flore incarnato, &

Hyacinthus Anglicus cinericeus: Item

Hyacinthus Hispanicus flore violaceo, & flore incarnato, Eyft.

qui *Hyacinthus carnei coloris*, Svver. item floribus albicantib. aut candidis, sive niveis, qui *Hyacinthus Belgicus candidus*, Lob. *Hyacinthus non scriptus flore candido*, Dod. *Hyacinthus albus Anglicus*, Tab. Ger. *Hyacinthus Hispanicus flore albo*, Svvert.

II. *Hyacinthus oblongo flore fusco.*

*Hyacinthus Mauritanicus*, Clus. hist. ap. 1. & cur. post.

*Hyacinthus Mauritanicus Clusij*, cui flores vicini plures obsoleti, & fusci, Lob. ad. part. 2.

III. *Hyacinthus obsoleto flore.*

*Hyacinthus obsoletior Hispanicus*, Clus. pan. obsoleti coloris *Hispanicus serotinus*, Eid. hist.

*Hyacinthus Hispanicus obsoleto flore*, Cam.

*Hyacinthus obsoletior Hispanicus semine compresso Pancratij Monspel. maritimi*, Lob. ad. par. 2.

*Hyacinthus serotinus maximus*, Eyft.

Variat floris colore ex purpureo pallido & virecente mixto: sic ex albo cinerei, & ex albicante virecente, Clus. ap. alt.

*Hyacinthus obsoletus Clusij*, flore obsoleto viridi, Svvert.

Sic eorum color valdè obsoletè spadiceus est, qualis plerumque ceruis esse solet.

IV. *Hyacinthus obsoleto flore alter.*

*Hyacinthus serotinus obsoleto colore*, Eyft.

V. *Hyacinthus serotinus albicans.*

*Hyacinthus serotinus facie Orientalis*, Eyft.

VI. *Hyacinthus oblongo flore flauo viridi.* *Hyacinthus obsoletus Æthiopicus* Clus. cur. post.

VII. *Hyacinthus oblongo flauo flore.*

Hic cum tertio convenit, nisi quòd minor, & flos ex sex foliolis luteis, aliquando candicantibus compositus est, in cujus medio staminula bina pallida conspiciuntur: in Gallia Narbonensi in summitate pontis Gari reperitur.

VIII. *Hyacinthus oblongo cæruleo flore minor.*

*Hyacinthus minor Hispan.* Clus. hist. ap. 2. & cur. post.

Variat flore cæruleo, albo, interdum mixto, dilutè suaviterque rubente, (qui

*Hyacinthus flore rubro ex Lusitania*, Lob. ad. par. 2.) venis saturatioribus per foliolorum externorum longitudinem excurrentibus.

IX. *Hyacinthus floribus campanulæ uno versu dispositis.*

*Hyacinthus totus albus*, Campanilla, Lob. ad. par. 2. ex Lusitania.

X. *Hyacinthus floribus campanulæ utrinque dispositis.*

*Hyacinthus Neapolitanus*, Svvert.

HYACINTHUS ORIENTALIS.

I. *Hyacinthus Orientalis caule maculato.*

*Hyacinthus Dioscorid. & Theoph. Ang.*

*Hyacinthus Orient. Matth. Gesner. hor. Dod. (cui & minor) Cast. Lugd. Clus. hist. Rauvv. cæruleus*, Tab. Ger. Eyft.

*Hyacinth. Orientalis Græcus*, Ad. Lob. Lugd.

*Hyacinthus Constantinopolitanus*, Cam.

*Hyacinthus*, Cæsalp.

II. *Hyacinthus Orientalis purpureus.*

*Hyacinthus Orientalis purpurorubens*, Lob. ico. flore purpureo, Cam.

Variat flore purpureo, purpurorubente: & Svvertius.

*Hyacinthum Orient. serotin. flore purpureo pingit: & huc referendus.*

*Hyacinthus fl. purpureo albo*, Eyft.

III. *Hyacinthus Orientalis exalbidus.*

Flores antequam aperiantur albi, aperti orastantum albas habent, reliqua parte carnei sunt, senescentes toti nivei fiunt, Clus. hist.

Est & alter floribus ex cinereo albis, foliis paulo angustioribus & crassioribus, qui *Hyacinthus Orient. fl. cinereo albus*, Eyft.

IV. *Hyacinthus Orientalis albus primus.*

*Hyacinthus Or. albus*, Lob. ico. & Clus. hist. Flore niveo, Eyft.

Flore albicante, & flore albo, Svvert.

*Hyacinthus Constantinopolitanus albo flore*, Cam.

Flore albicante & flore albo, Svvert. qui etiam *Hyacinthum facie Orientalis*, flore cæruleo & flore albo, &

*Hyacinthum Germanicum flore albo*, pingit.

Flores intus nivei, foris albi, foliis tribus externis ad *ὠχρόσινον* colorem accedentibus: aliquando argentei coloris, qui

*Hyacinthus Orientalis niveus*, Clus. hist.

*Hyacinthus Orient. argenteo colore*, Eyft.

V. *Hyacinthus Orientalis albus alter.*

*Hyacinthus brumalis Orientalis Gemmæ*, Lugd. albus, Lob.

VI. *Hyacinthus Orientalis maximus.*

*Hyacinthus Orientalis alter*, Matth. Lugd.

Hyacin-

Hyacinthus Orient. major, Dod. polyanthos, Ad. Lob. Tab. Lugd.

Hyacinthus Orientalis polyanthos, Clus. hist. Ger.

Hyacinthus Orient. præcox multiflorus cæruleus, Svvert.

Hyacinthus Orient. major, flore cæruleo, & alter violaceo colore, Eyf.

Flores sæpè 40. producit.

VII. Hyacinthus præcox albus.

Hyacinthus præcox flore albo Caccini, Clus. cur. post.

VIII. Hyacinthus Orientalis latifolius.

Hyacinthus Orient. *πολιανθὸς* alter, Clus. hist.

IX. Hyacinthus Orientalis variegatus phoeniceis caliculis subtus rubentibus: vel floribus anteriùs albescentibus, aversâ parte purpurascenibus.

Hyacinthus Orientalis variegatus, &

Hyacinthus Orientalis mixtus, Eyf.

V. Hyacinthus maximus polyanthos.

Hyacinthus Jacobæus altus multis floribus Italicus, Svvert.

XI. Hyacinthus Orientalis ramosus.

Hyacinthus Orientalis *πολυανθὸς*, Clus. hist.

XII. Hyacinthus Orient. florum folijs reflexis & variegatis.

Hyacinthus Orient. reflexis folijs, colore violaceo, &

Hyacinthus Orient. viol. colore albis lineis, Eyf.

Flores purpuroviolacci, lineis albicantibus dorsalibus distincti: vel lætè purpurei & janthini, virgulis obscurioribus signati.

XIII. Hyacinthus Orientalis, caule folioso.

Hyacinthus Asiaticus *φυλλοειδὴς* caule, Clus. cur. post.

Hyacinthus caule folioso, Svvert.

XIV. Hyacinthus Arabicus, Camerarij, quid?

XV. Hyacinthus exoticus flore phalangij.

Hyacinthus circa Alepum Ayur dictus, Rauvvolf.

Hyacinthus Tripolitanus, Cam. ad. Matth.

*Hyacinthus Orientalis serotinus.*

I. Hyacinthus Orientalis serotinus.

Hyacinthus Orient. serotinus mixtus, Eyf.

Florum apices albescent, qua pediculis adherent, rubescunt.

II. Hyacinthus Orient. serotinus floribus erectis candidis, vel cæruleis.

Hyacinthus Orientalis serotin. erectis candidis floribus, &

Hyacinth. Orient. serot. erectis cæruleis floribus, Eyf.

III. Hyacinthus Orient. serotinus striatus.

Hyacinthus minimus serotinus facie Orientalis hyacinthi, Lob. ad. par. 2. ap.

an Hyacinthus serotinus minimus cæruleus, Clus. hist. ap. 2.

Flos ex cæruleo dilutus, senis venis cæruleis striatus.

*Hyacinthus Orientalis flore pleno.*

I. Hyacinthus Orientalis flore duplici.

Hyacinthus flore duplici ex albo virescente, Clus. cur. post.

Hyacinthus Orientalis pleno flore subviridi, Svvert.

Hyacinthus Orient. fl. duplici, Eyf.

Flores gerit infitos duplices: ex albo virescentes, vel cæruleos, ad pediculum parum virentes.

II. Hyacinthus Orient. fl. cæruleo pleno: & Eyf.

III. Hyacinthus Orient. albus multiplici flore.

Hyacinthus candidissimus pleno flore, Eyf.

## HYACINTHUS STELLARIS.

I. Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus.

Narcissus Martius, Brunf.

Narcissus cæruleus & Hyacinthus alius, Trag.

Hyacinthus cæruleus minor mas, Fuch. ico.

Hyacinthus albicans seu fœmina, Fuch. Tur. Lugd.

Hyacinthi Germanici liliflori minor species, Lob. ob.

Satyrium trifolium, Dod. gal.

Bulbus fyl. quidam bifolius, Gef. hor. &

Hyacinthus, seu Bulbus fyl. Eid. col.

Bulbus vomitorius, Lon.

an Hyacinthus bifolius Theoph. Lob. ico.

Flore est cæruleo, in alijs colore magis saturo, alijs magis diluto, rarius ad carneum vergente, suaviter rubente: est etiam exalbido, & veluti cinericeo, subcæruleo flore: sunt qui & flavos notarunt.



II. *Hyacinthus stellaris trifolius*.

*Satyrium erythronium*, Dod.gal.

*Hyacinth. cæruleus minor*, Tur. minor fœmina, Fuch.ico.

*Hyacinth. cæruleus mas minor*, Fuch. Lugd.

*Hyacinthus Fuchij*, Dod.medius, Lon.

*Hyacinth. Germanicus liliflorus*, Ad. stellaris, vel flos Martius stellatus Germanicus, Lob.

*Hyacinthus stellatus*, Clus. hist. flore cæruleo, Cam.Eyft.

*Hyacinthi alterum genus*, Cæs.

Priore per omnia major & triphyllos, qui tamen voler, eundem dicat.

III. *Hyacinthus stellaris albus*.

*Narcissus candidus*, Trag.

*Hyacinthus niveus*, Fuch. floribus candidis, Dodon.

*Hyacinth. diphyllus Fuchij floribus candidis & purpureis*, Cord. obf.

*Hyacinthus stellaris albicans serotinus*, Lob. Lugdun.

*Hyacinthus albicans Botanicorum*, Lob. ad. part.2.

*Hyacinthus stellatus flore albo*, Cam.

*Bulbus vomitorius albo flore*, Lon.

IV. *Hyacinthus stellatus cæruleus staminibus ex viridi luteis*.

*Hyacinthus stellatus Italicus*, Eyft.

V. *Hyacinthus stellaris purpureus*.

*Hyacinthus stellaris major*, Lob. ad. par.2.

VI. *Hyacinthus stellaris spicatus cinereus*.

*Hyacinthus stellatus cineracei coloris*, Clus. hist. &

*Hyacinthus stellatus æstivus*, Eid. cur. post.

*Hyacinthus stellatus Byzantinus sive exoticus Someri*, latâ depresâ spicâ fastigiatus, Lob. ad. part.2.

an *Hyacinthus stellatus cinereus ex Gallica*, Eidem.

VII. *Hyacinthus stellaris cæruleus amœnus*.

*Hyacinth. stellaris Byzantinus alter elegantissimus serotinus bullatus*, Lob. ad. par.2.

*Hyacinthus latifolius Dalechampij*, Lugdun. icon.

*Hyacinthus peregrinus pluribus caulibus præditus, cæruleo violaceus*, Svvert.

Variat magnitudine & floris colore amœno cæruleo, dilutè cæruleo, quandoque ex cæ-

ruleo purpurascēte, vel violaceo : rarissimè albo.

VIII. *Hyacinth. stellaris obsoletè cæruleus*, vel major.

*Hyacinthus stellatus Byzantinus*, Clus. hist. & Eyft.

*Hyacinthus stellatus Byzant. tenuifolius præcox*, Lob. ad. part.2.

Huc referendus

*Hyacinthus Byzantinus flore cæruleo lacteo*, Svvert.

IX *Hyacinthus stellaris cæruleus striatus*.

*Hyacinthus stellatus Poreti*, Clus. cur. post.

X. *Hyacinth. stellaris saturè cæruleus*.

*Hyacinthus Hispanicus stellaris flore*, Clus. cur. post.

XI. *Hyacinthus stellaris æstivus cæruleo purpurascens major*.

*Hyacinthus stellatus æstivus*, Clus. hist. ap. altera.

Flores sunt subcærulei dilutiores : sic albi, staminibus purpurascētib.

XII. *Hyacinthus stellaris æstivus minor flosculis alternatim sitis*.

*Hyacinthus stellatus æstivus minor*, Clus. in auct. ap. alt. & cur. post.

XIII. *Hyacinthus stellaris foljis & radice lilij*.

*Hyacinthus stellaris lilifolius*, Lobel. Lugd. Ger.

*Hyacinthus liliaceus*, vel septimus, Tab.

*Hyacinth. stellat. λιβάδων*, Clus. hist. & ap. alt. ejusdemq; auctario & cur. post.

*Hyacinthus lilifolius flore cæruleo pallido*, Svvert.

Flores intensè cærulei, sive violacei, rarius nivei.

XIV. *Hyacinthus stellaris autumnalis major*.

*Hyacinthus autumnalis major*, Ad. Clus. hisp.

& hist. Lob. Dod. Lugd. (cui & *Typhium Theophrasti*) Ger.

*Hyacinthus stellatus autumnalis angustifolius major*, Eyft.

Aliquando cauliculis est ramosis, & Svvertius exhibet

*Hyacinthum autumnalem albo flore*.

*Hyacinthum flore purpureo pallido*.

XV. *Hy-*

XV. *Hyacinthus stellaris autumnalis* minor.

*Hyacinthus autumnalis*, Gef. hor. Ad. Clus. hisp. Lob. Lugd. Ger.

*Hyacinthus autumnalis minor*, Dod. Clus. hist. Eyft.

*Bulbus æstivus* Dalech. Lugd.

Flos cæruleus, purpuræ dilutioris, ex purpura rubens.

XVI. *Hyacinthus stellaris minimus*.

*Hyacinthus stellaris vernus pumilus*, Lob. ad. par. 2. Eyft.

XVII. *Hyacinthus minimus maritimus* in Prod. descript.

In Florilegio Svvertij adhuc pinguntur sex diversi *Hyacinthi*;

*Hyacinthus stellaris albus*: 2. cæruleus: 3. ex cæruleo violaceus: 4. carnei coloris: 5. luridus: 6. stellatus major, azureus, hicque elegantissimus existit.

## HYACINTHUS INDICUS.

I. *Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus*.

*Hyacinthus stellatus Peruanus*, Clus. hist. Lob. ad. par. 2. Eyft.

*Hyacinthus Peruanus*, Robino; flore cæruleo multiflorus, Svvertio.

*Hyacinthus stellatus Boëticus*, Clus. cur. post.

Variat colore floris, qui nunc è cæruleo purpureus, modò saturatoris purpuræ & quasi

violaceus, umbone purpureo, staminulis cæruleis: vel ex albo rubicante, umbone & staminulis albis, quem nomine

*Hyacinthi Peruani carnei coloris*, Svvertius pinxit.

II. *Hyacinthus Indicus bulbosus minor*.

*Hyacinthus Indicus minor Orientalis*, Svvert.

III. *Hyacinthus Indicus tuberosus flore Hyacinthi Orientalis*.

*Bulbus Indicus flore albo Hyacinthi Orientalis æmulo*, Paludano.

*Hyacinthus Orientalis Indicus*, Simoni Touar.

*Hyacinthus Indicus tuber. radice*, Clus. hist. Lob. ad. par. 2.

*Hyacinthus minor Indicus tuber. radice albus*, Svvert.

IV. *Hyacinthus Indicus tuberosus flore Narcissi*.

*Hyacinthus Indicus tuberosa radice*, Robino.

*Hyacinthus major Indicus tuberos. radice*, Svvert.

## HYACINTHUS COLCHICI folio.

I. *Hyacinthus latifolius maximus*.

*Hyacinthus Ind. Orient. dictus*, adhuc incognitus, Svvert.

II. *Hyacinthus latifolius alter*.

*Hyacinthus Africanus bulbo crasso facie Hyacinthi Peruani*, Svvert.

## BULBUS ERIOPHORUS

### BULBUS CRINITUS ET FLOS.

Tigridis.

**B**ULBI ἐριόφορος, id est, laniferi, inter veteres Theoph. 7. hist. 13. meminit, illum in littoribus nasci, lanamq. sub primis tunicis habere, ex qua togæ & alia vestes conficiantur: cujus & Plin. lib. 9. cap. 11. meminit, Theophrasti testimonio usus.

I. *Bulbus eriophorus Peruanus*.

*Eriophorus Peruanus*, Clus. hist.

Magnam cum *Hyacintho Indico bulbo* stellato affinitatem habet, hujus tamen folia duplo latiora: flos purpureus, circa umbili-

cum cæruleus, venâ atropurpureâ floris folium percurrente,

II. *Bulbus eriophorus Orientalis*.

*Bulbus eriophorus*, Clus. pan. & hist. Lob. Dod. Cam. Lugd. Tab.

Bulbus

Bulbus lanatus ex Oriente, Cæs.

Cum Dodonæus in florum historia ficticiam figuram posuerit, idcirco eandem figuram sub nomine

Eriophori bulbi commentitij, posuere Lobel. Lugd. at Cast.

Bulbi eriophori, & Tab. sub Eriophori bulbi altera icone.

Ipse verò Dodonæus edit. postrema, utramque figuram habet; alteram titulo Bulbi eriophori icon ab amico missa; alteram, Bulbi eriophori Viennæ nati effigies.

III. Bulbus eriphorus minor.

Hyacintho obsoleto Æthiopico, subjecit Clus. cur. post.

IV. Bulbus marinus crinitus, *τεχνώδης*, in hist. Lugd. proponitur; quid sit, ignoramus.

V. Tigridis flos, Dod. Lub. Lugd. Tab.

Ocelo Xochiel, id est, flos Tigridis, novæ Hisp. sive Mexiocanæ Provinciæ, in hist. Mexiocana.

Radicem habet porraceam, folia gladioli, flos rubet egregiè, circa medium tamen albus, & instar pellis Tigridis maculatus: hujus veram figuram in florilegio I. du Bry videre est.



## SECTIO SECUNDA.

# NARCISSUS: LEUCOIUM: LILIO- NARCISSVS SIVE TVLIPA.

## NARCISSUS ET EJUS SPECIES.

**N**ΑΡΚΙΣΣΟΣ καὶ λέγεον Dioscoridi l. 4. c. 161. & Theoph. 6. hist. 6. & 7. ejusdem 12. dicitur, non à Narcisso adolescente nimium seipsum adamante, ut Poëta fabulantur, sed à vi stupefaciendi, quam νάρκωσιν Græci vocant: seu ut Plinius, à narce, quam vim Narcisso inesse l. 21. c. 19. testatur: hinc Plutarcho in Symposio, quasi nervos hebetans & torpidas gravitates efficiens dicitur.

Unius Theophrastus meminit: at Dioscorides in flore differentiam notat, qui albus sit, intus croceus, in quibusdam purpureus, ita ut alius sit *περὺν ὀδὲς*, alius *κρεῖν ὀδὲς*, Et Plinio l. 21. c. 5. Narcissus alter flore candido, calyce purpureo: alter calyce herbaceo: per calycem intelligens quod in floris medio est, nullius Græci autoris exemplo: & seq. c. 19. Narcissum unum purpureo flore, & alterum, herbaceum dixit.

NARCISSUS PORRACEO FOLIO,  
angusto calyce, latifolius simplex,  
uno flore.

I. Narcissus maximus pallidus folijs in-  
canis.

Narcissus omn. maximus pallidus ad Clus.  
cur. post.

II. Narcissus maximus flore cæruleo albi-  
cante fimbriâ croco aureâ.

Narcissus maximus mediopurpureus, aut cæ-  
ruleus latifolius Hispanicus, Eyst.

III. Narcissus albus magno odore flore cir-  
culo pallido.

Narcissus 13. medioluteus Poëticus, Tab.

Narcissus mediopurpureus, Ger. ico.

Narcissus latifolius 7. Clus. hist.

IV. Narcissus niveus odoratus circulo ru-  
bello.

Narcissus ferotinus montanus, Clus. pan.

Narcissus latifolius 6. Clus. hist.

Narcissus mediocrubeus communis, Svvert.

V. Narcissus albus circulo purpureo.

Narcissus purpureus, Ges. hor.

Narcissus mediopurpureus, Dod. Lugd. Clus.  
pan. Eyst.

Narcissus mediocroceus purpureus, Ad.

Nar-

Narcissus Poëticus mediopurpureus, Lob.  
Narcissus, Cast. primus circulo rubeo, Cæs.  
Narcissus 14. & Poëticus 5. Tab.

Narcissus mediopurpureus præcox, Ger.

Unum fert florem, rarò binos: & huic simi-  
lem, circulo tamen rubro, in Pannonicis Clu-  
sius proponit,

Narcissum serotinum montanum vocans.

Narciss. medio rubeus communis, Svvert.

VI. Narciss. alb. circulo croceo vel luteo.

Narciss. Veterum, Trag. Candidus, Lon.

Narcissus primus, Dod gal. Cæs.

Narcissus Italicus flore candido, & Narcissus  
alb. Gef. hor.

Anemone limonia Theophrast. Narcisso co-  
gnata, Eid.

Narciss. Poët. mediocroceus, Lob.

Narcissus Poëticus medioluteus Dodonæi,  
Lugd.

Narcissus 10. roseoluteus major, Tab.

Narciss. medio purpureus præcox, Ger. ico.

Narcissus serotinus, Svvert.

Hic à priori potissimum circuli colore dif-  
fert, & Narcissus Dioscoridis videtur.

Hujus generis tres reperiuntur; forma, colo-  
re, aut odore nequaquam, & magnitudine pa-  
rum, sed floreandi tempore, differentes: majores, medij, præcoces: & serius prodeuntes, minores sunt.

VII. Narcissus albus circulo croceo minor.  
Narcissus minor serotinus mediocroceus, Lo-  
bel. ico.

Narciss. 16. serotinus albus, Tab. minor, sero-  
tinus, Ger.

VIII. Narcissus flore cæruleo, Clus. pan.  
Narciss. cæruleus, solo floris colore à Narcisso  
medio croceo differens, Lob. ad. part. 2.

### NARCISSUS EXOTICUS.

I. Narcissus Indicus totus ruber.

Narciss. latifolius octavus, qui & Indicus rubro  
flore, vulgo Jacobæus, Robi. Clus. hist.

Narcissus Indicus rubro flore, Lob. ad. part. 2.

Narciss. Ind. flore sanguineo, Svvert.

Ex India Orientali adfertur.

II Narcissus ex albo rubescens.

Narciss. Gareti, flore albo exteriori parte rubi-  
cundo Svvert.

III. Narciss. Ind. obtuso latiss. folio, bulbo  
vastissimo.

Narcissus Indicus Orient. bulbo magno & com-  
pressiore rotundo, folijs Narcissi, Svvert.

IV. Narciss. Ind. obtuso latissimo folio alter.  
Narcissus Indicus Occident. folijs Narcissi la-  
tifolij, Svvert.

V. Narciss. Ind. lato & multiplici folio.  
Narcissus promontorii Bonæ spei bulbo ob-  
longo, Svvert.

VI. Narcissus Africanus folijs bifolij.  
Narcissus Africanus sive Narciss. exoticus, Lo-  
bel. ad part. 2.

Variat folio acutiore, rotundiore, & compli-  
cato; flore est phœniceo.

### NARCISSUS LATIFOLIUS SIM- plex pluribus floribus.

*Narcissus totus albus.*

I. Narcissus albus major odoratus.  
Narcissus latifolius major, in latifoliorum clas-  
se alter, Clus. hist.

Communiter binos, interdum ternos &  
quaternos flores, & sex folijs, imò ex duode-  
cim constantes, Clusius notavit.

II. Narcissus Orientalis major albus.  
Narcissus Orientalis major polyanthos totus  
albus. Eyft.

Est latifolius, floribus copiosis albis perani-  
plis, odoratus, tribus staminibus luteis brevis-  
donatis.

III. Narcissus Orientalis medius albus.  
Narcissus Orient. medius totus albus polyan-  
thos, Eyft.

À priori sola magnitudine differt.  
IV. Narcissus Orient. albus calice stellato.  
Narcissus Orient. albus odoratus calice stella-  
to, Eyft.

Floribus est albis odoratis, in medio stami-  
na aurolutea instar stellæ radiatim disposita.

V. Narcissus totus albus major.  
Narcissus totus albus, Dod Lob. & Lugd.  
Narcissus totus albus prior, Clus. hisp.  
Narcissus latifolius simplici flore prorsus albo,  
Eid. hist.

Narciss. albus major, Cam. quintus albus, Tab.  
Narcissus Orient. polyanthos minor totus al-  
bus, Eyft.

Narciss. medioluteus polyanthos, Ger. ico.

VI. Narcissus totus albus major.  
Narcissus totus albus alter, Clus. hisp.  
Narcissus latifolius niveus alter, Eid. hist. deser.

*Narcissus* totus albus paucioribus floribus, Lob. ob.

*Narcissus* albus minor, Cam.

VII. *Narcissus* niveus.

*Narcissus* latifolius niveus tertius, Clus. hist.

VIII. *Narcissus* albus flore minore Jasmini odore.

*Narciss.* latifol. niveus tertius alter, Clus. hisp.

*Narcissus medioluteus.*

I. *Narcissus* orientalis albus calice luteo Campanulæ simili maximus.

*Narciss.* polyanthos orient. calice medioluteo odoratus maximus, Eyf.

Hujus, ut & duorum sequentium calix, campanulæ instar amplius luteus: flores jucundum odorem spirant.

II. *Narcissus* orientalis albus calice luteo medius.

*Narciss.* polyanthos orient. medioluteus odoratus medius, Eyf.

III. *Narciss.* orient. albus calice luteo minor. *Narciss.* polyanthos orient. medioluteus minor odoratus, Eyf.

IV. *Narcissus* orient. calice aureo pluribus foliolis pleno.

*Narcissus* orientalis mediocroceus calice pleno, Eyf.

Flos albus, calice aureo pluribus tortilibus foliolis pleno.

V. *Narcissus* Orient. calice rotundo auro-luteo.

*Narciss.* orient. mediocroceus major, Eyf.

VI. *Narcissus* pallidus mediocroceus.

*Narciss.* medioluteus Pisanus, Lob. ico. Svvert.

*Narcissus* latifolius flore prorsus albo secundus, Clus. hist.

VII. *Narcissus* pallidus medioaureus.

*Narcissus* sulphurei coloris minor, ad Clus. cur. post.

VIII. *Narcissus* albus circulo croceo polyanthos.

*Narcissus.* Matth. comp. octavus, edit. Ital.

*Narcissus* mediocroceus serotinus polyanthos, Lob. ico.

*Narciss.* quart. Matthioli, Lugdun.

*Narcissus* 15. niveus serotinus, Tab. totus albus, Ger. ico.

*Narcissus*, Castori; quem quinto simplici flore junxit.

Hic etiam circulo purpureo reperitur, qui *Narcissus* mediopurpureus, Eyf.

IX. *Narcissus* pallidus circulo luteo.

*Narcissus* medioluteus, Dod. Lugd. Ger. Svvert. Eyf. tetr.

*Narcissus* albidus medioluteus, Lob.

*Narcissus* 6. medioluteus 1. Taber.

*Narcissus* latifolius flore prorsus flavo, Clus. hist. icon.

X. *Narcissus* pallidus circulo aureo alter.

*Narcissus* latifolius 5. vel *Narcissus* pallido flore medioaureus, Clus. hist.

Meminit Clusius & alterius, cujus flos ex pallido virefcit, calice angusto flavo.

XI. *Narcissus* medioluteus copioso flore odore gravi.

*Narcissus* octavus fortè Matth.

*Narcissus* medioluteus, Ad. Lob. (cui & Donas Narbonensium) Clus. hisp. Svvert. medioluteus alter, Dod. Lugd.

*Narcissus* præcox simpl. flore, vel latifolius simplex 1. Clus. hist.

*Narcissus* 7. medioluteus 2. Tab.

*Narcissus* Pisanus, Ger.

*Narcissus* alter comofo flore, Cæf.

*Narcissus* Constantinopolitanus minor calice fimbriato, mediocroceus, Eyf.

Variat folijs obrufioribus & acutioribus: sic floris colore, qui aliquando sulfureus, five *ωχρό-λουνος*: aliquando 10. 12. etiam 18. flores observavimus.

XII. *Narciss.* medioluteus majorib. floribus.

*Narcissus* præcox, Clus. hisp.

*Narcissus* medioluteus alter, Lob. obs.

*Narciss.* latifol. Byzantin. mediolut. 2. Clus. hist.

Præcior priore, latioribus folijs, & floribus majoribus.

XIII. *Narciss.* niveus calice flavo odoris fragrantissimi.

*Narciss.* latifol. simpl. mediolut. 3. Clus. hist.

*Narcissus totus luteus.*

I. *Narcissus* luteus polyanthos Africanus.

*Narciss.* Africanus major, flavus polyanthos: in addit. ad Clus. cur. post.

*Narcissus* Africanus multiflorus coronatus, Svvert.

*Narcissus* luteus Africanus major, &

*Narcissus* Africanus aureus major, Rob.

II. *Narciss.* luteus polyanthos Lusitanicus.

*Narciss.*

Narcissus d'Argiers, aut Ægyptius, Lob. ad. part. alt.

Narciss. de Argiers polyanthos totus lut. Eyft.

Narciss. Africanus flore aureo, Svvert.

III. Narciss. luteus Constantinopolitanus.

Narciss. totus luteus ex Thracia, Clus. hisp.

Narciss. latifolius flavo flore sive 4. Zerincadacamer nomine allatus, Eidem hist.

Flos aut omnino luteus, aut pallidus: qui pallidus, caliculum planè aureum habet.

IV. Narciss. angustifolius totus luteus.

Narcissus totus luteus semper florens Caccini, ad Clus. cur. post.

Singulis caulibus ad quindenos flores, idque sæpius in anno, Florentiæ profert.

V. Narciss. angustifol. flavus magno calice.

Narcissus 9. qui angustifolius 1. vel Narcissus juncifolius 1. amplo calice, Clus. hist.

Narciss. maximo calice, flore luteo, Svvert. qui alium adjungit.

Narcissum oblongo calice, flore luteo.

Narciss. juncifolius præcox major, &

Narciss. juncifolius latiore calice, Eyft.

### NARCISSUS PORRACEO angusto folio.

I. Narcissus angustifolius albus major.

Narcisso juncifolio albo flore, junxit Clus. in cur. post.

II. Narciss. angustifolius albus minor: qui 1. in Prod.

III. Narciss. angustifol. pallidus calice flavo.

Narcissus sulfurei coloris majusculus, ad Clus. cur. post.

IV. Narcissus parvus albus fimbria suave rubente.

Narcissus parvus stellatus albus medio suave rubente vertice, Lob. ad. par. 2.

V. Narcissus mediocroceus gramineo folio.

Narcissus mediocroceus tenuifolius, Lob. ad. par. 2.

### NARCISSUS JUNCIFOLIUS. simplex, luteus & albus.

I. Narciss. juncifol. oblongo calice luteus major.

Narciss. juncifolius prior, Clus. hisp. Lugd.

Narciss. juncifol. major, Dod. odoratiss. Cam.

Narciss. luteus juncifolius vel luteus Africanus, Ad. præcox, Lob.

Narciss. 10. angustifol. 2. & juncifol. 1. Clus. hist.

Narciss. 8. juncifolius 1. Tab. juncifol. præcox, Ger.

Narciss. major juncifol. Eyft.

Flores terni, quaterni, quini, interdum gemelli odorati.

II. Narciss. juncifol. luteus minor.

Narciss. juncifol. Dod. flo. Lugd. alter, Clus. hisp.

Narciss. juncifol. minimus Dod. Camer. Clus. hist. Eyft.

Narciss. juncifolius serotinus, Lob. Ger.

Narciss. 9. juncifolius 2. Tab.

Narciss. flore luteo, brevi calice, Svvert.

Clusius frequentioribus: Lobelius paucioribus folijs dicit: uterque eadem figura utitur: unico aut altero flore flavo & odoro.

III. Narciss. juncifol. flore luteo variegato.

Narciss. luteus albicantribus lineis distinctus, brevi calice, Svvert.

IV. Narcissus juncifol. flore pallidiore, calice flavo.

Narciss. juncifol. minor, Clus. hist. ap. & Lob. ad. par. 2. minimus, Eyft.

V. Narciss. juncifol. flore rotundo roseo.

Narciss. juncifolius flore rotundæ circinatis roseo, Lob. Lugd. Svvert. cui flos albus est.

Narcissus 10. roseoluteus major & minor, Tab.

VI. Narcissus juncifolius totus albus.

Narciss. juncifol. flore albo, alter, Clus. ap. alt. auct. & cur. post.

Narciss. juncifol. polyanthos albus, Eyft.

VII. Narciss. autumnalis albus.

Narcissus juncifolius albus autumnalis medio obsoletus, Svvert.

VIII. Narciss. albus autumnalis minimus.

Narciss. autumnalis minor, Clus. hisp. Lugd.

Tab. Ger. parvus, Dod. Lob.

Narciss. serot. sive autumnal. minim. Clus. hist.

IX. Pseudonarcissus gramineo folio, sive Leuconarcissus æstivus: qui 2. in Prod.

### NARCISSUS MAGNO ET brevi calice.

I. Narciss. latifol. max. alb. calice brevi luteo. Narcissus albus max. calice luteo brevi, Eyft.

II. Narciss. latifolius pallidus calice amplo & aureo, caule striato.

Narcissus latifol. flavo flore amplo calice, Clus. cur. post.

Pseudonarcissus pallidus calice amplo, Eyft.

Variat unico flore, aliquando binos conjunctos habet: hic intensè luteus, ille pallidus: ad Clus. cur. post.

III. Narciss. latifol. pall. calice amplo alter. Narcissus omnium maximus pallidus amplo calice flavo: in addit. ad Clus. cur. post.

IV. Narcissus latifolius sulfureus vel albus brevi calice.

Narcissus sulfurei coloris brevi calice, Svvert.

Narcissus totus albus brevi calice, Idem.

Pluribus est floribus. Addit & alium rotum album triplici flore & angustiore folio.

V. Narcissus albus medius calice luteo brevi: & Eyttet.

### NARCISSUS MAGNO ET OB- longo tubo vel calice, latifolius.

I. Narcissus maximus pallidè luteus. Narcissus maximus griseus vel pallidus, amplo calice flavo, non descriptus, Svvert.

II. Narcissus alter crasso bulbo. Narcissus minor pallidus amplo calice flavo non descriptus, Svvert.

III. Narcissus subflavus tubo sexangulo. Narcissus falsus sive Pseudonarcissus tuba sexangulari dilutior flavus non descriptus, Svvert.

IV. Narcissus flavus tubo rotundo. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flavo flore, Svvert.

V. Narcissus albus tubo luteo. Narcissus seu Pseudonarcissus albus oblongo calice luteo, Svvert.

VI. Narciss. alb. calice flavo, moscari odore. Narcissus oblongo calice, Clus. hist. ap. alt. Narcissus albus luteo longiore calice, ad Clus. cur. post.

Pseudonarcissus albus calice luteo, Eyft. Triplicis Clusius meminit: 1. fl. albo, calice flavo. 2. flore albo, sed calicis ore magis croceo: 3. flore ex albo pallescente, aut *ἀχρολεύω*. calice latiore & oris croceis.

Et in curis post. in alijs stylus tubi oras superat, in alijs non excedit. Aliquando (ut ad cur. post. additum) fore majore ex folijs niveis, aut candidis, sed angustioribus & oblongis, odore grato.

VII. Narcissus albus calice flavo alter. Narcissus albus oblongo calice præcox, ad Clus. cur. post.

Triplex species: 1. latis & viridibus folijs, caule brevior, flore albo, tubo flavo: 2. folijs angustioribus: 3. folia tubum cingentia pallida, angustiora, & acuminata: & est tubo fimbriato & non fimbriato, ut est

Narcissus tuba non fimbriata flavescente, Svva.

VIII. Narcissus syl. pallidus calice luteo. *Βαλβουώδιον* Theoph. Codiaminum Gaza vertit, Plin. lib. 22. cap. 11. secutus.

Narcissus Brunf. Lac. quo ad ico. primam.

Narcissus luteus, Trag. Gef. hor.

Narcissus 8. Matth. fol. quo ad ico. 1.

Narcissus 3. Eid. comp.

Narcissus Matthioli, Lugd. quoad 2. ico. an Narcissus, Ang?

Codianum, vel Codiaminum flore Codij, id est, Campanulæ, Gef. hor.

Bulbus syl. & Codiaminum, Eid. col.

Pseudonarcissus, Dod. gal. vulgaris, Clus. hist.

Pseudonarcissus luteus, Tab. Eyft.

Narcissus luteus syl. Dod. Lon. Lugd.

Narcissus totus luteus montanus, Theoph. Ad. & Lob.

Narcissus calice prælongo anguloso, Cæs.

Pseudonarcissus Anglicus & Hispan. Ger.

Pseudonarcissus minor Germanicus, Svvert.

Cauli cuilibet communiter flos unus insidet: aliquando duo: hinc Pseudonarciss. vulgaris binos flores in eodem caule gerens, Clus. hist. ap. alt. verum & triplici flore adservo: reperitur & magis præcox, Clus. hisp.

Pseudonarcissus præcox, Eyft.

Sic Clus. hist. ap. alt. auctar. multas notat differentias, flores majores, minores, forma & colore dissimiles: aliquibus sex folia tubam amplexantia præpallida, alijs pallida, alijs saturatiora: tubus aut valdè amplus, aut angustus, qui vel pallidus, vel flavus & quasi aureus, aut oris crenatis, vel crenatis & fimbriatis simul, quales sunt

Pseudonarcissus simpl. Belgarum &

Pseudonarcissus luteus, Eyft.

Aut quodammodo æqualibus, & minimè crispis. Hue referri possunt:

Bulbus flore luteo superiore parte aperto, &

Bulbus alius flore luteo humili, cujus semen simile Hemerocallidi Valentinae: plura non habet, Clus. pan.

IX. Narcissus maj. tot. lut. calice prælongo. Pseu-



*Pseudonarcissus major*, Cluf. hisp. & Hispanicus Cluf. hist. Svvert.

*Narcissus* fyl. alter, Dod.

*Narcissus totus luteus montanus*, Theophrasti. Hispanicus, Lob.

*Narcissus totus luteus montanus major*, Eyft.

Huic similis inodorus, inefficacior locis ad meridiem, Ad.

X. *Narcissus totus luteus flor. folijs reflexis*. *Narcissus totus luteus oblongo calice & reflex. folijs*, Eyft.

XI. *Narcissus parvus totus luteus*.

*Pseudonarcissi* genus admodum exile, Cluf. pan.

*Pseudonarcissus minor* Hispanicus latifolius, Cluf. hist.

*Narcissus totus luteus mont. minimus*, Eyft.

*Narcissus* Hispanicus flore luteo pumilus, Svvert.

XII. *Narcissus albus oblongo calice*.

*Pseudonarcissus albo flore*, Cluf. hist. ap. alt. auct. totus albus, Eyft.

*Narcissus oblonga tuba totus albus*, Svvert.

Duplex est: unus altior flore longiore & tubo angustiore, flore albo, vel etiam *αχρόδενος* colorem accedente: alter humilior, flore brevior & tuba laxiore. Aliquando flos non pendulus sed protuberans, Cluf. cur. post.

XIII. *Narcissus albus fimbria lutea*.

*Pseudonarcissus* flore albo tuba oblonga, fimbrijs luteis, Svvert.

XIV. *Narcissus luteus repens*.

*Pseudonarcissus minor luteus repens*, Eyft.

#### NARCISSUS OBLONGO CALICE, vel Calathi figurâ, angusto etiam juncifolio.

I. *Narcissus angustifolius albus calice oblongo floreque reflexo*.

*Narcissus juncifolius albus fl. reflexo*, Cluf. ap. alt. auctar. & cur. post.

*Narcissus juncifolius alb. calice magno*, Lob. ad. par. alt.

*Narcissus totus alb. reflexus*, Svvert.

II. *Narcissi montan. juncifol. calice flavo*.

*Pseudonarcissus primus*, Cluf. hisp. juncifol. primus, Cluf. hist. & juncis folijs, Eid. cur. post.

*Narcissus montanus juncifol. minimus*, Lob. Lugd.

*Narciss. juncifol. fl. luteo reflexo*, Svvert.

III. *Narciss. montan. alter flore fimbriato*.

*Pseudonarciss. juncifol. 2. flavo flore*, Cluf. hist.

*Narciss. montan. juncifol. minim. alter, flore luteo fimbriato*, Lob. Lugd.

*Pseudonarciss. juncifol. Eyft.*

Huc referendus

*Narciss. tubâ fimbriatâ flore flavescente*, &

*Narciss. pseudojuncis folijs luteus fimbriat.* Svvert.

IV. *Narciss. montan. albus minimus*.

*Narcissus omnium minimus montanus alb.* Lob. Lugd.

*Pseudonarciss. juncifol. 3. albo flore*, Cluf. hist.

Variant hi tres: alijs flos amplior, vel flavescentis coloris, vel flavi, vel aurei: in nonnullis stilus oras excedit, in alijs vix ad oras pertingit: aliquando oris æqualibus, aliquando fimbriatis.

V. *Narciss. montanus juncif. calice aureo*.

*Pseudonarciss. minim. juncifol. aureus*, Eyft.

VI. *Narciss. montanus coronatus*.

*Narcissus montanus minimus coronatus*, Lob. ico.

#### NARCISSUS PLENO FLORE.

I. *Narcissus Orient. fl. multiplici & pleno alboluteo*.

*Narcissus nobilis Orient. polyanthos mixtus*, Eyft.

II. *Narciss. latifol. alb. medioluteus*.

*Narciss. 9. Matth. comp. & primus*, Eid. fol.

*Narciss. 8. Matthioli*, Lugd.

*Narciss. flore multiplici*, Cluf. hisp. (pleno flore i. in hist.) Lugd. multiplex, Dod.

*Narciss. albus polyanthos* (sive Chalcedonicus & multiplex) Lob. Ger.

*Narciss. 4. Lon. 1. polyanthos*, Matth. Tab.

*Narciss. exoticus sive Constantinopolit.* Cam.

*Narciss. major fl. multiplici*, Eyft.

*Narciss. Chalcedonicus pleno flore albo*, Svvert.

*Narcissi mediocroci plenifloris degeneratio- nes*, in sua historia se propositurum, Lob. ad. par. 2. pollicetur.

III. *Narciss. latifol. alb. medio aureus*.

*Narciss. pleno flore secundus*, Cluf. hist.

Terni, quaterni, flores, suavis odoris.

IV. *Narciss. albus corona multiplici lutea*.

*Narciss. pleno flore 2. Cluf. pan. 3. Eid. in hist.*

*Narciss. albus alter media fimbriata lutea mul-*

tiplici corollâ, Lob. ico.

Narcissus juncifolius multiplici complexu, constans, Cæf.

Narcissus medioluteus corona duplici, Svver.

Odore est, inter Narcissum & Muscari medio: etiam cum decem floribus vidimus.

V. Narcissus bulbo anguloso.

Narciss. Constantinopolitanus, quem Zeiden Sari vocant, Camer.

VI. Narciss. multiplex totus flavus.

Narciss. plenus quartus flavo flore, Clus. hist.

Narciss. flavus pleno flore, Svvert.

VII. Narcissus mediopurpureus multiplex.

Narcissus pleno flore quintus, Clus. hist.

Flos unus, interdum duo, odore ad Muscari accedens: aliquando viginti & pluribus: aliquando sexaginta quatuor folijs constat.

VIII. Narcissus totus niveus multiplex.

Narciss. pleno flore sextus, Clus. hist.

Narcissus albus pleno flore, Svvert.

IX. Narciss. albus multiplex ex Virginea.

Narcissus totus albus de Virginea pleno flore, oblongo apice, Svvert.

X. Narcissus sylv. multiplex calice carens.

Pseudonarcissus pleno flore, Clus. hist.

Pseudonarcissus luteus polyanthos, Tab.

Narcissus sylv. multiplex, Dod.

Narciss. luteus multiplici flore, Lob.

Narciss. luteus multiplex Dodonæi, Lugd.

Narcissus cujus flos multiplici plexu rosæ instar constat, Cæf.

Narcissus ex luteo pallidus flore pleno, Cam.

Narciss. sylv. stellatus, Eyf.

Duplex est: unus elegantior est, florem explicatum semper gerens: hic

Pseudonarcissus luteus flavo pleno flore, Svve.

Alter verò florem explicat, sed involucri inclusus permanet: uterque pallidus.

XI. Narcissus flore pleno variegato.

Narciss. Septentrionalis flore pleno luteo, Eyf.

XII. Narcissus luteus syl. duplici & triplici tubo aureo.

Narcissus duplici tuba flore luteo, Svvert.

Pseudonarcissus pleno flore, seu triplici tuba, Clus. hist. ap. alt. & cur. post.

Narcissus Septentrionalis calice luteo pleno, duplicatis folijs, Eyf.

XIII. Narcissus luteus syl. triplici tubo alter.

Pseudonarcissi pleno flore varietas, Clus. cur. post. qui duplicem proponit.

Narcissi totilutei præcoci Septentrionalium, sive montani Theophr. omnium vulgarissimi, triplicem ex eadem radice differentiam, additâ figurâ, Lob. ad. par. 2. recenset.

Narciss. Septent. fl. pleno luteo oris incis, Eyf.

XIV. Narciss. luteus tubo diviso.

Pseudonarcissus duplex diviso calice odoratus, Svvert.

XV. Narciss. latifolius luteus multiplex.

Narcissus Cyprius luteus polyanthos fl. pleno,

Lob. ad. par. alter. & addit

Narcissum polyanthea Byzantinum hujus familiæ esse, quem tamen non describit.

XVI. Narcissus juncifol. aureus multiplex Anemones formâ.

Narcissus juncifol. pleno flore, Clus. cur. post.

Narcissus juncifolius luteus flore pleno, Eyf.

Est & huic similis alter, qui licet multiplex sit, tamen adeo multiplex foliorum textura non est, quem

Narcissum aureum pleno flore vocat Svvert. hunc à Patre Gregorio de Regio Capucino, unâ cum alijs ex Italia accepimus.

## NARCISSUS MARITIMUS.

I. Narcissus maritimus.

Ἡμεροκαλλίς, Theoph. 6. hist. 1. ubi Elium Gaza vertit.

Hemerocallis quibusdam putatur, Bulbus scilicet littoralis, Theoph. Pancratium Monspel. & Squilla minor Pharmacop. Ges. hor.

Hemerocallis Valétina, Clus. hisp. & hist. Dod. fl. Lob. (cui & Narcissus Constantinopolitanus Matth.) Cam. (cui & Con Zambach Turcis) Taber.

Pancratium marinum, Ad.

Pancratium floribus rubris, Lob. ico.

Pancratium Dalech. Lugd.

Narcissus marinus, Dod. Clus. hist. ap. alt. & cur. post. Cæf.

Narcissus Pancratium marin. flore albo, Svve.

Variat flos colore: apud Monspelienfes est albo, est subluteo, & est pallecente: apud Italos, rubeo & purpureo, quandoque punicante: hinc apud Lobelium in iconib. duplex figura,

Pancratium marinum, &

Pancratium floribus rubris: & apud Taber.

Lilium marinum album,

Lilium marinum luteum:

Narcissus major five Pancratium floribus rubris,

bris, & Narcissus Pancratium maritimum sive Hemerocallis Valentina, Svvert.

## II. Narcissus Illyricus liliaceus.

Narciss. 3. vel Constantinopolitanus, Matth. & Lugd. qui priorem putat.

Afouzenas de las Indias, Lob. ob.

Lilionarcissus Hemerocallidis Valentinae facie, &

Lilionarciss. Orient. Plateau, Clus. hist.

Lilionarciss. Hemerocallidis facie, Eyst.

Narcissus montanus sive marinus alter, qui Matthioli tertius, Clus. hist. app. 2. & in auct. hujus meminit.

Narcissus Constantinopolitanus, Tab.

Narciss. 3. Matthioli multiflorus albus, Svvert.

Pancratium Indicum alterum vernum, sive

Narcissus Indicus alter facie Pancratij Monspeliani, Lob. ad. par. 2.

Flores feni, septeni: sic, caule duplici: ab uno 14. Liliacei candidi, ab altero 12. aliquando unus caulis triginta quinque; flores sustinuit: aliquando flos fuscus caryophyllo aromatico concolor.

## III. Narcissus Indicus autumnalis.

Pancratium Indicum, aut Narcissus Indicus maximus autumnalis quorundam, Lobel. ad. part. 2.

IV. Narcissus Indicus folio latissimo triquetro.

Narcissus sive Pancratium Orientale Svvert.

## V. Narcissus Indicus latifolius alter.

Narciss. Indic. sive Pancratium Occid. Svvert.

# LEUCOIUM BULBOSUM EJUSQUE Species.

*Λευκόιον apud Theoph. 6. hist. 7. & 7. ejusd. 13. Gaza violam albam vertit. Leucoion, inquit, florum prima se ostendit, emicat ubi cælum clementius statim, etiam nondum hyeme exacta: ubi verò immitius, postea. Plin. l. 21. c. 11. Viola alba florum prima ver nunciantium, cujus vita longissima est trimatus.*

## I. Leucoium bulbosum vulgare.

Leucoium Theophrasti, & Viola alba, Plinij.

Narciss. Martius. Brunf. septimus, Matth. Lugd.

Viola alba Theoph. Trag. (cui & Hemerocallida Diosc.) Fuch. Gef. car.

Narcissus & Viola alba, Tur.

Narcissi candidi genus, Cord. in Diosc.

Narcissus aquaticus, Cæs.

Viola alba bulbosa Fuchsi, Lugd.

Leucoium Theoph. Dod. gal. Lon.

Leucoium bulbosum Theoph. Gef. hor. Thal.

Leucoium bulbosum primum, Tab.

Leucoium bulbosum hexaphyllum, Dod. Cam. minus, Eyst.

Leucoium bulbosum præcox majus, Clus. pan. & hist. Ger. ico.

Leucoium alterum bulbaceum Theoph. Portæ.

Leuconarcissolirion prat. vernum paucioribus floribus, Ad.

Leuconarcissolirion paucioribus floribus, Lob.

Leuconarcissolirion vulgare, & Opition Theophr. Cam. in Matthiolum.

Narcissus Germanicus vulgaris, Svvert.

Flores in singulis pediculis singuli, rariss. gemini: tribus & quinque folijs pingit, Svvert. nomine

Narcissi Hispanici Leucoij minoris.

## II. Leucoium bulbosum flore patulo.

Narcissoleucoion Bohemicum, Svvert.

Leucoium bulbosum hexaphyllum majus, Eystett.

Folij est latioribus, flore majore & patulo.

III. Leucoium bulbosum majus five multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinij statuunt.

Leuconarcissolirion prat. vernum, Ad. Lob.

Leucoium bulbosum polyanthemum, Dodon.

Cam. Lugd. multiflorum, Tab.

Leucoium bulbosum majus, Ger.

Leucoium bulbos. serotinum majus, Clus. pan.

Leucoium bulbosum serotinum, Eystett. qui & minus exhibet.

Narcissus 2. Matthioli. Lugdunens. 3. & Matth. 10. Tab.

Narcissoleucoium majus Hispanicum, Svvert.

Variat folijs pallidioribus minus mucronatis sed

sed velut bifidis: floribus, maculis ex viridi pallidioribus infectis.

IV. *Leucoium bulbosum trifolium minus*.  
*Narcissus terrius alter*, Matth. comp.

*Narcissus* 8. alter, Eid. fol. 2. Lac. ico.

*Leucoium bulbosum triphyllon*, Dod. Cam. minus, Eyst.

*Leucoium bulbosum præcox minus*, Clus. pan. & hist.

*Leuonarcissolirion prat. vernum omn. minimum*, Ad.

*Leuonarcissolirion minimum*, Lob.

*Leuonarcissolirion bifolium*, Cam. in Matth.

*Narcissus*, Matth. quoad. 1. fig. Lugd.

*Narcissus montanus alter*, Cæs.

V. *Leucoium bulbosum trifolium majus*.

*Leucoium bulbosum Byzant. Clus. pan. præcox*, Eid. hist. & Lob. ad. par. 2. & *Leuonarcissolirium*, sive tertium bulbosum *Leucoion*, Lob.

*Leucoium bulbosum triphyllum majus Byzantinum*, Eystett.

an *Narcissus sextus*, Matth. Lugd.

*Leucoium bulb. 2. Tab. sub bulb. præcoce*, Ger.

VI. *Leucoium bulbosum trifolium cæruleum*.

*Leucoium triphyll. flore cæruleo Someri*, Lob. ad. part. 2.

VII. *Leucoium bulbosum autumnale latrifolium*.

*Narcisso leucoium autumnale*, Svert.

VIII. *Leucoium bulbosum autumnale*.

*Leucoium bulbosum autumnale minimum*, Dod. minus, Clus. hisp. Lugd. & Cam.

*Leucoium bulbosum autumnale tenuifolium*, Clus. hist.

*Leuonarcissolirion minim. autumnale*, Lob.

IX. *Leucoium bulbosum tenuifolium vernum*.

*Leucoium bulb. vernum minimum*, sive folio capillari præcox, Clus. cur. post.

X. *Leucoium unico & junceo folio*.

*Bulbus μονόφυλλος* seu unifolius.

an *βολβιον* Theophrasti, Clus. hist. app. 2. auct.

an *Orinthogalum unifolium flore albicante*, Svert?

XI. *Leucoico bulbo affinis duplex*.

*Bulbus* quatuor aut quinque flores gestans in modum *Campanulæ albæ*, Clus. pan. & hist.

Alterum addit bulbum flore magno, *Campanulæ* forma, terram spectante, intus luteo, foris purpureo, ibid.

## TULIPA ET EJUS SPECIES.

**T**ulipa, cujus descriptionem & figuram primus Gesnerus, Anno 1560. in append. ad Cordi hist. dedit, à pileo Dalmatico, vel amiculo capitis, ab ipsis gestari solito, nomen habet, idq; propter floris cum pileo similitudinem. Sunt qui *Anemonem*, λαμωνας Theoph. velint, cum ibi *Pulsatillam* intelligere videatur: alij *Cynorrhodon* Plin. l. 21. c. 5. censent: alij ad *Satyrrium trifolium* referunt. Turca Alé & Zampul vocant. πυθίωνα fortè Theophrasti.

Genera prima tria sunt: præcocius unum: serotinum alterum: dubium tertium, medio tempore florens.

*Præcox*, caule est pedali, firma medulla pleno, quem folia plerumq; terna, nonnunquam quaterna & quina amplectuntur, propendentia & nutantia, interdum surrecta: cauli flos unicus (rarissimè gemini, vel summo caule conjunctim nascentes, vel bifido inherentes) sex folijs (rarissimè septenis & octonis) constans, ex quo tot stamina, quot folijs constat, colore variantia prodeunt.

*Serotina*, caule est cubitali & tripedali. fungosa materia pleno, quem quaterna plerumq; folia, nonnunquam quina & sena firmiora, ut plurimum erecta non nutantia ambiunt: semine quam in præcoci majore, & bulbo longiore majoreq; plerumq; constat: sic & caulem ramosum interdum habet.

*Dubia*, quæ præcocium flore marcescente suos explicant, & serotinis florere incipientibus, jam

*jam senescunt, & cum his interdum florent. Sunt inter has nonnulla, quæ serotinarum magnitudinem aquant: aliæ quæ præcoces non superant, nec illis forma abfimiles sunt: & illa quidem vel amplissimis floribus prædita, vel præcoce non majoribus: quadam etenim præcocius humiliores sunt.*

*Omnium folia apice mucronato, aut orbiculato: vel tria interiora orbiculata, exteriora mucronata, & contrà existunt.*

### TULIPA PRÆCOX SIMPLICIS & unius coloris.

#### I. Tulipa præcox lutea.

an Satyrion triphyllon Dioscoridis.

Tulipa alia, Ges. ap. ad Cordum, lutea, Cast.

Lilionarcissus luteus, Lob.

Tulipa præcox flava, Clus. hist. tota lutea, Ger.

an Ouludia, Lugd.

Variat: vel pallet, unguibus plerumq; aureis, vel ad auri fulgorem accedentibus, unguibus veluti fuligine aspersis: interdum flos inodorus, vel odor imbecillus, vel quasi croci sive etiam ceræ recentis. Aliquando flavus, sequenti anno flavum & rubrum commixtum habuit.

#### II. Tulipa præcox rubra.

Tulipa Turcarum, Ges. ap. ad Cordum.

Narcissus quintus, Matth. Lugd.

Anemone limonia Theophr. Tulipa quorundam, Ges. hor.

Lilij rubentis genus videtur: Idem.

Satyrion erythronium fortè: Idem.

Lilionarcissus sanguineus puniceusve, Ad. Lob.

Tulipa, Dod. Lon. major, Lug. rubra, Cast. præcox rubra, Clus. hisp. pan. & hist.

Colore est nunc saturatiore, modo dilutiore & gratissimi aspectus: interdum ineleganti & obsoleto: foliorum ungues, vel lutei omnino, aut levi fuligine in luteo aspersi: in quibusdam in medio ungue macula nigra, in alijs ita lata, ut sola linea lutea ambiens conspiciatur: interdum ungues folij partem dimidiam occupant. Odor instar mali aurei, ut plurimum obscurus, vel papaveris virus referens. Aliquando qui ruber fuit, sequenti anno variè commixtus, ex rubro & flavo inter se confusis coloribus, modo flavo, medium folium occupante, modo rubro, vel utroque radiatim per oras discurrente fuit. Verùm eæ, quæ nativum colorem mutant, subinde corrumpi solent. Huc pertinent ex Eyst.

Tulipa præcox floribus rubris in album luteum languescentibus.

#### III. Tulipa præcox purpurea.

an Cosmo sandalos Veterum inter coronarias?

Lilionarcissus purpureus, Lob.

Tulipa præcox purpurea, Clus. hist.

Aliàs dilutior & Damascenam rosam colore referens: interdum adeò diluto, ut albescere videatur: aliàs purpura saturatior, & violaceum sive amethystinum colorem habet: hic est, Lilionarcissus purpureo violaceus, Lob.

Aliàs Pæoniæ floris æmulus: aliquando ex purpura nigricat, & obsoletior est: hic est,

Lilionarcissus purpureus sanguineus, puniceusve quintus, Lobel. & huc referas duos sequentes:

Lilionarciss. sanguineum paniceumve 8. &

Lilionarcissum sanguineum puniceumve obsoletum, tribus exterioribus mucronatis folijs, internis verò retusis, Lob.

Ungues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt: nonnulli apices nigros habent, pediculis veluti fuligine infectis: odora est & inodora. Aliquando purpurea, sequenti anno album & purpureum colores, variè inter se commixtos, & radiatim folia secantes, habuit. Item ex Eyst.

Tulipa purpurea calice pallescente &

Tulipa summe miniata calice luteo.

#### IV. Tulipa præcox alba.

Lilionarcissus niveus, Lob. ico.

Tulipa præcox alba, Clus. hist.

Flos omnino candidus, nisi tria folia exteriora dorso cineracei vel cærulei quippiam admixtum haberent; ungues lutei, nonnunquam veluti fuligine aspersi, apicibus & staminibus pallidis, aliquando ungues profus albi, apicibus nigricantibus:

Admonet Clusius, se Tulipas cærulei omnino coloris nondum vidisse: totum florem pallidè violaceum in horto meo habui.

### TULIPA PRÆCOX

Varia.

#### I. Tulipa præcox rubra varia, Clus. hist.

Rubra variæ floris folia exteriora mucronata,

H

inte.

interiora orbiculata, magna ex parte sunt: hujus differentiarum octo:

1. Est magnis oris auri fulgore splendentibus, magnis unguibus luteis: apicibus, vel nigris, vel obsoleta purpura tinctis, pediculis veluti fuligine infectis.

2. Foliorum exteriorum ora foris lutea, interiorius dilutius rubentia, rubedine quasi radiatim in luteas oras desinente: at interiora rubent, ungues lutei, stamina cinerea.

3. Folia dilutius minij colore rubent, oris mediocribus, foris minij colore, interiora folia ferè tota occupante, & virgatim in oras luteas desinente: unguibus magnis, flavis, apicibus cineraceis, pediculis luteis.

4. Folia exteriora medio dorso luteo, sanguineis virgulis distincta sunt, parte reliqua rubra, orisque luteis: interiora omnia ferè rubra, sed rubro colore in aureas oras radiatim desinente: interiore parte lutea, rubris radijs circa medium folium distinctis: ungues & pediculi lutei, apices nigri.

5. Folia omnia mucronata, externa, dorso lutei, reliqua parte sanguinei coloris, oris tamen extremis luteis, quæ internè sanguineis radijs tota resperfa: interiora foris sanguinis modo omnino rubent, oris luteis sive flavis coloribus se commiscantibus, interna parte flavis, circa medium sanguineis radijs, instar orbis insignitis: ungues & pediculi lutei, apices nigri.

6. Folia mucronata, oris aureis, reliqua parte rubris, excepto dorso foliorum exteriorum, quod aureis virgulis aspersum: omnium ungues lutei, radiatim in rubro commixti, pediculi lutei, apices nigri.

7. Folia externa mucronata, interna orbiculata tota rubra, oris tamen aurei coloris radiatim in rubro desinentibus: exteriores saturatiores, interiore tamen parte magis aurea: ungues, stamina, pediculi cum præcedenti conveniunt: omnium istorum flores satis odorati sunt.

8. Folia sunt parvis oris aureis, per reliqua elegantissimi rubri coloris: ungues flavi, stamina veluti fuligine tincta, apices obsolete purpurei.

II. Tulipa rosea variegata polyanthos. Tulipa polyanthos præcox rosea, colore mixta, Eylltet.

III. Tulipa præcox lutea varia, Clus. hist.

Lilionarcissus luteolis adversa parte folijs, secundum ora strijs rubris decoratus: intus verò luteus amœnus, Lob. ico.

Hujus etiam differentiarum novem sunt.

1. Flos primis diebus rotus luteus, at quarto, vel quinto, folia extrinsecus per oras rubris virgulis leviter distinguuntur, interna parte (præsertim tria externa) luteis remanentibus, & unguibus nonnunquam veluti fuligine tinctis, apicibus interdum luteis, pediculis fuscis.

2. Floris folia externa, circa medium rubris radijs raris insignita sunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum usque folium ferè excurrentibus: ungues aurei, stamina pallida.

3. Foliorum exteriorum ora, foris planè rubent, interiorius à medio ad oras extremas rubris virgulis distinguuntur: interiora folia externè omnino rubent: internè, à medio ad summum, rubrum nervum protensum, & latera rubentibus radijs exornata, habent.

4. Folia exteriora dorso luteo sunt, per oras verò dilutioris cinnabaris colore virgatim distincta: interiore parte, ad unguem usque cinnabaris color tota occupat: interiora folia cinnabaris colore infecta, nervo tamen duplici luteo secundum longitudinem, & luteis virgulis in oras externas excurrentibus: apices nigricant, pediculi lutei nonnullis fuligine infectis; ungues aurei, magni, stamina quodammodo superantes: Huc refer

Lilionarcissum luteum coccineum rubentibus oris, Lob.

5. Flos odoratus est, cujus folia tria exteriora mucronata & lutea sunt, oris purpura rubescens radiatim interculsanter insignitis: dein orarum extrema lutea sunt, & interna parte, ad folij medium, radij frequentes rubri coloris conspiciuntur: sic interiora folia orbiculata mucrone prædita, lineis rubris ab infimo ad extremas oras luteas distinguuntur: interior pars minus radiata, quam exterior: ungues magni & cum staminibus & apicibus lutei.

6. Flos aliquantulum odoratus, cujus folia orbiculata, foris aurea, oris luteis, intrus lutea, linea aurei, sive rubri coloris flavo permixti, radiatim & transversim folium medium secante: pediculi lutei, apices cineracei.

7. Folia orbiculata, exterioribus, dorso ad extremum mucronem luteo, oris latis ex aureo rubris:

rubris: unguibus, staminibus & apicibus luteis: nonnihil odor.

8. Flos priori par, sed dilutioris coloris, staminibus & apicibus duntaxat variantibus; nec odore caret.

9. Flos luteus, oris strijs rubris distinctis, & unguibus subviridibus: hic est

Lilionarcissus luteus hiliaris, oris rubris striatis, carinâ subviridi, Lob. ico.

Huc referatur ex Eyfett.

1. Tulipa lutea maculis minutis aspersis.

2. Tulipa lutea lituris aureis.

3. Tulipa lutea margine roseo.

4. Tulipa lutea maculis rubens.

5. Tulipa lutea prope calicem radio rubro.

6. Tulipa lutea lituris miniatis.

7. Tulipa ex pallido tota virescens.

8. Tulipa ex luteo citrini coloris lineis, dorsalibus viridibus.

9. Tulipa flava ex sulphureo colore palléscentibus lituris prope apices roseis flammiformibus.

10. Tulipa floridè pallens oris coccineis.

IV. Tulipa præcox purpurea varia, Clus. hist. Hujus differentiæ decem sunt:

1. Folia omnia mucronata, quæ Pœoniæ pleno flore purpureum colorem imitatur, oris ex albo purpurascens, unguibus ex luteo viridiq; coloribus permixtis, subobscuris, circulo exalbido eos ambiente: pediculis flavis veluti fuligine infectis: apicibus nigris: floribus magnis & admodum patulis.

2. Folia mucronata sunt, foris purpurea, internis media parte carnei coloris, oris ex albo palléscentibus, unguibus, staminibus, & apicibus flavis sive luteis.

3. Folia mucronata, foris & intus purpurea, oris extremis albis: ungues lutei, albo orbe circumdari: apices obsoletè purpurascens initio, dein ubi obversi sunt, flavo polline aspersi: pediculi flavi.

4. Folia mucronata, saturatiore purpureo colore prædita, ora exalbida, ungues albi, in imo flavi, apices & stamina pallida.

5. Folia mucronata, coloris purpurei dilutioris magisq; floridi: ora exalbida, ungues ex viridi pallentes, pediculi nigricantes, apices pallidi: hic solus odor.

6. Folia mucronata, obscurioris purpuræ, & quasi amethystino colore prædita: magnis oris

albis: unguibus, staminibus & apicibus flavis.

7. Folia orbiculatis oris, magnis & albis, reliqua parte saturatiore, nitenteque purpureo colore prædita: ungues flavos orbis albus ambit: apices cineracei, pediculi flavi.

8. Folia interiora aliquando orbiculata, dilutiori purpureo colore splendent: interiore parte tota ferè alba, omnium extremitates magnæ albæ: ungues, stamina & apices flavi coloris sunt: & hic est

Lilionarcissus rubellus nitidus candidis oris, Lobel.

9. Folia externa mucronata & reflexa, exterius obscure purpurascens: interna orbiculata & dilutius purpurascens: utraque in magnas oras albas desinentia, interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem per medium ambientem, habentia; & ungues luteos vel flavos, albo orbe inclusos: apices obsoletè purpurascens obtinent.

10. Folia omnia mucronata, & externa tria foris purpurea, magnis oris albis prædita, interiore parte alba, & eorum mediam partem orbe purpureo secante: ungues flavos, circulus albus ambit: stamina cum apicibus pallent.

Huc pertinent ex Eyfett.

1. Tulipa rosea venis luteis.

2. Tulipa miniata. linea viridi.

3. Tulipa floribus reflexis, interitis miniatis, exterius herbaceis, margine ex cinnabari rubente.

V. Tulipa præcox alba varia, Clus. hist.

Et hujus differentiæ octo notantur.

1. Folia externa albescunt, exceptis oris, quæ elegantis & dilutè admodum purpurascens sive carnei coloris sunt: interna magis purpurascunt, ungues lutei, dein exalbidi: stamina cum apicibus flava. Huc refer

Lilionarcissus candore & rubore confusum, Lobel.

2. Folia exteriora dorso sunt exalbido, virgulis purpureis adspersis, reliqua parte purpurascens, aut incarnato: interiora purpurea sunt: ungues stellatim flavi, dein albi: apices lutei: pediculi veluti fuligine adspersi.

3. Folia externa dorso albo sunt, punctis purpureis distincto, interiore parte dilutiori purpura nitente: interna, saturatiore sunt purpuræ: ungues flavi, radiati, stellæ instar: apices nigri: pediculi fusci.



4. Folia externa oras magnas carneo colore præditas habent, reliqua parte alba: interiora verò quasi carnei coloris sunt.

5. Folia externa, dorso sunt pallescente, aliàs alba præter oras, quæ foris brevibus & raris purpurascens radijs exornantur: interiora albescunt, oris, lineis purpureis longioribus & frequentioribus foris insignitis.

6. Folia exteriora, dorso & mucrone extremo pallent, aliàs candida, ora interius paucis purpurascens radijs distinguuntur: interiora, à medio ad oras radijs purpurascens, foris aspersa sunt: intus alba, oris rarioribus virgulis distinctis.

7. Folia exteriora alba: interiora oras habent, nunc paucis, nunc multis virgulis purpurascens, sive carnei coloris distincta: unguis flavi: apices ac pediculi omnium pallent.

8. Folia omnia, coloribus albo & carneo permixtis prædita sunt: sed qui cineraceum carneo colori temerè perfusum referant: unguis exalbidi: apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Verùm si Tulipæ præcoci semina germinant, rarò nativum matris colorem retinent, sed in varios colores florestransformant, præfertim Albæ, ex quibus aut omnino albi, aut albo varij: vel lutei & luteo varij: aut rubri atque rubro varij: vel purpurei, ac purpureo varij, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quoad flavas, aut rubras, pleraque proles matris colorem retinet, sæpè etiam in alium commutatur. Huc referatur ex Eystett.

1. Tulipa candida lineis viridibus.
2. Tulipa alba maculis roseis.
3. Tulipa albicans maculis latis rubentibus.
4. Tulipa alba marginibus rubescens.
5. Tulipa argentei & albicantis coloris.
6. Tulipa præcox ex albo in luteum lineis oblongis rubris.
7. Tulipa ex albo ruffa margine rubente.
8. Tulipa explicata flore candido lineis rubris.

VI. Tulipa præcox angustifolia.

Tulipa Persica præcox, Clus. cur. post. qui duplicem facit.

VII. Tulipa angustifolia altera sive folijs Hyacinthi.

Tulipa bicolor, tribus luteis & tribus rubris folijs Caccini, ad. Clus. cur. post.

## TULIPA SEROTINA.

I. Tulipa serotina lutea.

Tulipa sive Lilionarcissus luteus latifol. obtusus phœniceis rubentibus oris, Lob.

Tulipa lutea, Clus. pan. serotina flava, Eid. hist. Serotina lutea latifolia, Cam.

Tulipa sive Lilionarcissus luteus latifolius, Lugdun.

Flos coloris dilutioris, & quidem modo flavi, vel pallescentis, vel intensioris & quasi auri modo rutilantis: est cujus foliorum oræ sanguineis guttis aspersæ sunt: unguis ceræ recentis coloris, interdum nigricantibus venis distincti, vel macula nigra notati: apices cum pediculis, vel flavi, aut cineracei, vel fuligine infecti, aut omnino nigri. Huc referatur ex Eyst.

Tulipa aurei coloris.

Tulipa lutea, ex rubro viridi coccineo variegata.

Tulipa globosa serotina aureo colore punctata.

II. Tulipa serotina alba: cujus varietas ex Eystett.

1. Tulipa albicans margine coccineo.

2. Tulipa albicans ex flavo purpureo, folijs prope calicem luteis unguibus.

3. Tulipa nivea oris rubeo purpurascens.

4. Tulipa nivea oris ex rubro purpureis.

5. Tulipa serotina stellata.

6. Tulipa diversi coloris alba linea rubente.

III. Tulipa serotina coccinea: cujus varietas ex Eystett.

1. Tulipa coccinea albescentibus oris.

2. Tulipa globosa serotina cinnabari colore.

IV. Tulipa serotina rubra. Clus. hist.

Floris color plerumque saturatior & quasi nigricans: interdum dilutior & perelegans: unguis aut omnino flavi, aut nigri, qui, Sole illustrati, cæruleum quidpiam permixtum habere videntur: vel macula nigra majore, vel minore, (tenui orbe aureo inclusâ) flavum inficiente: apices cum pediculis, vel flavi, vel nigri: sic apices cinerei & pediculi flavi.

Ex his varietas observata, quod interdum ex rubræ semine, flava: contra ex flavæ semine, rubræ natæ sunt, unguibus sæpè variantibus.

Huc referatur

Tuli-

*Tulipa, versicolor, parte mediâ viridibus signaturis, alterâ verò rubrâ, Eyst.*

V. *Tulipa ferotina ramosa major.*

*Tulipa ferotina πολυανθής major, Clus. hist.*

*Tulipa ferotina polyanthos, Eyst.*

Huc referenda, *Tulipa ferotina lutea latifolia diclonos, Cam. & ejusdem cristata papaveris modo sive ἀνδροχιδής.*

VI. *Tulipa ferotina ramosa minor.*

*Tulipa ferotina πολυανθής min. Clus. hist.*

Utraque & rubro & flavo flore reperitur.

VII. *Tulipa ferotina brassicæ floridæ similis, vel Tulipa viridis prima.*

*Tulipa viridis, Eyst.*

Variat simplici & duplici folior. serie: & hæc *Tulipa ferotina viridis, duplici foliorum in flore serie, Clus. hist.*

VIII. *Tulipa viridis altera.*

*Tulipa ferotina viridis, oris pallidis & albis, Clus. hist.*

IX. *Tulipa ferotina flore pleno.*

1. *Tulipa ferotina flore pleno miniato, Eystett.*

2. *Tulipa ferotina tota lutea fl. pleno, Eyst.*

### TULIPA DUBIA.

*Tulipa dubia major.*

*Lilionarciss. luteus phœniceo confusè mixtus, Lob.*

*Tulipa media major prima, Clus. pan.*

*Tulipa dubia prima major, Clus. hist.*

Differentiæ, hujus sunt novem.

1. Folijs est mucronatis, calice admodum pallido, vel flavo: unguibus ceræ recentis instar flavis.

2. Folia habet flava orbiculata ad aurei mali præmaturi colorem accedentia: stamina cum apicibus flava, & flos odoratus est.

3. Flos omnino aureus, cujus externa folia dorso flavo prædita, oris dilutioris cinnabaris colore radiatim distincta: interna, cinnabaris coloris, binis nervis luteis, & radiolis flavis in latera excurrentibus: ungues magni, flavi: apices nigri: pediculi flavi, fuligine infecti.

4. Folia orbiculata flava, venis rubris secundum longitudinem excurrentibus, interdum totum dimidium folium inficientibus.

5. Flos dilutius rubet, cinnabaris colore, folijs mucronatis: vel saturatioris & quodammodo nigricantis coloris, exterioribus mucrona-

tis, interioribus orbiculatis: unguibus flavis veluti fuligine aspersis; vel in omnibus folijs, vel in exterioribus apicibus modo flavis & leviter nigricantibus, modo omnino nigris: pediculis flavis media ex parte nigricantibus.

6. Flos coloris albi exoleti, folijs ex albo pallescentibus, dorso flavescente: folijs interioribus orbiculatis, unguibus apicibusque pallentibus.

7. Folia orbiculata dilutissimi purpurei coloris & quodammodo carnei, ungues maximi albi, quorum principia cum staminibus & apicibus flavent.

8. Flores saturatius purpurascunt, prædulcium rufescentium vuarum instar, folia interiora orbiculata: ungues cum apicibus flavescent.

9. Flores saturæ admodum purpuræ, & ceraforum acidorum nigrorum succum referunt (Bliesfarb & nos vocamus) unguibus subcæruleis, vel ex cæruleo nigricantibus, staminibus fuscis.

II. *Tulipa dubia major altera.*

*Lilionarcissus phœniceus peramœnus oris luteis, Lob.*

*Tulipa media major secunda, Clus. pan.*

*Tulipa dubia prima, major altera, Clus. hist.*

Huc refer

*Lilionarcissum luteis oris flore patulo, Lob. qui in Lugdunensi historia, Tulipæ sive Lilionarcisso luteo latifolio jungitur.*

III. *Tulipa dubia media sulphurei coloris. Lilionarcissus striatus candidis suaverubentibus oris, Lob. ico.*

*Tulipa dubia secunda, media prima, Clus. hist.*

Variat quoque:

1. Flos pallidi coloris coctum sulphur refert, folia mucronata, ungues fuligine infecti.

2. Flos eleganter flavus, folia mucronata, ungues & apices nigri, pediculi fuligine infecti: hujus flos ex sedecim, mox tredecim, octo & sex folijs compositus.

3. Flos ex flavo & rubro coloribus permixtus, folijs sex magnis mucronatis & flavis constans, quæ ab ungue nigro rubras venas per folia radiatim excurrentes & in latera sparsas habet. Huc referantur ex Eyst.

1. *Tulipa lutea lituris miniatis.*

2. *Tulipa sulphurei coloris, oris rubris.*

IV. *Tulipa dubia media altera.*

*Lilionarcissus totus luteus sanguineo puniceo*

par & similis, odoratus Croci aut Narcissi æmulatione, & inodorus præcox & serotinus, Lob. ico.

Lilionarcissus Chalcedonicus totus luteus sanguineo puniceo par & similis, Lob. obs.

Tulipa dubia tertia, & media secunda versicolor, Clus. hist.

Et hujus differentiarum novem:

1. Flos coloris flavi dilutioris, vel pallescentis, cujus folia externa foris virescunt: alterius folia orbiculata, unguis subvirescentes: Item folia flava, interiora orbiculata & guttis sanguineis aspersa: vel folia flava, unguis cerei coloris: vel in unguibus macula nigra splendens: vel ex fusco & viridi coloribus commixtis.

2. Flore est flavo vario, initio flavo, tertio dietenui limbo rubeo exornato: cujus folia in una flava, oris cinnabaris colore infectis: in altera pallidiora, oris rubris venis ornatis, vel mali aurei præfaturum colore perfusis. Invenitur versicolor, flavo & rubro colore commixtis, instar sericei panni flavi, cujus subtegmen rubrum & unguis nigri sunt, & hæc dicitur Tulipa dubia 3. media 2. versicolor, Clus. hist.

3. Flos albus in flavum degenerans, folia vel omnia mucronata: vel interiora orbiculata; unguis, stamina & apices pallent.

4. Flos Ochrae colore, cujus foliorum mucro rubro colore tingitur: pallidus, oris rubris vel purpureis, vel carnei coloris venis distinctis.

5. Flos albus, initio virescente colore perfusus, staminum apicibus fuscis.

6. Flos albus, varius, dilutior, folijs interioribus orbiculatis, unguibus exalbidis, maculâ purpurascen-tem notatis, staminibus exalbidis, apicibus nigricantibus: vel unguibus & staminibus candicantibus: vel unguibus exalbidis, orbe subcæruleo inclusis, staminibus albis, apicibus nigricantibus, vel folijs extrinsecus saturatioribus, oris candicantibus, unguibus exalbidis cum subcærulea maculâ, staminibus albis, apicibus nigricantibus, folijs exterioribus mucronatis: vel folia mucronata, dilutioris aut saturatioris coloris: vel venæ purpureæ per totum folium dispersæ.

7. Flos purpureus, vel dilutioris & magis floridi coloris, folia interiora orbiculata, unguis exalbidis, stamina purpurascen-tes, apices nigricantes, vel purpureæ dilutioris, oris candicantibus, unguibus vel flavis, aut veluti

fuligine infectis, vel ex albo flavescentibus, aut ex cæruleo, flavo, & subvirescente mixtis, modo saturatioris, venis albicantibus permixtis, unguibus ex flavo nigricantibus, aut flavis, aut ex viridi nigricantibus, aut subcæruleis, vel ex cæruleo flavescentibus, aut cæruleis, orbe flavescente ambiente: sunt & dilutè purpurei & remissè miniati, aurei mali coloris, & vel dilutiores internè & per oras, vel saturatioris: interdum internè dilutissimi, foris saturatioris: unguis vel flavi, vel fuliginoso orbe cincti, vel ex viridi nigricantes, vel fusci sunt. Est humilior folijs interioribus orbiculatis, unguibus vel albis, vel candicantibus, supernè cæruleis, staminibus albidis, apicibus subfuscis, vel unguibus cæruleis, aut ex cæruleo virescentibus, vel nigricantibus. Huc pertinet Lilionarcissus coccineus rubentibus medijs folijs candicans, & ad basin notulis rubris cordis effigie aspersis, Lob. & Lilionarcissus coccineus, candidis oris, Lob. ico.

8. Flores purpureovarij, folijs vel dilutè purpurascen-tes, vel saturatioribus, oris mucronatis, vel orbiculatis exalbidis: unguis sunt aut albi, aut subcærulei, aut albi, orbe lato carnei coloris cincti, stamina plerumque nigricantia.

9. Flos rubet, foris purpurascens, intus carnei coloris: unguis, stamina, apices, flavi: vel folijs exterioribus, flavo colore aspersis: & colore obscuro ad lateritium accedente, unguis flavi, vel nigri: vel rubrae ferotinæ similes, unguibus flavo orbe cinctis; Oculis solis cognominatur: hic est

Lilionarcissus coccineus puniceusve rutilans, Lob.

10. Floris folia mucronata, initio viridia, dein oris pallescentibus, quæ in rubrum colorem mutantur, radiatim alteri colori se miscen-tes, colore viridi, qui senescente flore languescit, præsertim intrinsecus.

Verum ex semine interdum serotina nascuntur: sic ex purpurea præcoci, purpurea serotina dilutior, intrinsecus aurei mali colore, unguibus flavis, in exterioribus nigricantibus, nata: Item *ὠχρολίπνον*. E purpurea varia præcoce, purpurea serotina ad rubrum tendente, vel dilutior eleganter: vel ad carneum colorem accedente: unguibus ex cæruleo nigricantibus.

E pur-

E purpurea præcoci ὠχρόλουνος ferotina, rubra ferotina, unguibus & staminibus flavis; purpurea ferotina, unguibus nigricantibus: & purpurea varia ferotina. Sic ex ferotinis, aliquando præcoces, ut ex alba varia ferotina, natæ sunt præcoces, alba, flava, rubra, unguibus, flavis, rubra Oculus solis, & purpureo dilutior.

Nec omnes versicolores, tam præcoces, quam ferotinae, singulis annis eandem coloris gratiam retinent: sed alternis sæpius variant: ut Flava varia & Alba varia, uno interdum anno nitidissimæ sunt, sequenti vix alius color quam flavus, vel albus conspicitur: sic Rubra varia & Purpurea varia, nonnunquam magnas oras flavas & albas habent, sequente valde exiguas. In summa, tanta in Tulipis colorum varietas, ita ut singulis annis adhuc nascantur, quibus pares nunquam antè conspectæ: ita Deus in ipsis floribus admirabilem suam potestatem ostendit, ut ex prædictis, ex Clusio, Lobelio, Camerario, propriaque observatione adductis, colligere est: ita ut ducentarum specierum numerum superare deprehensum sit. Sic in Florilegio Svertij, Tulipæ imprimis variegatæ differentia triginta duæ proponuntur: quemadmodum & in Florilegio de Bry, & etiam Passini, aliquot species exhibentur: & in horto Eystett. supra quinquaginta depinguntur.

V. Tulipa bulbos in foliorum alis ferens. Tulipa bulbifera, Cusius pan. & hist. Taber. Ger. Tulipa prolifera, Cam.

### TULIPA PUMILIO.

#### I. Tulipa pumilio latifolia alba.

Tulipa pumilio alba unguibus luteis, Eystett.

#### II. Tulipa pumilio latifolia sulphurea.

Tulipa pumilio fulvo sulphurei coloris, Eystett.

#### III. Tulipa pumilio latifolia rubra.

Tulipa pumilio, Lob. ico.

Tulipa dubia humilior, Clus. pan.

Tulipa dubia pumilio, Clus. hist.

Tulipam nanam sive pumilionem flore luteo, Camer. habit.

#### IV. Tulipa pumilio angustifolia.

Tulipa pumilio altera, Clus. hist.

Tulipa pumilio angustifolia alba, Lobel. ad. part. alt.

#### V. Tulipa pumilio gramineo folio.

Tulipa pumilio alba altera Lusitanica, Lobel. ad. part. alt.

### TULIPA MINOR.

#### I. Tulipa minor lutea Italica.

an Narcissus octavus, Matth. comp. quem sub Narcisso Constantinopolitano primo Matthioli, ex ejus hist. latina, Lugd. proposuit.

Lilionarcissus Bononiensis luteus, sive Tulipa, Lob. Lugd.

Lilionarcissus Bononiensis, Eyst. & λεριοναρσιος & πολύνκλονος, Cam. in Matthiolum.

Lonchitis, Cæs.

Tulipa Apenninea, Clus. hist. Italica prima, Taber.

Tulipa Bononiensis, Ger. quæ plerumque polyclonos, Cam.

Senis, nonnunquam octonis folijs, flos constat.

#### II. Tulipa minor folio latiore.

Tulipæ Byzantinæ genus alterum, Clusius hist.

#### III. Tulipa minor rubra.

Tulipa rubra Apenninæ similis, Clus. hist.

Tulipa rubra angustifolia facie Bononiensis, Lob. ad. part. 2.

#### IV. Tulipa bombycina Cretica.

Tulipa bombycina flore rubro, Rober. Svert. & Bry.

an Tulipa Cretica Caccini, Clus. cur. post.

Tulipam Bononiensem facie & formâ refert, sed bulbos lanugine obsitus, & veluti tomentosus est.

#### V. Tulipa minor lutea Gallica.

Tulipa minor Narbonensis, Dodonæ. minor, Lugdun.

Narcissolilium luteum, Ad.

Lilionarcissus Narbonensis luteus montanus, Lobel.

Tulipa Narbonensis, Clus. pan. & hist. Cam. & Ger. tit. trans.

Tulipa Italica secunda, Tab.

Clusius in cur. post. meminit Creticæ Caccini, Mompelianæ, & ejus quæ in montanis Placentiæ (at hæc quænam est?) nascitur.

VI. Tu-

- VI. Tulipa minor ex luteo purpurascens.  
 Tulipa Hispanica, Clus. pan. & hist.  
 VII. Tulipa variegata Persica.  
 Tulipa Persica, Rob. Svvert. Bry. & Eyfset.

Tulipa Persica minor altera, Clus. cur. post.  
 Folia tria interiora alba, tria exteriora rubra,  
 per oras albicantia, ungue nigrâ maculâ nota-  
 to, staminibus violaceis.

## F R I T I L L A R I A.

**F**ritillaria, ab abaco in quo Scacorum lusus exercetur, quem Fritillum dici existimant, nomen habet: alijs Meleagris à Meleagride, avis plumis, quas, si non coloris specie, tamen varietate, & dispositione, & macularum magnitudine, refert.

- I. Fritillaria præcox purpurea variegata.  
 Meleagris, Dod. Meleagris flos, Lugd.  
 Fritillaria, sive Lilionarcissus purpureus variegatus, Lob. & ad. part. 2.  
 Fritillaria dilutior, Clus. pan. & hist. cui & Lilium variegatum vulgo.  
 Fritill. & Narciss. Caparoni<sup>a</sup> ab inventore, Cam.  
 Fritillaria, Eyfset.  
 Fritillaria vulgaris purpureo colore, Svvert.  
 Flos sæpissimè unicus, interdum bini, raro terni: sex folijs ut plurimum constans, rarius octonis & duodenis: areolis nunc quadratis, nunc longiusculis, colore partim candidi, partim purpurei, sive saturatioris carnei: est alia præcocior, alia serotina, & harum quadræ, ut plurimum saturatius, interdum dilutius purpurascunt. Huc pertinet  
 Meleagris flore max. Ital. flore gemello, Eyfset.  
 II. Fritillaria ramosa.  
 Fritillaria maxima purpurei coloris, Svvert.  
 III. Fritillaria polyanthos flavoviridis.  
 Fritillaria polyanthos lutea, Eyfset.  
 Fritillaria triceps colore flavo viridi, du Bry.  
 IV. Fritillaria umbellifera.  
 Fritillaria Hispa. umbellifera, Rob. Svv. & Bry.  
 V. Fritillaria flore magno pleno.  
 Fritillaria flore pleno, Cam. Eyfset.  
 VI. Fritillaria alba variegata.  
 Fritillaria alba ex phaio purpureo tessulata, Lob. ad. part. 2.  
 VII. Fritillaria alba præcox.  
 Fritillaria alba altera, Lob. ad. part. 2.  
 Fritillaria alba, Clus. hist. app. alt. & in app. 2. auct. unius flos totus albus: alterius foris albus, internè venis quibusdam purpurascens distinctus, & in cur. post.  
 Fritillaria albo flore, Svvert. alba, Eyfset.  
 VIII. Fritillaria serotina atropurpurea.

- Fritillaria saturatior, Clus. pan.  
 Meleagris altera, Dod.  
 Lilionarcissus variegatus atropurpureus Xantonicus, Lob.  
 Fritillaria Xantonica serotina, Lob. ad. par. 2.  
 IX. Fritillaria serotina floribus ex flavo virentibus.  
 Fritillaria 2. Clus. pan.  
 Fritillaria Aquitanica, Clus. hist.  
 Fritillaria Clusij, & Brisotti serotina, Lob. ad. part. 2.  
 Fritillaria minor obsoleto colore inodora, Eyfset.  
 Fritillaria Aquitanica flore luteo obscuro, Svv.  
 X. Fritillaria flava rubris maculis distincta:  
 Fritillariæ tert. genus, flavo colore, Clus. hist.  
 Fritillaria lutea Someri, Lob. ad. par. 2. Svvert.  
 XI. Fritill. angustif. lutea variegat. magno fl.  
 Fritillaria, juncifolia, Eyfset.  
 XII. Fritillaria angustifolia lutea variegata parvo flore.  
 Fritillaria Lusitanica, Clus. cur. post.  
 XIII. Fritillaria flore minore.  
 Fritillaria Pyrenæa, Clus. hist. ap.  
 Fritillaria nigra Pyrenæa, Lob. ad. part. 2.  
 Fritillaria Pyrenæa obsoleto luteo colore, Eyfset.  
 Flos exterius obsoleto color. venis flavescens, distinctus: interiore, ex viridi flavescens, maculis saturatè purpurascens, tessulatis dispositis notatus: odore gravi.  
 Variat: 1. internè ex luteo virefcit, oris reflexis lineis viridibus striatis, à medio ad centrum subfusca purpura tessulatus. 2. Flos hilarior purpurascens, tessulis similibus præditus. 3. ex luteo magis viridi parum subfusus, intus minus tessulatus: 4. ex fusco & luteo sublividus, intus minus tessulatus.  
 XIV. Fritillaria minima pluribus floribus.  
 Fritillaria minima, Svvert.

## S E C T I O T E R T I A.

CROCUS: COLCHICUM: OR-  
NITHOGALON.

## CROCUS ET EJUS SPECIES.

**C**rocum puerum, cum Smilacem virginem adamaret, in hunc sui nominis florem ver-  
sum esse, Virgil. & Plin. l. 16. c. 35. testantur. Κρόκον verò, filum villumq; significat, cu-  
jusmodi sunt croci stamina, seu villi, qui κρόκιδες appellantur, qui plerumq; terni, nonnun-  
quam etiam plures in floris medio conspiciuntur; & cum soli in usum veniant, per excellen-  
tiam Croci nomine donantur.

Genera duo fecit Theoph. sativum, de quo 3. hist. 6: 6. ejusdem 6: 7. ejusd. 9. & 10. Mon-  
tanum, de quo 6. hist. 7. At Dioscorides l. 1. c. 25. sativi meminit, qui pro ratione Regionum, in  
quibus plantatur, variat. Sic sylvestrem dicimus, alium majorem, alium minorem. Alium  
vernum, alium autumnalem: qui rursus colore & floris & foliorum variant.

## I. Crocus sativus.

Crocus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Dod. Cord. Lac.  
Gef. Lon. Lob. Tab. Sativus, Ang. Lugd.  
Crocus sativus autumnalis, Eyft.  
Crocum, Matth. Cast. Cæs. hortense, Cam.

Hic aliquando bis per annum florere solet,  
aliàs nihil à vulgari differens: & hic dicitur  
Crocus biflorus, Eyft.

Habetur Crocus verus purpureo colore, apud  
Svert.

## CROCUS SEROTINUS.

## I. Crocus alpinus autumnalis.

Crocum montanum, Clus. hisp. (1. in hist.)  
Lugdun.

Crocus montanus autumnalis, Lob.  
Crocus sylv. autumnalis, Dod. Cam.  
Crocus alterum genus sylv. Cæs.  
Crocus montanus vernus, Eyftett.

Flores modò candicantes, modò purpura-  
scentes, instar sativi, sed dilutiores & mi-  
nores.

II. Crocus autumnalis florem sine folijs pro-  
mens odor.

Crocus montanus 2. Clus. hist.

Crocus sylv. autumnalis, Lob. ad. par. 2.

III. Crocus autumnalis subcæruleus mul-  
tiflorus.

Crocum montanum 3. Clus. hist.

Huic affinis

Crocus sylv. Byzant. serotinus, Lob. ad. par. 2.

IV. Crocus autumnalis flore minore.

Crocum Pyrenæum autumnale, Clus. hist. ap. 2.

V. Crocus autumnalis flore majore vari-  
egato.

Crocus montanus autumnalis, Portæ.

## CROCUS VERNUS

latifolius.

I. Crocus vernus latifolius purpureus va-  
riegatus.

Crocus vernus latifol. purpur. versicolore flore  
vel 5. Clus. hist.

Variat flore, qui communiter sex, quandoq;  
octo folijs donatur.

II. Crocus vernus latifolius flore purpureo  
magno.

Crocus vern. latifol. purp. fl. majore, Clus. hist.

III. Crocus vernus latif. albus variegatus.

Crocus montanus sive alpinus, Gef. hor.

Crocus sylv. mont. fl. albo, Ad. Lob.

Crocus sylv. vernalis alter, Dod.

Crocus vernus major alter, Clus. hisp.

Crocus vernus latifol. albo flore, Eid. hist.

Variat, folijs externis venis purpurascen-  
tibus aspersis: aliquando foliorum mucronibus

purpurascunt: aliquando linea purpurea, vel nigra, per folium fertur, & hic est

Crocus flore albo lineis nigris, Svvert.

IV. Crocus vernus albus versicolor alter.

Crocus vernalis major 1. Clus. hisp. def.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore. 1. Eid. hist. def.

V. Crocus vernus latifolius purpureo violaceus.

Variat: 1. flore purpureo violaceo: 2. flore albo, purpureo violaceâ basi: 3. aliquando flos supernè purpureus inferiùs flavescit: 4. est & flore violaceo, vel cæruleo distincto: 5. vel cæruleo lineis violaceis variegato.

1. Crocus vernus purpureo violaceus, Lob.

Crocus sylv. vernalis prior, Dod.

Crocus vernalis major, Clus. hisp. & Lugd.

Crocus vernus latifolius purpur. flore minore, Clus. hist.

2. Crocus sylv. vernus 3. flore albo purpureo violaceâ basi, Lob.

Crocus vernus albus fundo violaceo, Eyfett.

At Dodon. Clus. & Lugdun. utrumque unâ tabellâ exprimunt.

3. Crocus sylv. primus Dalech. Lugd.

4. Crocus vernus fl. violaceo, Eyfett.

Crocus violaceus & cæruleus distinctus, Svvert.  
5. Crocus cæruleus lineis violaceis distinctus, Eid.

VI. Crocus vernus flore pleno.

Crocus vern. latifol. duplici flore, Clus. hist.

VII. Crocus vernus latifolius, multiflorus.

Crocus vernus polyanthos, isque duplex, Eyfett. alter purpureo violaceus, lineis candidis: alter floribus candidis, lineis purpureo cæruleis.

Crocus vernus multiflorus alb. facie lutei majoris, Svvert.

VIII. Crocus vernus minor albicans.

Croci montani species, Gef. hort.

Crocus (ylv. minor prior, vel sylv. 4. Dod.

Crocus vernus serotinus primus, Lob. ico.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore 2. Clus. hist. ico.

IX Crocus vernus minor purpurascens.

Crocus montanus flore ex candido & puniceo mixtis, Gef. hort.

Crocus sylv. 5. vel minor sylv. alter, Dod.

Crocus vernus albus 2. Lob. ico.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore 3. Clus. hist. ico.

Crocus vernus flore vario, Cam.

Crocus serotinus, Lugd. quem præced. junxit.

Crocus purpureo rubens, Svvert.

X. Crocus vernus latifolius albus, vel cinericeus.

Crocus cinericeus, duplex, Svvert.

XI. Crocus columbinus duplex, Svvert. (quid?)

## CROCUS VERNUS LATIFOLIUS

luteus, aureusve.

I. Crocus vernus latifolius flavus.

Crocus vernus latif. flavo flore, vel Croci sexti species prima, Clus. hist.

Crocus vernus luteus 1. Lob. ad. part. 2.

Crocus flore luteo, Svvert.

Crocus vernus polyanthos flore luteo, Eyfett.

Variat: 1. flore flavo sive fulvo nitido latiore, & majore. 2. minore & pallidiore. 3. flore luteo corona phœnicea, Lob. ad. part. 2.

II. Crocus vernus latifolius aureus.

Crocus vernus Mæfiacus, Clus. pan.

Crocus vernus latifol. fl. aureo, vel Croci sexti alia species, Clus. hist.

Crocus aureus, Lob. ad. part. 2.

III. Crocus vernus latifolius pallidus.

Crocus vernus Mæfiacus 2. Clus. pan.

Crocus vernus latifolius pallido flore, Eidem hist.

Crocus luteus flore pallido, Lob. ad. part. 2.

IV. Crocus vernus latifolius flavo varius.

Crocus vernus latifolius flavo vario flore 1. vel

Crocus vernus 7. Clus. hist.

Crocus vernus latifolius flavo vario flore Constantinopolitanus, seu Crocus luteus alter, Lob. ad. part. 2.

Crocus luteus lineis nigris, Svvert.

V. Crocus vernus latifolius flavo varius alter.

Croci verni latifol. flavo vario flore, vel Croci verni septimi alia species, Clus. hist.

Crocus syl. vernus versicolor aureo rutilo panonconcolor, Lob. ad. part. 2.

A priore potissimum differt radijs, foliorum exteriorum dorsum totum inficientibus.

VI. Crocus vernus latifolius flavo vario flore duplici, Clus. hist.

Crocus vernus latifolius secundus Constantinopolitanus, Lob. ad. part. 2.

CRO-



CROCUS VERNUS ANGU-  
stifolius.

I. Crocus vernus angustifol. magno flore.  
Crocus syl. angustifolius, Ang.  
Crocus vernus minor primus, Clus. hisp. Lugd.  
(quem cum 3. jungit) Tab.  
Crocus vernus angustifol. 1. Clus. hist.  
Crocus syl. min. Hispanicus flore patulo, vulgo  
Nozilicha minor, Lob.  
Crocus vernus, Ger.

Variat: flores infernè flavescent, intus candi-  
cant, reliqua ad cæruleum sive violaceum  
vergunt: inveniuntur & toti candidi.

II. Crocus vernus angustifolius gemino  
bulbo.

Crocus sylvestris, Lob.  
Crocus vernus minor alter, Clus. hisp. Tab.  
Crocus vernus angustifolius 2. Clus. hisp. desc.  
Crocus syl. vernalis mfnor alter, Dod.  
Crocus verni minoris alterum genus, Lugd.  
Crocus syl. 1. Dalech. Lugd.  
Crocus vernus flore violaceo, Eyflett.

Flos ex folijs sex, aliquando octo constat.

III. Crocus vernus angustifolius parvo  
flore.

Crocus syl. vernalis 6. Dod.  
Crocus vernus minor 3. Clus. hisp. Lugd. Tab.  
Crocus vernus angustifolius 3. desc. at ico. 2.  
Clus. hist.  
Crocus sylvestris Hispanicus, vulgò Nozili-  
cha major, Lob.

Crocus vernus minor, Ger.

IV. Crocus vernus juncifolius purpureus.  
Crocus vernus angustifolius quartus, sive vio-  
laceo flore, Clus. hist.

Hujus iconem figuræ primæ Lobelius in ico-  
nibus junxit.

V. Crocus vernus capillari folio, Clus. hist.  
ap. 1. & ap. 2. fine & cur. post.

Duplex est, unus purpurascens flore, ipsius  
folijs tribus venis saturatioribus distinctis:  
alter albo flore, qui etiam duplex, flore ma-  
jore, & minore.

VI. Crocus vernus angustifol. variegatus.  
Crocus vernus aureus variegatus, Eyflett.

Flos interius aureus, exterius strijs ex pur-  
pura nigricantibus radiatus.

## COLCHICUM ET EJUS SPECIES.

**K**ολχικόν, quòd plurimum in Colchide nascatur, Dioscoridi lib. 4. cap. 84. cui ἐφύμεγον,  
quòd eadem die, quâ sumptum, interficiat. Colchici appellatio apud Plin. lib. 22. cap. 9.  
inter venena reperitur.

*Colchicum autumnale.*

I. Colchicum commune.

Primula Veris, Brunf.  
Colchicum, Trag. Tur. Fuch. Dod. Matth.  
Lac. Gesner. hor. Lon. Cast. descrip. at Ephe-  
merum, ico.  
Colchicum nigrum & subrubens, Cord. hist.  
Colchicum sive strangulatorium & Ephe-  
merum crocifolium, & bulbi folium, Ad. Costæo.  
Lob.

Ephememerum venenosum, Amato.  
Hermodactylus vulgo & Crocus syl. Cæs.  
Colchicum Ephemera, Lugd.  
Colchicum masculinum & femininum, Tab.  
Germanicum, Ger. & album, Eid.  
Colchicum commune pallido colore, Svvert.  
Hermodactylus niger & rufus, Mesueo & Se-  
rapioni.

Variat: nam in montibus folio est latiore,  
in pratis angustiore: flore communiter dilutè  
vel saturatè purpurascens, aliquando albo:  
bulbo nigricante, aut rubente foris & interius.

Quare

Colchicum vulgare purpurascens flore, &  
Colchicum vulgare album, Eyflett. &  
Colchicum autumnale flore albo & flore ru-  
bello, Eidem:

Addit Svvertius

Colchicum, cui hoc solum peculiare, quòd au-  
tumno folia proferat.

II. Colchicum radice siccata alba.

Colchicum album, Cord. hist.  
Hermodactylus legitimus, Dod.  
Hermodactyli non venenati officin. Lobel.  
ico.  
Hermodactylus officin. Lon. Tab. Orientalis,  
Cæsalp.

Hermodystylus albus, Serapioni.

III. Colchicum Anglicum candidum angustifolij.

Colchicum candido flore Anglicum, Ad. & Lob.

Colchicum Anglicum Lobelij, Lugd. album, Clus. hist. Tab. & Ger.

Huc referri potest quod flore dilutioris coloris & lactei candoris:

Colchicum Lusitanicum serotinum, Lob. ob.

Colchicum pratense Salmanticum, Clus. hist.

IV. Colchicum montanum angustifolium.

Colchicum mont. Clus. hisp. Lugd.

Colchicum montanum Hispanicum & λεπτόφυλλον, Clus. hist.

Colchicum minus, Lob. Tab. & montanum, Eid. & Ger.

Colchicum Hispan. parvum, Cam.

Colchicum mont. minim. angustifol. autumn. Eystett.

V. Colchicum pumilum croci folijs.

Colchicum minim. tenuif. Gallæcium, Lob. ad. par. 2.

VI. Colchicum Illyricum, Ang. Lob. Lugd. Tab. Ger. Clus. hist. (quod sibi nunquam conspectum scribit) quid?

VII. Colchicum vere & autumn. florens.

Colchicum biflorum, Clus. hist. Lob. ad. par. 2. & Eystett.

### *Colchicum variegatum.*

I. Colchicum florum folijs albis & rubris alternatim dispositis.

Colchicum album & rubrum, Eyst.

II. Colchicum multiflorum.

Colchicum exoticum folijs ternis purp. ac alijs ternis albicantibus, varians: Eyst.

III. Colchicum alb. strijs variegatum.

Colchicum mixtum autumnale, Eyst.

Flos albus, strijs saturatè rubris seu sanguineis maculis inæqualibus infectus.

IV. Colchicum polyflorum variegatum.

Colchicum versicolor polyanthes reflorescens, Eystett.

Flos in albo pallidus, strijs & maculis dilutè purpurascens variegatus, è cujus medio alius flos proliis modo exurgit.

V. Colchicum latifol. variegatum.

Colchicum 4. sive latifolium, Clus. hist.

Colchicum Lusitanicum fortè, Eidem.

Colchicum Byzantinum polyanthos Fritillariæ facie autumnale, Eyst.

VI. Colchicum purpureo lacteum variegatum.

Colchicum versicolore flore sive 3. & ποικιλινός, Clus. hist.

Huc refer

Colchicum album strijs purpureocæruleis variegatum, Eyst.

Colchicum album distinct. lineis rubris, Svver.

VII. Colchicum ex albo & purpurascens varium.

Colchicum ποικιλινός, alterum, Clus. hist. ap. 1.

VIII. Colchicum flore Fritillariæ instar tessellatis.

Colchicum Neapolitanum, Clus. hist. & ap. 1.

Colchicum Fritillariæ facie pallidum, Svvert.

IX. Colchicum florum folijs angustis & variegatis.

Colchicum montanum minus versicolore flore, Clus. hist.

Floris foliâ longa & angusta, interius alba, exterius media parte viridia, altera carnei coloris.

X. Colchicum pleno flore variegatum.

Colchicum fl. pleno maculatum autumn. Eyst.

XI. Colchicum latifol. multiflorum variegat.

Colchicum polyanthos candid. eleganti rubore varium, Lob. ad. par. 2.

Folia latiora, cubitalis longitudinis.

*Colchicum polyanthes, sive multiflor. simplex & plenum.*

I. Colchicum candidum multiflorum.

Colchicum Pannonicum πολυανθος albo flore, Clus. hist. Cam.

Colchicum candid. Pannon. polyanth. Lob. ico.

Colchicum polyanth. Tab. vulgare poly. Eyst.

Colchicum Pannon. Ger. albo flore, Svvert.

Septenis, denis, duodenis, vel pluribus floribus lactei candoris: floribus etiam eleganter rubentibus reperitur: & hoc dicitur

Colchicum polyanthos, Lob. ad. par. 2.

II. Colchicum polyanthes lato Ellebori albi folio.

Colchicum Byzantinum πλατύφυλλον πολυανθος, Clus. hist.

III. Colchicum polyanthos multiplex.

Colchicum polyanthos flore multiplici autumnale, Eyst.

IV. Col-

## IV. Colchicum pleno flore.

Colchicum πολυανθεῖς, sive pleno flore, Clus. hist. & ap. 1.

Colchicum pleno flore, Lob. ad. par. 2.

Colchicum autumnale, Eyfett.

Quò bulbus major & vetustior, eò plures, majores & majore foliorum numero, flores constant. Sunt etiam flore albo vel purpureo, quod

Colchicum vernum fl. pleno purpureo, Eyf.

Colchicum album rubr. pleno flore, Svvert.

V. Colchicum polyanthes folijs latis convolutis.

Colchicum vernum flore purpureo plenum, Eyfett.

*Colchicum vernum.*

I. Colchicum vernum Helveticum.

Colchicum subobscurum flore & minore, Gef. Camer. Colchicum vere prodiens, Eidem Matth.

an Colchicum brumale, Lob. Belg.

II. Colchicum vernum Hispanicum.

Colchicum vernum, Clus. hist. ap. 2.

Colchicum vernum fl. purpureo, Svvert.

Flore est antequam se expandat albo, postea coloris purpurei dilutioris vel saturatoris.

III. Colchicum Alexandrinum, quid?

Colchicum Orientale, Matth. alterum Orient. Matthioli, Lugd.

Colchicum Syriacum Alexandrinum, Lob. Ad. Tab. Ger.

Tulipæ genus, quale Appenninæ videtur, Clus. hist.

Item scribit, se semen Colchico semine simile nomine Hermodactyli Syriaci accepisse.

## COLCHICUM LUTEUM.

I. Colchicum luteum majus.

Lirium alterum, Theophrasti.

Helichryso Cratevæ similis, Ang.

Narcissus in Apenino, Marcell. autumnalis quorundam, Clus. hisp. Lugd.

Narcissus autumnalis major, Dod. Clus. hist. Ger.

Narcissus autumnalis flore luteo, Eyf.

Narcissus autumnalis, Cæsalp. & Lob. ad. par. 2. (cui & Colchico - Narcissus) autumnalis luteus, Cam.

Colchicum luteum, Lob. Tab. luteo flore, Svve.

Variat in hortis Belgij angustioribus folijs & cauliculo dodrantali surrecto, Lob. obs. & Dod. ac Clus. hist. aliquando largiore foliorum numero à præcedente discrepat, & est Narcissus autumnalis flore luteo multiplex, Eyfett.

II. Colchicum melino flore.

Narcissus Persicus, Clus. pan. & hist. Camer. Tab. Ger.

III. Colchico luteo similis flore albo.

Sparganium Placæ, Clus. hisp. & hist.

IV. Colchicum luteum minus.

Colchicum parvum mont. lut. Lob. ico. Ger.

Narcissus autumnalis minor, Clus. hist.

Colchicum mont. luteum minus, Tab.

V. Colchicum luteum vernum.

Narcissus vernus præcocior flavo flore, Clus. hist. ap. 2.

Narcissus luteus vernus facie Narcissi autumnalis lutei, Lob. ad. par. 2.

Narcissus vernus flore luteo, Svvert.

an Colchicum vernum flavo flore Plateau, Clus. hist.

## ORNITHOGALUM ET EJUS SPECIES.

**O**ρνιθόγαλον, propter lacteum colorem, qui in flore nitet, similem ei, qui in alis aut ovīs gallinarum observatur, nomen accepisse videtur. Dioscorides lib. 2. cap. 174. pini, ut & Plin. lib. 21. cap. 17. Ornithogale nominans, meminere. Sunt qui Bulbinam Theoph. 7. hist. 13. & Athenai censent.

## ORNITHOGALUM UMBELLATUM album.

I. Ornithogalum umbellatum maximum.

an Narcissus quartus, Matth. Lugd. Tab.

Ornithogalum majus, Dod. Arabicum, Clus. pan. & hist. Eyf. Italicum, Cam.

Lilionarcissus polyanthos, Lob. ob.

Lilium Alexand. Neotericorum, Lob. ico. Cam.

Hyacinthus de Padro nostro Italicorum, Clus. hist. ap. 2. negans esse Narcissum 4. Matthioli, quod prius asseruerat.

Dulipan apud nos barbaro nomine, Cæsalp.

Ornithogalum Arabicum multiflorum album, umbilico interiore nigro, Svvert.

II. Ornithogalum umbellat. majus angust.

Ornithogalum medium, Eyft.

Flores intus candidi, exterius virescentes, flaminibus ex viridi pallescentibus.

III. Ornithogalum umbellat. alb. medium latifolium.

Ornithogalum aliud vulgare, Cluf. hist.

IV. Ornithogalum umbellat. med. angust.

Ornithogale, Manardo, Hermolao.

Ornithogalum Dod. gal. Tur. Ang. Gef. hor. Ama. Ger. Cast. vulgo, Cæsalp. secundum, Matth. Lugd.

Ornithogalum s. five vulgare, Cluf. hist. & pan.

Ornithogalum candido flore, Cord. in Dioscorid.

Ornithogalum candidum vulgare, Ad. Lob.

Bulbus Leucanthemos minor, Dod. Lugd.

Ornithogalum alterum minus, Cam.

Bulbus solsequius, Tab.

Ornithogalon spicatum, Svvert.

Est & folijs gramineis, ut in cæteris humistratis. Matthiolus duplex habet, & utrumque caule folioso pingit: quare in Lugd. historia utrumque à Dod. differre scribitur: sic Lacuna & Lugd. Matthioli utramque figuram proponunt: at Lonicerus, primam tantum, quam fistam suspicatur.

V. Ornithogalum album minus.

Ornithogal. minus è Pyrenæis, Cluf. hist. ap. 1.

Ornithogalum minus, Eyft.

VI. Ornithogalum umbellatum flosculis ex albo subcæruleis.

Ornithogalum Hispanicum minus, Cluf. hist.

### ORNITHOGALUM SPICATUM.

I. Ornithogalum latifolium & maximum.

Ornithogalum magnum Myconi, Lugd.

Ornithogalum maximum, Cluf. hist. ap. 1.

Ornithogalum vel Liliū Alexandrinum floribus albis innumerabilibus, Svvert.

Magna florum spica, aliquando centenis floribus nivei coloris.

II. Ornithogalum latifolium alterum.

Ornithogalum Æthiopicum, Cluf. cur. post.

Ornithogalum Indicum promont. Bonæ spei, Svvert.

III. Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus.

Asphodelus fœmina, Dod. Gal. Gef. hor.

Asphodelus Galeni, Lac. bulbosus Gal. Dod. Lugd. Cam. Ger.

Asphodel. Hyacinthinus fortè Galeni, Ad. Lob. obs. Hyacintho asphodelus, Lob. ico.

Ornithogalum majus, Cluf. in pan. majus primum, Eid. hist.

Ornithogalum Pyrenæum, Cluf. cur. post.

Ornithogalum aliud spicatum, Cam.

IV. Ornithogalum angustifolium, spicatum maximum.

Ornithogalum lacteum, spicatum max. Eyft.

V. Ornithogal. spic. seu comosum fl. lacteo.

Ornithogali lactei species major, Eyft.

VI. Ornithogal. majus spicatum flore albo.

Ornithogalum Narbonense, Dod. Lugd. spicatum, Cam.

Ornithog. spicatum Monspel. flore lacteo, Lob.

Ornithogalum alterum, Cam. apud. Matthiol. qui vulgari adjunxit.

Bulbus Ornithogalo similis Cæs.

Ornithogalum majus Monspel. Cluf. pan. secundum, Eid. hist.

Ornithogalum spicatum flore lacteo, Eyft.

Μάλλυ Dioscorid. lib. 3. cap. 54. Theophr. 7. hist. 11. & Epimedium Plinij, lib. 19. cap. 5.

VII. Ornithogal. majus spicatum alterum.

Ornithogal. 3. vel majus Byzantin. Cluf. hist.

Ornithogalum spicatum minus, Lob. obs.

VIII. Ornithogal. majus spic. flore luteo.

Bulbus Ornithogalo similis, flore luteo, Cæs.

IX. Ornithog. spicatum fl. viridi lactescente.

Ornithog. Pannon. albo flore, Cluf. pan. & hist.

Ornithogal. Pannon. Tab. Ger. Eyft.

Ornithogalum flore albo viridique linea in dorso prædito, Svvert.

an Ornithogalum serotinum, Cam.

X. Ornithogalum spicatum album.

Ornithogalum Hispanicum spicatum, Eyft.

XI. Ornithogalum cæruleo pallente flore.

Ornithogalum cæruleum pallens Hyacintho autumnali pene par, Lob. obs.

XII. Ornithogalum exoticum magno flore, minore innato.

Hyacinth. arborum Ornithogaloides, Colum.

Narcissus 4. Matthioli, Cluf. hist. ap. 2.

Ornithogal. Neapolitanum, Eidem ap. 2. Eyft.

Ornithogalum Neapolitanum flore interius candido, exterius cineraceo, Svvert.

Phalangij nomine, Honor. Belli ex Creta misit.

ORNI-

## ORNITHOGALUM LUTEUM.

I. Ornithogalum luteum sive pallidum majus.

Ornithogalum 7. sive pallido flore, Clus. hist.

II. Ornithogalum luteum magno flore. Ornithogal. flavum Alcmarianum, Clus. hist.

III. Ornithogalum luteum. Bulbus, Trag. (cepa agrestis) Lac. sylv. Ruel. Fuch. Tur. Gef. cat. Dod. Lugd. Cam. Eyf. Bulbus sylv. alius bifolius, Gef. hor. Sifynrichium, Cord. hist. Bulbus esculentus, Cast. Lon. Ornithogalon luteum, Cord. in Diosc. Ad. Lob. Tab. Lugd. Col. Svvert. Bulbus Ornithogalo similis florib. luteis, Cæs.

Ubi adolevit, folia inferiora amittit, quare apud Tabernæm. & Gerar. duæ figuræ.

Ornithogali lutei, & Ornithogali majoris, Taber.

Ornithog. lutei & Cephæ agrariæ nomine, Ger.

IV. Ornithogalum luteum minus.

Ornithogalum 10. sive Pannonic. luteo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogali lutei species minor, Lob. obs.

V. Ornithogal. angustifol. bulbiferum.

Ornithogalum angustifolium campestre luteum minimum bulbosum, Colum.

Variat: nam locis pinguioribus folia latiora & plura, sicut & flores: folia circa bulbillos hirsuta & candidiora sunt.



## SECTIO QUARTA.

CEPA: PORRUM: SCILLA:  
ALLIVM ET MOLY.

## CEPA ET EJUS SPECIES.

**A**gyptiorum numina, Cepas & Alliam (Plin. l. 19. c. 6.) prosequamur. Cepa à capitis magnitudine, Græcis κέμμυρον, ὅτι κέρεος συμμύειν πῖνι quod oculi pupillam comprimere cogat, utpote secundum Aristot. 20. probl. 22. mordaci nimium vapore lancinando & lacrymas movendo.

Genera Theophrasti. 7. hist. 4. à locis cognominata refert, Gardiam, Cnidiam, Samothraciam, Satamicam, Afcaloniam, & ffsilem. At Dioscorides l. 2. c. 181. longæ, rotunda, flavæ & candida meminit. Plin. l. 19. c. 6. Cepa, inquit, genera apud Græcos Sardia, Samothracia, Alfidena, Setania, Schista, Afcaloniam, &c.

Quare alia major est, alia minor: alia candida, alia viridis, alia rufa, alia subrubens: alia est rotunda, alia oblonga: omnes ut plurimum duplici aut triplici membranâ, quas Festus tallas, alij tunicas vocant, vestitæ. Sic alia acerrima, alia mediocriter acres, aut nihil ferè acedinis habentes. Sic alia feruntur, alia deponuntur: aliquando seminis loco bulbos gerunt, Ut Dalechampiùs notavit.

I. Cepa vulgaris. Cepe, Brunf. Gef. Lob. Cepa, Trag. Fuch. Tur. Matthiol. Lac Cord. in Diosc. Ang. Cast. Cæs. capitata, Matth. Cepa rotunda, Dod. Cepa sativa Matthioli, Lugd. Cepa alba & rubra, Gef. hort. Lon. Tab.

Variat colore floris, vel candido, vel purpurascens: tunicarum quoque, coloris rubri, aut candidi: radice formâ, major est, & minor: oblonga, sessilis, vel orbiculata, turbinata, qui-

busdam communioribus, in compressam latiorrem circumferentiam bulbaceam abit.

Cepas porraceas, vocant stolones, qui primo Vere, dum renelli sunt, antequam caulescunt, in cibos eruuntur.

II. Cepa oblonga, Dod. Gef. hor.

Cepa Hispanica oblonga, Lob. icon. Cam.

III. Cepa radice candida dulci.

Cepa quarta, Gef. hort.

IV. Cepa plurium caulium.

Cepa ovata à radice figura, Cord. hist.

V. *Cepa seetilis*, Matth. Cast. Lugd.  
an Gethyon Græcis, & *Cepola Columellæ*.  
VI. *Cepa fissilis*, Matth. Lugd. cui & *Cepæ*  
*χαίρι*, Portæ.  
*Cæpis affinis Muligia*, Cæf.  
VII. *Cepa sterilis*, Trag. Gesf. hor.  
*Cepa Ascalonica*, Matth. Lugd. cui fortè Bul-

bus *Setanius*, quem Theoph. & Plin. *Cepæ ge-*  
*nus esse testantur*.  
*Cepæ species sunt Ascalonia*, Cast.  
*Cepis affinis, Ascalonia vulgo*, Cæf.  
*Scaliones*, Tur.  
Verùm & Lobelius hist. Belgica *Ascalonitidem*  
antiquorum exhibuit, fortè à priore diversam.

## PORRUM EJUSQUE SPECIES.

**Q**uod *περάσων* Dioscorides l. 2. c. 179. vocavit, & in *κεφαλαίων*, *capitatum*, & *ἀμπελό-*  
*περάσων* distinxit; id Latini *Porrum*, quod porrò eat, & longè lateq; grassetur, voca-  
runt. Theophrast. 2. caus. 20. & 3. ejusdem 23. τὸ καρτὸν *περάσων*, *consum porrum* addidit: aliàs  
7. hist. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. de Porro egit. At Plin. l. 20. c. 6. est *sectivum* & *capitatum*; & illud  
l. 19. c. 6. *duplex fecit*.

I. *Porrum commune capitatum*.  
*Porrum*, Brunf. Cord. in Diosc. Dod. (& *Porrus*  
*Palladij*) Gesf. hor. Ang. Lon. Cæf. Cast. Tab.  
*Porrum commune*, Matth. Lugd. vulgare, Lob.  
*Porrum capitatum*, Fuch. Tur.  
*Porrum capitatum* Plinio, Hermol. Ruel. (cui  
*Gethyllidas Græcorum*) Dodon. gal. vulgare,  
Camer.

II. *Porrum sectivum latifolium*.  
*Porrum sectivum*, Plin. Dod. Cæf. Lugd. Portæ.  
*Porrum sectivum capiratum*, Matth. & (*sectile*)  
Lac. Lugd.  
*Porrum tonsile & capitatum*, Lob.  
*Porrum tonsile sive sectile*, Cam.

Hæc duo genere non differunt, cum ex eo-  
dem semine generentur, & cultura solum dif-  
crepent: quia id quod ad culinaria jusscula sæ-  
pius detonderi solet, *Sectivum* aut *Sectile* Co-  
lumellæ & Palladio nominatur: quod verò  
*capitatum* fieri debet, non *tondendum*, & au-  
tumnali tempore transferendum: etiam Plin-  
io monente.

III. *Porrum sectivum juncifolium*.  
*Porrum sectivum*, Trag. Fuch. Gesf. hort. Lon.  
Lugdun.  
*Porrum sectile*, Matth.  
*Cepa Ascalonia*, Matth. def. Ger.

*Cepa fissilis & Getion*. Tur.  
*Schænoprasum*, Dod. Ad. Lob. (cui *Ascalonia*  
Matth.) Tab. Ger.  
*Porro consili cognatum*, Cam.  
*Gethyllis*, quam *Ceparum* genus Nicandri  
Scholiastes dicit, Gesf. hort. in Porro sectivo.  
Differt à veterum *Sectivo*, cum illi folia lata,  
huic pro folijs junci inanes sint: hinc nomine  
ex Junco & Porro composito, *Schænoprasum*  
vocarunt.

Majus & minus habetur: illud rarius & ad  
condimenta mitius, quod *Gethium* Gesnero:  
minus vero *Gethyllis*.  
*Gethyllidem sylvest.* Gesf. lib. de hor. proponit.

IV. *Porrum folio latissimo*.  
*Porrum Syriacum*, Tab. Franco.  
*Porrum Indicum*, Cam.  
*Scorodoprasum*, Ger.

V. *Porrum sylv. inodorum*.  
*Porro simile, exilius & inodorum*, Lob.

VI. *Porrum sylv. gemino capite*.  
*Ampeloprasum*, seu *Porrum syl.* Lob. Lugd. cui  
à Matthioli diversum.

*Porrum sylvestre primum*, Tab.  
VII. *Porrum sylvestre vinearum*.  
*Ampeloprasum*, Matth. Ruel. Ama. Ang. Gesf.  
hort. Cæf. Port. Lugd.

## SCILLA EJUSQUE SPECIES.

**Σ**κίλλαν Theophrast. 1. hist. 7. & 10. proposuit, & 7. hist. 11. *Scilla Epimenidia vocata*, &  
*qua c'*, usu nuncupationem sortita sit, meminit. Sic Dioscorid. l. 2. c. 202. *σκίλλαν* habet,  
& cap.



& cap. seq. *πικροδένον*, quod Scillam aliqui nominant. Genera duo Scilla medica, Plin. l. 19. c. 5. mascula albis folijs, femina nigris: & tertium genus cibus gratum, Epimenidium vocatam & c. Et l. 20. c. 9. Scillarum in Medicina alba est, quæ mascula, femina nigra: candidissima utilissima.

I. Scilla vulgaris radice rubra.

Pancratium & Scilla Dioscor.

Scilla femina, Plinio.

Squilla, Brunf.

Squilla, Trag. (& Cepa muris) Matth. Fuch.

Tur. Cord. in Dioscorid. Gefn. hort. Lac. Lugdun. Lon. Camer. Cæsalp. cujus bulbus rufi coloris, & nigra in montibus non longè à mari, reperitur.

Scilla communis & Pancratium, Dod. gal.

Scilla nigra & femina Plinij, & Pancratium Dioscoridis, Costæo.

Scilla major, Cast.

Pancratium, Ang. & Scilla vulgaris, Guil. Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd. Tab.

Scilla rubentibus radicis tunicis folio aloës carinato, Lobel.

II. Scilla radice alba.

Scilla, mascula Plinio: femina, Myreps.

Scilla, Marcell. Hermol. Manard. Ruel. Guil.

Dod. Hispanica, Clus. hisp. & hist. Cast. ap. Lug. alba, Eyft.

Scilla (sive cepa marina) Lob. major, Tab.

Scilla minor, sive Pancratium, Cast.

III. Scilla esculenta.

Scilla epimenidia, Theophr.

Scillæ 3. genus epimenidia, Plin.

Scilla vera & legitima, Ang.

Scilla dulcis & candida in Cephalonia, & Creta, Costæo in Mesuem.

## ALLIUM EJUSQUE SPECIES.

**A**llium fortè ab ἀλλεσθαι exilire, quod exiliendo crescat. Σκέρδος in Dioscoridi l. 2. c. 182. vel quasi σκῆρον ῥόδον, id est, rudis rosa, propter odorem gravem: vel quod comestum, vapores excrementitios ad cutim pellat, & vescentibus pandiculationes moveat. Sunt qui ab halante gravi odore deducant, & Allium scribant.

Genera Dioscoridi, sativum & hortense, quod vel multiplici in Aegypto, vel singulari, ut Porrum, capite constet, cujus nucleos Græci ἀγλιδᾶς nominant: aliud sylvestre, quod ὀφύσκειρος. At Theophrasto 7. hist. 4. aliud præcox, aliud serotinum: differunt præterea magnitudine singulari: quædam etiam non nucleis, quædam verò multis coagmentantur, quos γέλας Theophr. ἀγλιδᾶς, Galenus: σκελιδᾶς, Aeginet. l. 4. c. 33. ὀφύλας, Aetius lib. & cap. 11. vocat. Verum Plinio l. 19. c. 6. Generum Allij differentia, in tempore, præcox maturefcit 60. diebus: tum in magnitudine. Ulpicum quoq. in hoc genere Græci appellavere. Alliam Cyprium, alij Antiscorodon (fortè rectius Aphroscorodon) & c. sunt qui velint Allium Ulpicum Plinij, Allium Aegyptiacum Dioscoridis esse.

In Virginea multis locis Allium nascitur, ab Anglicanoparum differens: desc. Virgin. quod ut & Cepe in Hispaniola, vix unquam bonum evadit: par. 4. Amer. c. ult. Et Indi ex omnibus Europæis radicibus Allium eligunt, quo ventriculum reficiant: Joseph. Acofta l. 4. c. 18.

I. Allium sativum.

Allium, Brunf. Trag. Matth. Ruel. Cord. in Dioscorid. Tur. Lac. Aug. Lon. Lobel. domesticum, March. Cast.

Allium hortense, Fuch. vulgare, Cam.

Allium sativum, Dod. Gef. hor. Ad. Cæf. Lugd.

Allium sativum multifidum, Cord. hist.

Verum Matthiolus, Lobelius & Dodonæus, una figura Allium sine flore, Allium cum flore,

& Allium amphicarpon; & Tabernæmon. sub Porro sylv. latifolio proposuit.

Genus quoddam capitibus ingentibus ex Africa adferri, Cæsalpinus auctor est.

II. Allium sativum alterum: sive Allioprasum caulis summo circumvoluto.

Allium sativum amphicarpon, quod & radicem nucleis feritur, & seminibus, quæ nucleos similitudine referunt, Cord. hist.



**Allium sativum secundum, Dod.**  
**Scorodoprasum secundum, Clus. pan. & hist.**  
**Allium Creticum, sive Serpentinum, Cam.**

III. **Allium sativum radice simplici.**  
*Μαδαφα*, Hippocrati.

**Allium mas, Matth.**

**Allium simplex, Cord. hist.**

**Allium sativum singulari capite, & Allium maculatum, Vercell.**

**Allium Ægyptiacum, Portæ.**

IV. **Allium Cyprium, Theoph.**

**Allium Ulpicum, Plin.**

**Allium Ulpicum vel Punicum, Columell.**

**Aphroschorodon, sive Allium Ulpium, Ruel. Gesner.**

**Allium Cyprium, sive Ulpicum, Portæ.**

**Allium sativum tertium, Dod.**

V. **Allioporum sive Scorodoprasum.**

**Scorodoprasum, Dioscor. l. 2. c. 183. Gal. Ægin.**

**Scorodoprasum, Trag. Matth. Cord. in Diosc.**

**Gesner. hort. Lac. Cast. Lugd. Portæ.**

**Allium porrinum, Car. Stephano.**

**Scorodoprasum & porrum Turcicum, Amat.**

VI. **Allium sphaericeo capite, folio latiore, sive scorodoprasum alterum.**

**Ampeloprasum primum, Dod.**

**Scorodoprasum sive allioporum, Ad.**

**Scorodoprasum, Lob. Cæs.**

**Scorodoprasum 1. Clus. pan. & hist.**

**Scorodoprasum alterum, Lug. qui cum sequen-  
 ri eadem tabellâ pinxit.**

**Porum Indum, Cam.**

VII. **Allium sphaericeo capite folio angustiore.**

**Scorodoprasum alterum, Lob. Lugd.**

VIII. **Allium sylvestre latifolium.**

**Allium syl. quod ursinum vocant, Plin. l. 19 c. 6.**

**Allium syl. Brunf. Trag. (& colubrinum) Eric.  
 Cordo: syl. latioris folij, Dod.**

**Allium ursinum, Matth. Fuch. Dod. gal. Ama.**

**Gesner. col. Tur. Clus. hist. Lugd. Thal. Cæs. Cast.  
 Cam. Eyfset.**

**Allium ursinum latifolium, Ad. Lob. Lugd.**

**Allium sylvestre bifolium & arctoscorodum,  
 Gesner. hort.**

**Allium sylvestre ophioschorodon appellatum,  
 Cord. in Diosc.**

**Ophioschorodon, Lon.**

**an Scorodoprasum.**

**Moly sive Allium Ursinum, Svvert.**

**Sunt qui Dioscoridis Scorodoprasum, aut ejus Ampeloprasum, aut Ophioschorodon, sed male, censeant.**

IX. **Allium montanum, latifolium maculatum.**

**Allium anguinum, Matth. Lugd. Portæ, serpentinum, Cast.**

**Allium latifolium maculosum, sive serpentinum, Ad.**

**Ophioschorodon, Lob.**

**Victoralis longa. Gesner. hort. Clus. pan. & hist.  
 (cui & major) Eyfset.**

**Allium alpinum, Gesner. hort. Dod. Tab. cui &  
 Victoralis mas.**

**Est mas & femina, illa latioribus, hæc angustioribus est folijs, quare**

**Victoralis mas, & femina, Camerario dicitur.**

X. **Allium sylv. campestre purpurascens.**

**Allium caninum primum, Trag.**

**Allium sylv. primum, Fuch.**

**Allium campestre, Cord. in hist.**

**Allium sylvest. Gesner. hort. Cæs. Cast. syl. minus,  
 Dod. gal.**

**Allium tenuifolium, Cam.**

XI. **Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus.**

**Allium in arvis, Plinio.**

**Allium syl. quod Ophioschoridon, Ruel. Matth.**

**Allium syl. tenuifolium, Ad. Lob. ico. Dod.**

**Allium syl. vulgare seu caninum, Thal. tenuifolium, Franco.**

XII. **Allium sylv. capitatum purpurascens minus: quod à primo potissimum magnitudine differt, cum palmare sit, & folijs junceis.**

XIII. **Allium sylv. bicornè flore obsoleto.**

**Allium caninum alterum, Trag.**

**Allium sylv. Tur. syl. alterum, Fuch.**

**Allium sylvestre majus, Dod. gal.**

**Allium rubentibus nucleis, Lob. ico.**

**Est majus & minus.**

XIV. **Allium aquaticum.**

**Allium fluviatile in sabulo ad Albim fluvium  
 in Misnia, Franc. hort. Lufar.**

## ALLIUM MONTANUM.

I. **Allium montanum bicornè latifolium flore dilute purpurascens.**

**Allium sive Moly mont. latif. 1. Clus. pan. & hist.**

**Allium montanum bicornè angustifolium flore purpurascens.**

Ampe-

*Ampelopiastron proliferum*, Lob. ico. Cam.

*Ampeloprasum* 1. Cam. apud Matth.

*Allium* sive *Moly montanum* 2. Clus. pan. (&

*Moly montanum* gramineo folio) & hist.

*Moly montanum* carmesino colore, Svvert.

III. *Allium* mont. bicorni flore exalbido.

*Allium* sive *Moly montanum* 3. Clus. pan. (&

*Moly montanum* junceo folio) & hist.

an *Gethioides* syl. Colum.

IV. *Allium* mont. bicorni flore obsoletiore.

*Allij* montan. quarti species 2. Clus. pan. & hist.

Huc referri potest

*Moly lurido* colore, Svvert.

V. *Allium* mont. bicorni fl. pallido odore.

*Allij* mont. quarti species 1. Clus. pan. & hist.

VI. *Allium* juncifol. bicorni luteum: quod  
1. est in Prod. Monspelio D. Saltzman. attulit.

VII. *Allium* mont. capite rotundo.

*Allium* sive *Moly montanum* 5. Clus. pan. (&  
*Moly montanum* purpureo flore) & hist.

VIII. *Allium* *Pyrenæum*.

*Moly* *Pyrenæum* purpur. flore, Clus. hist. ap. alt.

IX. *Allium* mont. folijs narcissi majus.

*Allium* sive *Moly narcissi* fol. 1. Clus. pan. & hist.  
an *Moly* folijs narcissi, Lob. Lugd.

Variat: 1. est, folijs splendentibus viridibus,  
floribus purpurasc. 2. folijs magnis cinereis &  
mollioribus, florib. dilutiorib. hoc posterius, est  
*Moly narcissi* folijs primi altera spec. Clus. hist.

X. *Allium* montan. folijs narcissi minus.

*Allium* sive *Moly narcissinis* folijs 2. Clus.  
pan. & hist.

*Allium saxatile* & *Bulbus vomitorius*, Cam.

Et hujus altera species folijs longioribus &  
angustioribus, floribus dilutioribus, & est  
*Moly narcissi* fol. secundi alt. spec. Clus. hist.

XI. *Allium* mont. radice oblonga: quod  
2. in Prod.

an *Allium* mont. sive *Petroscorodon*, Gef. hor.

*Allium* mont. radice oblonga, Eid. col. stirp.

XII. *Allium* montanum minus: quod  
3. in Prod.

## MOLY ET EJUS SPECIES.

**M**Ωλυ, ἀπὸ τῆς μωλδεν πρὸς νόσους, ab amoliendis morbis. Unius Theoph. 9. hist. 15. &  
*Dioscorid. lib. 3. cap. 54. meminere: at Plin. lib. 25. cap. 4. duplex proposuit: alterum*  
*radice rotunda: alterum verò longa.*

I. *Moly latifolium* liliflorum.

*Moly* Theoph. fortè & Plinij radice rotunda.

*Moly* Theoph. Ang. Dod. Clus. hisp. & hist. Cam.

*Moly* liliflorum, Ad. Lob. Lugd.

*Moly latifolium*, *Moly* Theoph. Dod.

*Moly* Homericum, Scillæ alterum genus, &  
*Pancratium*, Diosc. Cæs.

*Moly* Indicum flore purpureo, Svvert.

Flore est candido, vel subrubente.

II. *Moly latifolium* Indicum.

Duplex figura proponitur: altera priori simi-  
lis, paucis folijs, caule oblongo, capite rotun-  
do: altera, folijs plantaginis, caule brevi, capite  
ex pluribus bulbulis compacto: illud dicitur  
Caucasum, *Moly* Indicum vocatum, Lob.

*Moly* Indic. Dod. Lugd. Indicum 1. Tab. 2. Cam.

Alterius figuræ nomina:

Caucasum, Lob. ico.

*Moly* Indic. Clus. hisp. & hist. Indicum 2. Tab.

*Narcissus* sive *Pancratium* Clusij, Svvert.

III. *Moly latifolium* Hispanicum.

*Moly* Hispanicum purpureum, vel *Moly* mon-  
tanum latifol. purpur. Hispan. ad Clus. cur. post.

Flores plus minus 60. dilutè rubentes, aut  
purpurascentes. Huc refer

*Moly latifolium*, Eyft.

IV. *Moly latifol. luteum* odore allij primum.

*Moly* mont. latifol. flavo flore, Clus. hist. ap. alt.

*Moly luteum* Botanicorum perperam Orni-  
thogalum luteum latifolium, Lob. ad. par. 2.

*Moly* flavo flore, Svvert.

V. *Moly latif. luteum* odore allij secundum.

*Moly latifolium* flore flavo, Eyft.

VI. *Moly* African. umbella purpur. in Prod.

VII. *Moly* exoticum florib. albo viridibus

*Moly* flore albo lineis viridis coloris, Svvert.

VIII. *Moly angustifolium* umbellarum.

*Moly*, Matth. Cast. Lugd. Lon. angustifolium,

Dod. Lon.

*Myle*, Gefner. cat.

*Moly* *Dioscoridis* putatum, Ad.

*Moly* *Dioscoridis*, Lob. Clus. hisp. & hist. Cam.

an *Allium ursinum* alterum, Cæs.

IX. *Moly* humile folio gramineo.

*Chamæmoly*, an *Moly* *Dioscorid.* Colum.

X. *Moly* parvum caule triangulo.

Moly parvum Pefarenfe, Ponn. Ital.

XI. Moly angustifol. floribus majoribus.  
Moly minus, Cluf. hift.

Moly minimum albo flore, Svvert.

XII. Moly angustifolium folijs reflexis.  
Moly serpentinum vocatum, Lob. Lugd.

Scorodoprasum alterum Clusij, quibusdam.

XIII. Moly atropurpureum Svvert. mihi incognitum.

XIV. Moly moschatum capillaceo folio.  
Allium syl. perpusillum juncifolium moschatum, Lob. ad. part. alt.



## SECTIO QUINTA.

### LILIUM: MARTAGON: CORONA IMPERIALIS.

#### LILIUM ET EJUS SPECIES.

**L**ilium, κρίνον & λείριον Græcis, Theoph. 6. hift. 6. Lilij florem variare dixit, & purpureum esse, singulis caulibus, aliàs unum, aliàs plura exire. Dioscorides lib. 3. cap. 116. duo genera agnovisse videtur, dum scribit, & rubra lilia esse. At Plinio lib. 21. cap. 5. Lilium triplex, album, rubens, purpureum, quod aliquando gemino sit caule, quod Narcissum vocitent. Dividimus in Lilium radice bulbosa & una, ut sunt Lilia alba, Martagon: vel pluribus, Asphodeli bulbis constante, ut Lilium luteum & rubrum.

#### LILIUM ALBUM.

I. Lilium album flore erecto & vulgare.

Lilium five rosa Junonis, Apuleio.

Ambrosia five Lilium album Nicandri, Ang.

Lilium Brunf. Dod. gal. Tur. Matthiol. Lac.

Cast. Cæsalp.

Lilium album, Trag. Fuch. Gesner. hor. Ang.

Lon. Lugd. Tab. Ger. Eyft.

Lilium candidum, Cord. in Diosc. Ad. Lob.  
Dod. Franco.

Lilium album vulgare, Cam.

Variat: aliquando circa caulis medium, foliorum quasi cespes, ut pingit Bry, nomine Lilij multifolij Sturgardiæ nati.

Aliquando ex caule plano triumunciarum lato, numerosi flores exurgunt, ut idem figuram habet, cui titulus

Lilium liliorum, five 122. lilia ex eodem bulbo enata.

II. Lilium album floribus dependentibus, five peregrinum.

Sultan Zambach ( five Martagon Constantinopolitanum ) Cluf. pan. & hift. Eyft. du Bry. Martagon album, Lilium candidum Byzantinum, Lob. ico.

Lilia candida Martagonis Constantinopolitani nomine insignita, Lob. ad. par. alt.

Lilij albi species alia, Cam.

Hoc nonnunquam sexagenos flores in plano & lato caule prorulit, quare.

Lilium album Byzantinum ποδωνόες, Clusio.

Sic Lobelius ad. part. alt. in caule palmaris latitudinis, humanæ proceritatis, ducentos & plures candidissimos & suavissimos flores observavit.

Huc referendum

Lilij pulchri albi & ignoti species Theophrasti, Rauvvolf.

Lilium album Syriacum, Lugd. in ap.

an Lilia candidissima in Baya, medicinæ tota utilia, Linsc. par. 4. Ind. Orient. cap. 14.

#### LILIUM PURPUROCROCCEUM.

I. Lilium purpurocrocceum majus.

an Bulbus cruentus, Hippocrati.

Lilium purpureum Diosc. rubens Plinij.

Hemerocallis Diosc. Matth. Amat. Ang. Lac.

Cast.

Hemerocallis 1. Matthioli, Cam. & Lugd.

Hya-

Hyacinthus & Cosmofandalos Poëtarum, Dod. & Portæ.

Lilium rubrum, sive aureum, Brunf.

Lilium rufum, Trag. Dod. gal.

Lilium rubens, Gef. cat. Fuch. ico.

Lilium rubens vel croceum alterum, Gef. hor.

Lilium croceum, Fuch. Lon. fyl. croceo flore, Cæfalp.

Lilium purpureum, Tur. Ad. purpur. majus, Lob. Dod. & Cynorrhodon Plinij, ut & Ang. & Portæ) Lugd. Eyft.

Lilium aureum Ger. majus, Tab.

Martagon, Cast. ico.

Martagon radice alba, Ang.

Martagon Chymistarum, Lob. ico.

Vidi & candido flore.

II. Lilium purpurocroceum flore pleno.

Hemerocallis 1. Matthiol. flore pleno, Cam.

Lilium cruentum puniceum flore pleno, Eyft.

III. Lilium purpurocroceum minus.

Lilium purpureum minus, Ad. Lob. Dod.

Lilium purpureum alterum minus, Lugd.

Lilium rubrum minus non bulbiferum, Clusf. pan.

Martagon 3. Hyacinthus Poëtarum, Ang.

Lilium puniceum non bulbiferum minus, Clusf. hist.

Variat: communiter flore puniceo & quasi rubente, numero paucioribus: aliquando viginti & plures observantur: reperitur & pleno flore, duodecim, viginti, aut plurium foliorum textura, constans.

IV. Lilium phœniceum.

Martagon phœnicum dilutum, Lob. belg.

Martagon Chymistarum alterum, Lob. ico.

Lilium puniceum non bulbiferum majus flore diluto, Clusf. hist.

Flores nonnunquam sexaginta vno caule.

V. Lilium Sandycis colore polyanthos.

Lilium cruentum polyanthos, Eyft.

Flores 84. in hoc observari.

VI. Lilium cruentum plantaginis folio.

Lilium cruentum latifolium, Tab. quid?

## LILIUM BULBIFERUM.

I. Lilium bulbiferum latifolium majus.

Lilium cruentum bulbos majusculos squamatis compactos gerens, summo alis diviso caule, Lob. ico.

Lilium cruentum bulbos gerens, Lugd.

Martagon bulbif. majus, Clusf. pan. vel primum, Eid. hist.

Martagon rubrum, Tab.

Lilium cruentum latifolium, Ger.

II. Lilium bulbiferum angustifolium.

Martagon cruentum angustifolium, Lob. ico.

III. Lilium bulbiferum minus.

Lilium rubens vel croceum alterum, &

Lilium rubens seminiferum, Gef. hor.

Lilium cruentum 4. secundum caulem bulbulis donatum, Lob. cruentum aliud, Lugd.

Lilium purpureum tertium, Dod.

Martagon bulbiferum minus, vel pratense, Clusf. pan.

Martagon bulbiferum 3. vel lilium puniceum bulbiferum 3. Clusf. hist.

Hemerocallis prima Matthioli bulbifera, Camer.

Lilium cruentum bulbiferum, Eyft.

IV. Lilium bulbiferum incanum.

Martagon bulbifer. incanum, Clusf. pan. vel 2. Eid. hist.

Hujus iconem Lobelius primo adjunxit, & apud Lugdunensem, sub Lilio cruento bulbos gerente pingitur.

## LILIUM FLORIBUS REFLEXIS latifolium.

I. Lilium floribus reflexis montanum.

Asphodillus, Brunf.

Hyacinthus Poëtarum, vel 5. Trag.

Asphodelus fœmina, Fuch.

Lilium purpureum, Fuch. ico. Gesner. hor. fyl. Thal.

Lilium fyl. Dod. Cam. alterum, Clusf. pan.

Lilium fyl. purpureo flore. Cæf.

Lilium alterum, Martagon Italis, quod Petilium Plinius appellat, vna.

Lilium montanum, Ad. Lob. sive fyl. 2. minus, Clusf. hist.

Martagon, Matth. Lac. Lugd. Cast. desc.

Martagon primum, Ang.

Hemerocallis, Dod. gal. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lon.

Lilium montanum flore purpurascente punctatum, Eyft.

Variat floris colore, qui plerumq; subruber, aliquando dilutus albicans: sic & macule rubræ inordinatæ florum folijs, & intus & foris, maximè circa foliorum exortum, intrinsecus

asperguntur : hujus tres differentias Clusius agnoscit : huc referre oportet Martagon Pannon. flore suaverubente , ipsius Bry.

Reperitur etiam longiore spicâ, & dicitur Marragon montanum longiore spicâ, Bry : & etiam quasi duplici corolla ab eodem pictum, Francofurti natum.

II. Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum.

Lilium purpureum mas, Gef. hor.

Lilium syl. primum & majus, Clus. pan. & hist.

Hemerocallis flore rubello, Lob. ico.

Lilium Saracenicum , Tab.

Flores priore plures, saturatè purpurascen-tes, maculis nigricantibus distincti: aliquan-do dilutè purpurascen-tes, maculis carentes; Lilium flore purpurascen-te non punctatum, Eystett.

Pingit insuper Bry.

Martagon exoticum flore spadiceo , & Martagon flore carneo.

III. Lilium floribus reflexis, varijs, sive tertium.

Lilium montanum sive syl. tertium, Clus. hist.

Lilium montanum maximum polyanthos vari-egatum , Eyst.

Simile est Clusiano.

Flos antequam explicetur, foris carneus: ex-plicatus, intus alb. notis purpureis insignitus.

Clusius & quartum genus addit. floribus sa-turatè purpurascen-tes serius florentibus, & odore non insuavi præditis.

IV. Lilium fl. reflexis albis non punctatis. Lilium montanum albo flore, Clus. hist. ap. alt. & cur. post.

Lilium mont. minus alb. non punctatum, Eyst.

Marragon imperiale niveum sine maculis, Bry.

V. Lilium flor. reflexis albis punctatis.

Lilium montanum albis floribus maculis pur-pureis insignitis , Clus. cur. post.

Lilium montan. majus album punctatum, Eyst.

VI. Lilium flor. reflexis polyanthos album punctatum.

Lilium mont. maximum polyanthos album varijs maculis rubris maculis aspersis, Eyst.

VII. Lilium Byzantinum miniatum.

Lilium rubrum Zuphiniare , sive miniatum Chalcedonicum , Clus. pan.

Lilium rubrum sive miniat. Byzant. Eid. hist.

Hemerocallis Byzantina altera , Lob. ico.

Lilium Chalcedonicum miniatum serotinum, Lob. ad. par. alt.

Hemerocallis Constantinopolitana phœnicea unico flore , Lugd.

Flos colore elegantissimi minij aut ceræ rubræ recentis, rarius prorsus nivei, aliquando flavi coloris: modò unus, modò duo, quatuor, quinque, sex, tredecim.

VIII. Lilium Byzant. miniat. polyanthos.

Lilium Byzantinum miniatum saturatiore flore πολυανθός, sive Zuphiniare, Clus. hist.

Lilium Chalcedonicum miniatum præcox, Lob. ad. par. alt.

Flores quinos, senos, denos ut plurimum profert, rarius 20. 30. vel 40. in caule duorum triumve digitorum latitudine, aliquando satu-ratiore, aliquando dilutioris coloris, hocque Lilij Byzantini miniatum dilutioris floris nomi-ne pingitur à Clusio in hist.

Lilium Byzantinum serotinum , Eyst.

Lilium Byzantinum flore multiplici, Eid.

Hoc florum foliorum numero duodenario, & staminum multitudine à priore discrepat.

Varietas in folijs : quæ flore est dilutiore, caulem & folia viridiora habet: quæ verò satu-ratiore, hujus caulis & folia plerumq; ex pur-pura nigricant. Aliquando flores in modum corollæ disposiri nascuntur, ut Bry pingit, no-minans Martagon corollam præbens.

IX. Lilium purpuro sanguineum fl. reflexo.

Hemerocallis altera , Matth. Lugd. quam cum Lilio Zuphiani eandem vult, Clus.

Lilium sylvestre alterum, Dod. ico.

Hemerocallis Chalcedonica purpuro sangui-neâ polyanthos , Lob. Cam. (cui idem cum Lilio Zuphiani Clusij) Bry.

X. Lilium pyramidale moschatum.

Lilium sylvestr. sive Hemerocallis moschata polyanthos , &

Martagon imperiale nuperor. Lob. ad. par. alt. Martagon imperiale moschatum, Eyst.

Est florum centum & viginti & plurium, rosæ moschatæ odore, qui diluti & lividi colo-ris maculis ex fusco purpureis norati: florum 210. ferax in horto Eyst. conspectum fuit.

## LILIUM FLORIBUS REFLEXIS angustifolium.

I. Lilium rubrum angustifolium.

Lilium

*Lilium rubrum præcox*, Clus. hist. Bry.

Uno, duobus, tribus est floribus: & quia aliquando angustioribus est folijs, vel latioribus, idcirco Clusius in hist.

*Lilium rubrum præcox* 1. & 2. facit.

II. *Lilium* brevi & gramineo folio.

*Lilium rubrum præcox* 3. angustifolium, Clus. hist.

*Lilium* miniat. tenuifol. Clus. hist. ap. alt.

*Hemerocallis Macedonica* & *Martagon Pomponium*, Lob. ad. par. alt.

*Lilium montanum rubrum præcox*, Eyf.

Floribus aliquando 35. 46. & 48 sed in plano caule, vel miniati, vel cruenti coloris.

III. *Lilium* miniatum odorum angustifol.

*Lilij* miniati tenuifol. aliud genus, Clus. hist. ap. alt.

*Marragon Pomponij*, Eid. & cur. post. & Eyf.

IV. *Lilium flavum angustifolium*.

*Lilium montanum flavo flore maculis distinctum* & non distinctum, Clus. hist. ap. 1. & alt.

*Lilium montan. flavo flore*, Lob. ad. part. alt.

*Lilium montanum flore luteo punctatum* & non punctatum, Eyf.

*Martag. sive Hemerocallis punctata flavo fl.* &

*Marragon non punctatum, flore flavo*, &

*Martagon sive Lilium de Canada auri colorem referens, fl. intus nigris maculis asperso*, Bry.

*Lilium montanum magis flavo flore & atrioribus maculis*, Clus. cur. post.

Variat flos colore flavo, vel dilutior quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etiã subviridi fl. & dicitur *Martagon subviridi flore*, Bry.

## LILIUM SIVE CORONA

Imperialis.

I. *Lilium sive Corona Imperialis*.

*Corona Imperialis*, Dod. Lugd. (& *Chalcedonicum* Lale) Lon. Tab. Cam. Eyf. Rob. qui & Coronam imperialem majorem addit.

*Lilium sive Corona Imperialis*, Lob.

*Tusai sive Lilium Persicum* 1. (& *Hemerocallis Dioscoridis*) Clus. pan. & hist. & du Bry.

*Corona imperialis procerior rubra*, sed alia rubicunda, Svvert.

Variat flos colore luteo, vel verius pallescente, vel purpurei *Lilij* instar rubente, aut *Sandaracæ* colorem refert, & hæc dicitur *Tusai* 2. Clusij hist.

At Lobelius ad. part. alt. varietatem in caule, flore & folio adfert: cui alia præcocior, alia ferotina: præcocior altera folio lato dilutè vi-  
rente, flore pallidior; altera media, quæ elatior, folio pallidior, angustior, flore dilutior. At ferotina folijs latioribus, atrovirentibus, flore saturo phœniceo.

II. *Lilium*, sive *Corona imperialis multiflora latoque caule*.

*Tusai*, sive *Lilium Persicum* 3. & *Tusai πολυανθής*, Clus. hist. pan. & rar.

*Corona imperialis polyanthes*, Eyf.

*Corona platycaulos*, sive *laticaulis*, Lob. ad. par. alt.

Flores 20. 30. 40. 50. & etiam 70. in caule lato, qui sequenti anno caulem rotundum acquirit, cum 3. 5. 7. aut octo floribus.

III. *Lilium sive Corona imperialis duplici corona*.

*Corona imperialis phœnicea duplici corona*, aut serie florum, Lob. ico.

*Corona imperialis polyanthes*, Tab. ico.

*Corona imperialis florum classe duplici*, Eyf.

*Corona polyphyllos sive foliosa*, Lobel. ad. part. alt.

*Tusai*, sive *Lilium Persicum* 2. du Bry.

*Corona imper. duabus coronis ornata flore flavescente*, Svvert.

Et hujus varietas apud Lob. caule numerosis folijs stipato, corona duplici nonnullis floribus in caulis fastigio: altera, flore dilutior minus propendente, ob florum acervum caulem ambiente: & hæc est

*Corona polyphyllos & polyanthes altera*, Lob. ad. par. alt.

IV. *Lilium sive Corona imperialis non fœtens*.

*Tusai quarta differentia*, Clus. hist.

V. *Lilium sive Corona Imperialis ramosa*. *Tusai διανθής*, Clus. hist.

Ramis singulis 11. flores: vel in altero 8. vel plures: in altera, 5. vel sex.

## LILIUM PERSICUM.

*Lilium Persicum*, Dod. (& *Hyacinth. spurius* 6.) Lob.

6.) Lobel. (& Pannachio Perſianorum) Lugd. Taber.  
 Liliū non bulbolum, ſive arundinaceum flore ſubcroceo & alterum luteo, Cam. Eyſt. Rob. Syverr. Bry.  
 Liliū Suſianum, Cluſ. pan. & hiſt. Bry.

### LILIUM ASPHODELI radice.

I. Liliū luteum aſphodeli radice.  
 Liliū non bulbolum luteum, Dod. Lugd. Ger.  
 Lirioſphodelus luteus liſiſlorus, Ad. Lob.  
 Liliaſphodelus luteo flore, Cluſ. pan. hiſt. Cam.  
 Liliago minor aſphodelo affinis, Hemerocallis Dioſcoridis videtur, Cæſ.

Aſphodelus liliaceus, Eyſt. luteus, Tab.  
 Flore eſt communiter luteo, rarius albo.  
 II. Liliū rubrum aſphodeli radice.  
 Hemerocallis Dioſc. Theoph. & Plinij.  
 Liliū rubens harundinaceum, Gef. hort.  
 Liliū non bulbolum obſoleto colore rubens, Dodon.  
 Lirioſphodelus phœniceus, Lob.  
 Liliaſphodelus puniceus, Cluſ. hiſt.  
 Liliū rubrum non bulbolum, Lugd.  
 Liliago major aſphodelo affinis, Cæſ.  
 Aſphodelus liliaceus rubens, Tab.  
 Liliū non bulbolum ſive arundinaceum, Camer. ſive phœniceum, Ger.  
 Liliū fatuum, Eyſtett.



## SECTIO SEXTA.

# ORCHIS: SATYRIUM: DENS CANIS: OPHIRYS: OROBANCHE.

## ORCHIS EJUSQUE DIFFERENTIÆ

**O**ρχις ſive Teſticulus, à Theophraſto 9. hiſt. 19. & Dioſcoride l. 3. c. 141. proponitur: Dioſcorides, inter Orchidem, & Satyrion differentiam hanc fecit: Ορχιδας vocans, quæ radicem bulbolum habent, eamq; geminam, oblongam olivæ modo anguſtam, ſuperiorem pleniorē, & inferiorem molliorē, ac rugoſiorē. Satyrion autem, quod radicem habet unam, eamq; bulbolum, mali magnitudine.

Genera Orchidis, Dioſcorides duo fecit; unum, Κυνος ὄρχιν, teſticulum canis: alterum, Σεραπιάδα cognominatum. Sic Satyrion duplex, alterum σατύριον τετραφυλλον; alterum σατύριον ἑξυθρόνιον, vel ἑξυθραίνεν. Plinius l. 26. c. 10. Orchion Satyriorumq; deſcriptiones confundit: & l. 22. c. 8. Cynoforchidis nomine repetijt.

Lubet diſtinguere in eas, quæ radices habent, vel rotundas teſticulorum forma, vel palmas manuſve referentes. Illas, in eas quæ radices habent vel geminas, quas Orchides: vel unicam, quas Satyria nominabimus: has verò Orchides palmatas appellabimus. Orchidis genera facimus, Cynoforchin ſive Canis teſticulum, Teſticulum morionis, Orchin fetidam, ſive Teſticulum hircinum: Orchin Serapiada, vel Teſticulum vulpinum & Teſticulum odoratum: ad quæ genera quinq; Orchidum ſpecies reduci poſſunt.

### CYNOSORCHIS, SEU TESTI- culus canis.

I. Cynoforchis latifol. hiantē cucullo major.  
 Satyrion primum. Brunf. mas, Trag.  
 Orchis mas latifolia, Fuch. vel major, Lon.  
 Orchis & Teſticulus canis officin: Ama. lati-

folia, Eyſtett.

Orchis ſive Teſticulus & Cynoforchis, Ang.  
 Orchis prior Dioſcoridis, Corn.  
 Orchis primum genus, Dod. gal. Lugd. Thal.  
 Teſticulus ꝑ. Matth. 3. Lac.  
 Cynoforchis, Ad.

Testi-



**Testiculus latifol.** Taber. & **Satyrion triphyl-**  
**lon,** Eidem.

**II.** **Cynoforchis latifolia** hiante cucullo  
altera.

**Cynoforchis mas nostra,** vel 4. **testiculus,** Trag.

**Cynoforchis nostra major,** Lob. Lugd.

**Cynoforchis prior,** Dod. media, Cam.

**Cynoforchis major** 3. Tab. & altera, Ger.

**Serapias Dioscoridis,** sive **Basilica Siderites,** vel  
**Erythraea,** Gemmæ.

**III.** **Cynoforchis latifolia** spicâ compactâ.

**Cynoforchis tertia,** Dod. Lugd.

**Cynoforchis major altera nostra,** Lob.

**Cynoforchis major quarta,** Tab.

**Cynoforchis palustris,** Ger. ico.

**Orchis,** **Cynoforchis** & **Testiculus canis major**  
flore incarnato, Cam.

**Serapias Dioscoridis secunda,** sive **Orchis ba-**  
**silica altera syderites** flore candidiore, Gem.

**Satyrion** sive **Orchis major rubra,** Svertius.  
du Bry.

**IV.** **Cynoforchis latifolia** hiante cucullo  
minor.

**Cynoforchis altera,** Dod. Lugd. Tab.

**Cynoforchis major,** Ger.

**Cynoforchis majoris secunda species,** Lob.

**Hæc communiter** latioribus, rarius angustiori-  
bus folijs reperitur.

**V.** **Cynoforchis angustifolia** hiante cucul-  
lo: quæ 1. in Prod.

### CYNOSORCHIS MILITARIS.

**I.** **Cynoforchis militaris major.**

an **Testiculus** 4. cum **Cynoforchide** 2. Trag.

**Testiculus** aliud tertio loco, Cord. hist.

**Cynoforchis quarta,** Dod.

**Orchis strateumatica** sive **stratiotes major,** sive  
**militaris,** Gemmæ, quæ **Basilica** 3. Lob.

**Orchis strateumatica major,** sive **Basilica tertia**  
Gemmæ, Lugd.

**Orchis latifolia altera,** Clus. pan. & hist.

**Testiculus** 5. **militaris,** Tab.

**Ornithophora candida,** Ger. ico.

**Orchis purpurea,** du Bry.

**II.** **Cynoforchis militaris media.**

**Orchis** flore rubro elegantissimo, Clus. pan. at  
secunda, Eid. in hist.

**III.** **Cynoforchis militaris minor.**

**Orchis strateumatica minor** Gem. Lob. Lugd.

**Orchis strateumatica,** Ger.

**Testiculus strateumaticus minor,** Tab.

**IV.** **Cynoforchis militaris montana** spicâ  
rubente conglomeratâ: quæ 2. in Prod.

**V.** **Cynoforchis militaris pratensis elatior,**  
floribus variegatis: quæ 3. in Prod.

**VI.** **Cynoforchis militaris pratensis hu-**  
milior.

**Orchis Pannonica** 4. Clus. pan. & hist.

**Orchis minor** flore incarnato, Eyst.

**Orchis Pannonica,** du Bry.

**Hujus species altera** ampliore, crassiore &  
longiore spicâ.

**VII.** **Cynoforchis montana** purpurea o-  
dorata.

**Orchis quinta odora** serapiada Diosc. Trag.

**Orchis quarta** Dodonæo, Lugd.

**Testiculus primus,** Matth. species 4. Eidem  
comp.

**Testiculus candidus,** Cord. hist. ico.

**Orchis fœmina,** major, Fuch.

**Orchis fœmina,** Eid. ico. Tur.

**Orchis tertium genus,** Dodon. gal.

**Testiculus** 12. Taber.

**Major & minor** habetur, quare species duæ  
Trago.

**VIII.** **Cynoforchis** obscurè purpurea o-  
dorata.

**Orchis Pannonica tertia,** Clus. pan. & hist.

**Cynoforchis** flore purpurascens, Eyst.

**IX.** **Orchis** globoso flore.

**Orchis rotunda** Dalechampi, Lugd.

an **Orchis** species, floribus quasi in umbella,  
Thal.

**X.** **Chamæorchis alpina** folio gramineo:  
quæ 4. in Prod.

### ORCHIS MORIO.

**I.** **Orchis morio** mas folijs maculatis.

**Satyrion mas,** Brunf. **Cynoforchis,** Eid. Ang.

**Testiculus** 1. Matth. icon. 4. Eidem folio, Lac.  
Castor.

**Orchis altera** Dioscoridis, Corn.

**Orchis mas angustifolia,** Fuch. Tur.

**Orchis mas minor,** Lon.

**Orchis Delphinia palustris,** Gem.

**Orchis** 2. genus, Dod. gal. Thal.

**Testiculus morionis mas,** Dod. Lugd.

**Cynoforchis morio,** Lob. Franc.

**Cynoforchis morio mas,** Tab.

**Cynoforchis maculata,** Ger.

Satyrium Apulei, Svvert. du Bry.

Flore est purpureo, vel ex roseo candido, purpureis maculis notato.

II Orchis morio folijs sessilibus maculatis. Cynosorchis delphinia sessilibus maculosis obtusioribus folijs, flore purpureo violaceo, caule sesquicubitali, Lob. ico.

Cynosorchis maculata, Tab.

Cynosorchis morio mas, Ger. ico.

III. Orchis folijs sessilibus non maculatis. Orchis colore vario, vel 5. Clusij, pan. & hist. descript.

Variat floris colore, modò purpureo saturatiore, modò dilutiore, modò carneo, modò omnino lacteo; nunc maculis, interdum nullis, aspersis.

IV. Orchis morio femina.

Testiculi species tertia, Matth.

Testiculo alteri adjungit, Lac.

Orchis, sive Cynosorchis femina minor, Fuch.

Orchis angustifolia femina altera, Fuch. ico.

Orchis tertium genus, Dod. gal.

Orchis delphinia montana, Gem.

Testiculus morionis femina, Dod. Lugd.

Cynosorchis morio femina, Lob. Lugd. Ger.

Cynosorchis morio 3. Tab. Cynosorchis femina, Eyfset.

an Testiculus alius, Cord. hist. Ab hac sola radice, triplici bulbo constante differt, quæ

Triorchis Serapias mas, Fuch. Lugd.

Triorchis mas minor, Fuch. in ico. Tur. Tab.

Triorchis mas, Lon.

Orchis Serapias mas, Dod. gal.

Huc referri potest

Orchis angustifol. femina altera, Fuch. ico.

Orchis, sive Cynosorchis femina minor, Fuch.

Orchis quartum genus, Dod. gal.

Orchis morio minor, folijs maculatis.

Cynosorchis minimis & secundum caulem pe-

dalem & cubitalem maculosis folijs, floribus purpureis, Lob. ico.

Satyrium maculosum, Svvert.

VI. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, mas.

Orchis Antrophora oreades altera, Colum.

VII. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, femina.

Orchis antropophora oreades, Colum.

VIII Orchis flore simiam referens.

Orchis Zoophora cercopithecum exprimens Oreades, Colum.

## ORCHIS FOETIDA.

I. Orchis barbata odore hirci, brevior latioreque folio.

Tragorchis, Dod. gal. maximus, Ger.

Testiculus hirci, Dod. Lob. obs. primus, Tab.

Testiculus, sive Tragorchis, Ad.

II. Orchis odore hirci longiore angustiorque folio.

Testiculus hircinus vulg. & leporis testic. Lob.

Testiculus hircinus secundus, Tab.

Testiculus linguâ bifurcatâ, Cæs.

Orchis saurodes, vel scincophora lacertarum æmulatione, Gemmæ, Lugd.

Testiculus hircinus vulgaris, Lugd.

Tragorchis mas, Ger.

III. Orchis odore hirci minor.

Tragorchis minor & verior, Gem. sive Coriophytes, vel coriophora flore instar cimicum, Lob.

Tragorchis minor & verior, Lugd.

Testiculus hircinus tertius minor, Tab.

Tragorchis femina, Ger.

IV. Orchis odore hirci minor spicâ purpurascente.

Orchis Batavica sexta, Clus. hist.

V. Orchis spicâ purpureâ foetida.

Orchis teterrimo odore foetida, Clu. pan. & hist.

## ORCHIS SERAPIAS.

*Serapiades dicuntur, quod horum flores insecta facunda & lasciva referant, tanquam à Serapiade Alexandrinorum olim Deo nomen habentia: cujus templum excellens Canopi erat, ubi lascivijs, cantibus & saltationibus colebatur, Strabone 17. sua Geographia referente.*

I. Orchis bifolia latissima.

Orchis latifolia maxima, Clus. pan.

Orchis prima amplissimis folijs, Clus. hist.

Orchis bifolia latifolia, Thal.

II. Orchis bifolia altera.

Orchis latifolia altera, Clus. pan. & hist.

Orch. hermaphrodica, Lug. Ger. secund. Gem.

Testicul. vulpin. Eyfset. hermaphroditicus, Tab.

Orchis psychodes diphylla, Lob.

Orchis bifolia, Tab.

Testi-

Testiculi species quinta, Cam. epit.

III. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo.

Orchis altera serapias, Gesl. cat.

Orchis altera Satyrion vulgò, Ang.

Orchis serapias, Brasl. at primus, Dod. Lugd.

Orchis bifolius, Cam. Orch. fl. albo minor, Eyf.

Testiculus bifolius, Cord. hist.

Testiculi tertij species prima, Matth. Lugd.

Testiculus vulpinus, Franco.

Testiculus vulpinus primus, Lob. latifol. Tab.

Satyrium trifolium, Eid.

Orchis Ornithophora, Ger. ico.

Orchis flore albo, du Bry. minor & Testiculus leucanthemos, Eyf.

IV. Orchis trifolia major.

Testiculus sacerdotis, Ruel.

Orchidis undecima species, Trag.

Testiculus candid. odorat. major, Cord. hist.

Testiculus vulpis, Dod. gal. Lugd.

Satyrium trifolium, Fuch. Tur. Lon. qui tres bulbos adpingit.

Triorchis trif. Tab. & triorch. major mas, Eid.

Satyrium trifolium, Ama.

Flore communiter est candido: reperitur & purpureo: si quis cum præcedenti eandem velit, facillè assentiamur.

V. Orchis trifolia minor.

Culices minores triphyllæ, Lob. ico.

VI. Orchis hermaphroditica.

Orchis batrachires, Gem. Lob. Tab. Lugd.

Orchis Melittias, Ger. ico.

VII. Orchis fucum referens major foliolis superioribus candidis & purpurascens.

an Orchis Serapias Dioscoridis.

Satyrium quantum, Brunf.

Orchis sexta, & satyrium alterum, Trag.

Orchis sive Testiculus minor violaceis floribus, Cord. hist.

Orchis serapias fœmina, Dod. gall.

Orchis serapias secundus major, Dod. Lugd.

Orchis secunda species Dodonæi, Lugd.

Orchis sphegodes, Gem. Lob. ob. Lugd.

Testiculus vulpinus major, Lob. ico.

Testiculus 7. sphegodes, Tab.

Orchis strateumatica, Ger. ico.

Testiculi species 2. Matth. Lac.

Testiculus figura & colore apem referens, Cæf.

Orchis serapias 2. Dodonæi, Lugd. Eyf.

Triorchis fœmina, Fuch. Lon.

Satyrium floribus apes referens, Tur.

Satyrium, testiculus vulpinus, Svvert. du Bry.

VIII. Orchis fucum referens flore subvirgata.

Orchidis sextæ species altera, Trag.

Testiculus vulpinus minor, Ad.

Orchis serapias secunda minor, Dod.

Orchis melittias sive apis cadaverulum exprimens, Lob. Lugd. Tab.

Triorchis fœmina, Tab.

Orchis myodes & Testiculus vulpinus major, Ger. ico.

IX. Orchis fucum referens colore rubiginoso.

Testiculo vulpino similis minor, Ad.

Testiculus vulp. 2. sphegodes, Lob. ico.

Satyrium minus, Svvert.

Hæc non longè Monspelio in pratis à Latet, cæruleis, punctatis, albis, pallidis, purpureis, variegatis floribus, reperitur.

X. Orchis muscam referens major.

Orchis myodes altera, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius quartus, Tab.

XI. Orchis muscæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbis.

Satyrium exiguum & 7. Trag. Satyrium, Tur.

Testiculus pumilio, Cord. hist.

Orchis quintum genus, Dod. gal.

Orchis angustifolia fœmina tertia, Fuch. ico.

Orchis fœmina minor, Lon.

Orchis serapias tertius, Dod.

Orchis myodes prima, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius primus, Tab.

Serapias batrachites, Ger. ico.

Triorchis serapias tertius, Lugd.

XII. Orchis muscam referens lutea.

Testiculus vulpinus luteus, Ad.

Orchis myodes lutea Narbonensis, Lob. Lugd.

Testiculus muscarius tertius luteus, Tab.

Orchis myodes minor, Ger. ico.

Orcheos genus humile, Lugd.

XIII. Orchis angustifolia.

Testiculus 16. minor, Tab.

Orchis andrachnites, Ger. ico.

XIV. Orchis papilionem expansum herbacei coloris referens.

Cynosorchis quintus, Dod.

Orchis Ornithophora, vel ornithes folio lævi, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus vulpinus, Tab.

Orchis Ornithophora folio maculoso, Ger. ico.

Orchis, du Bry.

XV. Orchis papilionem referens, folijs maculatis.

Orchis ornithophora folio maculoso, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus 15. Ornithophorus, Tab.

Testiculus sphegodes, Ger. ico.

Variat foliorum forma, est prægrandibus, parvis, ovalis figuræ ex acuto in larum, vel in rotundum desinentibus: florum colore purpureo, subpurpurascente, albo.

XVI. Orchis papilionem referens angustifolia alba.

Ornithophora candida, Löb. ico.

Orchis ornithophora alba, Lugdun.

XVII. Orchis araneum referens.

Orchis andrachnitis, Lob. ico.

XVIII. Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga: sub Orchide s. in Prod. desc.

Testiculi tertij species prima, Matth. fig. major.

Testiculi 3. species Matthioli, Lugd. fig. 2.

Testiculus 13. Taber.

XIX. Orchis montan. Ital. lingua oblonga altera.

Orchis macrophylla, Colum.

### MONORCHIS ET TRIORCHIS.

I. Orchis odorata moschata, sive Monorchis.

Orchis pusilla pallida odorata, vel 6. Clus. pan. at 7. in hist.

an Testiculi species minor bulbo singulari, Gef. hort.

Variat folio brevior, latior, longior, & angustior.

II. Orchis lutea hirsuto folio.

Orchis Frisia littoralis, Lob. Lugd. qui & quintam junxit.

Orchis Frisia, Ger.

Testiculus luteus, Tab.

III. Triorchis lutea folio glabro.

Triorchis lutea, Gem. Lob. Lugd. Triorchis lutea 2 Tab.

Testiculus odorat. Ger. quem cum seq. junxit.

Modò terni, modò quaterni pusilli, penduli testiculi subsunt.

IV. Triorchis lutea altera.

Orchis minor Leodiensis, Lob.

Triorchis lutea, Gem. Lugd. prima, Tab.

V. Triorchis lutea radice oblonga.

Triorchis lutea tertia Gemmæ, Lobcl. (qui in icon. etiam 2. junxit, ut & Lugd.) Tab.

Orchis Leodiensis, Ger.

VI. Triorchis, vel Tetrorchis alba odorata major.

Tetrorchis, vel Triorchis alb. spiralis, vel autumnalis, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus odoratus major, Dod.

Triorchis, Ger. Triorchis odorata, Tab.

Aliquando ternos, aliquando quaternos testiculos oblongos fibrosos obtinet.

VII. Triorchis alba odorata minor.

Satyrium 3. vel odoriferum, Brunf.

Testiculus candid. odorat. minor, Cord. hist.

Testiculus odoratus, sive Orchis spiralis minor, Lob.

Testiculus odoratus, Ad. Lugd.

Testiculus odoratus minor, Dod. Tab.

Orchis flore albo odorato, Cam.

VIII. Pseudoorchis.

Orchis minor radice repente, Cam.

Palma Christi radice repente, Ger.

Orchis repens, Eyft.

IX. Chamæorchis lilifolia.

Orchis lilifolia minor fabulorum Zelandiæ & Bataviæ: five

Chamæorchis aggerum Zelandiæ & Bulbo eriophoro similis bulbus, Lob. ad. part. 2.

an Pseudoorchis *μονόφυλλος*, Clus. hist.

## ORCHIS PALMATA ET Satyrion.

**Q**uas Orchides palmatas vocamus, eas recentiores Satyria basilica nominant. Brunfelsius verò & Tragus, Orchidum sæminas faciunt, eò quòd. præter duas radices instar duarum palmarum junctas (hinc vulgo Palma Christi) notam impudicam, vulvæ muliebri similem, habeant. Digtos citrinos Avicenna, Matthiolus censet.

Diosco-

*Dioscorides lib.3. cap.143. 144. αἰσίπρον duplex proposuit: alterum, quod alij αἰσίδρον vocant, quod ut plurimum terna folia, rumici aut lilio similia, sed minora atque rubescentia habeat, caule nudo cubitali: flore lilij candido: radice bulbosa mali magnitudine, rufa, intus alba, ovi instar, sapore dulci, orig. grato.*

*Alterum ἐρωδρόν sive ἐρωδραῖον cognominatum, quod semine est lini majore, firmo, splendente ac lævi: radicis cortice aliquantum gracili ac rufa, internè alba, dulci & gratâ: quæ non secus ac prior venerem potenter stimulat. Plinius, Satyrium cum Orchyde confundit, ut lib.26. cap.10. videre est, & Satyrj aliud genus erythraicon appellari scribit.*

*Matthiolus videtur ad descriptionem Dioscoridis, duplex Satyrium proposuisse: de utroque autem dubitatur.*

### Satyrium.

#### I. Satyrium primum, Matth. Lugd.

Satyrium trifolium, Cast.

Hocalij Phallum Hollandicum, alij Faufel, cui tria folia afficta sint, censent.

#### II. Satyrium erythronium, Matth. Lugd. Cast.

De utroque dubij sumus, & Camerarius in suo emaculato Matthiolo omisit.

#### III. Satyrium è Guinea, Rob. Svvert. nec dum vidimus.

### Orchis palmata.

#### I. Orchis palmata pratensis latifolia longis calcaribus.

Palma Christi major, Matth. desc. Franco.

Palma Christi altera, Cord. hist.

Palma Christi & Serapias mas lævi folio, Lob.

Palma Christi mas, Ad. Ger. prima, Tab.

Satyrium basilicum, Corn.

Satyrium basilicum mas, Gef. col. Dod. Lon. descript.

Satyrium basilicum majus recentiorum, Lugd. descript.

Satyrium recentiorum Græcorum, & basilicum mas latifolium alterum, Thal.

Palma Christi erecta variegata, Eyst.

Satyrium sive Palma Christi, Svvert.

Flores saturato rosei, maculis purpurascensibus insigniti.

#### II. Orchis palmata pratensis angustifolia major: quæ 6. in Prodr.

Palma Christi 3. Eyst.

#### III. Orchis palmata pratensis maculata. Orchis fœmina altera, Trag.

Satyrium basilicum Græcor. & officin. Christi-palma, Ruel.

Satyrj genus, basilicum Græcum, Gef. car:

Satyrium basilicum fœmina, Gef. col. Lon. Dod.

Palma Christi, Ama. Cord. hist. Cæs.

Palma Christi fœmina, Ad. Ger.

Palma Christi maculata, Tab. Franco, Eyst.

Palma Christi, serapias fœmina pratensis, Lob.

Satyrium fœmina folijs maculatis, Thal.

Serapias fœmina pratensis, Lugd.

Orchis serapias, Cam.

Satyrium fœmina, Svvert. du Bry.

Variat: flore, qui in purpura vel rubet, vel dilutè ad cæruleum inclinatur, vel albus est: vel variegatus, albis maculis ac venulis rubescentibus distinctus: interdum maculis caret: huc Palma Christi erecta flore candido & fl. variegato, &

Palma Christi candidis floribus, Eyst.

#### IV. Orchis palmata pratensis maxima.

Cynosorchis macrocaulos, sive conopsæa, sive galericulata, Gem. Lob.

Cynosorchis conopsæa, Lugd.

#### V. Orchis palmata minor calcaribus oblongis.

Serapias minor, Lob. minor rubra Gemmæ, Lugd.

Serapias minor nitente flore, Ger.

Palma Christi minor mas, Tab.

#### VI. Orchis palmata angustifolia minor.

Satyrium fœmina, Brunf.

Satyrium alterum, Trag. desc.

Orchis fœmina, Trag. ico.

Palma Christi major, Matth. ico. tertia, Cord. hist.

Satyrium basilicum majus, Lugd. ico.

Satyrium basilicum mas, Fuch. Dod. gal. Lon. ico.

Satyrium basilicum mas, tenuifol. Thal.

Satyrium regale, Tür.

Palma Christi fœmina, Tab.

Palma Christi peregrina flore rubro, Eyft.

VII. Orchis palmata angustifolia minor odoratissima: in Phytopinace, & sub 7. in Prod. descripta.

VIII. Orchis palmata caryophyllata. Orchis serapias caryophyllata, Lob. ico.

IX. Orchis palmata sambuci odore. Orchis serapias 7. Clus. pan. Pannonica 8. hist. Duplex est: 1. floribus exalbidis, foliolis sub floribus pallidis. 2. floribus purpureis, foliolis purpurascens.

X Orchis palmata batrachites. Serapias batrachites, vel Myodes, Lob. ico.

XI. Orchis castrata. Satyrium castratum vel eunuchum, Lob. Satyrium castratum, Gemmæ, Lugd. Testiculus sextus castratus, Tab. Serapias castratum, Ger.

XII. Orchis palmata palustris latifolia. Serapias palustris latifolia, Lob. Ger. Satyrium basilicum foliosum, vel 3. Dod. Satyrium basilicum mas latifolium 1. Thal. Cynoforchis palustris platyphylla, Gemmæ, Lugd.

Palma Christi palustris, Franco 3. Tab. Satyrion latifolium, Svvert. du Bry. Palma Christi flore purpureo, Eyft.

XIII. Orchis palmata palustris altera. Serapias palustris altera leptophylla, Lobel. Lugd.

Cynoforchis palustris altera, Gem. & Ger. Testiculus galericulatus, Tab.

XIV. Orchis palmata palustris tertia. Cynoforchis palustris lævi folio, Lob. Cynoforchis leptophylla, Gem. Lugd. Palma Christi palustris 2. Tab. Serapias palustris latifolia, Ger.

XV. Orchis palmata palustris maculata. Cynoforchis palustris altera lophodes, vel nephelodes, Gem. Lob. Lugd. Palma Christi palustris 1. Tab. Ger.

XVI. Orchis palmata palustris tota rubra. Cynoforchis Dracontias, Gem. Lob. Lugd. Tragorchis, Tab. ico.

Serapias palustris leptophylla, Ger. ico.

XVII. Orchis palmata flore viridi: quæ 8. in Prod.

XVIII. Orchis palmata montana maxima: quæ 9. in Prod.

XIX. Orchis palmata montana altera. Serapias montana folio lævi, & Cynoforchis montana, Lob.

Serapias maxima folio lævi, Gem. Lugd. Serapias mont. Tab. Serap. caryophyll. Ger. ico.

XX. Orchis palmata montana maculata. Cynoforchis mont. folio maculoso, Gem. Serapias candido flore (montana) Lob. Lugd. Ger.

Palma Christi major, Cast. Palma Christi maculata montana, Tab. Satyrion folijs macularis, Svvert.

XXI. Orchis palmata angustifolia alpina nigro flore.

Satyrium basilicum alpinum, Gef. hor.

Satyrium basilicum odoratiss. Gef. cat.

Satyrium basilicum minus, Dod.

Palma Christi minor, Matth. Lugd. Franco. Cast. descript.

Orchis minor odoratus, Ad.

Palma Christi minor fœmina, Tab.

Orchis serapias odoratiss. flore minima alpina, Cam.

## ORCHIS ABORTIVA.

I. Orchis abortiva fusca.

Coagulum terræ Plinij quibusdam.

Satyrium nonum, Trag.

Orobanche, Gef. col.

Orchis sylvestris, Lon.

Neottia, Dod. Franco.

Nidus avis, Dod. gal. Lob. ico. Lugd. Eyft.

Satyrium abortivum (spec. Hypocistidis) Lob. ico. part. alt. & Ger.

Orchis abortiva Lobelij, Clus. hist. an Orobanche prima, Tab.

II. Orchis abortiva violacea.

Limodorum Austriacum, Clus. pan.

Pseudolimodorum, Eidem hist.

## OPHRIS.

**A**D Orchides propter florum formam referenda videtur Ophris à Plinio lib. 6. cap. 15. nominata, quam vocem aliqui Supercilium reddunt.

I. Ophris



I. *Ophris bifolia*.

*Perfoliata sylvestris* mas, Brunf.

*Satyrium* 10. & *bifolium*, Trag.

*Alisma*, Cord. Gef. hort.

*Ophris*, Matth. Fuch. Ang. Gef. cat. Cast. Tab.

Cam. Cæs. Thal. Franc.

*Bifolium*, Dod. gal. Ad. Lob. Lon. Cam.

*Pseudorchis* seu *bifolium*, Dod.

*Ophris bifolia*, Ger.

Est major & minor, tam in hac, quam in trifolia.

II *Ophris trifolia*.

*Perfoliata sylvestris femina*, Brunf.

*Ophris trifolia*, Tab. Ger.

III. *Ophris bifolia bulbosa*.

*Pseudorchis*, seu *Bifol. bulbosa*, Dod. ed. Belg. & post.

IV. *Ophris minima*: in Prod. descripta. an *Ophris pumilum* & *tenellum* genus, Clus. cur. post.

## DENS CANIS.

I. *Dens canis* latiore rotundioreque folio.

*Mithridatum* Cratevæ Plinij, Aug. Cæs.

*Pseudohermodylus*, Matth. Lugd. Tab.

*Hermodylus* Meisæi, folio maculoso, &

*Dens canis*, Gefn. hort.

*Satyrium erythronium*, Gef. col. Ad. Lob. ico. Taber.

*Dens caninus*, Dod. (*Ephemero* Diosc. conveniens) Cæs. Cam. Ger.

*Dentali* 1. Clus. pan.

*Dens caninus purpurascens* flore, Clus. hist.

*Satyrium* & *Dens caninus*, Lob.

*Satyrium rubrum* Dalech. Lugd.

*Dens canis* flore rubro, Eyst.

Flos ex purpura rubet, aut candore micat, aut purpura ex candore confusus pallet: qui florere rubro est, maculis rubris: qui albo, lacteis maculis variegatur: sic folia aliquando maculata, aliquando ijs carent: & communiter bina habet: tantum bina, Cæs. alp. plurimum terna, Advers. rarò terna, Clus. quina etiam, Lugd.

II. *Dens canis* angustiore longiore folio.

*Erythronium* flore albo angustioribus folijs, Lob. ico.

*Dentali* 2. Clus. pan.

*Dens caninus* albo flore, Clus. hist. Cam. Eyst.

*Satyrium trifolium* & *Satyrium* Dalech. Lugd.

Flos lacteus, aut ex purpurascens alboque mixtus.

## OROBANCHE.

*Ὠροβάγχη*, *Ervangina Gaze*, quod ἑρὸς ἐν ἄρχη, *erum strangulet*, dicitur. Duplex est, aliud *Theophrasti* s. hist. s. aliud *Dioscoridis* l. 2. c. 172. & *Orobanche* Plin. l. 18. c. 17. & l. 22. c. ult. nominatur.

I. *Orobanche* major *geryophyllum* olens. *Limodorum* (quasi famem adferens) *Theophrasto*.

*Orobanche*, *Dioscorid.* *Galen.* *Oribas.* *Æginet.* *Aëtio*.

*Cynomorion*, à canini genitalis similitudine, *Plinio*.

*Leonina herba*, *Hermolao*, & *Legumen leoninum*, *Ruel*.

*Leo herba*, *Constantino*.

*Orobanche*, *Matth.* *Ania.* (*herba tauri*, vel *vacæ*) *Ang.* *Cord.* in *Diosc.* l. ac. *Gef. cat.* (*Leontoboranos*) *Lon.* *Lob.* *Cæst.* *Thal.* *Cæs.* *Eyst.*

*Orobanche vera*, *Gef. hort.*

*Limodorum*, sive *Orobanche*, *Dod.*

*Orobanche* 1. Clus. hist. altera, Lugd. Tab.

*Rapum genistæ*, *Dod. gal.* *Ger.*

Variat: quæ *genistæ* vulgari adnascitur, flore est subviridi: quæ *Hispanicæ*, floribus majoribus luteis.

Hæc semper alicujus vicinæ plantæ fibris adnascitur: observavi ad *Genistam*, *florem tinctorum*, *Hieracium Sabaudum*, *Trifolium*, *Astragalum sylvaticum*.

II. *Orobanche* flore majore, ex cæruleo purpurascens: quæ 1. in Prod.

III. *Orobanche* *Monspeliaca* floribus oblongis.

*Orobanche* major, *Lob. ico.*

*Limodorum* *Monspeliacum*, Clus. pan.

IV. Oro-



IV. Orobanche majore flore.

Orobanche quarra, Lob. ico.

Orobanche, Eyfster.

V. Orobanche quæ Hypopytis dici potest : quæ 3, in Prod.

VI. Orobanche ramosa.

Orobanches, Lob. ico.

Orobanche altera brevior & ramosa, Cæf.

Orobanche, Cam. ad Matth.

Orobanche 3, πολύκλων, Cluf. hift.

Variat : floribus aliquando cæruleis, aliquando purpurafcentibus, aliquando subalbidis, & libenter inter Cannabem nascitur.

VII. Orobanche radice dentata major.

Dentaria major, Matth. Lob. Lugd. Cam. Franco, Ger. Eyfster.

Anblatum (id est aphyllon, quod folijs careat)

Cord. hift. Dodon. (& radix squamata) Thal.

Squamatia, Lon.

Dentaria major, five ἀφύλλον 1. Cluf. pan. & hift.

Dentaria absque folijs, Cast.

Dentaria crocodilia, Tab.

Arachidum è genere Orobanches, Cæf.

Ægolethros Plinij, malus Hentricus vinitoribus, Gef. in hift. bovis & col.

VIII. Orobanche radice dentata minor.

Dentaria ἀφύλλον altera, seu min. Cluf. pan. & hift. an Anblati species minor, Thal.

Clufius, suæ flores ex albo purpurafcentes tribuit : Thalius, candidam totam scribit.

IX. Orobanche radice coralloide.

Dentaria ἀφύλλον 3. Cluf. pan.

Dentaria coralloide radice, Cluf. hift. Eyfster.

Dentaria minor, Ger. aphyllus minor, Tab.



# CASPARI BAUHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER TERTIVS. OLERA ET OLERACEA.

## SECTIO PRIMA.

RAPA: RADICES INDIS EDVLES: RAPVNCV-  
lus: Campanula: Rapiſtrum: Napus: Raphanus: Lepidium: Ibe-  
ris: Dracunculus eſculentus: Eruca: Sinapi: Rheſeda: Luteo-  
la: Eryſimum: Hydropiper, ſive Perſicaria: Capſi-  
cum, ſive Piper Indicum.

## RAPA ET EJUS SPECIES.

**R**apa, quaſi ruapa, quòd è terra eruatur, Tarroni l.4. ling. Lat. at verifimilius à Græco  
ῥαπῆς, Athenæo l.9. c.2. ραπῆς, Dioſcoridi l.2. c.134. à rotunda orbicularive radicis  
figura. Genera: Theoph. l.7. hiſt.4 ait alios diverſitatem generis putare, alios negare, ſed mare  
tantum ſæminag, differe, & ambas ex eodem ſemine naſci, ſed ut effaſminentur raras de-  
ponendas: nam ſi denſæ poſitæ ſint, omnes maſculeſcere: at 7. hiſt.6. Rapa ſylveſtris mcminit.  
Sic Dioſcorides, ſativum & ſylveſtre agnoſcit. Plin. l.18. c.13. Græcos ſcentus, duo prima fecit  
genera, maſculum, ſæmincumq, & modum eas ſerendi ex eodem ſemine. Species verò omni-  
um tres (addit) aut in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari; tertiam ſpeciem  
ſylveſtrem appellavere, in longitudinem radice procurrente: & l.19. c.5. Medici, maſculini  
ſexus faciunt in his rotunda: latiora verò concava ſæminini.

Dividimus in ſativam & ſylveſtrem: illam in longam & rotundam, ſive ſæminam  
& marem: rotundam, in ſeſilem & orbiculatam. Raparum ſolum in India tam ſerax  
eſt, ut ea in vijs quoq, publicis ſponte proveniant: ita ut cum Indi in nonnullis locis agros  
frugibus conſituri eſſent, propter ingentem Raparum propaginem, ab inſtituto ipſis deſiſten-  
dum fuerit: Joſeph. Acoſta l.4. c.18.

### I. Rapafativa rotunda.

Rapa mas, Theoph. Plinij: Rapum, Dioſcorid.  
Rapa ſativa, Brunf. Cord.  
Rapum ſativum, Fuch. Ruel. vulgare, Trag. Dod.  
Rapum vel Rapa, Ang. Tur. Lac. Gef. hor. Caſt.  
Rapum rotundum, Matth. Lon. Ama.  
Rapum ſeſili rotunditate, Cæſ.

Rapum majus orbiculat. ſeu turbinat. ad. Lob.  
Rapum ſativum orbiculatum, Lugd.  
Rapum orbiculatum, Franco, Taber.  
Rapum rotundum, utrumque majus & minus,  
Taber.  
Rapum majus & minus rotundum, Ger. at ro-  
tundum Rapum utrumq; ſub Buniade.

Variat colore externo radicis, viridi, candido, puniceo, obsoletè nigricante: habentur aliquando in Alsatia, quæ foris & intus flavescent: magnitudine & parvitate, Plinius & Tragus 40. Amatus verò 50. & 60. libras excedentes viderunt: communiter forma tuberosa, rarò globi instar orbiculata, frequentius in latitudinem effusa.

II. Rapa sativa oblonga, seu fœmina.  
Rapa fœmina, Theoph. & Plinio.  
Rapum oblongum, Trag. oblongius, Dod.

Rapum longum, Matth. Lon. Cast. Lugd. Franc. Tab. qui majus & minus facit: utrumque sub Raphano sativo Gerardus habet.

Rapum tereti, rotunda, oblonga quæ radice, Ad. Lobel.

Rapa oblonga, Ama. Cæs.

Aliquando cubitalis, rariùs sesquicubitalis est: sic 30. librarum Matthiolum notavit.

III. Rapa sylvestris: & Cæs.

Rapum sylvestre, Matth. Lugd. Rab. Ger.

Rapum sylvestre non bulbosum, Ad. Lob.

## RADICES VARIÆ, QVIBVS INDI vescuntur & utuntur.

**Q**uemadmodum varijs fructibus ob insignem arborum fructiferarum varietatem vescimur: sic in India Occidentali, varijs radicibus in cibis utuntur. Quare Josephus Acoftalib. 4. c. 18. vel par. 9. Ind. Occid. recenset, Papas (de qua inter Solana agemus, Solani tuberosi esculenti nomine) quæ ipsis præcipua est, Manihot, Ocas, Yanocas, Camotes, Batates, Xiquimas, Yuca, Cochuchio, Cavi, Totoras, Mani: addens & alias infinitas esse, & inter ceteras Batates, quæ instar cibi delicati & suavisimi comeduntur. Sic etiam radices ex Hispania ad Indos delatas magis propagari, quàm Indicas, si in Europam deferantur. Et Ulricus Faber, ut in par. 7. Amer. cap. 9. habetur, apud Carios India populos, Triticum Turcicum, vel Meijs & Mandeochade, Padades, Mandeoch parpij, Mande poere, Manduris, VVache Ku, &c. invenisse refert.

I. Rapum Americanum folijs Bryoniæ.  
an Oetum Plinij l. 21. cap. 15. mandunt (scilicet Ægyptij) & Oetum, cui pauca folia minimaq; verum radix magna.

οἰζον (alij σίγγον legunt) sive Vingum ut Gaza reddit, Theophr. l. 1. c. 11. quod Ægyptij Vingum appellant, folia habet ampla & germen pusillum, sed radix longa & in modum fructus, & cibo idonea.

Hetich Indis & Æthiopibus, Dalech. in Plinium.

Hetich Americum Theveti, Lugd. Lerio desc. Bras. c. 12.

Radix rapis magnis similis, longitudine sesquipedali, crassitudine amborum pugnorum: cujus tres species Lerijs censet: nam inter coquendum alia violaceum, ceu pastinacæ: alia aureum, ut cotonea mala: alia denique album colorem acquirit.

II. Rapum Brasilianum, sive Americanum alterum.

Igname in Insula S. Thomæ, Scalig. Lugd.

Ignames, Adverf.

Iniamos in Guinea cibus Negritarum vulgarissimus, quo & panis loco utuntur: par. 6. Ind. Or. c. 38. & 57. & Linscot. par. 4. Or. c. 11.

Ingnamos, par. 6. Ind. Or. c. 12. & 23.

Inhame Lusitanorum, sive Igname, Clus. hist. & notis in Garzi.

Tres species propter medullæ colorem: at lutea, Carotæ colore in pretio est: magnitudine etiam variat: ac Clusius duplex genus agnoscit.

Alterum à priore differens cortice inequali & tuberculis obsita, cum viticulis spinosis, quam Ycam Peru nominant.

III. Mandioca: radix in Insula S. Catharinæ: hist. Brasil. sive par. 3. Amer. c. 4. 9. 11 15. 17.

IV. Manihot Indorum, sive Yuca folijs cannabinis.

Arachidna, Theoph. & Aracidna Plin. quibusd. Manihot, Theucto, Lugd. Lerio desc. Bras. c. 8.

Yuca, Gomaræ. hist. gen. Lugd. Joseph. Acoftæ l. 4. c. 17.

Yuca

Yuca Peruana, Frag.

Jucca, Benzonii, l. i. c. 28. vel par. 4. Ind. occid.

Mandechade radix apud Carios: par. 7. Am. 7.

Mandioca: par. 3. Amer. l. i. c. 4. 9. 17.

Cocushavv, Hariot in Virginea.

Hujus folium latum in septem lacineas divisum esse scribunt: at radix brachij crassitie, ex qua Indi farinam conficiunt, (par. 2. & 3. Amer.) qua cum carne & piscibus, ut nos panem utuntur: ex ea & placentas & panem conficiunt, quem Cazabis, Benzo: at Monardes & Acofta, Cacavi nominant: sic in Hispaniola ex hac secundarium panem, quem Cazabi vocant, conficiunt, (par. 5. Ind. occid. 12.) ex hujus succo potionem parant: par. 3. Amer. lib. 2. cap. 15.

Huc refert oportet

Maniel folijs pœoniæ; par. 3. Am. ep. 2. de Bras.

V. Hatle radix in Florida, ex cujus farina in annonæ penuria panis fit: par. 2. Amer.

VI. Aypi Brasilianorum, radix sesquipedalis, femoris crassitudine, ex qua farinam duplicem conficiunt: aliam percoctam & duram, quo diutius conservetur: aliam minus coctam & molliorem, panis candidi medullæ saporem referens: illam Ovy-entan, hanc Ovy-pou appellant folijs pœoniæ similitudine: Lerio descript. Brasil. sive par. 3. Amer. c. 8.

VII. Yuca folijs Aloës.

Yuca, Gerardo.

Yuca nova gloriosè elata & opinata, Lob. ad altera parte.

VIII. Batatas, Camotes Hispanorum, Clus. hisp. & hist. Lugd. Cast.

Battades, Ad.

Barata Hispanorum, Camotes sive Amotes & Ignames, Lob.

Batatas Indiæ occid. Benzonii, Monard.

Potates & Potate, quas Camotes nominant: par. 8. Ind. occid.

Camotes, Joseph. Acoftæ, lib. 4. cap. 18. Frag.

Batates radix: par. 9. Ind. occid. 14. c. 18. cibus

Nigritarum vulgaris: par. 6. Ind. orient. 38.

Batatas fructus in Angra; Linscot. par. 3. Ind. orient. 6. & par. 4. cap. 12. & par. 8. & par. 9. addit. Ind. occid.

Pina sive Batata radix: par. 8. Ind. occid.

Sisarum Peruvianum, Tab. Ger.

Radix Raphani prægrandis amplitudine: genera tria, corticis colore vel purpurascente, vel pallente, vel candido, quæ affata fructuum, vel leguminum loco Indis est.

IX. Hajas Indiæ occident. similis Batate, nisi quod minor & suavior sit: Benzon. sive par. 4. Amer. cap. 28.

Aies, Clusio.

X. Cochucho, radix parva, dulcis, quam aliqui, quo magis in delitijs sit, condiunt: Joseph. Acoft. lib. 4. cap. 18.

XI. Xiquimas, radix qua æstate utuntur ad refrigerandum sitimque sedandam: Idem, l. c.

XII. Mandech parpie, radix Castanea- rum sapore: par. 7. Ind. occid. 7.

XIII. Mandech Mandapore, radix ex qua vinum conficiunt, l. c.

XIV. Bacheku radix: par. 7. Ind. occid. c. 18.

XV. Mandues, Carios populi edunt par. 7. Ind. occid.

XVI. Mandepore: apud Siberaos radix supra terram emimens amplissimis folijs, quæ aquam continet, non secus ac si in vase asservaretur, & ex radice sæpe dimidijs cantharus exprimitur, qui colorem lactis habet, par. 7. Ind. occid. cap. 26. etiam ex hac radice vinum conficiunt: Idem cap. 7.

XVII. Cardes radix, qua Indi ad levandam sitim utuntur: par. 7. Ind. occid. c. 3 & 21.

XVIII. Cassavi radix: par. 8. Ind. occid.

XIX. Tagari, radix in Naupon pro lavando corpore: par. 4. Ind. orient. cap. 8.

## RADICES VARIÆ IN INSVLA

Virginea.

**R**adices quarum in Insula Virginea pro cibis usus est, Thomas Hariot recenset, & sunt Opinavvk, Okcepenauk, Koishucpenauk, Tsinavv, Cocushavv, Habafcon.

I. Opinavvk; idem cum Papas Acoftæ, quod Solanum tuberosum esculentum nominamus.

II. Okcepenauk, radix rotunda, capitis humani magnitudine, quam cum carnibus & pi-

scibus in panis penuria comedunt: Hariot.

III. Kaishucpenauk; radix alba, ovi gallinæ magnitudine & forma, qua elixa vescuntur, Hariot.

IV. *Tſnavv*; radix, *Chinæ* ſimilis, ex cuius ſucco cum aqua, panis pinſitur, & pulſ, gelatinæ ſimilis, conficitur, *Hariot*.

V. *Cocuſchavv*, *Hariot*; eſt *Manihot*

*Indorum*, de quo antè.

VI. *Habaſcon*; radix magnitudine & figura paſtinacæ, quæ cum alijs coquitur: *Hariot*.

## RAPUNCULUS ET CAMPANULA GLABRA.

**R**apunculus vulgò dictus, γεργύλη ἀργία, rapum ſylveſt. *Dioſcoridis*, lib. 2. cap. 135. male cenſetur: & à *Plinio* lib. 20. cap. 3. *Rapi* ſylveſtris nomine proponitur. Alijs *Faſione* ejusdem, l. 22. c. 22. creditur, cuius tamen verba, ut quidam cenſent, rectius ad *Smilacem* levem referuntur. *Erinus Nicandri* & *Dioſcorid.* l. 4. *Erineon* *Plinij*, l. 23. c. 7. ex *Columna ſententia*. In hanc Claſſem & *Campanule*, à floris forma nominata, referenda ſunt.

### I. Rapunculus eſculentus.

*Raponeoli*, *Brunf.*

*Rapunculum* vulgare, *Trag.*

*Rapunculus*, *Matthiol.* *Lac.* *Dod.* *Camer.* *Tab.* *Caſt.* *Cæſ.* *Portæ.*

*Rapum* ſylveſtre, *Gef. hort.* *Fuch.* *Dod.* *gal.*

*Rapuntium* parvum, *Ad.* *Lob.* (& *pes locuſtæ* *Avicennæ*) *Ger.*

*Rapunculus* minor, *Matth.* & *Dodonæi*, *Lugd.* *Erinus Nicandri* & *Dioſc.* *Colum.*

Flore eſt cæruleo, purpureo, aliàs candicante.

### II. Rapunculus minor folijs inciſis.

*Erinus*, *Cæſalp.*

*Erini* ſeu *Rapunculi* minimum genus, *Colum.*

### III. Rapunculus ſpicatus.

*Rapunculum* ſylveſtre, *Trag.* *Lon.*

*Rapi* ſyl. genus, in ſyl. & mont. *Gef. hor.*

*Rapum* ſylveſtre majus, *Dod.* *gal.*

*Rapunculum* alopecuron & *Rapi* ſylveſtris 6. genus, *Dod.*

*Rapuntium* majus alopecuron comoſo flore, *Ad.* *Lob.*

*Rapunculus* alopecuroides longa ſpica, *Cluſ.* *hiſt.*

*Rapunculus* ſyl. ſpicatus, *Thal.*

*Rapunculus* major *Dodonæi*, *Lugd.*

*Phyteuma* folijs *Rapunculi*, *Cæſalp.*

*Rapunculus* flore ſpicato purpureo & albo, *Camer.*

*Rapunculus* nemoroſus primus, *Tab.*

*Rapuntium* majus, *Ger.*

*Spica* vel longior, vel brevior alba, vel cinericea; hæcque variat folijs modo maculis nigris ad umbilicum notatis, & marem; modo non maculatis, & ſœminam dicunt; eſt & coloris violacei elegantis & ſaturi.

### IV. Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari.

*Rapunculus* Alopecuroides orbiculari penè ſpica, *Cluſ.* *hiſt.*

*Rapuntium* corniculatum montanum, *Colum.* *Spicâ* eſt orbiculari; folijs etiam variat.

V. *Rapunculus* ſcabioſæ capitulo cæruleo. *Scabioſæ* 3. genus ſive ovium, *Dodon.* *gal.* *Gef. hort.*

*Scabioſa* minor, *Dodon.* *ico.* 3. deſcript. minor 5. *Tab.*

*Scabioſa* media ſervato anguſtifolio flore globulariæ, *Ad.*

*Scabioſa* media, *Lob.* *Lugd.*

*Scabioſa* ovilla, *Cam.*

*Aphyllantes* 1. *Theoph.* *Lugd.*

*Rapuntium* alterum leptophyllon capitatum, *Colum.*

*Scabioſa* ſyl. minor cærulea, *Eyſt.*

*Caulis* habet 5. 7. etiam 30. flores cæruleos, rariùs albos: folia aliquando crenata, aliquando ſolùm hirsuta.

Huc pertinet

*Rapunculus* ſyl. ſpicatus cæruleus, *Thal.*

VI. *Rapunculus* umbellatus *Sonchi* folio.

*Rapunculus* *Sonchi* folio, *Cluſ.* *hiſt.*

VII. *Rapunculus* umbellatus latifolius.

*Rapunculus* ſyl. cæruleus umbellatus minor, *Thal.*

*Rapunculus* ſyl. umbellatus 2. *Cam.*

VIII. *Rapunculus* umbellatus anguſtifol. *Rapunculus* ſyl. cæruleus umbellatus major, *Thal.*

*Rapunculus* ſyl. umbellatus 1. *Cam.*

IX. *Rapunculus* umbellat. folio gramineo.

*Rapunculus* ſyl. umbellatus 3. *Camer.* *ico.* *ad.* *Thal.*

Rapun-

*Rapuntium alterum angustifolium alpinum*, Colum.

X. *Rapunculus persicifolius magno flore*.

*Phyteuma*, Matth. Lugd. Cam. Cæs.

*Campanula cærulea fativa*, Dodon. gal. five *hortensf.* Lugd.

*Campanula media*, Dod.

*Campanula hortensis persicæfolia lacticiniosa flore volubilis*, Ad.

*Campanula Persicæfolia*, Lob. Clus. hist. Ger.

*Rapunculus campanulatus Nerijfolius* 1. Thal.

*Campanula angustifolia*, Tab.

Flore est cæruleo, aliquando albo, & sub  
*Campanula alba* & cærulea persicifolia, Eyf. pingit.

XI. *Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major*.

*Rapunculus nemorosus* 2. Tab. nemorosus, Ger.

*Rapunculus campanulatus Nerijfolius* 3. Thal.

*Rapunculus syl. major*, Eyf.

XII. *Rapunculus nemorosus magno flore minor*.

*Rapuntium five Erinus magno flore*, Colum.

XIII. *Rapunculus nemorosus angustifol. parvo flore*.

*Rapunculus nemorosus* 3. Tab.

*Campanula lutea linifolia*, Ger. ico.

XIV. *Rapunculus hort. latiore folio seu Pyramidalis*.

*Campanula major*, Dodon. major lactescens, Lob. Lugd.

*Campanula lactescens foetidior*, Clus. hist.

*Pyramidalis*, Cast. Lugd. Luteriana, Eyf.

*Campana Pyramidalis*, Cam.

*Campanula lactaria*, Tab.

*Campanula lactescens pyramidalis*, Ger.

Folio est oblongo, quandoque subrotundo.

XV. *Rapunculus Creticus*, seu *Pyramidalis altera*.

*Petromarula seu lactuca petræa Cretica Belli*, Ponæ: & apud Clus. in epist. 1. Belli. *Petramarula*, *Rapunculus Creticus*, Imperato.

XVI. *Rapunculus alpinus, seu pyramidalis minor*: qui 1. in Prod.

an *Campanula*, folijs serratis cærulea, Eyf.

XVII. *Rapunculus alpinus corniculatus*, quem sub *Rapunculo alpino spicato simili* in *Phytopinace* & *Matthiolo*, & 2. in Prod. descripsimus.

*Trachelium petræum minus*, Ponæ.

*Rapuntio corniculato affinis*, Colum.

XVIII. *Campanula alpina latifolia flore pullo*.

*Rapunculi alpini latifolij nomine*, Doct. Burgerus ex Austria misit; sub 3. in Prod.

XIX. *Campanula alpina linifolia cærulea*: in *Phytopin.* sub. 3. in Prod. sub. 4. descripsimus, quæ cum sequenti minimè confundenda.

XX. *Campanula minor rotundifolia vulgaris*.

*Rapi syl. genus minus*, quod *Campan. cærulea*, agrestis, Gef. hor.

*Campanula sylvestris minima*, Dod.

*Campanula minor*, Ad. (Clus. hist. solonominè) five *minor rotundifolia*, Lob. Lugd.

*Campanula minor alpina rotundioribus imis folijs*, Clus. hist. ico.

*Rapunculus campanulatus linifolius seu* 7. Thal.

*Rapunculus sylvestris minor*, Tab.

*Campanula rotundifolia*, Ger.

*Campanula minor sylvestris flore cæruleo*, Eyf. tetr.

Floribus communiter cæruleis, subinde candidis.

XXI. *Campanula minor rotundifolia flore in summis cauliculis*.

*Rapunculus sylvestris flore ex purpureo candicante*, Tab.

*Rapunculus sylvestris flore albo*, Eidem.

*Rapunculus sylvestris minor*, Eyf.

*Campanula minor alba*: & purpurea, Ger.

XXII. *Campanula minor rotundifolia alpina*.

*Campanula minor alpina*, Clus. pan. & hist. descrip.

*Phyteuma alterum montanum*, Cæs.

Flos nunc cæruleus, nunc purpureus, aut violaceus, modò colore dilutiore, & quasi cinereo, interdum niveo.

XXIII. *Campanula rotundifolia minima Cantabrica* Plinij, Ang.

In *Phytop.* & in Prod. sub. 5. descripta.

XXIV. *Campanula Cymbalariae folijs, vel folio hederacco*: in *Phytop.* & in Prod. pro 6. descripta.

XXV. *Campanula serpillifolia*.

In *Phytopinace*, & in Prod. pro 7. descripta.

# TRACHELIVM SIVE CAMPA- nula hirsuta.

**T** *Rachelium dicitur, quod in colli affectibus commendetur; hinc Cervicaria, imò & Uvularia: & à forma, Campanula.*

I. Campanula maxima folijs latissimis. Trachelium majus Belgarum, Lob. (& Trachelium majus Anglicum septentrionale candidum, Eid.) Clus. hist.

Hæc instar suffruticis est & perennis, florum colore varians, albo, cæruleo, & etiam cinereo.

II. Campanula hortenſis Rapunculi radice. Trachelium in maritimis, Ad. Trachelij genus molliorib. fol. Clus. pan. & hist. Cervicaria 4. Dod. major syl. Eyf.

III. Campanula folijs subrotundis: pro campanula hirsuta prima in Prod. describitur.

IV. Campanula hortenſis folio & fl. oblongo. Medium, Matth. Gef. hor. vulgare, Cam. Rapi syl. genus maximum, Gef. hor. Viola Mariana, Gef. hor. Ad. Lob. Dod. cui & Rapum syl. Diosc. Lugd. Clus. hist. Tab. alba & purpurea, & Ger.

Rapunculi alterum genus grandius, Cæf.

Flore est communiter cæruleo, est & purpureo, subalbido & lacteo: hinc figuræ quatuor apud Eyf.

Medium fl. albo: cæruleo: purpureo & argenteo. (flore pleno reperiri asserunt.)

V. Viola mariana laciniatis folijs peregrina. Medium Dioscor. vel Mindium Rhafis, Rauvvolff. in Itin. & Lugd. & Cam. in Matth.

VI. Campanula Drabæ minoris folijs: est Campanula hirsuta, 2. in Prod.

VII. Campanula vulgatioꝝ folijs urticæ, vel major & asperior.

Uvularia major, Trag.

Campanula, Ang. major, Fuch.

Trachelium majus, Dod. gal. Lugd. Ger.

Cervicaria, Lon. & Digitalis purp. altera, Eid.

Cervicaria major, Dod. Tab.

Trachelium sive Cervicaria, Ad. Lob.

Trachelium folijs urticæ, Clus. pan. sive vulgare, Clus. hist.

Archangelica, Cæf.

Rapi syl. genus majus folijs ferè urticæ, Gef. hort.

Cervicaria maxima, Thal.

Flore est communiter subcæruleo, est dilute

purpureo, est & candido; tota planta strigosior reperitur, hinc tres figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum: & apud Eyf. duæ, Cervicaria hortenſis flore cæruleo.

Cervicaria hortenſis flore albo.

VIII. Campanula urticæ folijs oblongis minus asperis.

Cervicaria major altera, Dod.

IX. Campanula media folijs inferius candida lanugine vestitis.

Cervicaria media, Thal.

X. Campanula folijs Echij.

Cervicaria major tenuifolia, Thal.

Trachelium *duplex* Clusij, ipsi Cam.

XI. Campanula folijs Echij floribus villosis: quæ 3. in Prod.

XII. Campanula folijs Anchusæ floribus oblongis.

Trachelium montanum, Lugd.

XIII. Campanula alpina pumila lanuginosa.

Trachelium pumilum alp. Clus. pan. & hist.

XIV. Trachelium saxatile folijs pulmonariæ Gallorum.

Pyramidalis villosa saxatilis latifolia, vel Rapunculus montanus pulmonariæ Gallorum folio & Trachelij flore, Clus. cur. post.

XV. Campanula alpina sphaerocephalos.

Trachelium majus petræum, Ponæ.

XVI. Campanula Alpina Tragopogi folio.

Trachelium montanum, Colum.

Trachelium Tragopogi folijs, Clus. hist.

XVII. Campanula pratensis flore conglomerato.

Uvularia exigua, Trag.

Rapi syl. genus, Uvularia in pratis, Gef. hort.

Trachelium minus, Dod. gal. Ad. Lob. Clus. hist. Lugd. Ger.

Cervicaria tertia, sive minor, Dod.

Cervicaria minor, Thal. Tab.

Duplex est: alteri flores in summo caule conferrim in orbem nascuntur: ijque vel majores, vel minores: alteri singulares per caulem sparguntur. &

Cervi-



Cervicaria sphærocephalos duplex, Clus. hist.

XVIII. Trachelium Gignanteum &

XIX. Viola Calathiana, apud Gerard. quid?

XX. Cervicaria Valerianoides cærulea.

Trachelium umbelliferum cæruleum, Ponæ.

Ital.

## R A P I S T R V M.

**R**apistrum, à similitudine cum Rapæ folijs dictum videtur: unde quibusdam Rapæ syl. altera nominatur: alij Erysimum Theoph. censent: alij ad Sinapi: alij ad Lampsanam referunt, & recte, cujus Dioscorides lib. 2. c. 142. inter olera sine descriptione meminit. Et Plin. l. 20. c. 9. inter syl. Brassica & Lanipsana est, pedalis altitudinis, hirsutis folijs, napi similibus nisi candidior esset flore.

## I. Rapistrum flore luteo.

Rapistrum, Brunf. Dod. Gef. hor.

Rapistrum arborum, Ad. Lob. & Thal.

Sinapi agreste quartum, Trag.

Irion, Fuch. Corn. Cord. Tur. sive Erysimum, Dod. gal. Cam. ep. Cast.

Lampšana, Matth. (quibusdam etiam Irionejusdem) Gef. hort. A. g. Lugd. Lon. Ger.

Lampšana vera, Lugd. flore melino, Tab.

Rapæ sylvestris altera, Cæs.

Folij aliquando incis, vel sinuatis: aliquando minimè: hinc quidam duas species faciunt.

## II. Rapistrum flore albo filiquâ articulata.

Sinapi agreste tertium, sive Lampšana veterum, Trag.

Lampšana, Tur. Cæs.

Rapistrum flore albo Erucae folijs, Lob. ico.

Armoracia, quibusdam Rapistrum album, Tab.

Raphanus sylvestris, Ger. ico.

Rapistrum purpureum, Tab. arborum, Ger.

Flore est albo, subcæruleo, aliquando purpurascete.

## III. Rapistrum flore albo lineis nigris depicto.

Lampšana Apula, Plinij & Dioscoridis, Colum.

IV. Rapistrum floribus Leucioj marini: hoc 1. est in Prod.

V. Rapistrum Italicum filiquis longissimis.

Rapistrum montanum sive sylvestre Irionis folio, Colum.

VI. Rapistrum monospermon.

In Phytopinace & Matthiolo: & in Prodr. pro secundo descripsimus.

## N A P V S.

**B**ονιάς Dioscoridi l. 2. cap. 136. significatione à tumente figura deducta, quare Rapis, hoc nomen magis competere, sunt qui velint: γογγύλης species Galeno.

Differentias duas & in Medicina Græcos servare, Plinius l. 20. c. 4. scribit, alterum Bunion, alterum Buniada vocantes: sunt qui Buniaden, Napum sylvestrem esse velint. At. l. 19. c. 5. Naporum genera quinq. facit, ubi legendum est Raphanorum, cum ex Theophrasto 7. hist. 4. desumpta sint, ubi τῶν ραφανίδων genera quatuor dicit.

## I. Napus sativa.

Napus, Brunf. Ang. Matth. Tur. Gef. hort. Dod.

Lac. Cord in Diofc. Cast. Cam. Lon. cui prima.

Rapum sativum alterum & Napus veterum, Trag.

Napus Bunias sativus, Fuch. Lugd.

Bunias sive Napus, Ad. Lob. Ger. def.

Radix colore albo, vel luteo, sive buxæo est; rarius nigro.

## II. Napus sylvestris.

Rapum sylvestre, Trag.

Napus agrestis, Tur. sylv. Dod. Lugdun. cui & Βονιάς.

Bunium & Napus sylv. Ad.

Napus Bunias sylvestris, Fuch.

Napus 2. Lon. Bunias sylv. Lob. ico.

an Napum sylv. Cæs.

Nascitur etiam ex non transplantatorum semine.

## III. Napus syl. Cretica; in Prod. descripta.

RAPHA-

## RAPHANVS.

**P**ΑΦΩΙΣ (quasi radix perspicua) Dioscoridi l.2. c.137. Posteribus dicitur παφαω, παφαω π παδίας φαίνεσθαι, quia satum statim oriatur. Theophrastus utraq, voce usus quidem est, sed quem Raphanum vocamus, ipse παφαωδα appellavit: at παφαω, ipsam Brassicam nominavit: quæ causa erroris fuit Plinio, dum l.19. c.15. scribit, Græcos Raphani genera tria fecisse, foliorum differentia, &c. quæ de Brassica intelligenda, cum ex Theoph. 7. hist. 4. desumpta sint. Latinis radix (πίζα Theophr.) quòd ceteras amplitudine corporis superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat: siquidem in frigidis locis, quibus gaudet, sicuti in Germania, infantium puerorum magnitudinem æquet. l.19. c.5. teste. Sic in regno Congiano, crassitudine humanæ tibiæ, gratiq, saporis spontè provenire, Pigafettius in ejus regni descript. l. & cap.1. testatur: aliàs copiosissime in India provenire, asserit Linsc. part.4. Ind. Orient. 10. par. 7. cap.19. & part.8.

Genera duo Dioscoridi, sativum & sylvestre: at Theoph. sex, Corinthium, Cleonæum, Liothalsium, Bæotium, & genus quod folijs erucæ simili constat: hæc Theophrasti, Plin. l.19. c.5. Naporum nomine recenset, posterius genus sylvestre statuens: at ibidem, ex Romanorum sententia, inquit, nostri Raphani alia fecere genera, Algidense à loco, longum atq, translucidum: alterum Rapi figura, quod vocant Syriacum, suavissimum ferè ac tenerrimum, &c. etiamnum subjungit, unum sylvestre, Græci agrion vocant, nostri Armoraciam.

Quare observavimus alium præcoccem, serotinum alium: præcox, corpore est oblongo, gracili, semine majore, in quod facile abit. Serotinus albus, qui vel oblongus, vel orbicularis: niger, qui rotundus, rarius oblongus, siliquis quidem majoribus, sed semine minore: ruber, oblongus, cortice rubro, fibris nonnullis rubentibus, per substantiam dispersis. Radice lutea Cameraarius notavit: meminit & Byzantini, semine Constantinopoli accepto, qui postea in communem degeneravit, radice penitus languescente.

I. Raphanus major orbicularis, vel rotundus.

Raphanus, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Diosc.

Raphanus vulgaris, Gef. hort. primus, Matth.

Raphanus magnus, Ad. & Lob. sive Radicula fativa, Dod.

Raphanus sativus, Fuch. Lac. Cast. Lugd.

Raphanus rotundus, Lon. Tab. & orbiculatus, Tab. Ger. & pyriformis.

Radix vulgò, quibus Radicula, Cæs.

Floribus purpureis aut candidis, & radice rotunda, vel orbiculata, variat. In India frequentes sunt: & licet brachij humani crassitudine proveniant, ramen substantiæ teneræ & suavis saporis sunt, quibus pro vulgari cibo utuntur: Joseph. Acosta. l.4. c.18.

II. Raphanus niger.

Raphanus cortice nigricante, Gef. hort.

Raphanus niger, Lobel. icon. radice nigra, Camer.

Raphanus sylvestris, Cast. ico.

Radix & parva & crassa, pro sationis tempore.

III. Raphanus minor oblongus.

Raphanus Cleonæus, Theophrast. Algidensis, Plinij.

Raphanus longus, Trag. Matth. Lon.

Raphanus prælongus, Gef. hort.

Raphanus secundus, Matth. Lugd.

Raphanus minor purpureus, Ad. Lobel. Lugd.

Radicula fativa minor, Dod.

Cortice est albo, rubello, præsertim parte quæ extra terram eminet.

IV. Raphanus Creticus: de quo in Prodromo.

V. Raphanus rusticanus.

Thlaspi alterum, Diosc. l.2. c.186.

Raphanis sylv. Dioscorid. l.2. c.138. &

Raphanus sylv. seu Armoracia Plinij, quibus Armoracia aut Raphanus major, Brunf.

Raphia-

Raphanus major, Trag. Gef. hort.  
 Raphanus syl. Fuch. marinus, Tab.  
 Raphanus vulgaris & rusticus, Matth.  
 Armoracia Plinij, Lac.  
 Thlaspi majus, Cord. in Dioscorid. Lon. ma-  
 gnum, Cæf.  
 Raphanis magna, sive Radicula magna, Dod.  
 Raphanus rusticus, Ad. Lobel. Ger. rusticus,  
 Cam. Lugd.

VI. Raphanus aquaticus folijs in profundas  
 lacinias divisus.

an Raphanus cujus folia Erucæ similia Theoph.  
 & Napi sylv. genus, Plinij.  
 Radicula sylvestris, Dod.  
 Raphanus sylv. officin. aquaticus, Lob. ico.  
 Raphanus aquaticus, Tab. Ger.  
 Raphanus syl. & Raphanus palustris, Lugd.  
 an Raphanus sylv. Cord. in Diofc.  
 Sifymbrium sylv. Cæf.

VII. Raphanus aquaticus Rapiftri folio.  
 Rapiftrum aquaticum, Tab. Ger.  
 an Raphanus sylv. Cæf.

## LEPIDIVM.

*Ἀπὸ τοῦ Dioscoridi l. 2. c. 205. sic dictum, quòd λεπιδία, seu squamas & maculas faciei de-  
 leat: vel ἀπὸ τῆς λεπιδίας, id est, ἐκ δάκρυον dictum, quòd suā acrimoniā urenti ulceret,  
 excoriet, eaq̃, facultate, vel ferro notas fronti servorum inustas deleat; de quo forsā Colum-  
 mella l. 10. Lepidium Plinio l. 20. c. 17.*

I. Lepidium latifolium.  
 Piperitis, Brunf. Lon. Dod. gal.  
 Lepidium sive Piperitis, Trag. Matth. Cam.  
 Lepidium magnū, Fuch. Tur. majus, Cord. hist.  
 Lepidium Dioscorid. Ang.  
 Lepidium Pauli & Plinij, Matth. Lugd. Cæf.  
 Lepidium Æginetæ, Gef. hort. Tab.  
 Lepidium Plinij, Lac. Dod.  
 Raphanus sylv. officin. Ad. Lob. Ger.

II. Lepidium glastifolium.

Lepidium annuum, Lob. Lugd.

III. Lepidium Dentellaria dictum.

Dentellaria Monspel. & Flamula, Gef. hor.

Herba S. Antonij Romæ, Gef. ap. ad. Cord. hist.  
 in Chamænerio.

Molybdæna Plinij, Ang. Cam. cui & Crepanel-  
 la Itatorum.

Sarcophago Cretensibus: Phrocalida in Le-  
 mno: Mauronia Lesbijs, Bellonio.

Dentaria, sive Dentillaria Rondeletij & Nar-  
 bonensium, Ad. Lob.

Plumbago, Clus. hisp. & hist. Cast. Tab.

Dentellaria & Enneaphyllon Plinij, Lugd. &  
 Dentellaria Rondeletij.

Glastum sylvestre, sive Isatis sylv. Diofc. secun-  
 dum ipsius notha, Cæf.

## IBERIS.

*Ἰβερὶς ἢ καρδαντάνη Dioscoridis l. 1. c. 189. Galenus ejus descriptionem ex Damocrate in  
 curatione doloris Isebiadici proponit, folia Nasturtij, cum Dioscoride, tribuens. Plinius Ibe-  
 ridis remedia diversis in locis recenset.*

I. Iberis Nasturtij folio.  
 Iberis & Lepidium, Matth. fig. folio major.  
 Iberis, Cast. Cæsalp. cui Lepidium sylv. forte  
 Columellæ, secunda, Tab.

Iberis Cardamantica, Ger.

Lepidium campestre, Ang.

II. Iberis latiore folio.

Iberis & Lepidium, Matth. fig. min.

Iberis, Lugd. Dod. Lac. Gef. hort.

Lepidium hortenfe, Ang.

Iberis Cardamantica, Ad. Lob. cui & Lepidium  
 Iberias Pauli.

III. Iberis nasturtij folio minor.

Iberidis pusillæ seu Nasturtij sylv. nomine ex  
 Thuringia D. Fürerus misit.

## DRACUNCVLVS ESCVLENTVS.

**T** *Ἀρχὸν Simeonis, Serhi lib. de alim. facult. reliquis Græcis & Mauritanis indita, aliqui ad Drabam, alij ad Chrysocomen Dioscoridis referunt.*

## I. Dracunculus hortensis.

Draco, Ruel. Hermol. Scal. Dod. gal. Ad. Lob.  
 Dracunculus hortensis, Matth. Cast. Tab. Eyst.  
 Tarchon Avicen. & Serhi, Gef. hort.  
 Draco herba acetaria, Cord. ob.  
 Draco herba, Dod. Ger. horrensis, Gef. hort. seu  
 acetarius, Lugd. (& Chrysocoma, Diosc.) Cam.  
 Dragone vulgo, Cæs.  
 Tragum vulgare, Clus. hist.

## II. Dracunculus pratensis ferrato folio.

Pyrethrum, Brunf. ico. Gallorum, Ruell.  
 Tanacetum album seu acutum, Trag. (& Mil-  
 lefolium 3.) Tab.  
 Ptarmica, Matth. Fuch. Tur. Gef. hor. Lon. Cast.  
 Lugd. Cam. Ger.  
 Ptarmica folio Tarac. vel Sternutator. Ad. Lob.

Ptarmica vulgaris sive pratensis, Clus. hist. Lo-  
 bel. (& Ptarmica folio Taraconis, vel Sternu-  
 tamentoria) Lugd. Clus. hist. (& Ptarmica pra-  
 tensis) Cam. Ger.

Pyrethrum syl. Dod. gal. syl. ac parvum, Cord.  
 in Diosc.

Tarchon syl. vela aquaticum, Gef. hor. & col. &  
 Draco aquaticus.

Ptarmica syl. Germanica, Thal.

Draco syl. sive Ptarmica, Dod.

Menta Saracenica Myconi, Lugd.

Ptarmica vulgaris, Eyst.

## III. Dracunculus pratensis flore pleno.

Ptarmica vulgaris pleno flore, Clus. hist.

## IV. Dracunculus alpinus folio Scabiosæ: in

Prod. descriptus.

## ERVCA ET EJVVS SPECIES.

**E** *Ruca, quod vellicando linguam quasi erodat: ὀφύων Dioscoridi l. 2. c. 170. & Theoph. 1. hist. 9. ob suavi-  
 ratem quæ ei in condiendis obsonijs inest, Plinios l. 20. c. 13.*

*Genera duo Dioscoridi, sativum & agreste, cujus semine pro Sinapi in Iberia utuntur. Et Plinius l. 20. c. 13.  
 Eruca sylvestris meminit. At Theoph. 7. hist. 4. Erucæ generis differentias omnino deesse volunt.*

## I. Eruca latifolia alba: sativa Dioscoridis.

Eruca, Brunf. Hermol. Ruel. Corn. Matth. Ang.  
 Cord. in Diosc. Gef. hort. Cast.  
 Eruca, sive Rucula marin. maj. & Sinapi, 8. Trag.  
 Eruca sylvestris, Fuch. ico. Lon.  
 Sinapis alterum genus, Fuch.  
 Sinapi horrense, Tur. syl. Dod. gal.  
 Erucula major. Cord. hist. ico.  
 Eruca sativa, Matth. Lac. Ad. Lob. Dod. Lugd.  
 Sinapi hortense, Lugd. ico.  
 Eruca folio latiore, Cæs.  
 Eruca major, Cam.

Flores pallentes: venas nigras aliquando  
 obtinent; Et hæc est

Eruca, sive Rucula marin. maj. & Sinapi 2. Trag.  
 Eruca major, Cord.

## II. Eruca latifolia semine nigro.

Eruca gentilis, sive Erysimon Marnardo, Port.  
 Eruca major sive Hispanica, Ad.  
 Eruca altera fruticosa, Cæs.

III. Eruca latifolia: pro Eruca 1. in Prod. def.  
 an Eruca tertia Anglica, Cam.

## IV. Eruca sylvest. major lutea caule aspero.

Eruca syl. Matth. Ad. Lob. Dod. Lugd. (cujus E-  
 rysimum verum etiam videtur.) Cast. Tab. Ger.  
 Erucæ genus, spontè nascens, Cæs. qui flores  
 albos tribuit.

Flore majore, circa Monspelium in horto  
 Dei, crescit.

## V. Eruca sylv. minor luteo parvoq; flore.

Sinapi 1. genus syl. Fuch. ico.

Eruca sylv. Fuch. Tur. Lugd.

VI. Eruca palustris & Nasturtij folio, fili-  
 qua oblonga.

Eruca sylv. foetida, Gef. col.

Eruca palustris minor, Tab.

Sinapi palustre, Ger.

VII. Eruca syl. minor lutea bursæ pastoris  
 folio: quæ 2. in Prod.

## VIII. Eruca syl. minor incana: quæ 3. in Prod.

## IX. Eruca lutea latifolia, sive Barbarea.

Herba S. Barbaræ (& Sinapi agreste 5.) Trag.  
 Lon. Cast.

Scopa regia (sive Sideritis latissima) Fuch.  
 ico. Ang.

S. Barbaræ herba, Fuch. Gef. hort.

Pseudobunias, Dod. gal. Ad.  
 Carpentorum herba, Ruel.  
 Nasturtium palustre, Gef. hor. hybernum, Thal.  
 Barbarea, Dod. Lob. Tab.  
 Eruca palustris, Lugd.  
 Bunium adulterinum, Cam.

Variat foliorum magnitudine, nam in hortis ad acetaria culta, acutiora habet, quæ fœmina dicitur, Tabernæmontano: nonnunquam rubent & nigrescunt.

X. Eruca lutea sive Barbarea pleno flore: quæ Eruca 4. in Prod.

XI. Eruca cærulea in arenosis crescens.

Hæc est Eruca palustris cærulea, in Phytopinace, & Matthiolo (& in Prod. pro 5.) descripta pistaque: magnitudine & parvitate variat.

XII. Eruca maritima Italica siliquâ hastæ cuspidi simili.

Cakile Serapionis, Anguil. Ad. Lobel. Lugd. Camer.

Eruca maritima, Lugd.

Nasturtium maritimum, Eid.

Erucae genus in maritimis, Cæs.

Eruca Kackile dicta, Colum.

Habetur latifolia & angustifolia: hæc si in hortis seratur, oblongo angustoque folio excrescit.

XIII. Eruca maritima Cretica, siliquâ articulata: quæ 6. in Prod.

XIV. Eruca Monspeliaca siliquâ quadrangulâ echinata: quæ 7. in Prod.

Sinapi echinatum, Lugd.

XV. Eruca angustifolia Austriaca.

Eruca syl. angustifolia, Lob. Lugd.

XVI. Erucae folia napi radice.

Pycnocomon Ang. quid?

## SINAPI ET EJVS SPECIES.

**S**inapi, *σινάπι* Dioscoridi l. 2. c. 18 4. & Theoph. 7. hist. 3. & 6. *παρά τῷ ἀνέσθῳ πρὸς ὄπας*, oculos Senim ledit: dicitur etiam Theoph. *βάπι*, quasi immite, ob vehementem ejus acrimoniam: & Athenienses Napy appellasse, Plin. l. 19. c. 3. author est, Sinapi nominans.

Unius Dioscorides & Theoph. meminere: at Plinius, generatim facit: unum gracile, alterum simile rapi folijs, tertium Erucae.

I. Sinapi rapi folio.

Sinapi Diosc. & Theoph. Sinapi alterum Plinij.  
 Sinapi, Ang. Gef. hort. Cast. primum, Matth.  
 Lac. Cæs. Port.

Sinapi hort. Cord. in Diosc. Lon. Lugd. desc.

Sinapi sativum prius, Dod.

Sinapi sativum Erucae aut Rapi folio, Ad. Lob.

II. Sinapi hortense semine albo.

Sinapi sativum album, Trag.

Sinapi alterum sativum, Ad. & Lob.

Sinapi album, Cam. & Eyst.

III. Sinapi apij folio.

Sinapi gracile, Plinio.

Sinapi, Brunf. luteum sativum, Trag.

Sinapi primum, Fuch. Tur. Cast.

Sinapi alterum, Matth. Lac. Cæs.

Sinapi hortense, Fuch. ico. Dod. gal.

Sinapi sativum, Lugd. sativum alt. Dod. Ger.

Sinapi agr. apij aut potius laveris fol. Ad. Lob.

Sinapi syl. luteum, Lon.

Eruca palustris major, Tab.

IV. Sinapi Erucae folio.

Eruca sive Rucula mar. min. & Sinapi 9. Trag.

Eruca, Dod. gal. sativa, Fuch. hortensis, Tur.

Eruca sylvestris, Gef. hor.

Sinapi tertium, Matth. Cast. Cæs.

Sinapi sylvestre, Dod. Lugd.

Sinapi syl. minus irionis veri folio, aut burfæ pastoris, Ad. Lob.

V. Sinapi parvum siliquâ asperâ.

In Phytopinace & Prod. descriptum est.

VI. Sinapi umbellâ purpureâ.

Sinapi alterum agreste nostras, Colum.

VII. Sinapi Indicum.

Safeni, semen est Sinapis, magna copia in Sundan: par. 4. Ind. orient. 8.

VIII. Sinapi simile Indicum semen.

Nachani semen nigrum minutum sapore Secales, ex cujus farina panes conficiuntur, Garz.

Semen sinapi simile sed nigrius, cujus farinâ in panes orbiculares subactâ vescuntur tota Æthiopia ora maritima, Clus. in notis.

## R E S E D A.

**R**eseda à doloribus sedandis dicta, cum collectiones & inflammationes omnes discutere, Plin. l. 28. c. 12. scribat: propter saporem Erucae, & quod aliqui ex Erucarum syl. genere esse censeant, huc relata est.

I. *Reseda maxima*.  
*Reseda*, quæ *Sesamoides majus Ghino*, Gef. hort.  
*Sesamoides magnum*, Lac. at alterum, Cæs.  
*Reseda maxima*, Lob. Ger.  
*Reseda tenuifolia*, Tab.  
*Reseda Plinij*, Eyft.  
*Reseda lutea*, Lugd. recta, Cam.  
*Erucago vulgaris*, Col.  
 II. *Reseda vulgaris*.  
*Rheseda Plinij Neotricorum*. *Eruca peregrina Italica*, vel *Cantabrica*, Ad. Lob. *Rheseda Plinij*, Ger.  
*Reseda latifolia*, Tab. at *supina*, Cam.  
*Reseda major*, Thal.  
*Reseda lutea*, Lugd.  
*Sesamoides primum*, Cæs.

Ludit folijs simplicioribus, & in unoquoque pediculo plurimis: major & minor est.  
 III. *Reseda linariæ folijs in prodromo descripta*.  
 IV. *Reseda alba minor*.  
*Sesamoides parvum Salmanticum*, Clus. hisp. & hist. (quam duplicem facit) Lob. Tab. Ger.  
 V. *Reseda lapidea*.  
*Planta marina Resedæ facie*, Clus. exot.  
 VI. *Resedæ affinis Phyteuma*.  
*Phyteuma Monspelienfium*, Gesner. Ad. Lob. *Narbonensium*, Lugd.  
*Sesamoides parvum*, Lac. tertium, Cæs.  
*Erucago Apula*, Colum.  
 Variat folijs nunc oblongis, nunc in aliquot lacinias, & quidem frequentius quatuor, modo quinque divis.

## L V T E O L A.

**C**um *Luteolam* aliqui *Resedam Plinij* faciant, & in multis cum *Reseda* conveniat, de ea nunc; quæ sic dicta, quod eâ panni lanei & tela lineæ, candidæ quidem, colore luteo, virente verò, qui antè caruleo tincti, inficiantur. Quare *Plinius*, lib. 33. cap. 5. *Luteam*. *Vitruvius* 7. *Architect.* 14. *Luteum*, & *Virgil.* *Ecolg.* 4. *Lutum* nominat. At *Casalpinus*, lib. 9. cap. 35. *Myagron seu Melampyron Dioscoridis* statuit.

I. *Luteola herba falicis folio*.  
*Antirrhinon*, Trag. Lugd. Thal.  
*Pseudostruthium*, Marth. Cast. Lugd. Eyft.  
*Struthium*, Lac. Gef. hor.  
*Lutea vel Luteum Vitruvij*, Gef. hor. Cam.  
*Herba lutea*, Dod. gal. Lugd.  
*Lutum herba*, Dod.  
*Luteola*, Ad. Lob. Ger.  
*Guadarella vulgo*, Cæs.  
*Catanance*, Lon. Tai.

II. *Luteola Cretica*.  
*Struthium legitimum Dioscoridis* quæ *χυμῆν* in tota Græcia appellatur, quâ fullones in tingendo serico luteo utuntur, Hon. Belli ep. 2. ad. Clus.  
 II. *Luteola herba folio cannabinæ*.  
*Lutea maxima Cretica Belli*, Ponæ in Bal.  
*Lutea major frutescens Cretica*, Ponæ ed. Ital.  
 IV. *Luteola herba sterilis*.  
*Lutea major sterilis Cretica*, Ponæ ed. Ital.

## E R Y S I M V M.

**E**ρύσιμον *Dioscoridi*, lib. 2. cap. 188. alijs ἀπὸ τοῦ ἐρύειν, foliorum multiplici sectione: alijs quasi ἐρίσιμον, quod est pretiosum: alijs ἀπὸ τῆς ἐρύειν, quod ob suam caliditatem irabendi facultate præditum sit, dictum: nam *Sinapis* sapore est, & multis *Sinapis* syl. species est. *Plin.* lib. 22. cap. 25. *Iris*, *Erysimum Græcis*: ubi *Erysimon Dioscoridis*, cum *Erysimo* fruge *Theophrasti* 8. hist. 1. & 4. caus. 16. (*Gaza Trionum vertit*) confundit.

I. *Erysimum vulgare*.  
*Hierobotane fœmina*, Brunf. 4.  
*Verbena fœmina & Sinapi* 7. Trag.

*Sinapi alterum genus syl.* Fuch. ico.  
*Verbena*, Tur. recta sive mas, Fuch. Lugd.  
*Erysimum*, *Synapi* syl. species, Gef. hort.

Erysi-

Erysimum Dioscoridis, Dod. gal. Ger.  
Irio, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lugd. Lon.  
Cæsalp.

Irio five Erysimum, Ad. Lob. Dod. Cast.

Cleome Octavij, Ang.

Erysimum nostrate, Thal. primum, Tab.

II. Erysimum alterum filiquis Erucæ.

Erysimum 2. Tab. sub Eruca sativa, Ger. ico.

Majus est & minus.

III. Erysimum polyceration, vel corniculatum.

Irio alter, Matth. Lugd. Cam.

Erysimum verum, Ang.

Dentilaria alia, Irio aliquibus, Gef. hor.

Erysimum alterum Italicum, Ad. Lob.

Irionis tertia species, Cæf.

Saxifraga Romanorum, Lugd. desc. figura sub Saxifraga aurea.

IV. Erysimum latifolium majus glabrum.

Irio Apulus alter lævi folio Erucæ, Colum.

an Irio altera, Cæf.

Ex semine Irionis nomine, à D. Imperato misso, & nomine Rapistri Hispanici non scripti, à D. Gillenio, in horto meo crevit.

V. Erysimum angustifolium majus.

Rapistrum sylvestre Irionis folio, Colum.

VI. Erysimum similis lævis laciniata fl. luteis.

Herba S. Alberti, Cæf.

an Barbarea minor, Lob. ob.

VII. Erysimum similis hirsuta non laciniata alba.

Variat folijs latioribus, angustioribus: magis minusve crenatis & hirsutis: icon & descript. in Matth. & Prodromo habetur.

Barbarea muralis, Joh. Bauhino, lib. de Plantis à Sanct.

## HYDROPIPER SEV PERSICARIA.

**Y** Δροπῖπερι, Dioscoridi lib. 2. cap. 191. id est, Aquaticum piper, à loco & sapore nomen habet, Latinis Persicaria, à foliorum forma: hæc vel mitis acidæ sapore, vel acris est: illa folijs maculosis, vel ijs carentibus.

I. Persicaria mitis maculosa & non maculosa.

Pulicaria fœmina, Brunf. Persicaria fœmina, Eid. Ruel. Lon.

Persicaria, Fuch. Dod. Ang. Cast. Lugdun. cui & Plumbago Plinij quibusdam.

Persicaria altera, Trag. Matth. Tab.

Persicaria maculata, Ericio Cord. Ger.

Persicaria maculis nigris, Gef. hor.

Persicaria mitis, Ad. Lob. ico. maculosa, Lob.

Persicaria prima, Britannica Plinij, Cæf.

Cratæogonum, Lac.

Plumbago Plinij, l. 25. c. 13. quibusdam: alijs Britannica ejusdem, l. 25. c. 3. alijs Lapathum quoddam viderur.

Floribus est communiter purpurascens, aliquando candidis: folijs aliquando maculam nigram in medio habentibus, aliquando ea carentibus.

II. Persicaria urens seu Hydropiper.

Persicaria mascula, Brunf. Ruel. cui & major, mas, Lon.

Persicariæ primum genus, Trag. Tab.

Hydropiper, Fuch. Ang. Dod. Matth. Cord. in Diosc. Lac. Cast. Cæf. Lugd. Ger.

Cratæogonon, Ang.

Persicaria hydropiper, five aquatile piper urens, Ad.

Persicaria urens, Lob. mordax, Thal.

Flore est ex roseo rubicundo: colore Persilico: candido: aliquando folijs macula rubra aspersa est.

III. Persicaria angustifolia: in Prod. desc.

Persicaria major, Lob. ob. Thal.

IV. Persicaria minor.

Pulicaria pusilla repens, Lob. Lugd.

Persicaria pusilla, Tab.

Floribus est albis, aut purpureis.

## CAPSICVM SEV PIPER INDICVM.

**K** Αψῖον Actuario, à κάπῳ mordeo, quod semen comestum mordeat, imò adurat. Plin. lib. 19. cap. 12. Siliquastrum, quod ob piperis saporem Piperitidis nomine sit acceptum: Axi, Indis. Piper: Piper Brassilianum: piper Indicum in Guiana: piper Indicum cornutum, à quibusdam Siliquastrum: Auctoribus historiæ Indicarum.



*Differentia in foliorum latitudine, vel angustia; in fructus colore & forma: colore, qui in initio alijs viridis, alijs niger; in maturitate, aut ruber, aut croceus, flavusve; rarius albus. Figura alijs longa, eaq; vel crassa, vel gracili, vel incurvata: alijs brevis eaq; lata, cordata, vel rotunda cerasi forma, vel angulosa: & vel erecta, vel dependens: deniq; & caule piloso.*

*Axi aroma in Ind. Occid. quod in Cusco, Veho: in Mexico, Chili: in Castilia, piper Indicum appellatur. Est viride, & rubrum, & croceum. Aliud vehementius mordicat, quale Caribbe vocatum: aliud lenius, & moderatius: est & genus quoddam dulcissimum, quod è manibus vellunt, & edunt: & quoddam aliud exilius, quod moschum fragrat, & gustu admodum sapidum. Joseph. Acoſta lib. 4. c. 20. vel part. 8. Ind. Occid.*

#### I. Piper Indicum vulgatissimum.

Siliquastrum, Trag. (una figura tres species proponit) Lac. Tab.

Capſicum rubrum & nigrum, Fuch. ico.

Siliquastrum majus & minus, Fuch.

Piper Indicum, Matth. Gesn. hort. (cui & Catecuticum) Cæs. (cui Circæa Dioscorid. forte)

Cist. Cam.

Cardamomum Arabicum, Gesn. hort.

Piperitis seu Siliquastrum Peruvian. Cord. hist.

Piper Indic. 3. rubrum & nigrum, Gesn. hort.

Capſicum, Clus. in Mon.

Capſicum vel Piper Indicum longioribus siliquis, Lob. Capſicum Actuarii, Eid. ico. & Ad.

Capſicum sive Piper majus & minus, Lugd.

Piper Americanum vulgatum, Clus. cur. post.

Piper Indicum medium, Eyft.

Piper Indicum Occid. quod Axi vocant, Frag.

II. Piper Indicum propendentibus siliquis oblongis recurvis.

Capſicum oblongius, Fuch. ico. Dod gal. Lugd.

Capſicum longioribus siliquis, Ger.

Siliquastrum tertium, Fuch.

Capſicum oblongiorib; & recurvis siliquis, Dod

Piper oblongum recurvis siliquis, vel 2. Regio. in Clus. cur. post.

Hujus differentiae tres sunt.

1. Siliquis longissimis, deorsum spectantibus in mucronem recurvum abeuntibus, quod Piper Indicum maximum longum, Eyft.

2. A priore sola magnitudine differt, quod Piper Indicum minus, recurvis siliquis, Eyft. Piper decimum, Regio.

3. Siliqua flava, vel aurea, eaque oblonga vel lata, vel ovali figura, quod

Piper duodecimum, Regio.

Piper Indicum siliquis flavis, &

Piper Indicum aureum latum, Eyft.

III. Piper Ind. propendentib; siliquis rotund.

Siliquastrum latis siliquis, Trag.

Capſicum latum, Fuch. ico. Dod gal. Lugd.

Siliquastrum quartum, Fuch.

Piper Indicum rotundum, Gesn. hor.

Capſicum cordatum, Cam.

Siliquastrum fructu propendente rotundo, Regio, in Clus. cur. post.

Et hujus differentiae quatuor sunt.

1. Siliqua lata, rugosa, quod

Piper octavum, Regio.

2. Cordata, eaq; oblonga vel rotunda, quod

Piper Indicum cordatum oblongum, &

Piper Indicum cordatum, Eyft.

Piper sextum, Regio.

3. Siliqua olivari.

4. Siliqua rotunda Cerasorum modo, eaque majore vel minore, rubri vel nigri coloris, quod

Piper minimum siliquis rotundis, Eyft.

Piper septimum, Regio.

IV. Piper Indicum fructu dependente pomi amoris forma.

Piper Indicum rotundum maximum, Eyft.

an Piper ex Ind. Melopeponis forma Monardi.

Folia sunt Solani vulgaris, fructus rotundi, fulcis aliquot distincti pendunt, rubore coralli.

V. Piper Indicum fructu aculeato.

Majus est & minus: illud rotundum, hoc orbiculatum, utrumq; rubet; & innoxium quasi in aculeum abit, quod

Piper Indicum rotundum aculeatum, &

Piper Indicum orbiculatum medium, Eyft.

VI. Piper Indicum siliquis surrectis & oblongis.

Piper oblongum erectum majus pyramidale vel secundum, Reg. in Clus. cur. post.

Hujus differentiae quatuor.

1. Pyramidale majus.

2. Pyramidale minus: quod

Piper erectum minus pyramidale vel 3. Regio.

Piper

Piper Indicum medium longum erectum, Eyst.

3. Oblongum surrectum majus & min. quod  
Piper oblongum exiguum erectum pyramida-  
le, vel quartum, Regio.

Piper Indicum minimum erectum, Eyst.

4. Siliqua bifurcata, quod

Piper undecimum, Regio.

Piper Indicum bifurcata siliqua, Eyst.

VII. Piper Indic. siliquis surrectis rotundis.

Piper rotundum majus surrectum, Reg. in Clus.  
cur. post.

Hujus quoque differentiae quatuor :

1. Rotundum maximum obtusum, quod

Piper majus surrectum vel primum, Regio.

Piper Indicum maxim. rotund. erectum, Eyst.

2. Rotundum minus parum acuminatum :

3. Cordatum majus :

4. Cordatum minus angulosum.

Verum Piperis Indici differentias novende-  
cim, du By in suo Florilegio proposuit: at scul-  
ptor linguae Latinae ignarus, omnes siliquas  
propendentes sculpsit, licet rectè depictar & no-

minibus notatas ad ipsum transmississemus.

VII. Piper Ind. siliquis surrectis cerasi forma.

Capficum brevioribus siliquis, Lob.

Capficum Brasilianum, Clusad Monard. Lugd.

Capficum minimis siliquis, Dod. Ger.

Siliquastrum rotundum, Cam. ep. Matth.

Piper Indicum surrectis corniculis, Cam.

Siliquastrum rotundum angustifolium, Tab.

Huc referendum

Piper oblongum erectum minimum, Regio.

Piper Indic. surrectis corniculis parvulis, Cam.

IX. Piper Indic. caule piloso flore majore.

Piper Indic. caule pilis albis praedito, Cam.

X. Piper Indicum radice eduli.

Piperis tertium genus minoribus granulis,  
cui sunt radices Ictici dictae, satis boni saporis,  
quas in minima frustra conscindunt & plantant,  
& farmenta in modum Lupuli, supra terrae su-  
perficiem spargunt: Stad. par. 3. Americae.

XI. Tomates grana sunt recentia & viridia  
quae cruda esitare solent. Et ex ijs plerumq; con-  
dimenta parantur: par. 8. Ind. Occid. l. 4. c. 20.



## SECTIO SECUNDA.

# NASTURTIIUM: THLASPI: BURSA PASTORIS: MYAGRVM: DRABA: AL- LIARIA: COCHLEARIA.

## NASTVRTIVM EJVSQVE SPECIES.

**N**asturtium Καρδαιμον Dioscoridi lib. 2. c. 185. Theoph. 7. hist. 1. quasi Καρδαιμον, quod ca-  
put calore suo & acrimonia tentet: vel ἀπὸ τῆς καρδίας, quod cordatos faciat; vel  
quod in Syncope Cardiaca dicta, plurimum valeat. Latinis Nasturtium, à naribus torquendis;  
quod odore & seminis acrimonia sternutamenta provocet: hinc Plinio l. 19. c. 8. (& Varro)  
à narium tormento velut torporem excitans.

Genera, Theophr. 4. hist. 7. plura esse dicit. Dioscorides tantum Nasturtium Babylonicum  
optimum esse scribit. Plinio l. 20. c. 13. est hortense sive sativum, latioribus folijs, est & sylve-  
stre: illud album, hoc nigrum, ubi de semine eum loqui censemus. Dividimus in hortense,  
pratense, aquaticum, montanum.

### NASTURTIIUM HORTENSE.

I. Nasturtium hortense latifolium.

Nasturtium Hispanicum, Ges. hort. Tab. Ger.

Nasturtio, tale folium Cam. ep. Matth. adpin-  
gir: descripto & figura Matthiolo addita.

II. Nasturtium hortense vulgatum.

Nasturtium album, Plinio.

Nasturtium, Brunf. Ang. Matth. Cæsalp. Cast.  
Tabern.

Nasturtium hortense, Trag. Fuch. Tur. Lac. Ad.  
Lob. Dod. Lugd. Ger. Cam.

Aliud est folijs simplicibus, quod læve & al-  
bium, vel subhirsutum minusq; album; aliud fo-  
lijs valde divisis, & vel majus, vel minus.

III. Na-

III. Nasturtium hortense crispum. Hujus semen etiam nuper Nasturtij Mauritanij nomine Lugduno Batavorum accepimus.

Est latifolium & angustifolium, utrumq; in Matth. descriptum & depictum, sicut & in Prod.

*Nasturtium pratense.*

Nasturtium pratense magno flore.

Flos cuculi, Brunf. Dod.

Nasturtium pratense (vel 3.) Trag. Gesn. Tur. Hiberis, Fuch. ico.

Nasturtium agreste, Fuch. sylvestre, Lon.

Lepidium minus, Cord. in Diosc.

Sisymbrium Cardamine, Dod. gal. Lac. tertium, Dod. Lugd.

Sisymbrium aquatic. alter. quoad folia, Matth. Tab. & Lugd.

Cardamine altera, Lob. Lugd. Ger.

Cardamine 1. & Sisymbrium alt. Diosc. Tab.

Cardamine altera simplici flore, Clus. hist.

Cardamine latifolia, Ger. quoad folia.

Sisymbrium aquat. non absimilis, Cæs.

Iberis sive Cardamantica nasturtij folio 1. Thal.

Nasturt. aquat. simplici flore, Eyst.

Flos communiter ex candido, leviter purpurascit, aliquando profusus albus est.

II. Nasturtium pratense flore pleno.

Cardamine altera pleno flore, Clus. hist.

Nasturt. aquaticum flore pleno, Eyst.

III. Nasturt. prat. parvo flore: quod 2. in Prod.

Sisymbrij aquat. alterius nomine, Matth. Lugd.

& Tab. Si flores spectes exprimere videntur.

Nasturtij siliquosi sylvatici, seu montani majoris Thalij nomine, D. Furerus.

Nasturtij pratensis congereris, D. Jungermanus Lipsian misit.

IV. Nasturt. prat. folio rotundiore, fl. majore.

Cardamine sive Sisymb. alterum Diosc. Ad. Lob.

Cardamine, Ger. secunda, Tab.

Et hæc floris colore variat, hinc

Cardamine 2. species altera florib. lacteis, Tab.

Cardamine lactea, Ger.

V. Nasturt. prat. rotundifol. minuto flore.

Sisymb. alter. seu Nasturt. aquat. 3. species, Thal.

VI. Nasturtium pratense odoratum radice granulata tuberosa.

Cardamine quinta, Dalech. Lugd.

VII. Nasturt. sylv. minus: quod 3. in Prodr.

*Nasturtium aquaticum.*

I. Nasturtium aquaticum supinum.

Sisymbrium alterum vel Cardamine, Diosc.

Nasturtium aquat. (& 2.) Trag. Lon. Dod.

Vella Galeni, Ang.

Sium & Laver, Dod. gal.

Cardaminum Sion, Ruel.

Cresso, Laver odoratum, Eri. Cordo.

Sisymbrium Cardamine, Fuch. Lugd.

Sisymbrium aquaticum, Matth. Cæs. Cast. pri-

um, Tab. & Portæ.

Sisymb. alterum, Cord. in Diosc. Gesn. hor. Thal.

Sisymbrium tertium, Lac.

Sion Cratevæ, Sisymb. 2. Diosc. & Senecio Scirapionis, Ang.

Sion Cratevæ Erucaefolium, Ad. Lob.

Sium majus, Ger.

an Nasturtio similis herba Scorbutum curans: par. 9. Ind. occid. additam.

II. Nasturt. aquatic. majus & amarum.

Sisymbrij alterius species secunda, Thal.

III. Nasturt. aquat. erectum folio longiore.

Sium, Lac. Cast. vulgare, Matth. Lugd.

Sion Matthioli & Italorum, Lob.

Hoc licet glabrum sit, tamen caule & foliorum cauliculis villosis habemus.

IV. Nasturtium aquaticum minus.

Sisymbrium aquaticum alterum vel minus, Cam. ep. Matth.

Cardamine quarta Dalech. Lugd.

Variat magnitudine & parvitate, fortè ratione loci: nam in aquaticis major est: in vinetis verò Wilensibus riguis, uti & Patavij minorem multò observavimus: sic caule erecto, & penè aphylo, in arenosis prope Wisam fluvium, reperitur.

*Nasturtium Montanum.*

I. Nasturtium montanum luteum.

Sium alterum aquaticum luteum, vel Cardamine tenuifolium montanum, Colum.

II. Nasturt. montanum luteum folijs fatis.

Nasturtium montanum minus, Thal. quid?

III. Nasturtium alpinum trifolium.

Cardamine trifolia, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Cardamine alpina 1. trifolia, Clus. pan. & hist.

IV. Nasturtium alpinum minus refedg folijs.

Hoc in Phytopinace, sub Nasturtio 8. in Prod. sub 4. descripsimus, quod aliquando altius, aliquando ad tres tantum uncias exurgit.

V. Nasturt. alpin. minus fol. in orbem sparsis.

Cardamine alpina media, Clus. pan. & hist.

VI. Nasturt. petræum folijs bursa pastoris.

Nasturt.

*Nasturtium petræum*, Tab. Ger.

VII. *Nasturtium alpinum infipidum*.

*Cardamine alpina infipida*, Colum.

VIII. *Nasturtium alpinum tenuissimè divisum*.

*Nasturtium oolum*, Gef. in epist.

*Cardamine alpina minima*, Clus. pan. & hist.

*Cardamine alpina*, Tab. Ger.

*Thlaspi montanum minimum*, Lugd.

*Cardamine pusilla saxatilis montana* *diuronædis*, Colum.

IX. *Nasturtium pumilum vernum*, quo nomine Monspelio accepimus.

Hoc rariùs palmare, frequenter unciam solum altum reperitur.

X. *Nasturtium alpinum capsulâ Nasturtii horrensis*. Hoc *Cardamidi* montani verni nomine D. Furerus misit.

In *Phytopinace* sub *Nasturtio* 9. in Prod. sub 5. descripsimus.

XI. *Nasturtium alpinum bellidis folio majus* 6. in Prod.

XII. *Nasturtium alpin. bellidis folio min.*

*Plantula Cardamines æmula*, &

*Sinapi pumilum alpinum*. Clus. pan. & hist.

Folij est modò longioribus, modò rotundioribus.

XIII. *Nasturtium Barbareæ folijs*: quod 7. in Prodr.

### *Nasturtium sylvestre.*

I. *Nasturtium sylv. Olyridis folio*.

*Bursa pastoris minor*, Brunf.

*Thlaspidij genus & Nasturt. 5. Trag.*

*Bursa pastoris* 2. & 4. Eidem.

*Thlaspi angustifol.* Fuch. Lug. minus, Dod. Ger.

*Thlaspi minus hortense vulgare*: Lob. ico.

*Thlaspi minus tenuifolium*, Lon.

*Iberis*, Tur.

*Nasturtium sylvestre*, Thal.

*Thlaspi minus Germanicum*, Tab.

Luteum est & album, & quia acerrimum ad *Nasturtium* referimus.

II. *Nasturtium sylv. tenuissimè divisum*.

*Seriphium Germanicum*, Trag.

*Nasturtium sylv.* Fuch. ico. Gef. hort.

*Seriphium absinthium*, Fuch. Lon.

*Thalietrum*, Dod. gal. Lugd.

*Thaliætrum*, Thal. (cui *Nasturt. μυρίστρον*) Tab.

*Sophia Chirurgorum*, Ad. Lob. Dod. Ger.

*Accipitrina*, Cæs.

Folio est latiore, angustiorëve, hinc

*Thaliætrum latifolium & angustifolium*, Tab.

*Sophia duplex*, Gerardo.

*Accipitrina duplex*, Cæs. alpino.

III. *Nasturtium sylvestre Erucae affine*.

*Nasturtium sylv.* Clus. hisp. & hist. Lugd.

*Eruca Nasturtio cognata tenuifolia*, Lob.

## THLASPI ET EJVS SPECIES.

**N**asturtio *Dioscorides lib. 2. c. 186.* ὁ λάπτι subjungit, quod à fructus forma, quæ veluti infractus & contusus, à ὁ λάπτι infringo, nomen accepit: ἡ ὁ λάπτιον, quasi fructum clypeatum; ἡ ὁ λάπτι ἄρσιον.

Genera duo *Dioscoridi & Plinio lib. 28. c. 13.* alterum angustis, alterum latis folijs, quod *Persicum Sinapi Cratevæ* dicatur: fortè *Raphanus rusticanus*.

### *Thlaspi arvense.*

I. *Thlaspi arvense filiquis latis*.

*Thlaspi & Thlaspidium vulgare*, &

*Bursa pastoris prima*, Trag.

*Thlaspi*, quod vulgo *Nasturt. testorum*, Ruel.

*Thlaspi latifolium*, Fuch.

*Thlaspi cardamoides*, sive *Nasturtiarium*, Cord.

*Thlaspi minus latifolium*, Lon.

*Thlaspi Dioscoridis (& Scorodathlaspi)* Dod. gal. Lugd. Ger.

*Thlaspi* 2. Matth. Lugd. majus, Tab.

*Thlaspi* 1. *Diosc. Creticum Galeni*, Ang.

*Thlaspi drabæ folio*, Ad. Lob.

*Thlaspi Dioscor. Drabæ & Chamelinæ folio*, Eidem ico.

*Thlaspi latius* Dod. *platicarpon*, Cam.

*Thlaspi*, & *Thlaspi nigrum Galeni*, Cæs.

Varietas in filiquis: aliud majoribus, aliud exilioribus reperitur.

II. *Thlaspi arvense Acetosæ folio*.

*Thlaspi majus*, Tab. Ger.

III. *Thlaspi Vaccariæ folio bursæ pastoris filiquis*: primum in Prod.

IV. *Thlaspi arvense Vaccariæ incano folio* majus.

*Thlaspi primum*, Matth. Lac. Cast. Lugd.

*Thlaspi alterum*, Dod. Lugd. 3. sive *Cratervæ*, Ang.

*Thlaspi minus*, Cord. in Diosc.

*Thlaspi vulgatissimum Vaccariæ folio*, Ad. & Lobel.

*Thlaspi vulgatiss.* Ger.

*Thlaspi verum* cujus semine in *Theriaca* utimur, Camer.

*Thlaspi officinarum*, Colum.

Folijs est aliquando leviter crenatis, aliquando ijs carer: hinc diversa authorum figura: quare apud Matthiolum posuimus *Thlaspi* 1. & *Thlaspi ferrato folio*.

V. *Thlaspi Vaccariæ incano folio minus*: quod 2. in *Prodromo*.

VI. *Thlaspi villosum capsulis hirsutis*.

In *Phytopinace*, & pro 3. in *Prodr. descrip-*timus, & in *Matthiolo nostro* sub *Thlaspi villosi* figura habetur.

VII. *Thlaspi arvense perfoliatum majus*.

*Thlaspi oleraceum*, Tab. sub *Thlaspi incano*, Ger. ico.

*Thlaspi primum Dalech.* Lugd.

*Thlaspi alterum* mitius rotundifolium bursæ pastoris fructu, Colum.

In *Phytopinace* sub 5. descripsimus.

VIII. *Thlaspi perfoliatum minus*.

*Thlaspi pumilum*, vel *Thlaspi montanum minus*, Clus. pan. & hist.

*Thlaspi minimum*, Tab. minus, Ger.

### *Thlaspi umbellatum.*

I. *Thlaspi umbellat. arvense Iberidis folio*.

*Thlaspidij aliud genus*, vel 3. *Trag.*

*Thlaspi amarum*, Tab. Ger.

*Thlaspi Allobrogicum Cretico*, par. Clus. hist.

Flores & cæruleo alboq; communiter mixti, rarius penitus albi, vel flavescentes: in *Phytopinace* sub 14. descripsimus.

II. *Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio*.

*Draba* sive *Arabis*, aut *Thlaspi Candia*, Dod. Ges. hort. Lugd.

*Thlaspi* 4. Matth. Lugd. cui & *Thlaspi* 4. *Donæi*.

*Thlaspi Cappadocicum*, Ang. flore incarnato & flore albo, Eyst.

*Thlaspi Creticum*, Gesn. hort. Cæsalp. Taber. Camer.

*Thlaspi Candia umbellatum Iberidis folio*, Ad. & Lob.

*Thlaspi Candia*, Ger.

Flore est purpureo, aliquando albo, luteo haberi ajunt & communiter in umbella, rarius in oblonga spica.

III. *Thlaspi Cretic. flore albo majus*: sive 4. in *Prod.*

IV. *Thlaspi umbell. Cretic. flore albo odoro*, minus.

*Thlaspi quartum parvum odorato flore*, Clus. hist.

*Thlaspi Cappadocici minoris annui nomine*, D. Doldius misit.

V. *Thlaspi umbell. nasturij folio Monspe-*liacum.

*Thlaspi alterum minus umbellatum Nastur-*tij hortensis folio *Narbonense*. Ad. Lobel. icon.

*Thlaspi aliud umbellatum Penæ*, Lugd. & *Nasturtium sylv. Dalechampi*, Eidem.

*Thlaspi Narbonense umbellatum*, Tab. Ger.

### *Thlaspi montanum.*

I. *Thlaspi montanum glasti folio majus*.

*Thlaspi prim. vel montanum peltatum*, Clus. pan. & hist.

*Thlaspi pannonicum*, Lobel. icon. Camerar. Tab. Gerard.

II. *Thlaspi montanum glasti folio minus*.

III. *Thlaspi alpinum bellidis cæruleæ folio*: *Thlaspi secundum* & *Badense*, Clus. pan.

*Thlaspi montanum* 2. Clus. hist.

*Thlaspi album supinum*, Lob. ico. Tab. Ger.

*Thlaspi montanum bursæ pastoris fructu primum*, Colum.

Siliquis non nihil variat, hinc apud Tab. & Ger. figuræ duæ ad Clusij & Lobelij imitationem: sic & flores aliquando in umbella, ut re- & Columna pinxit: communiter in modum spicæ dispositi.

IV. *Thlaspi montanum semper virens*.

*Thlaspi montanum candidum*, Lugd.

V. *Thlaspi saxatile rotundifolium*, quod 5. in *Prodr.*

VI. *Thlaspi alpinum majus*.

*Thlaspi tertium*, Matth. Lugd. Thal. qui ta- men diversum describit.

Ut Matthiolus pingit ex Italia habemus: verum ut in nostris alpibus provenit, ab illo planè diversum, in nostro Matthiolo & Prodromo figura exhibetur.

VII. *Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo.*

*Thlaspi tertium saxatile*, Cam. epit. Matth. & hort.

*Thlaspi petraeum myagroides*, Ponæ.

*Thlaspi saxatile minore folio*, in nostro Matth. ubi figura & descriptio: ut & sub 6. in Prod.

VIII. *Thlaspi alpinum repens*: pro 7. in Prodromo descript.

IX. *Thlaspi parvum saxatile flore rubente.* *Lithothlaspi quattum carnosum rotundo folio*, Colum.

Ex Provinciæ saxosis & hoc, & 9. & 11. à D. Bursero habemus: simile cum 11. sed folijs & thecis majoribus, ex Hispania D. Albinus attulit.

X. *Thlaspi saxatile Polygalæ folijs*: cauliculis est pedilibus, folijs polygalæ forma, sed longe minoribus: flosculis exiguis, albidis, thecis rotundis infractis, semine minutissimo in saxosis circa Monspelium.

XI. *Thlaspi saxatile vermiculato folio.* *Lithothlaspi montanum fruticosius vermiculato acuto folio*, Colum.

XII. *Thlaspi montanum incanum luteum serpilli folio majus.*

*Thlaspi supinum luteum*, Lob. ico.

XIII. *Thlaspi saxatile incanum luteum serpillio folio minus.*

*Jonthlaspi luteo flore, incanum montanum* *duaneoides*, Colum.

### *Thlaspi Alysson dictum, sive Alysson.*

I. *Thlaspi Alysson dictum campestre majus.* *Alysson*, Math. Ang. Lugd. Cam.

*Thlaspi Græcum*, Ad. & Lob. ico. Ger.

*Thlaspi Græcum polygonati folio*, Tab.

*Alyssum minimum*, Clus. pan. & hist.

Flosculis est albis, interdum luteis.

II. *Thlaspi Alysson dictum campestre minus.*

*Thlaspi* 4. Dod. gal.

*Alyssum minus Dalech.* Lugd.

*Thlaspi minus clypearum*, Tab.

*Polium alpinum flore luteo*, Eyft.

Si cum præcedenti non idem, saltem affine.

III. *Thlaspi Alysson dictum maritimum.*

*Thlaspi Narbonense centunculi angustifolio*, Ad. Lob. ico. Lugd. Tab.

*Thlaspi umbellatum Narbonense*, Ger. ico.

*Thlaspi maritimum Dalech.* Lugd.

*Thlaspi syriacum*, vel *Græcum alterum anguloso bifori pericarpio lentifolio*, Adversaria proponunt: sed quid?

### *Thlaspi clypeatum.*

I. *Thlaspi biscuratum asperum Hieracifolium & majus.*

*Thlaspi parvum hieracifolium*, sive *Lunaria lutea Monspelienisium*, Ad. Lob.

*Thlaspi clypearum*, Clus. pan. & hist.

*Thlaspi quoddam genus*, in monte S. Juliani, Cæsalp.

*Lunaria lutea Dalech.* Lugd.

*Thlaspi bisulcatum*, vel *Lunaria bisulcata*, Camer.

*Thlaspi majus clypeatum*, Ger.

*Thlaspi minus clypeatum* 1. Tab.

*Leucoium montanum* 1. Thal.

*Leucoium alissoides umbellatum montanum*, Colum.

Hoc ipsum ex Creta *Thlaspi* nomine, Honorius Belli misit, quod folijs minus asperis, sed tota planta incana est.

II. *Thlaspi biscuratum asperum minus.*

*Jondraba alissoides Apula spicata*, Colum.

Folijis est brevioribus, crassioribus incanis, totaque planta humilior: ex Hispania D. Albinus attulit: at multò minoribus, minusque asperis ex montibus Tyrolensibus habemus.

III. *Thlaspi biscuratum villosum flore calcari donato.*

*Leucoium montanum flore pedato*, Colum.

Hoc sub 8. in Prodromo describitur.

IV. *Thlaspi clypeatum serpilli folio.*

*Thlaspi alterum minus clypearum serpilli folio*, Ad. Lob. ico.

*Thlaspi minus clypeat.* Penæ, Lugd.

*Jonthlaspi minimum spicarum, lunatum*, Col.

*Lunaria Græca quarta*, Cæf.

Aliquando thecæ veluti in longam spicam dispositæ sunt, quemadmodum D. Columna misit, aliquando magis in summo compactæ, ut Monspeffuli legimus.

*Thlaspi fruticosum.*

I. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio latifolium: hoc 9. est in Prod.

Est majus circa Mafsiliam à D. Burfero: est minus pauloque angustioribus folijs, in Italia collectum.

II. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio angustifolium.

*Thlaspi fruticosum* folio Leucoij marini minoris, Lob. Lugd. Tab.

*Thlaspi* semper virens, Cam.

III. *Thlaspi fruticosum* folio thymbræ hirsuto.

*Thlaspi fruticosum* alterum, Lob. Lugd. Tab.

*Thlaspi fruticosum* minus, Ger.

*Thlaspi* 5. Hispanic. albo flore, Clus. hist.

IV. *Thlaspi fruticosum* spinosum.

*Thlaspi fruticosum* spinosum Narbonen. Lob. Lugd.

*Thlaspi spinosum* 5. Tab. Ger.

Folia habet Leucoij oblonga, incana, obtusa, ut in monte Lupi observavi: at in hortum Monspeliensem translatum, unde D. Burferus attulit, breviora & rotundiora obrinet.

V. *Thlaspi fruticosum* incanum.

*Thlaspi incanum* Mechlinense, Lob. Lugd. Clus. pan. & hist.

an *Thlaspi incanum fruticosum* Franconicum, Cam.

an Iberis prima, Tab. quod sub *Thlaspi fruticoso*, Ger. ico.

*Thlaspi exoticum.*

I. *Thlaspi repens* hederæ folio.

*Thlaspi hederaceum*, Lob. Lugd.

II. *Thlaspi Alexandrinum*.

Hoc in Phytopinace sub 12. in Prod. sub. 10. descriptum.

## B V R S A P A S T O R I S.

**T** *Thlaspi species* apud antiquos fuit, quæ nunc *Bursa pastoris*, à marsupiolis compressis (alijs *Capsella*) dicitur: quibusdam *Sanguinaria* & *Crispula*.

*Bursa pastoris folijs sinuatis.*

I. *Bursa pastoris* major folio non sinuato: in Phytopinace & Prodromo sub prima descripta.

II. *Bursa pastoris* major folio sinuato.

*Bursa pastoris* major, Brunf. Trag. Gef. hor. cui & *Thlaspi* fatuum.

*Bursa pastoris*, Matth. Lac. Lon. Corn. (cui Medica, Diosc.) Cord. in Diosc. Ad. Lon. Lob.

Thal. Cæs. (& *Thlaspi* genus antiquorum) Lugd. Cast. & herba Cancræ, Ger.

*Pastoria bursa*, Fuch. Dod. major, Tab.

Folij variat: aliquando eleganti est folio, instar Coronopi repentis.

III. *Bursa pastoris* media.

*Bursa pastoris* sexta, Trag. minor, Gef.

*Bursa pastoria* minor, Tab. minima, Ger.

IV. *Bursa pastoris* minor folijs incis: & Thal. qui alterius, folijs integris meminit.

*Pastoria bursa* minor, Dod. minima, Lob. ico.

Hæc aliquando ad duas tresve solum uncias apud Monspelienfes exurgit; aspectu ob foliorum incisuram elegantissimo, quam *Thlaspi* minus nominant.

*Bursa pastoris folijs integris loculis oblongis.*

I. *Bursa pastoris* major loculo oblongo.

*Draba minima*, muralis Dioscoridis, Colum.

*Thlaspi Veronicæ* folio, Richerio.

In Phytopinace sub 6. in Prod. sub. 2. descriptum.

II. *Bursa pastoris* minor loculo oblongo.

*Gensblum*/id est, anserum flos, Brunf.

*Paronychia alfinefolia*, Ad. Lobel. Lugdun. Camer.

*Paronychia vulgaris*, Dod. latifolia, Ger.

*Herbula bursæ pastoris* affinis, Cæs.

*Thlaspios minima* species, Thal.

*Alfine minima*, Tab.

*Pilosella siliquata minima*, Cam. ad Thal.

*Myosotis parva* Dalech. Lugd.

Folij communiter integris, rarissimè lacinatis.

III. *Bursa pastoris* alpina hirsuta: quæ 3. in Prod.

IV. *Bursæ pastoris* similis siliquosa major, seu majoribus folijs.

*Pilosella*



*Pilosella filiquata major*, Thal.

*Aizoon telephium* Dalech. Lugd.

V. *Bursæ pastoris similis filiquosa minor*, seu minoribus folijs.

*Paronychia altera myagri folio*, Gesneri, Camer.

*Pilosella filiquata minor*, Thal. & Cam. fig. hort. D.

## M Y A G R V M.

**M** *τάραξ* Diosc. l. 4. c. 117. meminit, cui *Rubia folia* tribuit: & Plinio, l. 27. c. 12. *Myagros* dicitur: verum quid sit, nunc non decernimus. Sunt qui nostrum *Myagrum*, *Erysimum* Theoph. & Galeni velint: alij *Sesamum*, ob seminis similitudinem, & olei ubertatem.

I. *Myagrum filiqua longa*.

*Viola lutea* syl. Trag.

*Myagrum alterum Thlaspi effigie*, Lob. Lugd.

*Myagrum* 2. Tab. *Erysimum* 3. Eid.

*Camelina*, Ger. *Eruca* syl. angustifolia, Eid.

Ratione folii variat, cubitalis, folijs latis, aliquando trium quatuorve unciarum angustis: & inter hæc est medium.

II. *Myagrum facivum*.

*Linaria quinta*, Trag.

*Sesamum*, Trag. Lac. Lon. *Sesamum* non est Ges. hor.

*Myagrum Dioscoridis*, Ruel. Ang. Dod. gal.

Ad. Lob. Lugd. Ger.

*Myagrum primum*, Tab.

*Pseudomyagrum*, Matth. Lugd.

*Camelina* live *Myagrion*, (& *Erysimum cereale*) Thal. Dod. Thal.

*Dorella*, Cæsalp.

Aliquibus in locis feritur olei causa, & latioribus folijs est: multis locis sponte provenit.

& hoc strigosius, hinc figurarum varietas, ut in Matthiolo nostro videre est.

III. *Myagrum sylvestre*.

*Pseudomyagrum alterum*, Cam. in Matth.

*Paronychia* 2. Tab.

Huic simile minus, quod

*Myagrum* 3. in arvis, Cam.

IV. *Myagrum foetidum*; quod 1. in Prod.

V. *Myagrum monospermon latifolium*.

*Myagrum hortense monospermon*, Eysf.

*Bricourres* nomine semen missum fuit; *Pseudoisaridem* *Alpinus* nominabat.

Hoc in *Phytopinace* sub 5. & in Matth. ubi & figura exhibetur, & sub 2. in Prod. habetur.

VI. *Myagrum monospermon minus*: 3. in Prod.

VII. *Myagro similis filiquâ rotundâ*.

In *Phytopinace* sub *Myagro* 6. in Prod. sub 4. descripta, *Thlaspi* nomine *Norinbergâ*: *Lepidij*, *Monspelio*: *Myagri Montbelgardo*, habemus.

## D R A B A.

**D** *Rabam* *ῥαβαν* Dioscorides, lib. 2. cap. 186. ipsi *Thlaspi* subjungit, unius factâ mentione.

I. *Draba umbellata*, vel *Draba major* capitulis donata.

*Arabis* live *Draba*, Matth. Ang. Ad. Lob. (& *Nasturtium Babylon*) Lugd.

*Arabis*, Lac. Lon. *Arabis* verior, Cam. *Drabe*, Matth.

*Draba vulgaris prima*, Clus. pan. & hist.

*Draba Dioscorid.* Cæs. Cast. Colum.

Folijis dentatis observavimus; sunt qui non dentatis pingant.

II. *Draba tenuifolia* velut *spicata*: 1. in Prod.

*Drabæ ferventis vernæ* nomine, *Phorenia* Doct. Agerius attulit.

III. *Draba minor* capitulis orbicularibus. *Draba minor*, Clus. hist.

IV. *Draba alba filiquosa*.

*Draba secunda*, Clus. pan. & hist.

V. *Draba alba filiquosa repens*.

*Draba altera*, Lob. ico.

*Draba* 3. succulento folio, Clus. pan. & hist.

*Arabis* seu *Draba altera*, Lob. ob. Lugd.

*Eruca muralis*, Lugd.

an *Thlaspios* generibus cognata filiquosa, Thal.

VI. *Draba Erysimi* flore & filiquis.

*Sinapi* & *Thlaspi* media Provincialis planta, Ad. Lob. ico. Lugd.

VII. *Draba lutea* siliquis strictissimis.  
*Arabis* quorundam, Cam. sp. Matth. & hor.

VIII. *Draba* flore cæruleo galeato : hæc  
 2. est in Prod.

## ALLIARIA.

**A**lliaria è quod folia digitis comminuta, *Allium* seu *Porrum* sectivum cum *Nasturtio* redoleant : quibusdam, *Thlaspidium* secundum *Cræva* : alijs *Alectorolophos* *Plinij*, lib. 25. cap. 3.

Alliaria, Trag. (cui & *Thlaspidium cornutum*) Fuch. Matth. Dod. (cui & *Pes asininus* *Pandeet.*) Lac. Ad. Lob. Cast. Lugd. Cæsalp. Thal. Lon. Tab. Cam. Ger.  
 Alliaria altera, Ama.  
 Alliastrum, Gefn. hort.

Rima marina, Euricio Cordo. Rima maria, Anguillaræ.  
*Alectorolophos* *Plinij* quibusdam, Dalech. in *Plinium*.

Folio latissimo amplissimoque & subrotundo, quandoque reperitur.

## COCHLEARIA.

**C**ochlearia, à foliorum forma modicè cava, parvum & non valde profundum cochlear referentia, dicta : quam aliqui *Telephium*, alij *Britannicam* *Plinij*, lib. 25. cap. 3. volunt, (licet forma & sapore *Thlaspi* & *Nasturtijs* affinis sit) è quod ei malo, quod *Stomacacen* & *Scelotirben* vocant (Scorbutum esse volunt) auxilio esse *Britannicam* *Plinius* scripserit.

### I. Cochlearia folio subrotundo.

Cochlearia, Dod. Gefn. hor. Lugd. Cam. epit. Matth. & hor. & par. 3. Ind. orient. navig. 3. *Telephium*, Lac.  
*Britannica*, Gefn. hor.  
*Cochlearia Batava*, Ad. & Lob.

### II. Cochlearia folio sinuato.

Cochlearia Anglica *Atriplicis* folio, Ad.  
*Cochlearia Britannica*, Ad. Lob. Dod. Lugd. Ger.

### III. Cochlearia minor erecta: quæ 1. in Prod.

IV. Cochlearia Danica repens: quæ 2. in Prod.

## SECTIO TERTIA.

## BRASSICA EJVSQVE SPECIES.

**B**rassica *Theophrasto* 1. hist. 19. inter *Ulera* est, quæ ἀπὸ τῆς βράζειν à vorando. *Dioscoridi*, lib. 2. cap. 14. καράβη, quasi κοράμβη, quod oculorum pupillas ladat, dicitur. *Theophrasto* & *ραφανον* dici, in *Raphano monimus*.

Genera : *Dioscoridi* sativa, sylvestris & maritima. At *Theoph.* 7. hist. 4. alia crispata, alia levis, alia sylvestris. *Plinius*, cum lib. 19. cap. 8. *Brassica cauliumve* tria genera ex *Catone*, cap. 157. enarrasset, plura adhuc esse refert, *Cumanam*, *Aricinam*, *Pompejanam*, *Sabellicam*, *Lacuturrem*. At lib. 20. cap. 9. Græcos in tres species divisisse scribit : *Crispam*, quam *Selinada*, à similitudine foliorum apij vocarint : alteram leam, latius folijs, quæ *Caulodes* quibusdam : tertiam propriè *Crambem* appellatum.

Recentioribus differentie sunt pro foliorum colore, crispitudine, densitate, alijsq; qualitatibus. Alijs enim color viridis, alijs candicans, alijs purpurascens. Crispitudo & levitas, tam in candida, quam in viridi, quam nigram vocant, varius in purpurea, reperitur. Summa genera sunt *Sativa*, *sylvestris* : *Sativa*, alba & rubra, &c.

*Brassica*

*Brassica capitata.*I. *Brassica capitata alba.*

*Brassica alba*, Brunfels. quæ capitata & sessilis, Cord. in Diosc.

*Brassica alba sessilis & glomerata*, Lob. ico.

*Caulis capitatus*, Trag.

*Caputium Brassicæ* 3. genus, Cumanum Plinij, Eric. Cord.

*Brassica capitata*, Matth. (& Lacuturris) Lac. Ges. hort. Lon. Tab. Lob. Cast. alba, Ger.

*Brassica alba sessilis glomerosa*, aut capitata *Laſucæ* habitus, Ad.

*Brassica capitata albida*, Dod. (cui *Tritiana*) Lugd.

*Brassicæ* 4. genus, Fuch. Tur.

*Brass. capitata* 1. genus, & *Cumana* Plin. Cæf.

Hæc candida est, quæ Lacuturris Plinij: est & viridis, quæ *Tritiana*.

II. *Brassica alba capite oblongo non penitus clauso.*

*Brassicæ albæ* 2. species, Lacuturris, Dod. gal.

*Brassica patula*, Sabauda vulgo, Ad.

*Brassica Sabauda hyberna*, Lob. ico.

*Brassica Sabauda*, Tab. Ger.

III. *Brass. ex capitibus pluribus conglobata.*

*Brassica capitata polycephalos*, Lugd.

In hac aliquando quinquaginta capita ovorum magnitudine numerantur.

IV. *Brassica capitata rubra.*

*Brassicæ rubræ* 2. species, Dod. gal. Lugd.

*Brassica convoluta & arctè occlusa rubro colore*, Ad.

*Brassica capitata rubra*, Dod. Tab. Ger.

V. *Brassica gongylodes.*

*Brassicæ albæ* 4. species, Dod. gal.

*Brassica thyrsuta*, Ges. hor.

*Caulorapa*: *Brassica peregrina*, medio caule turbinata & rapata, Ad.

*Brass. caule rapum gerens*, Dod. rapicaulis, Cam

*Brassica raposa*, Rapitius colis Catoni, Lugd.

*Caulorapum*, Matth. Scalig. Lob. ob. Cam. ep. Taber.

*Rapa Brassica peregrina*, caule rapum gerens, Lob. ico.

*Brassicæ capitata* 2. genus, Lacuturres Plinio, Cæsalp.

Variat rapo rotundiore & longiore: illa *Caulorapum rotundum*: hæc *Caulorapum longum*. Tab. & Ger.

IV. *Napopraffica*, in Prodrqmo descripta.

VII. *Brassica cauliflora.*

*Brass. Pompejana aut Cypria*, Dod. gal. Lug. Cam

*Brassica florida*, Ad. Ger.

*Brassica cauliflora*, Dod. Cam. ep.

*Brassica florida botrytis*, Lob.

*Brassicæ capitata* genus 3. Cæf.

*Brassica prolifera florida*, Tab.

An hæc Theophrasti, qui nullum aut parvum semen producere scribit?

*Brassica non capitata.*I. *Brassica alba vel viridis.*

*Brassica*, Brunf. lævis. Matth. Cæf. Cast.

*Brassicæ sativæ majoris species altera*, Trag.

*Brassica candida*, Ges. hort. lata alba, Lon.

*Brassica alba vulgaris*, Lugd.

*Brassica vulgaris*, Ad. sativa, Lob. Dod. Ger.

*Brassica prima*, Tab.

*Brassica in India*, folia semper hiantia servat, nec unquam capita proferit: part. 4. Ind. Or. c. 10.

Hæc est *Brassica lævis* Theoph. & Plinij, cui & *Caulodis*.

Hanc altitudine arbores adæquantem *Mornardes Florentiæ* vidit.

II. *Brassica rubra.*

*Brassica* 1. genus, Fuch. rubræ 1. genus, Lugd.

*Brassica Cumana sive rubra*, Dod. gal.

*Brassica prima*, Tur. vulgaris, Cord. in Diosc.

*Brassica rubra*, Ges. hort. Ad. Lon. Tab. Ger.

III. *Brassica spinosa*: hujus in *Phytopinace* & *Matthiolo* (ubi & icon) mentio fit: & in *Prod.* sub 2. describitur.

IV. *Brassicæ folia peregrina.*

*Achanaca* Theveto. & Lugd. qua in regno *Mely*, ut nos *Guajaco*, utuntur.

V. *Brassica Brasiliæ folijs Nymphææ.*

*Cajova brassicæ* genus, *Cajov-a* Leriø descript.

*Brass. cap. 12.*

*Brassica crispa.*I. *Brassica alba crispa.*

*Brassica crispa*, Matth. Lac. Ges. hort.

*Brassica alba crispa*, Lugd.

*Brassica Sabauda*, Dod.

*Brassica Sabauda crispa*, Tab. Ger.

*Brassica patula crispa Sabauda æstiva*, Lob. ico.

quibusdam Lacuturris, alijs *Sabellica* Plinij.

II. *Brassica asparagodes crispa.*

*Brassica asparagodes*, Dalech. Lugd.

*Brassica crispa prolifera*, Tab. Ger.

*Brassica epiphyllitis*.

Folia modò laciniata, modò plana & expansa: vel tota viret, vel venæ & costæ rubent: hinc prolifera, & prolifera crispa, Tab. & Ger.

III. *Brassica fimbriata.*

*Brassicæ* 2. genus, Fuch.

*Brassica Sabellica* sive crispa, Dod. gal.

*Brassica crispa*, Dod. Lugd.

*Brassica nigra*, Dod. Lugd.

*Brassica nigra crispissima*, Cæf.

*Brassica fimbriata*, Lob. tophosa, Tab. Ger.

IV. *Brassica fimbriata pumila.*

*Brassica Anglica*, minima, Ad.

Tota nivea, oris fimbriatis purpureis, maculis aspersis.

*Brassica Apij folio.*

I. *Brassica lato Apij folio.*

*Brassica folijs laciniatis*, Matth.

*Brassica tenuifolia laciniata* (prior,) Lob. Lug.

*Brassica Selinisia latifolia*, Tab. Selinisia, Ger.

II. *Brassica angusto apij folio.*

*Selinada & Apiana*, Plinio.

*Brassica crispa seu Apiana*, Trag. Lon. Lugd.

*Brassicæ rubræ* 3. species, Dod. gal. Lugd.

*Brassica Selinoides*, Dod. *Selinisia angustifolia*, Tab.

*Brassica Selinoides*, Ger. scissis folijs, Cæf.

*Brassica Apiana crispa*, Cam.

*Brassica sylvestris.*

I. *Brassica arvensis.*

*Brassica syl.* Trag. *Crambe dicta*, Dod. Tab.

*Brassica* 3. Fuch. Lugdun. 5. species, Dod. gal. 1. Tur.

II. *Brassica sylvest.* Dioscoridis, Dod. Port.

*Brassica sylvestris*, Ang. Matth. Lugd. Cæf.

*Subhirsuta* alijs, alijs lævis, alijs *Hyoscyami* modo *hirsuta*, Matth. Amat.

III. *Brassica maritima monospermos.*

*Brassica sylvestris*, Tur.

*Brassica marina monospermos*, Lob. ico. sylv. multiflora, monospermos, Ad. Lob. ico. Lugdun. Ger.

*Brassica marina Anglica*, Ger. ico.

*Brassica Anglica*, Tab.

IV. *Brassica campestris perfoliata flore albo.*

*Perfoliata*, Lon. altera, Trag.

*Perfoliata siliquosa sive major* Tragi, Cam.

*Brassica agrestis*, Cord. hist. Lugd. cui altera species.

*Perfoliata minor*, Ges. hort.

*Brassica campestris* 1. Clus. hisp. & hist. Cast. Lugd.

*Brassica sylv. sive campestris*, Cam.

an *Brassica sylv. folio betæ*, Thal.

*Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa*, Lobel. icon.

*Perfoliata siliquosa*, Ad. Lob. ob. Ger. *Napifolia*, Tab.

*Brassica sylv. perfoliata*, Dod.

V. *Brassica campestris perfoliata flore purpureo.*

*Brassica campestris altera*, Clus. hisp. & hist.

VI. *Brassica syl. latifolia folijs non sinuosis.*

*Brassica sylv. major latifolia*, Thal.

VII. *Brassica sylv. ramosa glabra.*

*Brassica sylv. virgata*, Cord. hist.

*Brassica sylv. procera*, Thal.

*Brassica sylv. prima Cordi*, Lugd.

VIII. *Brassica sylvestris folijs circa radicem cichoraceis.*

*Sinapi album*, Lugd.

*Brassica sylvest. longifolia*, Thal.

IX. *Brassica sylvestris hispida non ramosa.*

*Turritis*, Lob. ico. Tab. Ger.

*Turrita vulgatio*, Clus. hist.

*Vaccaria*, Taber.

X. *Brassica sylv. ramosa hispida.*

*Turrita rarior*, Clus. hist.

XI. *Brassica syl. folijs membranaceis: sylvestrem mediam, & sylv. minorem Thalius habet, quas non novi.*

XII. *Brassica sylvest. alpina: quæ sub 3. in Prod. describitur.*

*Turritis alpinae nomine D. Burserus misit.*





## SECTIO QUARTA.

ISATIS SIVE GLASTUM: LAPATHVM: ACETOSA: SPINACHIA: RHA:  
CENTAURIUM MAJUS.

## ISATIS SIVE GLASTVM.

**I**Σάτις *sativa* (Dioscoridi l.2.c.215.) *folia habet plantaginis sylvestris, lactuca similia: quare genera duo fecit: & Plinio l.20.c.7. lactuca spontanea tertium genus, quod Isatim vocant: & quartum quod Glastum vocitant, folijs priori simile aut laphato sylvestri.*

I. Isatis *sativa* vel *latifolia*.

Isatis domestica, sive Glastum, Matth. Cast.

Isatis *sativa*, Trag. Fuch. Dod. ut. Cord. in Diosc.

(cui & Latinorum Lutea & Glastum) Ges. hor.

Lac. Lon.

Glastum *sativum*, Tur. Ad. Lob. Cam.

Glastum, vulgo Guadum, Cæs. cui & Isatis syl.

Dioscorid.

Isatis Græcorum, Nil Avicennæ, Indicum officinarum, Fragofo, & Aniraliud.

II. Isatis *sylvestris* vel *angustifolia*.

Isatis syl. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. Ges. hort.

Lac. Lon. Lob. Lugd. Tab.

Glastum, sive Isatis *sylvestris*, Ad.

Isatis *agrestis*, Cord. in Diosc.

Glastum syl. Tur. Cam.

III. Isatis *Indica* folijs *Rorismatini*, Glasto affinis.

Anil herba folijs *Mungiriqua* (ocymo Clusi-  
us vertit) similibus, Garziæ & Acostræ: cum

Isatide multum convenire, addit Clus. & Nil  
apud Avicennam, interpres Glastum vertit.

Nil sive Anil, Cam.

Annil sive Indigo, Gali sive Nil, herba roris-  
marini facie, Linsc. 4. par. Ind. Or. 25.

Herba anil sive Enger, 4. per. ind. Or.

Planta ex qua Annil sive Indigo conficitur, par.  
9. Ind. Occid. l. 4. c. 23.

Agmir, Fragofo.

Pastellus herba ad colorandas lanas expetita,  
& cujus venditione in Insulis Azores victum  
comparant: Linscot. par. 3. Ind. Or. 6.

Indigo in Sian crescit maxima copia: par. 8.  
Ind. Or.

Color Indicus quem in Cambaja Anil vocant  
par. 2. Ind. Or. 11.

IV. Isatis *montana*.

Glastum montan. Dalechamp. Lugd. quid est?

V. Wassevvovvr herba quam decoquunt pro  
rubri coloris tinctura in Virginea.

## RAPATHVM ET EJVS SPECIES.

**L**apathum à Theoph. i. hist. 9. inter oleranumeratur: & 7. hist. 2. *sylvestris* tota forma cum  
perfectum est, Beta proximum cernitur. Λάπαθον Diosc. l. 2. c. 140. ab effectu nominatur,  
à λαπάθην exinaniendo, quod foliorum decoctum alvum emolliat, & exinaniat: Latinis Ru-  
mex, ut Plinio l. 19. c. 21. qui Lapatho *sativo* & l. 20. c. 21. Oxalidi tribuit.

Genera quinque Dioscoridi, ὀξυλάπαθον, κυπαθίον, ἀρχειον, ἐξαλίδα & ὑπολάπαθον,  
Theophr. 7. hist. 6. in *sylvestrem* & *urbanam* partitur. Plinius lib. 20. cap. 21. meminit *sativi*,  
*sylvestris*, quod Oxalidem vocat. Oxylapathi, Hydrolapathi, Hippolapathi, & Bulapathi. Lu-  
bet ab Acetosa ordiri.

## A C E T O S A.

I. *Acetosa pratensis.*

*Cypathum* 4. *Diosc. sylvestre*, *Plinio.*

*Oxyllapathum*, *Gil. Manardo.*

*Oxalis* five *Rumex* proprie, *Hermolao.*

*Rumex acetosus*, *Ruel.*

*Acetosa* *Brunf. Lon. major*, *Cast. Colum.*

*Oxalis*, *Trag. Matth. Lac. Fuch. Dod. Amat. Ad.*

(& *Lapathum oxalida*) *Lobel. Cæs. Tab. Ger.*

*Porte major*, *Thal. Lugd.*

*Rumicis* 4. genus, *Tur. Cord. in Diosc.*

*Lapathi* alia species, *ὄξυλλος* dicta quibusdam

*Lapathum acutum*, *Ang.*

*Lapath minimum*, *Oxalis* dicta major, *Gef. hor.*

*Acetosa major altera*, herba *S.* quibusdam, *Ren.*

Hujus folia aliquando media parte virent, altera verò candida sunt: aliquando in imo utrinque

bifurcata: nonnunquam folia crispantur, & hæc

*Oxalis crispa*, *Tab. & Ger.*

II. *Acetosa montana maxima.*

*Oxalis major Brokenbergensis*, *Thal.*

an *Oxalis altera*, *Cæs.*

III. *Acetosa montana geniculis nodosis.*

*Oxalis amplissimo folio*, *Clus. pan.*

*Oxalis montana maxima*, *Eid. hist.*

IV. *Acetosa montana bulbosa.*

*Acetosa quarra*, *Colum.*

V. *Acetosa ruberosa radice.*

*Oxalis tuber.* *Lob. Dod. Lugd. Tab. Ger. Cam.*

an *Acetosa altera minor bulbosa radice*, *Colum.*

VI. *Acetosa Americana, folijs longissimis*

*pediculis donatis: hæc 1. in Prod.*

*Acetosa vesicaria peregrina*, *Eyst.*

VII. *Acetosa calthæ folio peregrina.*

*Oxalis Zarynthi*, *Alpino.*

VIII. *Acetosa rotundifolia hortensis.*

an *Lapathum tertium*, *Diosc.*

*Oxalis Romana* & *Veterum*, *Dod. gal.*

*Oxalis rotundioribus folijs*, *Gef. hort. rotundifolia*, *Dod. rotunda*, *Lugd. Tab.*

*Oxalis sativa Franca rotundif. repens*, *Ad. Lob.*

*Oxalis Franca seu Romana*, *Ger.*

*Oxalis tertia*, *Cæs.*

*Acetosa rotundis folijs*, *Cam. qui &*

*Acetosa Hispan. grandissimis folijs meminit.*

*Acetosa major quæ & repens*, *Renod.*

Ludit folijs, communiter subrotundis, rarius ad formam foliorum Boni Henrici oblongis

& in acutum desinentibus.

IX. *Acetosa rotundif. alpina: quæ 2. in Prod.*

X. *Acetosa scutata repens: hæc 3. in Prod.*

XI. *Acetosa Cretica semine aculeato.*

Hæc in *Phytopinace* sub 10. in *Prodr. sub 4. descripta*, & *March. una cum figura adposita.*

XII. *Acetosa O. mi folio Neapolitana.*

*Acetosa tertia*, vel *Acetosa ocimi folio Neapolitana* *βουεραλίσσος*, *Colum.*

Hanc *D. Columna* misit.

XIII. *Acetosa arvensis lanceolata.*

*Oxalis minima* *Trag. (& Lapatiolum)* *Dod.*

*Oxalis minor*, *Matth. Gef. hort. Lugd.*

*Oxalis tenuifolia sinuata vervecina*, *Ad. Lob.*

*Acetofella*, *Lon.*

*Acetosa minor*, *Cast.*

*Rumicis* seu *Lapathi* 6. genus, *Cord. in Diosc.*

*Oxalis spontè nascens*, *Cæs.*

*Oxalis ovina*, *Tab. tenuifolia*, *Ger.*

*Acetosa syl. omnium minima*, *Renod.*

Ratione loci pinguioris aridiorisve, major minorve, latioribus angustioribusve folijs reperitur.

XIV. *Acetosa lanceolata angustifolia repens: hæc 4. in Prod.*

Hujus species minor videtur, quæ dicitur

*Oxalis minima 1. Tab. minor*, *Ger.*

XV. *Acetosa arvensis minima non lanceolata.*

*Oxalis minima 2. Tab. minima*, *Ger.*

XVI. *Acetosa folijs similis villosa.*

Herba *Joh. infantis*, *Monard. Lugd. Frag. Cast.*

## L A P A T H U M.

*Lapathum hortense.*

I. *Lapathum hortense folio oblongo, five secundum Diosco. idis.*

*Rumex hort. vel 2. Trag. sativus*, *Cord. in Diosc.*

*Lapathum hortense*, *Gef. hort. Lugd.*

*Lapathum sativum*, *Ang. Dod. descr.*

*Hippolapathum* (y) *Matth. edit. prima*, *Lugd.*

II. *Lapath. hort. seu Spinacia semine spinoso.*

*Spinachia* *Manardo*, & *Atriplicis* forte genus,

*Bras. Brunf. Fuch. Dod. Tab.*

*Spinacia*, *Hermol. Matth. Ad. Lob. Cæs. Ger.*

*mas*, *Cam.*

*Spinachia*, *Atriplex Hispaniensis* *Ruellio*, &

*Seutlomalachon*, *Lon. Cast.*

*Spinachium*, *Matth.*

*Spinacia sativa mas*, *Lugd.*

*Olus Hispanicum Spinachia vulgaris*, *Trag.*

*Spinaceum olus*, & *Spinachia mas*, *Gef. hort.*

*Spinachia*, ob semina dura & spinosa, Græcis

recen-

recentioribus *σπανύχια* à raritate in usu Medico. alijs Seutolapathum, hoc est, mediæ naturæ inter Betam & Lapathum: alijs Seutlomalache.

III. Lapathum hortense seu Spinacia semine non spinoso.

Spinachia nobilis & 1. Trag.

Spinachia sylvestris, Lugd.

an Spinachia sylvestris, Cæsalp.

Hujus figuram in Matthiolo exhibemus.

IV. Lapathum hortense seu Spinacia sterilis.

Spinachia tertia, Trag.

Spinachia fœmina, Ruel. Scalig. Lugd. Cam.

*Lapathum syl.*

I. Lapathum folio acuto plano.

Oxylapathum, Diosc. & Plinij.

Lapathum acutum, Lob. Ger. desc.

Lapathum acutum, Trag. sive acutifolium, Ad.

Oxylapathum, Herm. Corn. Amato, Ruel. Fuch.

Dod. gal. Matth. Lac. Cast. Lugd. Portæ.

Rumicis 1. genus, Tur.

Rumex & Lapathum sylv. Bras. acutus, Cord. in Diosc.

Lapathum syl. Gesl. hort. Dod. sativum, Cam.

Lapathum seu Rumex, Matth. ico. Lon. Cæsalp.

Hippolapathum syl. Tab. videtur.

Hydrolapathum magnum, Ger. ico.

II. Lapathum folio acuto crispo.

Lapathum acutum crispum, Tab.

Hydrolapathum minus, Ger. ico.

Rumex minor, Thal.

III. Lapathum folio acuto rubente.

Lapathi tertij altera (pecies, sive Lapathum nigrum, Dod. gal.

Rumicis species folijs rubentibus venis distinctis, Cord. ob.

Sanguis draconis herba, Gesl. hort. Lon.

Lapathum sanguineum, Ad. Lob. Cam. Ger. sine icone seu maculatum Renod. rubens, sive nigrum, Dod.

Lapathum rubrum, Cam. in Matth.

Lapathi syl. 3. genus, Lugd.

Folijs paulo latioribus, rotundioribusque vulgari scribit Cæsalpinus,

Lapathum rubrum Cretense, nominans.

IV. Lapathum folio acuto flore aureo.

Lapathi syl. 4. genus, Dalech. Lugd.

V. Lapathum minimum.

Lapathum acutum minimum, Lob. ico. Ger.

Lapathum minimum, Tab.

VI. Lapathum unctuosum, folio triangulo. Bonus Henricus, Brunf. Trag. cui & Spinachia sylvestris, Matth. Tab. Ger.

Rumicis 2. genus, Tur. 3. genus, Trag. Fuch.

Atriplicis syl. species, Gesl. col.

Atriplex canina, Lon. ico.

Tota bona Spinaciæ facie, Ad.

Tota bona, Lob. Dod. (quibusdam Chrysolachanum) Thal.

Lapathi syl. secundum genus, Lugd.

Piger Henricus spinaceum olus syl. Renod.

Folijs maximis Aaronis instar aliquando reperitur.

VII. Lapathum folio minus acuto.

Lapathi 3 species, Dod. gal.

Lapathum syl. Ang.

Rumex agrestis, Cord. in Diosc.

Lapathum folio retuso, Ad.

Lapathum folio minus acuto, Lob. ico.

*Lapathum hortense sive Theophrasti.*

I. Lapathum hortense latifolium.

Hippolapathum Dioscoridi, Galeno, Plinio,

& Rumex urbana, Theoph.

Rhabarbarum, Brunf.

Rhabarbarum in hortis Germaniæ, Corn.

Rhabarbarum Monachorum (Franciscanorum) Trag. Gesl. hor. Cam. Portæ, Thal.

Hippolapathum, sive Rhabarbar. Monachorum, Ang. Gesl. (aut ejus species) Dod.

Hippolapathum, & Hippolap. hortense Matthiolo: sativum, Cast. Tab.

Hippolapathum longifolium Alp. sativum latifolium, Ad. Lob. (& Patientia vulgi) Lugd.

cui & Hippolapathum hortense, Matthiolo: & Lob. figura.

Rumicis 2. genus, Fuch. 3. genus, Tur.

Lapathum sativum, Dod. gal. hort. Lac. Lon.

maximum, Gesl. hort. magnum, & Hippolapathum, Cæf.

Lapathum latifolium, Cam. Hippolapathum

veterum Bulapathum, Scalig.

Lapathi species, Cord. in Diosc.

Rumex major, idem cum Rhab. nisi quod sit sylvestrior, Thal.

II. Lapathum hortense rotundifolium sive montanum.

Lapathum rotundum, Ang. an Lapathum folijs fere rotundis, Gesl. hort.

Lapathum rotundifolium, Clusio pan. Cam.



Hippolapathum rotundifolium, & Pseudo-Rharecentiorum, Ad. Lob. Lugd.  
 Lapathum montanum, Cæf.  
 Rumex latifolius, Clus. hist.  
 Rhabarbarum Monachorum triplex vidi 1. folio oblongo, radice longa, fibris oblongis, intrinsecus rufescente: 2. folio rotundo: 3. folio subrotundo, fibris transvers. radice intus flava.

*Lapathum aquaticum.*

I. Lapathum aquaticum folio cubitali.  
 Rumex palustris, Trag. aquaticus, Thal.  
 Rumicis 5. genus, Cord. in Diosc.  
 Lapathum 1. Ang. palustre, Tab. sub Lapatho acuto, Ger. ico.

Hippolapathum, sive Lapathum 4. loco descriptum, Dod. gal. Matth. Gesf. hor. Lon.  
 Hippolapathum sylv. March. desc. Cast. Thal. cui & Hydrolapathum.  
 Hydrolapathum magnum sive aquaticum, Ad.  
 Hydrolapathum majus, Lob. Lugd.  
 Lapathum sativum, Dod. ico. qui in descriptione confundit, Hippolapathum & Hydrolapathum.

II. Lapathum aquaticum minus.  
 Hydrolapathum minus, Lob. Lugd. Tab.  
 Hippolapathum sativum, Ger. ico.

III. Lapathum maritimum foetidum: hoc in Prodro-mo describitur.

R H A E T E J V S S P E C I E S.

**C**um Hippolapathi utriusque radix, pro Rhabarbaro, sed in dupla, triplave dosi usurpetur, nunc de Rhabarbaro dein Rhapontico, quod quibusdam ex Lapathi generibus: tum de Centaurio magno, cum id vulgò Rhaponticum & nominetur, & pro eo vendatur, & ei aliqui Hippolapathi rotundi folij radicem substituant.

Rhabarbarum, Dioscoridi, lib. 3. cap. 2. Ρῥα & ῥηόν: Rha, & Rheum, cujus tantum radicem describit, dictum volunt. Romanis, Rhaponticum appellatum: Arabibus, Raved & Rhabarbarum: cujus tria genera Mesueo 2. med. purg. 5. Indicum quod optimum & Rhavedseni vocant: alterum Barbarum: tertium Turcicum, quod deterius, in quo genere Rhaponticum fuerit, quale est Rhabarbarum acerbum officinarum, colore minus vario, minus croceo, minus odorato, minus densum, ac facultate minus solvente. Verùm videtur Dioscorides suo Rha, non Rhabarbarum nostrum, cujus Mesues meminit, sed Rhaponticum, cujus iconem Lobelius proposuit, intelligere.

I. Rhabarbarum Officinarum.

Rhabarbarum nostrum, sive Raved Seni Arabum: idem genere cum Dioscoridis Rhapontico, tantum loco differens, Cord. in Diosc.  
 Rhabarbarum seu Indicum, Cord. hist.  
 Rhabarbarum & Rhaponticum idem, nisi quod hoc immaturum sit. Ang.  
 Reobarbarum, Lac.  
 Rhabarbarum cholagoga, Ad.  
 Rhabarbarum Garziæ, Acoftæ, Frag. Lob.  
 Rhabarbarum tertium, Tab. secundum, Ger.  
 Rhabarbarum Americanum, Monar.  
 Rheon offic. Dod.  
 Rhabarbari 2. nomine, aliam cum folijs & radice pingit Tab. sub Hippolapatho rotundifolio apud Ger.  
 Rhabarbaricum verum, Lapathorum generis videtur, Gesf. hort.

Rhabarbaricum, Cord. hist.

Rhabarbarum, nullibi, nisi in China provenit, quæ inde per Usbeken in Turciam, hinc Venetias deferretur; & quidem vel navibus, quod citius corrumpitur, vel itinere terrestri, quod durabilius & carius, Linsc. par. 4. Ind. orient. 29. quæ forte ex Pauli Veneti, lib. 2. desumta.

II. Rhabarbarum Matthiolus pingit, quem sequuntur, Lon. Lugd. Cast. Tab. & Ger. an idem sit cum superiore, cum Rhabarbari nec folia, nec flores visa sint, ignoramus: meminit quoque Alpinus Rhabarbari, quod habeat folia Rumice latiora, crassiora, & lanugine alba obsita, Cam. suo Matthiolo radicis fragmenta addit.

III. Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro, Rha & Rheum Dioscoridis.

Ponti-

Ponticum Rha antiquorum, Ad. Lob.  
 an Rhapontica, Lon. Rhaponticum verum  
 offic. Tab.  
 Rha Græcis cognitum Monardi.  
 Rhaponticum liccatum, Ger.  
 Rhaponticum Thracicum, Alpino.  
 an Rhaponticum, vetusto Codice, Tab.  
 an Rheum antiquis appellatum, Cæs.  
 I V. Rhaponticum folio Helenij incano.  
 Rha, Rhecoma & Rhacoma Plinij, Dod. gal.

Rhaponticum, Lac. Cast.  
 Centaurium majus montanum folijs Enulæ,  
 forte, Gefn. hort.  
 Rha capitatum folio Enulæ Centaurij majoris  
 facie, Ad. Lob.  
 Rha five Rhei, ut existimatur icon, Dod.  
 Rhapontici icon alia, Tab.  
 Rha capitatum, Ger. Helenij folio, Lugd.  
 V. Rhaponticum angustifolium incanum.  
 Rhaponticum alt. angustiore folio, Lob. Lugd.

## CENTAURIUM MAJUS.

**C**entaurei majoris Dioscoridis, lib. 3. cap. 8. & Plinius, lib. 25. cap. 4. & 6. Item, l. 26. c. 15.  
 & alibi meminere, Theophrastus 1. hist. 19. ubi Fel terra Gaza reddit, ut & 9. hist. 14. at  
 3. hist. 5. Centaurium verum.

I. Centaurium majus folio in lacinias plu-  
 res diviso.

Rhapontica, quæ hodie Centaurea major,  
 Trag. Er. Cord.

Centaurium majus, Ang. Tur. Lac. Ad. Lon.  
 Lob.

Centaurium majus alterum, Gefn. hort.

Centaurium magnum, Marth. Dod. Cast.

Centaurium majus, Rhaponticum Pharma.  
 Cord. in Diosc. & hist. Cam. Tab.

Centaurea major, Cæs. alp.

Centaurium majus 1. vulgare, Clus. hist.

II. Centaurium majus folio non dissecto.

Centaurium majus alterum, Clus. hisp. & hist.

Dod. Ad. Lob. Lugd.

Rheu Baldense quonondam Ponæ.

III. Centaurium Alpinum luteum.

In Phytopinae sub 3 & in Prodrom. descrip-  
 timus, & postmodum Rhapontici Lusitanici  
 nomine, ex horto Patavino accepimus.



## SECTIO QUINTA.

BETA: BLITVM: ATRIPLEX: HALI-  
 MVS: AMARANTHVS: PARIETARIA:  
 MERCVRIALIS: PHYLLON.

## BETA ET EJVS SPECIES.

**B**etam Dioscorides, l. 2. c. 149. πύτλον nominat, dicitur & πύτλον ab impulsu, quod facili  
 excreseat: Beta verò, quoniam figuram literæ B dum semine turgere referre videatur.

Genera: Dioscorides nigram & candidam fecit: & Theoph. 7. hist. 4. candida sapore  
 nigra præstantior, quæ Sicula (nunc Cicla Prædictus) appellatur: at 6. hist. 3. & sylvestris  
 in genere Carduorum meminit, quæ tamen folia aculeata non habeat. Plinius, lib. 19. cap. 8.  
 ex Theoph. Beta à colore duo genera Græci faciunt, nigrum & candidius, quod præferunt  
 appellantq; Siculum: nostri (subjungit) Beta genera faciunt Vernalis & Autumnale. Idem,  
 lib. 20. cap. 8. Candidæ nigræq; usum proponit, & sylvestrem, quam Limonium vocant,  
 addit, quam Dioscorides, lib. 4. cap. 16. λειμώνιον nominat.

*Beta minor.*

I. Beta communis sive viridis.  
Beta agrestis, Trag.

Eandem cum Beta sequenti qui volet, dicat.

II. Beta alba vel pallescens, quæ Cicla offic.  
Beta, Brunf. Tab. Ger. candida, Trag. Fuch.  
Tur. Cord. in Diosc. Dod. Lac. Lugd.

Beta alba, Matth. Anguil. Gef. hort. Lon. Ad.  
Lob. Cast. Cam.

Beta folio brevior & viridior, Cæf.

Variat foliorum colore, viridi, vel ex obscuro magis virente, quam nigram vocant etiam Advers. & Lob. in obser.

III. Beta rubra vulgaris.

Beta rubra, Brunf. Trag. Lon. Dod.

Beta nigra, Ang. Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. Gef. hort. (& rubra) Cast. Lugd.

Beta rubra vulgarior, Ad. Lob. Lugd.

IV. Beta rubra radice rapæ.

Beta rubra, Matthiol. Gefn. hort. (cui & Scutostaphylinum) Ad. Lob. Cast. Lugd. rubra

Romana, Dod.

Rapum rubrum, Fuch. Gef. hort.

Rapum sativum rubrum, Fuch. ico.

Beta nigra, Cord. in Dioscor. nigra Roman. Dod. gal.

Betæ species 3. Ang. Cæsalp.

Beta erythrorrhizos, Lugd.

V. Beta Cretica semine aculeato.

In Phytopinace sub 6. & Matthiolo & Prodr. (addita figura) descripsimus.

VI. Beta laro caule.

Beta *πλωύναυλος*, Dalech. Lugd.

VII. Beta syl. maritima.

Beta syl. spontanea marina, Lob. ob.

*Beta major folijs latissimis.*

I. Beta pallide virens major.

Beta altera, Cæsalp.

II. Beta rubra major.

III. Beta lutea major.

Beta flava, Gefn. hort. lutea, Cam.

Beta quarta radice buxæ, Cæsalp.

## BLITVM ET EJVS SPECIES.

**B**λίτον Dioscoridi, lib. 2. cap. 143. quasi βλήτον abijciendum, vel propter inertiam & vilitatem, vel ob insulsum sativumve saporem. Festus, à βλάξ pisce omnino inutili, deducit: licet & stolidum & insulsum significet: Blitum, Plinio, lib. 2. cap. 22.

Genera Theoph. 1. hist. 9. plura dixit, at nec Dioscorides, nec Plinius, differentias proposuere. Aliud majus est, aliud minus: utrumque album & rubrum.

I. Blitum album majus.

Blitum album, Matth. Cast. majus, Dod.

Blitum majus album, Dodon. gal. Ad. Lobel Lugd.

Blitum, Lac. sativum album, Gefn. hort.

II. Blitum album minus.

Blitum, Trag. ico. Fuch. Tur. Dod. gal. Lon.

Blitum minus, Dod. minus album, Ad.

Blitum sylv. album, Gefn. hort. sylv. minus, Thal.

III. Blitum polyspermon à seminis copia.

Blitum 3. Trag. syl. Cam. in Matth.

Polysporon Calsiani, Anguil. Lugd. Lobel. observ.

Polyspermon, Lob. icon. Tab.

Atriplex sylv. sive Polyspermon, Ger.

IV. Blitum rubrum majus.

Blitum rubrum, Matth. Ad. Lob. ico. Camer. Cæsalp.

Blitum rubens, Dod. majus rubrum, Dod. gal. hortense rubrum, Gefn. hort.

Blitum rubrum minus, Matth. in ico. Lugd.

Blitum nigrum, Ang.

Blitum. Lob. ob. Tab. Ger.

V. Blitum rubrum minus.

an Sanguinaria, Brunf.

Blitum nigrum, Trag. minus rubrum, Dod. gal.

Blitum sylv. rubrum, Gefn.

Blitum rubrum minus, Ad. rubrum supinum, Lob. ico.

Blitum alterum sylv. Cæsalp.

Hoc vel caule tantum, vel omnibus partibus rubet.

## A T R I P L E X E T E J V S.

## Species.

**A** τράφαξις, παρὰ τὸ ἀθρόως αὐγεῖν, *cum octavo die à saturo prodeat*, Theoph. 7. hist. 1. χρυσοπαχανον, *olus aureus, à luteo flore, quem fert*, Diosc. lib. 2. cap. 145.

Genera duo Diosc. & Plinio, lib. & cap. 22. sylvestri & sativum. Dividimus in hortensem, sylvestrem & maritimam.

*Atriplex hortensis.*

I. *Atriplex hort. alba sive pallidè virens.*  
*Atriplex sativa*, Trag. Dodon. gal. Lac. Ad Lugd.

*Atriplex sativa alba*, Lob. ico.

*Atriplex*, Matth. ico. Cæsalp. hortensis, Fuch. Cast.

*Atriplex domestica*, Ang. Matth. fol

*Atriplex alba*, Gesn. hort. *sativa viridis*, Cord in Diosc.

*Atriplex alba viridis*, Lon.

Folio est in luteum languescente, vel pallidè virente: est & nigricante.

II. *Atriplex hortensis rubra.*

*Atriplex sativa folio rubicundo*, Trag.

*Atriplex rufo folio*, Cord. in Diosc.

*Atriplex sativa altera*, Dod. gal. Lugd.

*Atriplex hortensis*, Dod. hortensis rubra, Lon.

*Atriplex sativa*, Lob. ob. *sativa altera folio & flore purpureo livens*, Ad. Lob. ico.

*Atriplex rubra*, Tab. sub *sativa alba*, Ger. ico.

*Atriplex purpurea grandis*, Cam.

*Atriplex sylvestris.*

I. *Atriplex sylv. folio sinuato candicante.*

*Atriplex sylv. 2.* Matth. Lugd.

*Atriplex sylv.* Ang. Cord. in Diosc. Gesn. col. Cæ. Tab. sub *Atrip. marina*, Ger. ico.

*Atriplex sylv. sinuata*, Ad. vulgarior *sinuata*, Lobel.

*Atriplex fimetaria major*, Thal.

II. *Atriplex sylv. altera.*

*Atriplex agrestis*, Trag. sylv. prima, Matth. edit. 2. Lugd.

*Atriplex sylv.* Fuch. Dod. Lon.

*Atriplex fimetaria minor*, Thal.

*Cynocrambe 1.* Cæsalp.

III. *Atriplex sylv. latifolia.*

*Blitum 4.* & *Solanum 4.* Trag.

*Atriplex sylv. 3.* Matth. Lugd.

*Atriplex sylv. sive Pes anserinus latifolia*, laceris lacinijs, Ad. Lob.

*Pes anserinus*, Fuch. Dod. Lon. Lugd. Cam.

*Cynocrambe alterum genus*, Cæsalp.

*Chenopodium 1.* Tab.

IV. *Atriplex sylv. latifolia acutiore folio.*

*Blitum 5.* & *Arriplicis sylv. genus*, Trag.

*Bliti species*, Lon.

*Chenopodium 2.* Tab. sub *Atriplice sativa purpurea*, Ger. ico.

V. *Atriplex sylv. fructu compresso roseo: hæc 1.* est in Prod.

VI. *Atriplex sylv. mori fructu.*

*Atriplex sylv. baccifera*, Clus. hist.

VII. *Atriplex sylv. lappulas habens.*

Hæc in Phytopinace sub 8. & in Prod. sub 2. descripta, in Matthiolo quoque nostro depicta. In monte Ventoso Galliæ Narbonensis, major existit.

VIII. *Atriplex fœtida.*

*Atriplex canina* & *Blitum fœtidum*, Trag.

*Tragium Germanicum*, Dod. gal.

*Garosmum*, Cord. hist. Dod.

*Atriplex sylv. altera*, Gesn. hort.

*Atriplex pusilla. olida, hircina*, Ad.

*Atriplex olida* Lob. Ger. canina, Lon.

*Vulvaria*, Cast. Tab. Lugd.

*Cynocrambe affinis*, Connina vulgo, Cæf.

IX. *Atriplex angusto oblongo folio.*

*Atriplex sylv. altera*, Dod. gal.

*Atriplex sylv. 1.* Matth. & 2. Lugd.

*Atriplex sylv. polygoni aut Helxines folio*, Ad. Lob. Cam.

*Atriplex sylv. humilime*, Dod.

*Atriplex sylv. 3.* Cam. in Matth.

Folij est oblongis angustis non sinuatis, rarius foliorum principio alis duabus appofitis.

X. *Atriplex Virginiana.*

*Atriplicis genus*, ex cuj. semine pulicula fit, ex caulis cineribus Sal, quo ad saliendo cibos utuntur: in desc. Virginæ, vel Ind. occid. par. 1.

*Atriplex*

*Atriplex maritima.*

I. *Atriplex maritima laciniata.*  
*Atriplex marina*, Matth. Cast. Dod. Lugd. Cam.  
*Atriplex marina repens*, lutea & xerampelina, Ad.  
*Atriplex marina repens*, Lob.

*Cynocrambe* 3, genus, Cæs.  
 Reperitur rubro & etiam herbaceo semine.  
 II. *Atriplex halimi folio.*  
*Atriplex halimoides*, Lob. ob.  
 III. *Atriplex maritima angustifolia*: hæc 3, in Prodromo.

## H A L I M V S.

**A** *ἄλμυρος* Dioscoridi l. 1. c. 121. id est, *marinus*, eò quòd in maritimis proveniat: vel rectius, ut Plinius l. 8. cap. 22. *Oculus maritimum salsum*, & inde nomen, nam & alibi quam in maritimis provenit: quòd verò Plinius sine aspiratione legat, fortè factum quia Solinus, *Alimon* in Creta nasci prodidit, mirabili effectu, quod ea admorsa interdum nulla fames sentitur, ut inde ei nomen impositum sit, quòd famen arceat. Et apud Theophr. 4. hist. 20. *ἄλμυρος* legitur, ubi Gaza *Auronem* vertit.

Generum duorum Plinius l. c. scribit, *sylvestre* & *mitius*: per *mitius sativum* intelligens, quem *Tholosani*, ut Lugd. historia vult, in hortis habent, & ab effectu herbam *Colicam* vocant: sic & *sylvestris* non longè *Tholosâ*, in quibusdam sepibus nascitur.

I. *Halimus latifolius* sive fruticosus.  
*Halimus*, Dioscoridi. *Alimus mitius*, Plin.  
 an *Halimus*, Ang.  
*Halimus*, Ad. Lob. primus, Clus. hisp. & hist.  
*Halimus alter latiore folio*, Cæs.  
*Portulaca marina*, Dod. ico.

II. *Halimus verus Dalech.* Lugd. quid? cuius Clusius in hist. meminit, ejus fidem dubiam scribens.

III. *Halimus angustifolius procumbens.*  
*Halimus* 2. Clus. hisp. & hist. descr.  
 sub *Portulaca* obiter, Dod.

IV. *Halimus seu Portulaca marina.*

*Halimus vulgaris*, Matth. Eyst.  
*Halimi alia species*, Sandalida Cretenf. Ang.  
*Portulaca marina*, Dod. ut. Tur. Lem. Ad. Lob. Lugd. Tab.  
*Halimus* 3. Clus. hisp. & hist. sed figur. in hist. est sub 2.  
*Halimus* 1. tenuiori folio, Cæs.  
 Videtur *Alimus sylv.* Plinij: licet Lemnius *Halimum esse neget*: & Advers. & Lobelius *Crithmum Dioscoridis suspicentur*.  
 V. *Halimus minor*: qui in Prodr. describitur, & nomine *Halimi aurei arvi* D. Feurerus Northusâ misit.

A M A R A N T H V S. E T E J V S  
Species.

**A** *μάρανθος* dicitur, quasi immarcescibilis, eò quòd hujus flos decerptus non marcescat, & cum cuncti flores defecere, aquâ madefactus reviviscat, & hybernas coronas faciat, ut habet Plin. l. 21. c. 8. At Theophr. 6. hist. 6. *φλόξ* dicitur, Gaza *Flammam* vertit.

I. *Amaranthus maximus.*  
*Blitum*, Matth. in ico. majus, Eid. fol.  
*Blitum rubrum majus*, Cast. Lugd.  
*Amaranthus purpurascens* 3. Dod. gal.  
*Amaranthi species arborescens*, Gel. hor.  
*Amaranthus major floribus paniculosis spica-*

*tis purpureis*, Ad. Lobel.  
*Amaranthus major fl. obsoleti coloris*, Dod.  
*Bliti peregrini genus* 1. Cæs.  
*Blitum Indicum*, Tab.  
*Amaranthus magnus*, Cam.  
*Amaranthus paniculâ sparsâ*, Ger.

Quinoa sive Blitum majus Peruanum, Clus. hist.  
Amaranthus major paniculis rubris, Eyst.  
Petrus Cieca, granis dicit rubris, quo se Quinto  
incolæ sustentent; noster alba fert.

Variat: altera hujus species paulo humilior,  
dilutior panicularum colore & folijs angu-  
stioribus.

II. Amaranthus paniculâ incurvâ.  
Amaranthus purpureus 2. Dod. gal.  
Amaranthus holosericeis sanguineis reticula-  
tis floribus, Ad. Lob.  
Amaranthus holosericeus, Lugd. cristatus, Ca-  
mer. Eystet.

III. Amaranthus paniculâ conglomeratâ.  
Amaranthus, Cæs. primus, Cast.  
Flamma, Ang.  
Amaranthus Plinij major, Gef. hort.  
Amaranthus purpureus saturo coccineus, Ad.  
Lobel.

Amaranthus saturo cocci colore, Dod.  
Amaranthus purp. Lugd. Ger. purp. major, Tab.

IV. Amaranthus simpliciter panicula.

Circeâ, Trag.  
Amaranthus, Matth. parvus, Cam.

Amaranthus purpureus, Fuch. Tur. Dod. gal.  
Cord. in Diosc. & hist.

Amaranthus Plinij minor, Gef. hort.

Amaranthus communis minor, Eid. col.

Amaranthus angustifolius simplici spicatâ pa-  
niculâ, Lob.

Amaranthus angustifolius, Lugd.

Amaranthus vulg. Tab. sub Amarantho cocci-  
neo, Ger.

Amaranthus spicatus, Eyst.

V. Amaranthus folio variegato.

Celosia, Trag.

Blitum maculatû peregrinum, Theombrotum

Plinij quibusd. Corchoro cognatum, Gef. hort.

Blitum maculosum & herba Papagalli, Dod.

Amaranthus tricolor, Ad. Lob. Tab. Ger. Eyst.

Amaranthus altera, Cast.

Amaranthus pictus, Cam.

Symphonia Plinij & Gomphrena, Lugd.

Bliti peregrini alterum genus, Cæs.

Varietas colorum, in altero hilarior extremo  
flavo, medio puniceo, reliquo viridi; aliquan-  
do viridi, luteo, rubro: in altero obscurior, il-  
lum fœminam, hunc marem faciunt.

## PARIETARIA.

**E** 'Αγλήν Dioscoridi l. 4. c. 86. à semine aspero vestibustenaciter adharente: περιμύρον Galeno 6. simpl. quod  
Perdices hac delectentur. Plinio l. 22. c. 17. Helxine & Perdicium. Parietaria, quod in parietibus exeat:  
unde Muralis herba, Cels. l. 2. c. 33.

I. Parietaria Officinarum & Dioscoridis.  
Helxine, Brunf. (cui & Parthenij 7. species)  
Matth. Dod. gal. Fuch. Lac. Gef. hor. Lon. Cast.  
Lugd. Cam. cui & Urceolaris Scribonij.  
Helxine, Ad. (Virriola, sive Perdicium) Lob. Cæs.

Helxine altera, Cord. in Diosc.

Parietaria, Brunf. Tur. Cord. hist. Dod. Tab. Ger.

Parietaria vulgaris & major, Trag.

II. Parietaria minor ocimi folio.

Parietaria exigua vel 1. Trag.

## MERCURIALIS.

**A** ἡρίστis, παρθέλιον, ἔργος παρθένου Dioscoridi l. 4. c. 91. Linz oſtis sive Parthenium, Mercurij inventum (Plin.  
l. 25. c. 5.) ideo Græcis, hermu poa, apud nos Mercurialis: Theoph. 9. hist. 19. ἡρίστον censetur.

Genera: Dioscoridi, fœmina est & mas, & Linz oſtis syl. mas, quam νεώτερον ἡρίστον αὐτὸν vocat. Theo-  
phraſte, fœminifica & marifica: Plinio, masculus & fœmina.

I. Mercurialis testiculata, sive mas, Diosc.

& Plinij.

Mercurialis, Brunf. (cui parthenij 6. species)

Trag.

Mercurialis mas, Ang. Matth. Fuch. Dod. Lac.

Gef. hort. Lon. Ad. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Camer.

Mercurialis mascula, Tur. Cord.

Mercurialis fructum ferens, Cæs.

Phyllon arthenogonon Theop. Cord. in Diosc.

II. Mercurialis spicata, sive fœmina, Diosc.

& Plinij.

Mercurialis vulgaris & 1. Trag.

Mercurialis fœmina, Ang. Matth. Fuch. Dod.

Tur. Gef. hor. Lac. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Cast.

Lugd. Tab. Ger.

Mercurialis florens, Cæs.

Phyllon Theligonon Theoph. Cord. in Diosc.

Hæcunciam vix superans, Monspeßuli locis  
sterilibus reperitur.

### III. Mercurialis montana testiculata.

Mercurialis syl. Trag. Lon. quæ Cynocrambe,  
Gef. hort.

Mercurialis macula syl. Cord. hist. Thal. Cyno-  
crambe, Matth. Fuch. Dod. Lac. Ad. Lob. qui una  
figura utramq; exprefsit, Caft. Lugd. Cam.

Mercurialis mas, Fuch. Cam. ep. Matth.

Mercurialis altera vel montana, Cæf.

Mercurialis canina mas, Colum.

### IV. Mercurialis montana spicata.

Cynocrambe live Mercurialis fœm. syl. Cam.

Cynocrambe fœmina, Eid. ep. Matth.

Mercurialis canina fœmina, Colum.

Mercurialis sylv. fœmina, Cord. hist. Thal. at  
Cordo in Diosc. fœmina non invenitur.

Hæc aliquando magis foliofa est.

### V. Cynocrambe Dioscoridis.

In Matthiolo nostro & Prodomo descripta fi-  
gurâ additâ.

Alline, Cæfalp.

Allines facie planta nova, Colum.

Cynocrambe legicima, Belli apud Ponam.

## PHYLLON.

**Φ**Υλλον ἀπὸ φλογένου ἢ θυλαγόνου Theoph. 9. hist. 19 habet: quem secutus Diosc. l. 3. c. 140. hic ὁ, ἐπεὶ φυλλον quog;  
nominavit, ad differentiam Mercurialis, quæ etiam Phyllon dicitur: videntur autem ambo subiectâ plan-  
tam intellexisse: in hoc solum dissentiunt, quod Theophr. ἀπὸ φλογένου, Dioscorid. θυλαγόνου vocat, & contrâ.

### I. Phyllon testicularum.

Phyllum, Matth. qui marem, at Cam. in Matth.  
utrumq; proponit.

Phyll. mas seu Arrhenogonum, mariparum, Ad.

Phyllum Arrhenogonon, Lob. ico. Lugd.

Phyllon marificum, Clus. hisp. & hist. mas Lob.

ob. Dod. (fœminam exprimit) Caft. Tab. sub.

Cynocrambe, Ger.

### II. Phyllon spicatum.

Phyllon theligonon, Dod. in ico. Ad. (live fœ-  
miniparum) Lob. ico. Dod. Lugd. Ger.

Phyllum, Gef. hort.

Phyllon fœminificum, Clus. hisp. & hist. Tab.

Phyllon fœmina, Caft.

Et si oleæ folio sit, aliquando tamen, licet rari-  
us, ferratis folijs circa Monspelium observatur.



## SECTIO SEXTA.

LACTUCA, SONCHVS, LAMPSANA, ENDIVIA,  
CICHORIUM, DENS LEONIS, HIERACIUM, CHON-

DRILLA, SENEIO, JACOBÆA.

### LACTUCA ET EJUS SPECIES.

**L**actuca, quod copia lactis exuperet, & lac augeat, ὀκράξ Dioscoridi l. 2. c. 165.

Genera: Dioscoridi sativa est & sylvestris: Theophr. 7. hist. 3. genera plura sunt, candida, cujus tria  
genera: laticaulis, rotundicaulis & Laconicum: de sylvest. 7. hist. 6. agit: sic Plinius l. 19. c. 8. Lactuca tria ge-  
nera Græci fecere, unum laticaulis, alterum rotundicaulis, tertium sessile, quod Laconicon vocant. Alij colore &  
satus tempore genera discernere: nigras, quæ Januario feruntur: albas, quæ Martio: rubentes, quæ Aprili: di-  
ligentiores, plura genera faciunt, purpureas, crispas, Cappadocicas, Græcas, &c.

Dividimus in sativam & sylvestrem. Sativam, in crispam, rotundam, capitatam Cypriam: Folio enim  
alia est latiore, alia longiore, crispo, plano, sinuato: colore, alia obscurius, vel etiam pallidè virente, rubro, vel  
etiam maculis purpureis aspersis: sic capitata, alia alba, alia rubra, ac si vinum aspersum esset, alia nigra: sicq;  
duobus posterioribus semina nigra, alijs verò candida sunt.

Lactuca hortensis.

### I. Lactuca sativa.

Lactuca, Trag. Gef. hor. Cæf. Tab.

Lactuca florens, Matth. Lac.

Lactuca sativa, Ang. Dod. Cord. in Diosc. Lug-  
dun. Taber.

Lactuca sativa folio Scariolæ, Ad. Lob.

Lactuca capitata, quoad ico. Fuch. Tur.

Lactuca rotunda, Lon. ico.

### II. Lactuca folijs Endiviæ.

Endivia major, Trag. desc. & Lon.

Lactucæ 4. genus, Matth.

Lactu-



*Lactuca intybacea*, Tab. Ger.

III. *Lactuca maculosa*.

*Lactuca quinta*, Dod. gal.

*Lactuca Romana*, Matth. Ges. hort.

*Lactuca rubra*, Cæs.

*Lactuca fusca* ac rubente purpurei coloris, rubens Plinij, Dod.

IV. *Lactuca folio obscuri⁹ virente, semine nigro*.

*Lactuca 2. folijs obscurius virentibus, nigra* Plinio, Dodon.

*Lactuca Romana dulcior, nigriore & Scariolæ hortensis folio*, Ad.

*Lactuca nigra*, Cæs. *Lactuca Romana*, Cast.

Folia simul ligata ut in Endiviâ albescunt.

V. *Lactuca folio oblongo acuto*.

an *Lactuca Gallica*, Cast.

Hanc in Phytopinace, Prodr. descripsimus.

VI. *Lactuca Italica laciniata: de qua in Prod.*

VII. *Lactuca capitata*.

*Lactuca sativa major*, quæ in caput coit, Trag.

*Lactuca 3. Dod. gal.*

*Lactuca capitata*, Matth. Dod. Cast. Tab. Ger.

*Lactuca fessilis*, Ges. hort. Lon.

*Lactuca capitata crispis brassicæ folijs*, Lob. ob.

*Lactuca sativa fessilis, sive capitata, rugosis crispis brassicæ folijs*, Ad. Lob. ico.

*Lactuca caputia cognominata*, Cæs.

VIII. *Lactuca crispa*.

*Lactuca crispa & 3. Trag.*

*Lactuca*, Tur. crispa, Matth. Dod. Lugd. Cæs.

*Lactuca sativa crispa*, Fuch.

*Lactuca crispa non capitata*, Ad. Lob.

*Lactuca crispa 1. & 2. Tab. Ger.*

Folijis latoribus & paulò angustioribus variat: hinc duæ apud Tab. & Ger. icones. Habetur alba & rubra: hæc verò durior est.

IX. *Lactuca crispa altera*.

*Lactuca Intybacea crispa*, Tab.

*Lactuca Sabaudica crispa*, Ger.

X. *Paravas herba refrigerans: par. 4. Ind. or. 8.*

*Lactuca sylvestris*.

I. *Lactuca sylvestris costâ spinosâ*.

*Lactuca sylvest. Diosc. Theophr. & Plinij*, quæ Thridacine Galeni videtur.

Endivia, Brunf. sylv. Lon. desc.

*Lactuca syl. prior*, Trag. Endivia vulg. & 2. Eid.

*Lactuca sylv. Ang. Matth. Fuch. Tur. Dod. Lac.*

Lon. Cast. Lugd. Thal. Cæs. Col.

*Lactuca agrestis*, Cord. in Diosc. & hist.

Series domestica, altera *Lactucina* Dioscor. Ad.

Chondrylla prima forte Dioscor. quæ Endivia sylv. quibusdam Ruellio.

Series domestica, Lob.

*Lactuca sylv. vera*, Lugd. desc.

Scariola & Serriola, Eric. Cord.

II. *Lactuca sylvestris odore viroso*.

Endivia major & 1. Trag. Lon. ico.

*Lactuca sylv. verior & Thesion*, Lugd. ico.

*Lactuca agrestis*, Cord. hist. ico. Lob. ico.

*Lactuca agrestis*, Scariolæ hortensis folio, *Lactuca* flore, Opij odore, Ad.

*Lactuca sylv. Anglica*, odore Opij similis, Cam.

III. *Lact. montana purpureo cærulea major*.

*Lactuca sylv. purpureo flore*, Ges. hort.

*Lactuca sylvatica*, in Cord. hist. cap. de Soncho.

*Sonchus arboreescens puniceo flore*, Ges. hort.

*Lactuca sylv. ἐρυθραία*, Thal.

Libanotis Theophr. sterilis, Tab.

*Sonchus 3. Eid. sub Eryfimo sylv. Ger. ico.*

*Sonchus mont. purpur. τέρρα πετταλον*, Col.

IV. *Lactuca mont. purpureo cærulea minor*.

*Sonchus 2. vel lævis purp. flore*, Clus. pan.

*Sonch. lævior Pannonic. 4. purp. flore*, Eid. hist.

V. *Lactuca sylvestris Peruana*.

*Lactuca sylv. pumila*, Monardi & Lugd. quid?

VI. *Lactuci folia renalis*.

Herba ad renum morbos utilis Monardi, & Lugd. quid?

## SONCHUS EJUSQUE SPECIES.

Σόνχος Dioscoridi l. 2. c. 159. & Theoph. 6. hist. 4. ἀπὸ τοῦ σόλῳ χέαν, quòd succum salubrem, qui stomachi rofiones lenit & nutritibus lac auget, fundat, Latinis Cicerbita, *Lactucella*, *Lacteron*, quòd caule dissecto, lac copiosum defluit.

Genera duo Diosc. alter sylvestrior, magisq; spinis horrens: alter, qui teneritate quadam mollescit: Theophrastus spinosi meminit. Plinio l. 1. c. 22. *Sonchus albus & niger*, *Lactucæ* similes ambo, nisi spinosi essent.

I. *Sonchus asper non laciniatus*.

*Intybus sylv. seu erratica acutis folijs*, Trag.

*Sonchus asper major*, Cord. hist.

*Sonchus tenerior aculeis asperior*, aut horridiuscula, Lob. ob.

*Sonchus lævis tenerior*, Ad. Lob. ico.

*Sonchus asperior*, Lugd. 3. *asperior*, Dod.

*Sonchus alia* in ruderibus, Cæsalp.

II. & III. *Sonch. asper laciniat. & non lacin.*

*Cicerbita asperior*, Eri. Cord.

*Sonchus spinosus*, Ang.

*Sonchus aspera*, Matth. Fuch. Tur. Lac. Gesn. hort. Lob. ico. Cast. Lugd. *asper*, Lon. Tab. sub lævi haber, Ger.

*Sonchus sylvestrior aspera*, Dod. gal.

*Sonchus asper*, Eid. fol.

*Sonchus*, Cord. in Diosc. Cæs. cui & *Sonchus alter* Dioscoridis.

*Sonchus asper minor*, Cord. hist.

*Sonchus lævis tenerior latifolia*, Ad. Lob. ob.

*Sonchus lævis latifolius*, Lugd.

*Andryala major*, Dalech. Lugd.

Folia habet laciniosa dentis leonis, ubi solo squalidiore oritur: at si lætiore, non laciniata, Dipfasi aut *Lactucæ*: & senum septenūmve cubitorum proceritatem aliquando assequitur.

IV. *Sonchus asper laciniatus Creticus*: qui 1. in Prodomo.

V. & VI. *Sonchus asper subrotundo folio*: est major & minor: qui 2. in Prod.

VII. *Sonchus asper arborescens*.

*Sonchus* 3. Clus. Pan. vel 3. *lævis altissimus*, vel

*Sonchus lævior Austriac.* 5. *altissimus* Eid. hist.

*Sonchus arborescens*, Tab. & Ger.

*Sonchus lævis.*

I. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*.

*Intybus sylv.* seu *Erratica tertia*, Trag.

*Sonchus lævis*, Matth. Gesn. hor. Dod. Cast. Lug.

*Sonchus lenis* seu *lævis*, Cord. hist.

*Sonchus non aspera*, Fuch. tener, Ang.

*Sonchus tenerior non aspera*, Dod. gal. &

*Lactuca leporina* Apuleij.

*Endivia sylv.* Lon. ico.

*Sonchus lævis vulgaris*, folijs laciniatis dentis Leonis, Lob.

*Sonchus lævis laciniatis folijs*, Lugd.

*Sonchus in collibus umbrosis*, Gesn.

*Andryala minor*, Dalech. Lugd.

*Sonchus lævis alter flore luteo*, & tertius flore niveo, Tab.

*Sonchus lævis flore albo*, & alter fl. niveo, Ger.

Flore est luteo, rariùs niveo, vel albo

II. *Sonchus lævis* in plurimas & tenuissimas lacinias divisus: hic 3. in Prod.

III. *Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus*,

*Scariola sylv.* *Lactucæ species* Galeno, Ang.

*Sonchi genus læve*, Gesn. hort. Eid. in ap.

an *Sonchus lævis alter*, Matth. Cast. Lugd.

*Sonchus alter folio profundis lacinijs sinuato hederaceo*, Lob.

*Sonchus* 4. *lævis alter*, Lugd.

*Sonchus lævior vulgaris*, Clus. hist.

an *Lactuca montana*, Cæsalp.

*Sonchus sylvaticus* 4. Tab.

Major & minor reperitur.

IV. *Sonchus lævis minor pauciorib. lacinijs*.

*Sonchus lævis latifolius*, Tab. Ger.

Est angustioribus folijs in incultis: latioribus in vinctis.

V. *Sonchus lævis angustifolius*.

*Sonchus lævis Matthioli*, apud Lob. ico.

*Sonchi genus*, terra crispa, Gesn. hort.

*Terracrepulus* in Hetruria; Cæs.

*Crepis Dalechampij*, Lugd.

VI. *Sonch. angustif. maritim. qui* 4. in Prod.

*Sonchus montanus.*

I. *Sonchus lævis laciniatus cæruleus*, vel *Sonchus alpinus cæruleus*.

*Intybus παλίφουλλος* & *Harcynica*, Thal.

*Sonchus lævis flore cæruleo*, Clus. pan. &

*Sonch. lævior Austriac. cæruleo flore*, Eid. hist.

*Sonchus cæruleus* & *Sonchocichoreum*, Cam. in Matth.

*Sonchus cæruleo flore*, Eid. hort. (qui duum generum dicit.) & Ger.

*Sonchus lævis* 4. flore cæruleo, Tab.

Floribus etiam albis *Thalius* notavit.

II. *Sonchus lævis laciniat. lut. mont. major*.

*Sonchus Dendroides* Dalechampij, Lugd.

III. *Sonchus lævis laciniatus luteus minor*: qui 5. in Prod.

*Sonchus hirsutus sive villosus.*

I. *Sonchus villosus luteus major*.

*Sonchus lanatus* Dalechampij, Lugd.

Magnitudine variat, caule aliquando sesquicubitali, cubitali & pedali.

II. *Sonch. villos. lut. minor*: hic 6. est in Prod.

III. *Sonchus latifolius leviter hirsutus*.

*Cichoreum sylv. alterum ænigis*, sive *Cichoreum dulce*, Colum.

*Soncho affinis Lampfana vulgò, sed malè.*

I. *Soncho affinis Lampfana domestica*.  
*Chrysolachanum* Plinij, Ruel.

*Lampfa-*

Lampsanam negant, Advers.  
 Lampfana, quibusdam Napium, Dod. gal.  
 Sonchis cognatum, Gesn. hort.  
 Cichorium vel Sonchi genus, Eid. col.  
 Lampfana, Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cam.  
 cui & Papillaris in Prussia.

Sonchus sylv. i. Tab. & 3. Eid. ico.

Sonchus sylvaticus, Ger.

Folij aliquando prorsus integris, aliquando  
 in lacinias aliquot dissectis, Thalius notavit.

II. Soncho affinis Lampfana sylvatica.

Sonchus sylvaticus 2. Tab.

## INTYBUS SIVE ENDIVIA, CICHOREVMVE

ejusque species.

**S**oncho subjungit Dioscorides, l. 2. c. 260. *Σέβν*, cujus verba sic interpretamur: Seris duum generum, quorum sylvestris Picris, & Cichorium vocatur: quæ verò ex hac latioribus est folijs stomacho commodior est hortenfi: Et hujus etiam dua species sunt, quarum hac lactuca similior & latifolia: altera verò angustiore est folio & amaro. Intubi meminit Theoph. 7. hist. 7. inter olera numerando, & universa genera Intyborum amara dixit, 2. caus. plant. 7. Cichorea quoque mentio 7. hist. 9. uti & Intybi erratici 1. hist. 15. Plinio, l. 20. c. 8. Intubum erraticum Ambugiam appellavere: in Aegypto Cichoriam vocant, quod syl. sit, sativum autem Serin, quod est minus & venosius. Et syl. genus alij Hedyphnoia vocant, latioris folij. Seris & ipsa Lactuca similima duorum generum est: sylvestris melior, nigra ista & aspera; deterior hyberna & candidior.

I. Intybus sativa latif. sive Endivia vulgaris.

Seris domestica latifolia, Dioscoridi.

Intubum & Seris hyberna, Plinio.

Scariola Arabum interpretibus.

Cichorea sativa, Trag.

Intubus, Tur. major, Matth.

Intubum sativum latif. Fuch. Dod. gal. Lob. Lug.

Intybum sativum, Cord. in Diosc. Dod. Ger.

Intybum latifol. Italicum, Gesn. hort.

Cichorium sativum, Eid.

Intybus hortensis, Lac.

Seris hortensis altera, Ang.

Intybus sativa major, Cast.

Seris (sive Endivia alba) Gesn. hort. Lob. ico.

Seris sive Intybum sativum latifolium, Ad.

Endivia, Gesn. hor. cui & Hypochæris Theoph. hortensis, Cam.

Intyb. major sativa, sive Cichor. domestic. Tab.

Florib. est cæruleis, raro cædidis, ut & minor.

II. Intybus sativa angustifolia.

Intubus sive Endivia minor, Matth.

Intybum sativum angustifol. Fuch. Dod. gal.

Lugd. qui & Dod. & Matth. figuram habet.

Intybus hortensis alter, Lac.

Intybum angustif. Scariola aliquibus, Gesn. hor.

Cichorium sativum, Cord. hist.

Cichorium angustifolium, Lon.

Seriola, aut Endiviola, Ad.

Intybus minor i. & Intyb. minus album, Tab.

Serium, Cichorium sativum minus, Eid. ico.

Intybum syl. & Intyb. syl. latifolium, Ger. ico.

Intybus sativa minor, Cast.

an Cichorium Romanum Cæsalp. cui Apate Theoph. quia semina nigra habet,

III. Intybus crispa: Matth. Tab.

Seris sive Intybus crispa, Ad.

Intybum crispum, Lugd.

Endivia crispa, Ger. Romana crispa, Cam.

## CICHORIUM.

I. Cichorium sativum.

Seris sylv. quæ colitur & sativa dicitur, Ang.

Seris, Lob.

Cichorium domesticum, Matth. Cast.

Cichorium hedyphnois, Lac.

Cichorium sativum cæruleum, Ad. Lob. ico.

Cichorium latioris folij, Dod.

Cichorium sativum latifolium, Lon.

Intubum syl. latifolium, Lugd.

Cichorium sativum duplici figura & album

sativum, tres fig. apud Tab. & Ger. sub sativo, sativo latifolio, & sylv.

II. Cichorium sylv. sive Officinarum.

Seris *πικρίς* Dioscoridi: cichorea Theoph. *πικρίς*

Amarugo Gaza vertente, Theoph.

Intubum erraticum, Plinio.

Solsequium, Brunf.

Cichorea, Trag. sylvestris, Matth.

Seris sylv. Ang. Lob. Seris picris, Lob. ico.

Seris sylv. picris, Cichorium, Ad.

Cichorium syl. Gesn. col. Dod. Cast. agreste, Lon.

Intybum agreste, Er. Cord. Gesn. hor. sylv. Fuch.

Dod. gal. (cui & Ambubeja) Cord. Diosc. Thal.

Intubum sylv. angustifol. Matthioli, Lugd.

Hypochæris Dalechampi, Lugd.

Cichorium, Lac. Cord. hist. Cæf. Tab.

Hieracium latifolium, Ger. ico.

Duplex est, alterum folio prors. integro, un-

ciarum duarum quandoq; latitudine: alterum, in laciniis diviso, Thal. At hujus floris color communiter cæruleus, est & candido & roseo: aliquando caulis latitudinem digitorum quatuor acquirit.

III. Cichorium spinosum, quod in Matthiolo, Tabernæmontano emaculato, & in Prodro, addita figura descripsimus.

Cichorium spinosum Creticum Belli, Ponæ.

Cichorium spinosum, vulgè *γαμψύρσι*, h.e. Hydriæ spina, Belli in ep. 4. ad Cluf. (hist.

Chondrillæ genus elegans cæruleo flore, Cluf.

*Cichorium syl. luteum,*

I. Cichorium pratense luteum hirsutæ asperum, vel Hieracium hirsutum folijs caulem ambientibus.

Cichorea 3. sive lutea, Trag.

Hieracium prat. asperum, Gesn. col.

Cichorium luteum, Tab. Ger.

Intybus syl. seu Cichorium syl. fl. luteo, Thal. Lactariola altera, Cæs.

Variat: nam aliud folijs est integris, aliud divisis: illud, quadruplex est: 1. caule & folijs spinulis horret: 2. folia infernè aspera, supernè glabra in ambitu exasperata: 3. folijs angustioribus asperis: 4. caule brachiato folijs palmariibus, in ambitu profundè, ut Dentis leonis, divisis: ut Thal. monet. flore albo notavit, Tab. & Cichorium luteum 2. facit.

II. Cichorium prat. hirsutum vesicarium.

Cichorium sylv. vesicarium pratense, Colum.

III. Cichorium montanum angustifolium hirsutæ asperum.

Hieracium intybaceum asperum, vel 9. Tab.

Hieracium asperum, Ger.

IV. Cichorium prat. luteum lævius.

Hedypnois Plinij, Dod. gal. Ad. cui & Cichorium luteum, Lob. cui & Aphaca, Theoph.

Dentis leonis 3. species, Dod. Tab.

Aphace Dalechampi, Lugd.

Endivia syl. Cæs.

Dens leonis cichorizata, Ger.

*Dens Leonis.*

I. Dens Leonis latiore folio.

Aphaca exoleru genere, Theoph. 7. hist. 7. & 10.

Aphace, Plin. lib. 21. cap. 15. & 17. & Hedypnois, Plin. lib. 28. cap. 8.

Dens leonis, Brunf. Matth. Dod. Lob. (& corona & caput Monachi) Tab. Ger.

Hieracium maj. Trag. parvum, Cord. in Diosc.

Hieracium minus, Gesn. hort.

Hedypnois major, Fuch.

Chondrilla Galeni, Ang. quibus, Taraxacon.

Chondrilla altera & rostrum porcinum, Dod. gal. Thal.

Dens leonis vulgi, sive Urinaria, Ad.

Taraxacon minus, Lon.

Aphaca, Cæsalp.

Hedypnois Dalechampi, Lugd.

Habetur & major & media quæ vulgarior est: folio acutior, aliquando obtuso.

II. Dens leonis angustiore folio.

Aphaca angustioris folij, Cæs.

III. Dens leonis asphodeli bulbulis.

Cichorium Constantinopolitanum, Matthiolo.

Cast. Lugd. sic à Matthiolo appellatum, Colum.

Dens leonis Monspelienis, Ad. Lob. ob.

Chondrilla altera Dioscoridis, Lob.

Dens leonis altera, Tab.

IV. Dens leonis latifolium caulescens, qui 1. est in Prod.

V. Dens leonis tenuissimo folio: qui 2. in Hieracium fœtidum 3. Colum. (Prod.

VI. Dens leonis minor folijs radiatis: 3. in an Trinciarella, Cam. (Prod.

VII. Dens leonis minus aspero folio: hic 4. in Prod.

VIII. Dens leonis minimus.

Cichorium syl. pumilum sive Hedypnois, Cluf. cur. post.

## HIERACIUM EJVSQVE SPECIES.

**I** *Ἐγάνυος* Dioscoridi, l. 3. c. 72. Latinis *Accipitrina*, ab *accipitre*, qui *ἰεραξ*, nomen habet. (Hieracia ab alijs Plinio) quoniam accipitres scilicet eam succoq; oculos tingendo, obscuritatem cum sensere discutiant, Plin. l. 20. c. 7. ubi inter *Lactucam sylvaticam* refert, & cum ea confundit: dicitur & *Σοχίτης*.

Genera: magni & parvi Diosc. meminit: recentioribus plures sunt differentia.

*Hieracium dentis leonis folio acuto.*

I. Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites.

Intybus sylv. 2. acutis folijs, Trag.

Hieracium majus, Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. Tur. (sub Hippoglossi figura) Ad. Lob. Cast. Thal.

Hieracium latifolium majus, Cam.

Taraxa-

*Taraxacon majus*, Lon.

*Hieracium minus Dalechampij*, Lugd.

an *Hieracium magnum*, Cæs.

Aliquando folio asperiore inter segetes re-  
peditur: communiter erectum: nonnunquam  
reclinatum.

II. *Hierac. majus folio Sonchi angustiore.*

*Hieracium alterum*, Dod.

III. *Hieracium majus folijs Sonchi semine  
curvo.*

*Hieracium majus Creticum sativum*, Gef. hor.

*Hierac. Cretic. pro Endivia Jurea missum*, Cam.

IV. *Hieracium majus erectum latifolium  
caule aspero.*

V. *Hieracium majus erectum angustifoli-  
um caule aspero.*

Huic & priori, aliquando prima folia ob-  
tusa sunt.

VI. *Hieracium majus erectum angustifoli-  
um caule lævi.*

*Hieracium majus Dioscor. Tab. Ger.*

VII. *Hieracium dentis leonis folio, flore  
suaverubente.*

*Hieracium Apulum, suaverubente flore*, Colum.

VIII. *Hieracium dentis leonis folio mono-  
clonon sub asperum.*

*Hieracium intybaceum, vel 6. Tab.*

Variat: culmo unico nudo ex radice: rari-  
simè culmo bipedali ramofo, sub aspero, cujus-  
modi in Italia reperitur.

IX. *Hieracium dentis leonis folio mono-  
clonon glabrum.*

X. *Hieracium minus glabrum, folijs ele-  
ganter virentibus: hoc 2. est in Prod.*

XI. *Hieracium asperum flore magno den-  
tis leonis.*

*Hieracium folijs & floribus dentis leonis bul-  
bosi, Lob. ico.*

*Viperea vel Scorzonera Italica, Cast. ico.*

XII. *Hieracium dentis leonis folio hirsu-  
tie asperum minus laciniatum.*

*Hieracium alterum saxat. montan. Colum.*

XIII. *Hieracium dentis leonis folio hirsutie  
asperum magis laciniatum: quod in Prod. 1. est.*

XIV. *Hieracium hirsutum ferè umbellatum,  
Hieracium nonum, Clus. hist.*

*Hieracium dentis leonis folio obruso.*

I. *Hieracium dentis leon. folio obtuso majus.*

*Hieracium minus primum, Dod. gal.*

*Hieracium longius radiculatum, Ad. Lob. Ger.*

*Hieracium 3. Dod.*

*Hieracium macrorrhizon, Tab.*

*Apargia Dalechampij, Lugd. quoad descript.*

II. *Hieracium dentis leonis folio obtuso mi-  
nus, flore magno: hoc 3. in Prod.*

III. *Hieracium dentis leonis folio floribus  
parvis: quod 4. in Prod.*

IV. *Hieracium dentis leonis folio bulbo-  
sum: hoc 5. est in Prod.*

V. *Hieracium minus dentis leonis folio  
sub aspero.*

*Hypochæris. Porcellia, Tab. Ger.*

*Hieracium pumilum 4. Colum.*

VI. *Hieracium minus dentis leonis folio  
oblongo glabro.*

*Hyoseris altera vel angustifolia, Tab.*

VII. *Hieracium minus flore ex albo carneo.*

*Hieracium parvum Creticum, Clus. hist. ap. 1.*

VIII. *Hieracium minus folio subrotundo.*

*Hieracium minimum vel 2. Clus. pan. in hist. 9.  
icone, at descriptione II.*

*Hyoseris latifolia vel mascula, Tab.*

*Hyoseris mascula, Ger.*

Variat ratione loci: nam in siccioribus na-  
tum minus est, quemadmodum Clusius pingit:  
at locis lætioribus, pluribus est caulibus pal-  
maribus.

an *Hieracium minus Hyoseridis latifoliæ fa-  
cie, Eyst. Sed hoc semen papposum fert.*

IX. *Hieracium Bæticum, Clus. in cur. post.*

*Hieracium Chondrillæ folio.*

I. *Hieracium maximum Chondrillæ folio  
asperum: quod 7. est in Prod.*

II. *Hieracium Chondrillæ folio hirsutum.*

*Hieracium folijs & facie Chondrillæ, Lob. ico.  
Camer.*

*Hieracium II. Tab.*

Variat: in German. hirsutius & majus, Mon-  
spessuli minus & lævius: at utrobiq; folijs la-  
ciniatis: in Italia & minus & lævius, & folijs  
solum dentatis, provenit.

III. *Hieracium Chondrillæ folio glabrum.*

*Hieracium 5. five aphacoides, Tab. Ger.*

IV. *Hieracium Chondrillæ folio glabro ra-  
dice succisâ, majus.*

*Hieracium minus, Trag. Ang. Matth. Fuch. Lac.  
Gef. Cast. Tab. minus alterum, Dod. gal.*

*Succisa tertia, Trag. hirsuta folia tribuit.*

*Hieracium minus præmorsâ radice, Ad. Lob.*

*Hieracium 4. Dodon.*

Sonchus,

Sonchus, Lon.

Picris Dalechampij, Lugd.

Hieracium leporinum, Ger.

Variat foliorum incisuris profundioribus, & hoc Hieracium nigrum, Tabern. & Ger. (quod Hieracium folijs Coronopi dici posset) nominant: vel minus profundis.

V. Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisâ, minus.

Lagopus 3, vel Lactuca leporina, Trag.

Lactuca leporina Apuleij, Ang.

Hieracium quintum, Dod.

Apargia Dalechampij, Lugd.

At si quis 4. & 5. solum magnitudine, foliorum latitudine, & angustia differre velit, facile assentiar.

*Hieracium Intybaceo folio.*

I. Hieracium intybaceum flore luteo: hoc 10. in Prodr.

II. Hieracium intybaceum flore magno albedo: hoc 11. est in Prod.

III. Hieracium intybaceum flore ex purpura rubentibus.

Hieracium intybaceum 10. Clus. hist.

*Hieracium Cichoraceo folio semine adunco.*

I. Hieracium capitulum inclinans semine adunco.

Hieracium facie hedypnois, Lob. ico.

Rhagadiolus, Cæs.

Magnitudine & parvitate, folijs magis minusve sinuosis, ad agros Monspelienses variat: & in hortum translatum asperitatem penè amittit.

II. Hieracium siliquâ falcatâ.

Hieracium Narbonense falcatâ siliquâ, Lobel. Lugdun.

Rhagadiolus alter, Cæs.

Hieracium Monspeliac. & Narbonense, Tab.

Hieracium falcatum, Ger.

Quod Monspelij crescit, folijs est latioribus: quod Patavi, angustioribus, à quibus Sonchus stellatus, Chondrilla stellata, & Cichorium stellatum nominatur.

III. Hieracium proliferum falcatum: quod 12. in Prod.

Hieracium calyce barbato, Colum.

IV. Hieracium minimum facultatum: quod 13. in Prodr.

*Hieracium montanum hirsutum.*

I. Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti.

Hieracium montanum folio Cycopsis, Ad.

Buglossum echioides luteum Hieracio cognatum, Lob. ico.

Buglossum luteum, Cam. Ger.

Hieracium echioides, Tab.

II. Hieracium mont. rapifolium: quod 14. in Prod.

III. Hieracium alpin. asperum conyzæ facie.

Hieracium Britann. vel 4. Clus. pan. & hist.

IV. Hieracium mont. dentis leonis folio incano, vel laciniatum lanuginoso folio.

Hieracium mon. laciniatum folio, vel 7. Clus. pan.

Hieracium 8. folio hedypnoidis, Eid. hist.

Hierac. mont. angustif. folijs Cichoraceis, Tab.

Hieracium 7. Clusij, Ger.

V. Hieracium alpinum folijs dentatis flore magno: quod 15. in Prod.

VI. Hieracium alpinum latifolium hirsutum incanum flore magno.

Hieracium 1. latifolium, Clus. pan. & hist. Ger.

Hieracium phlomoides, Tab.

Hieracium latifolium Pannonicum, Cam.

an Pilosella major Gallorum, Thal.

an Costa, Cam.

Folio est interdum sinuoso, interdum laciniato: maculis aliquando lividis insignitis, plerumq; carentibus.

VII. Hieracium alpinum latifolium villosum magno flore.

Hieracium alpin. hirsuto folio, vel 5. Clus. pan.

Hieracium 5. villosum, Eid. hist.

Hieracium latifolium montanum, Tab.

Hieracium 5. Pan. Cam. 5. Clusij, Ger.

VIII. Hieracium ramosum magno flore: quod 16. in Prodr.

IX. Hieracium montanum hirsutum ramosum parvis floribus.

X. Hieracium alpinum non laciniatum flore fusco: quod 17. in Prod.

Hieracium Germanicum 1. Colum.

XI. Hieracium hortense floribus atropurpurascentibus: quod 18. in Prod.

Hieracium latifolium peregrinum phlomoïdes, Eyf.

Pilosella major quibusdam.

XII. Hieracium pumilum saxatile asperum radice præmorsa: quod 19. in Prod.

an Hier.

XIV. Hieracium mont. lanuginosum laciniatum parvo flore: quod 20. in Prod.

XV. Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso.

Hieracium pumilum 2. Colum.

XVI. Hieracium montanum angustifol. nonnihil incanum.

Hieracium mont. vel 6. Clus. pan. & hist. Cam.

Hieracium montanum angustifol. 2. Tab.

Hieracium 6. Clusij, Ger.

Variat folijs magis minusve incanis, ijsque integris vel minimum laciniatis: est & tertia folijs integris, atrovirentib. minimeq; incanis.

*Hieracium montanum glabrum.*

I. Hieracium mont. latifol. glabrum majus.

Hieracium montanum majus latifolium, Tab. sub Chondrilla Hispanica, Ger. ico.

II. Hieracium montanum latifolium glabrum minus.

Hieracium montan. latifol. minus, Tab. Ger.

III. Hieracium alpinum pumilum chondrillaefolio: quod sub 7. in Prod.

IV. Hieracium Tragopogonis folio.

Scorfonera 4. Clus. pan.

Hieracium 7. vel pumile, Eid. hist.

V. Hieracium capillaceo folio: quod 21. in Prodr.

*Hieracium Murorum, Pulmonaria Gallica dicta.*

I. Hieracium murorum folio pilosissimo.

Alsine seu Auricula muris major, Trag.

Pulmonaria Gallica, Scopa regia fortè Plinij, Gesn. hort.

Sideritis Plinij latissimo folio, Eid.

Pulmonaria Gallor. flore Hieracij, Ad. Lob.

Clus. hist. Lugd. cum figura Carthon.

Pulmonaria Gallica sive aurea, Tab.

Corchorus Dalechampi, Lugd.

Lactariola, Cæsalp.

Variant in pictura; Tragus, Lugd. & Tab. folijs subrotundis & pilosis: at Lobelius, glabris & oblongis pingit: sic folia quandoque parte infera rubent: aliquando albis maculis aspersa, conspiciuntur.

II. Hieracium murorum laciniatum minus pilosum.

Pulmonaria Gallica foemina, Tab.

Lobelij figura melius huic, quam præcedenti convenit.

Hoc folio est modò latiore, modò angustiore, & hæc

Pulmonaria Gallica tenuifolia, Tab. dicitur.

III. Hieracium murorum angustifolium non sinuatum: quod 22. in Prod.

*Hieracium pratense.*

I. Hieracium profundè sinuatum pubescens: quod 21. in Prod.

II. Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus.

Intybus ἀνυμέναιος major, Thal.

III. Hieracium prat. latifol. non sinuatum minus.

Intybus ἀνυμέναιος minor, Thallio.

*Hieracium fruticosum.*

I. Hieracium fruticosum latifolium folijs dentatis glabrum: quod 22. in Prod.

Hieracium majus latifol. vel 2. Clus. pan. & hist.

Intubi 6. species, Thal.

Hoc etiam caule graciliore & folijs angustioribus, in reliquis conveniens, reperitur.

II. Hieracium fruticosum latifol. hirsutum.

Erinus, Matth.

Basilicum aquaticum, Cast.

Hieracium frutescens latifol. polyanthos, Eyst.

Variat: 1. folijs uncias quinque longis, sesquiunciam latis, subrotundis, dentatis & asperis, quemadmodum Patavij provenit, & à Guilandino, Militaris Galeni & Lactaris Plinij, dicebatur, 2. folijs est multò longioribus, angustioribus, parum dentatis, molli lanugine pubescentibus, quod apud nos reperitur, licet rarius.

III. Hieracium fruticosum subrotundo folio: quod 25 in Prod.

Hieracij foliati nomine D. Jungerm. misit.

IV. Hieracium fruticosum angustif. majus.

Hieracium Sabaudum, Ad. Lob. Lugd.

Hieracium alterum grandius, Lob. ico. Cam.

Hieracium primum, Dod.

Hieracium majus angustifol. vel 3. Clus. pan.

Hieracij 3. genus alterum angustif. Eid. hist. ico.

Intubi 7. species Thal.

Hieracium montanum angustifolium 1. Tab.

Hieracium intybaceum, Ger. ico.

Caule est aliquando magis, aliquando minus aspero, folijs magis minusve crenatis, longioribus & angustioribus, brevioribus, & latioribus.

V. Hieracium fruticosum minus: quod 26. in Prodr.



## CHONDRILLA ET EJUS SPECIES.

**X**ονδρίλλα ἢ κυχόριον Diosc. l. 2. c. 161. dicitur : & propter formam, quibusdam Seridis agrestis species. An forte apud Theoph. 7. hist. 9. & 11. Ἀπάρη, Fraus Caza.  
Genera duo Dioscoridi: Plinius, l. 6. c. 22. unius meminit.

*Chondrilla lutea.*

I. Chondrilla juncea viscosa arvensis: quæ prima Dioscoridis.

Cichorea procera vel 5. Trag.

Chondrilla, Tur. altera, Cord. in Diosc.

Condrilla viminea viscosa vinearum. Ad. Lob. ico. Lugd.

Cichoreum syl. luteum, Dod.

Condriillæ species in collibus & vineis, Cæf.

Condrilla viminalibus virgis, Clus. hist.

an Chondrilla Bellonio.

Chondrilla juncea, Tab. Ger.

Chondrilla prima Dioscoridis, Colum.

II. Chondrilla viminea viscosa Monspeliaca: quæ 1. in Prod.

III. Chondrilla viscosa caule foliis obducto. Chond. saxatilis viscosa caule *κνυμυδιόρρογω*, Col.

IV. Chondrilla viscosa humilis: quæ 2. in

V. Chondrilla viscosæ affinis. (Prod.

Ixopus, Cord. hist.

Seris longifolia Mutoni, an Chondrilla altera Dioscor. Lob. ob. quid est?

VI. Chondrilla bulbosa. five Chondrilla 2. an *περδίνιον*, Theoph. 1. hist. 11. (Diosc.

Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa, Ad. Lob. ico.

Cichorium bulbosum Dalechampij, Lugd.

Cichorium strumosum Myconi, Lugd.

Herba terræ crepolæ similis. Cæf.

an Chondrillæ 2. species, cui florem purpureum tribuit, Ang.

Condrilla altera Diosc. putata, Clus. hist.

Chondrilla altera Diosc. Clus. hist. Columb.

Chondrilla marina, Tab. Ger.

VII. Chondrilla bulbosa major & ramosa.

Condrilla secunda, Cæsalp.

Hæmorrhoidalis, Cast.

VIII. Chond bulbosa Syriaca foliis latioribus.

Chond. alterius aliud genus, Rauvv. Clus. hist.

Chondrillæ aliud genus, Diosc. Lugd.

IX. Chondrilla bulbosa, Cyriaca foliis angustioribus.

Chondr. Diosc. altera, Rauvv. Lugd. Clus. hist.

X. Chondr. verrucaria fol. cichorij viridibus.

Cichorium verrucarium, Matth. Cast. Clus. hist.

Zacintha Matth. ico. Cast. Lugd.

Verruca Condrilla, Ad.

Verrucaria, Seridis species, Gesf. hort.

Chondrillæ species in rudibus, Cæf.

XI. Chondrilla foliis Cichorei tomentosis.

Chondrilla prior, Diosc. legitima, Clus. hisp.

Chondrilla verrucaria, Lob. Lugd. (& hist.

Chondrilla prior, Dod. Clus. Lugd.

Hieracium magnum Dalechampij, Lugd.

Chondrilla græca, Tab.

XII. Chondrilla tota hirsuta, Cam. quid?

XIII. Chondrilla prior Matthioli, Cast. &

Chondrilla altera, Lac. (Lugd.

Figmentum ex Cichorio, aliqui existimant.

*Chondrilla cærulea & purpurea.*

I. Chondrilla cærulea latifolia laciniata.

Chondrilla altera, Matth. Cast. prima, Lac.

Chondrilla prima Cichorio similis, Cord. in

Chondrilla tenera, Eid. hist. (Diosc.

Chondrilla latifolia cærulea, Tab. Ger.

Chondrilla purpurascens flore, Lugd. ico.

II. Chondrilla cærulea altera, Cichorij syl. fol.

Chondrilla cærulea Belgarum, Ad. Lob.

Chondrilla, Dod. gal. altera, Eidem.

Apate Dalech: Lugd.

Chondrilla cærulea & alba, Tab.

Chond. cærul. & lutea, Ger.

Chond. cæruleo flore, Caccialepore Italica, Cam.

Chondrilla, Cæf. & prima, Ang.

Flore est cæruleo, rarius albo.

III. Chondrilla foliis laciniatis serratis purpurascens flore.

sub Superba recetiorum anonymos habent Ad.

Chondrilla rara purpurante flore semine nitido deciduo, Lob.

Chondrilla rara purpurea Lobeli, Lugd.

Chondrilla Hispanica Narbonensis, Tab.

Senecio Carduus Apulus, Colum.

In hortis latioribus est foliis, ut Tab. pingit;

Columnæ optima est, prout spontè provenit.

IV. Chondr. purpureo flore, radice crassa, Jaccis congener, Cam. quid?

V. Chondrilla purpurascens fœtida.

Chondrilla rubra fœtida, Eyf.

In Phy. opinace & in Prod. pro 3. descripta.

VI. Chondrilla cærulea cyani capitulo.

Sesamoides parvum, Matth. Cast. Cam. Tab.

Ger. minus Matthioli, Lugd.

Corono-

Coronopus quidam flore cæruleo, Gefn. col.  
Sesamoides parva Diosc. Ad. Lob.  
Chondrillæ species tertia, Dod.  
Catanance quorundam, Lugd.

Cyanus forsan Plinij, Colum.

VII. Chond. cærulea cyani capitulis altera.  
Sesam. parvū fl. magis completo, Cam. ad Matt.  
Chond. Sesam. dicta cærulea fl. completo, Eyst.

### SENETIO EJVSVQE SPECIES.

**S**enecio *ἡριέγων* Dioscoridi, l. 4. c. 97. quasi Vernus senex quod flores Vere capillorum ritu canescant, & in lanuginem abeant. Theoph. 7. hist. 7. inter olera & intubacea numerat: quod per totum annum penè assiduo germinet floris productione, 7. hist. 10. semper enim alterum alteri succedens, tempora omnia occupat, idq; propter alimentum quandam mediocritatem, ut loquitur 1. caus. plant. 27. Plinio, l. 25. c. 13. Erigeron, quod à nostris vocatur Senecio. At nullas differentias, Theoph. & Diosc. proponunt. Plinio vero monente quidam & alterum genus fecere, non quale esset demonstrare.

#### I. Senecio minor vulgaris.

Erigerum, Dioscoridis ac Plinij.  
Verbena fœmina, Brunf. qui in postremâ editione se errasse fateatur.  
Senecio vulgaris & 1. & Herbulum Trag.  
Senecio minus Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diosc.  
Ang. Gefn. hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cæs.  
cui & Carduncellus. Senecio minor, Cast.  
Erigeron secundum, Dod. gal. minus, Eid.  
Senecio 1. Tab. sub Erygero tomentoso, Ger. ico.  
Erigeron seu Senecio vulgaris, Thal.

#### II. Senecio minor latiore folio sive montana.

Senecio in montibus, Cæs.  
Senecio 2. vel montana, Tab.  
Erigerum, Ger.

#### III. Senecio incanus pinguis.

### JACOBÆA ET EJVSVQE SPECIES.

#### I. Jacobæa vulgaris laciniata.

(Lon. Flos S. Jacobi, Brunf. Trag. & Senecio major,  
Senecio major sive flos S. Jacobi, Matth. Cast.  
Lugd. qui & Fuch. & Matth. figuram habet.  
Herba S. Jacobi, Fuch. Cæs.  
D. Jacobi herba vel flos, Gefn. col.  
Jacobæa, Dod. Ger. vulgaris, Clus. hist.  
Jacobæa Senecio, Ad. Lob.  
Herba Jacobæa, Tab.

Artemisia *πολύδαν* Dodonæi, Thal.

Variat folijs: alterius sunt instar Erucae laciniata: alter. ad Raphani fol. accedunt, sed minus hirsuta: tert. querc. tenuifol. instar divisa sunt.  
Senecio major, Cam.

#### II. Jacobæa subrotundo min. laciniato folio.

Verbasculum minimum, Lugd.

#### III. Jacobæa maritima.

Jacobæa marina, vel Chrysanthemum, & Artemisia marina neotericorum, Ad. Lob. ico.  
Cineraria, Dod. Lug. Cæs. (cui Artemis. 1. Diosc.)  
Jacobæa maritima Penæ, Lugd. (Cam.)  
Eruca cinerea, Eid.

Erygeron primum, Dod. gal. majus, Eid.

Senecio fœtidus, Gefn. hort. Lugd.

Erygeron tomentosum alterum, Lob.

Erigeron fœtidum seu majus, Thal.

Jacobæa 1. vel Pannonica mollior, Clus. pan.

Jacobæa Pannonica 1. Eid. hist.

#### IV. Senecio hirsutus.

Senecio 2. Trag. Aphaca, Theoph.

Erigeron tertium, Aphace. Theoph. Thal. Dod.

Erygeron tomentosum & Senecio incana, Lob.

Senecionis species Dodonæi, Lugd.

Senecio tomentosa 3. Tab.

#### V. Senecio ambrosiæ odore.

Senecio flore odorato, Cam.

#### VI. Senecio folio non laciniato.

Senecionis genus Myconi, Lugd.

Achavon abiat, id est, Artemisia alba, Alpin.

#### IV. Jacobæa incana altera.

Jacobæa marina, Dod. gal. Lugd.

Jacobæa altera, Dod.

Cineraria marina, Eyst.

Eandem cum præcedenti dicerem, nisi Dodonæus edit. lat. à Cineraria distingueret: & in Eyst. horto, à Cineraria Lobelij alia dicitur.

#### V. Jacobæa marit. sive Cineraria latifolia.

In Phytopinace, & sub 1. in Prod. descripta.

VI. Jacobæa alpina laciniata fl. huphthalmi.  
Jacobæa 3. Clus. pan. & Jacobæa Pannon. 3.  
latifolia 1. Eid. hist. (ratis.)

#### VII. Jacobæa alpina folijs subrotundis ser-

Conyzæ alpinæ genus, Gefn. hort. & fræt.

Conyza montana, Gefn. col.

Jacobæa latifolia altera, Clus. pan.

Jacobæa 4. vel latifolia 2. Eid. hist.

VIII. Jacobæa mont. lanuginosa angust non  
Jacobæa Pannonica 2. Cl. pan. & hist. (laciniata.)

IX. Jacobæa rotundif. incana: quæ 2. in Prod.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER QVARTVS.

## SECTIO PRIM A.

TANACETUM; PARTHENIUM; CHRYSANTHEMUM;

BUPHTHALMUM; CHAMÆMELUM; COTULA.

TANACETUM EJUSQUE SPECIES.

**T**anacetum, fortè a Tannaco quo nomine Parthenium appellatum fuisse. Plin. l. 21. c. 30 testatur: Parthenon microphyllon fortè Hippocratis, Hermolao. Ἀρτεμισία λεπτέφυλλον & Dioscoridis l. 3. c. 128. quibusdam videtur, nobis non item.

*Tanacetum odoratum.*

I. Tanacetum vulgare luteum.

Tanacet. Matricariæ 2. species & Parthenium,

Tanacetum vulgare, Trag. Eyf. (Brunf.

Tanacet. Matth. Gef. hor. Lon. Dod. Cæ. Ger.

Tanacetum citrin. Thal. maj. Dod. gal. (fol.

Artemisia tenuif. Fuch. in ic. monoclonos, Fuch.

Ambrosia Amato: recentiorum, Cord. in Diof.

Athanasia vulgaris, Lac.

Tanacetum millefolij folijs, floribus Abrotani  
fœminæ, aut Agerati, Ad. Lob.

Athanasia seu Tanacetum, Lugd. Cast.

Artemisia Dioscoridis, Tab.

Flore est luteo, rarius albo, & dicitur

Artemisia flore albo, Taber.

II. Tanacetum folijs crispis.

Tanacetum argutioribus fimbrijs, Ad.

Tanacet. specios. cristat. Anglic. Lob. Lug. Eyf.

Tanacetum crispum, Dod. crispum & Angli-

cum, Cam. in Matth & hort Ger.

Artemisia sativa Anglica, Tab.

III. Tanacetum minus album odore cam-  
phoræ, five Achillææ, Diof.

Millefolium nobile & stratiotes vera, Trag.

TANACETUM AFRICANUM.

**P**lantam hanc aliqui Othonnam Diof. l. 2. c. 215. & Plin. l. 27. c. 12. alij majorem quidem Othonnam, mi-  
norem vero Argemonem Diof. l. 2. c. 208. & Argemoniam, l. 25. c. 9. alij Lycopersum Galeni: alij Caltham  
Plin. l. 21. c. 6. quam gravis odoris dicit: alij Petilium florem Plin. l. 21. c. 8. suspicantur: alij ad Chrysanthemi ge-  
nus referunt, ut Matth. Afric. vel Tunetanus flos dicitur eo quod primum hic flos in German. fuerit illatus. quan-  
do Carol. V. Imp. ad Tunetum victoria potitus est: cum in Africa spontè proveniat. Tanacetum appellare lubet.

I. Tanacet. five flos African. major flore pleno.  
an Othonna Dioscoridis & Plinij.

Caryophyllus Indicus major, Matth. Lugd.

Flos Africanus major, Dod. gal. multiplex, Eid.

Rosa Indica magna, Gef. hort.

Flos & Caryoph. Indic. & Pedua Punica lingua.

Achil. Mat. Lac. Cord. in Diof. & hist. Thal. Cast.

Millefolium stratiotes, & Stratiotes, Gef. hor.

Achillea five millefolium nobile, Tab. Ger.

Tanacet. minus, Dod. candidis florib. Lob. Lug.

Achillea sideritis, Lugd.

Scopa regia Plinij, Dalech. in Plin.

Floribus candidis, purpureis & au-  
lantibus, Matthiolo.

IV. Tanacetum alpinum odoratum.

Iva moschata Rhæris, Tanacero cognata her-  
bula, Gef. hort.

Tanacetum parvum alpinum, Lugd.

*Tanacetum inodorum.*

I. Tanacetum mont. inodor. minore flore.

Sideritis 3. Matthioli, quoad folia, & Lugd.

Tanacet. inodor. Dod. Ger. fl. bellidis maj. Eyf.

Tanacetum non odorum sylv. Ad.

Tanacet. inodor. 2. Clus. pan. & hist. (Lob.

Tanacet. non odor. perperam sideritis Italorum,

Tanacetum album seu λευκον, Thal.

Athanasia Leucanthemos, Lugd.

Tanacetum Leucanthemum, Tab.

II. Tanacetum inodorum flore majore.

Tanac. inodor. 1. vel ampliore fl. Clus. pa. & hist.

Caltha Africana fruticosa, Eid.

Othonna major polyanthos, Ad. Lob.

Flos seu Caryophyllus Indicus major, Cast.

Flos Indiæ vulgo. Othona veterum, Cæf.

Flos Indicus major flore pleno, Cam.

Flos Africanus major aureus multiflorus, Tab.

Flos Africanus major polyanthos, Ger.

Caryoph. Indic. fl. multip. luteo pleno major, &

Caryoph. major Indic. fl. multip. aureo, Eyft.

Caryophylli Hispan. dicti prima varietas, Col.

Variat flore, qui aliquando ad Pugni magnitudinem crescit, & in globum colligitur; hinc Svvert. & Bry.

Aphricanus flos max. flore aurantij colore.

Aphricanus major flore pleno: addit Bry.

Caryophyllum Indicum majorem luteum, vel aureum; sic & colore est luteo, pallido, aureo. Aliquando in uno flore observata folia, 230 bifida & trifida, & per margines punctis notata.

II. Tanacet. African. majus simplici flore.

Caltha Africana flore simplici, Ges. hort.

Flos Africanus major simplici flore, Lobel. ico. Tab. Ger.

Flos Ind. major flore simplici, Cam.

Africanus flos maximus simplex flore luteo, Svvert. Bry.

Caryophylli Hispanici dicti tertia & quarta varietas, Colum.

Variat: colore est croceo, est pallente: petalis octonis, aliquando novenis.

I. Tanac. African. seu flos Africanus minor.

an Argemone Dioscorid. Argemonia Plinij.

Caryophylli Indici, Trag.

Flos vel Caryophyllus Indic. minor, Ges. hor.

Caryophyllus Indicus minor, Matth. Ges. col. Lugd. Cast.

Flos Africanus, Dod. Lob. Indian. minor, Lon.

Flos Indianus seu Viola flammea, Fuch.

Tagetes Indica, Eid. Lugd.

Othonna, Lac. Italorum & ocellus African. Ad Tanacetum Peruvianum, Cord. hist.

Caltha Africana minor flore simplici, Ges. hor.

Viola flammea quibusdam, Eid.

Flos Portugalicus vel Indicus minor, Eid. col.

Pedua Pœnorum, Guil. pap.

Flos Indiæ alter minor, Argemone veter. Cæs.

Flos Africanus minor flore simplici & multiflorus, Tab. Ger.

Flos Ind. minor flore simplici & pleno, Cam.

Caryophyllus Indicus fl. luteo, simpl. minor & Caryoph. Indic. fl. aureo simpl. minor, Eyft.

Variat flore simplici & pleno: quamvis multiplex rarus sit: croceos, melleos & albos reperiri, Amatus scribit; adde & rubros: aliud citius, aliud tardius floret.

Africanus flos simplex & Africanus flos alter pleno flore, Svvert. Bry.

Caryoph. Indic. fl. luteo rubescens simp. min. & Caryoph. Indic. plenus fl. luteo rubescens minor, Eyft.

Caryophylli Hisp. dicti altera varietas, Colum.

IV. Tanacetum Africanum minimum sericea hirsutia obsitum.

Caryophylli Hispanici dicti varietas septima & octava, Colum.

Variat flore simplici quinis petalis, & altera polyanthos, Colum.

V. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso simplici.

Caryoph. Mexican. fistuloso flore simp. Colum.

VI. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso pleno.

Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fistuloso flore, Colum.

VII. Tanac. African. folijs tenuissimè divisis.

Caryophylli Hisp. dicti varietas nona, Colum.

VIII. Flos Indicus.

Jolo Suchil, id est, flos cordialis, figura & magnitudine cor representans: Joseph. Acosta l. 4. hist. Ind. Occid. cap. 27.

IX. Angiers, Indiæ flores holoserici tactu referentes, in odori aspectu amabiles: Idem.

## PARTHENIUM.

**P**arthenium, quasi Virginalis. quod morbus mulierum uterinis medeatur (hinc vulgo Matricaria) Diosc. l. 3. c. 155. cui & Aëginetæ, ut & Galeno & Aëginetæ. Plin. & Artemis. l. 25. c. 6. & Mercur. l. 25. c. 5. & huic Parthen. nomen tribuit: at de Matricaria agit l. 21. c. 30. quod in hortorum sepibus flore albo nasci scribit. Unius meminere.

I. Matricaria vulgaris, seu sativa.

Amaracus Galeno & Aëginetæ, Crispula Man.

Matricaria, Parthenij i. species. Brunf.

Artemisia tenuifolia, Fuch. Tab.

Artemisiam ramosam altera species, Fuch. ico.

II. Matricaria sylvestris flore toto luteo.

Matricaria sylvestris, Trag.

Artemisiam tenuifoliam altera species, Thal.

Matricaria, Trag. Lon. Dod. Lugd. Cæs. Camer. Ger.

Matricaria nostras. Ad. Lob. fl. simplici, Eyft.

Parthenium, March. Dod. gal. Lac. Cord. in Dioscor. Ges. hor. Cast. Thal. 2. Tur.

Amaracus Galeni, Eric. Cord.

III. *Matricaria odorator.**Matricaria altera ex Ilua, Cam.**Artemisia tenuifolia odorata, Tab.*IV. *Matricaria flore pleno.**Matricaria duplici flore, Lob. ico. Ger.**Matricaria pleno flore, Cam. Eyf.**Parthenium pleno sive polyphylo flore, Clus. pan. & hift.**Artemisia tenuifolia flore pleno, Tab.*V. *Matricaria inodora.**Achaovan, Parthenium inodorum, Alpi.*VI. *Matricaria alpina Chamæmeli folijs.**Parthenium alpinum, Clus. pan. & hift.**Matricaria sive Parthenium alpinum, Cam.*VII. *Matricaria folijs abrotani.**Parthenium σμυρόφυλλον, Myconi, Lugd.*VIII. *Matricaria maritima.**Cotula sive Parthenium marinum minimum, Ad. Lob. ico.**Parthenium maritimum minimum, Lugd.**Chamæmelum minimum, Dalech. Eid.*

## CHYSANTHEMUM ET BUPHTHALMUM.

**X**ρυσάνθεμον, propter flores luteos aureo fulgore splendentes, Dioscoridi, l. 4. c. 58. & quia orbem oculi imitantur, etiam βύφθαλμον dicitur.

βύφθαλμον adjungimus, quod flore simile sit boum oculis, Plin. l. 25. c. 8. de quo Dioscorides, l. 3. c. 156. post Parthenium egit, qui utrique planta βύφθαλμος nomen tribuit. Dein, quia forma & viribus plurimum conveniunt, ita ut dubitari possit, sint ne apud Diosc. & Plinium diversa plantæ, an verò eadem, quod ex capitis utriusque collatione clarum fiet: quare Galenus & Aegineta, Buphthalmi, non vero Chrysanthemi, meminere.

Genus Chrysanthemi unicum est Dioscoridi & Plinio, licet. l. 26. c. 8. Chrysanthemi primi meminerit, ubi pro primo, potum legendum censemus.

I. *Chrysanthemum folijs matricariæ.**Tinctorius flos 4. Trag.**Chrysanthemum, Matth. Lac.**Chrysanthemum & Chalcitis, Tab.**Chrysanthemum segetum, Ger.**II. Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo.**Buphthalmi altera species, Gesn. hort.**Chrysanthemum Creticum mixtum, Eyf.**III. Chrysanthemum majus folio profundius laciniato magno flore.**Chrysanthemum Creticum 1. Clus. hift. luteum, Eyfett.**IV. Chrysanthem. majus folio in minores lacinias diviso.**Chrysanthemum Creticum 2. Clus. hift.**an Chrysanthemum, quod crudum edunt in Lemno insula, Bellon.**an Chrysanthemum quod ματελίνα vocatur & à rusticis editur, Belli epist. 1. ad Clusium.**Chrysanthemum alpinum.**I. Chrysanthemum alpinum incanum folijs laciniatis.**Chrysanthemum alpinum 1. Clus. pan. & hift.**II. Chrysanth. alp. folijs abrotani multifidis.**Achillæa montana Artemisiæ tenuifoliæ facie, Ad. Lob. ico.**Achillæa montana, Lugd. Tab.**Ageratum ferulaceum, Lugd.**Chrysanthemum alpinum 2. Clus. pan. & hift.**III. Chrysanth. alp. fol. longis tenuiter incis.**Chrysanthemum alpinum 3. Clus. pan. & hift.**Buphthalmum.**I. Buphthalmum, Tanacetii minoris folijs.**Buphthalmum, Trag. Matth. Lac. mille folij**folio Chrysanthemi flore, Ad. Lob. Cast. Lugd.**Cam. Tab. sub Buphthalmo albo, Ger.**Buphthalmus & Chrysanthemum, Gesn. hort.**Buphthalmus qui & crisipula herba, Amato.**Buphthalmum vulgare, Clus. pan. & hift.**Chamæmelum chrysanthemum, Fuch.**Cotula lutea, sive tertia, Dod.**Chrysanth. Cord. in Diosc. Tur. tenuifol. Eyf.**Chrysanthemum verum, Gesn. col.**Aster Atticus, Cord. hift. ico.**Cotula non fœtida, Lon.**II. Buphthal. fl. luteo subtus purpurascente.**Buphthalmum Narbonense, Clus. Pan. & hift.**Buphthalmum tenuifolium Narbonense, Lob. obs. descript.**Buphthalmum verum, Dalech. Lugd.**Buphthal. flore purpurascente, Cam. in Matth.**III. Buphthalmum cotulæ folio.**Buphthalmum alterum folio & facie cotulæ fœtidæ, Ad. Lob. ico.**Buphthalmum alterum Penæ, Lugd.*

IV. Chry-

IV. Chrysanth. fruticosus subcandidum.  
Chrysanthemum alterum ex Sicilia, Cæs.  
Bupthalmum, Camer. in Matth. icon. verum,  
Tab. Ger.  
Chrysanthemum primum, Cæs.  
V. Bupthalm. lanuginos. folijs millefolij.

an Dioscoridis?  
Chrysanthemum Valentinum, Clus. Hispan.  
pan. & hist. Lob. ico. Ger.  
Bupthalmum tenuifolium Narbonense, Lob.  
ob. quoad icon.  
Chrysanthemum Hispanicum, Tab.

## CHAMÆMELVM ET COTVLA.

**A** "Nōtus Dioscoridi, lib. 3. cap. 154. αἰθέμον Theoph. 7. hist. 13. dicitur & χαμαίμελον, quod mali odorem habeat, Plinio, lib. 22. cap. 21. cui & Anthemis.

Genera plura Theophrasto: at Dioscoridi & Plinio tria, flore tantum distantia: flores in medio auri, orbiculato ambitu candidi & λευκάθημα: melini & χρυσάνθημα: aut purpurei, & propriè ῥεάνθημα vocatur.

I. Chamæmelum vulgare, Leucanth. Diof.  
Chamæmelum (Parthenii 3. species) Brunf. Lac.  
Cæs. Cast. Thal. Tab. Ger.  
Chamomilla Amato 3. & vulgaris Trag. Lon.  
Chamæmilla Ang. Chamæmelon, Thal.  
Chamæmelum Leucanth. Fuch. Gesn. hort.  
Chamæm. syl. Dod. gal. vulgare Gesn. hor. Dod.  
& arvense Cam.

Chamæmelum vel Anthemis vera, Gesn. hor.  
Anthem. Tur. Cord. in Diof. Matth. Gesn. col.  
Anthemis vulgarior sive Chamæmill. Ad. Lob.  
Chamæmelum sylv. Matthiol. & Dod. utriusque figura posita, Lugdun.

II. Chamæmelum nobile sive Leucanthemum odoratius.  
Parthenium Diof. & nobilis Chamom. Trag.  
Chamæmelum Leucanthem. Dod. gal. Tur.  
Leucanthemum odoratum, Dod.  
Chamæmel. hortense, Gesn. hor. vel nobile, Eid.  
Chamæmel. leucanthemum odoratum, Dod.  
Parthenium nobile, Eid. ap.  
Chamomilla nobilis, Lon.

Anthemis, sive Leucanth. odorati?, Roman. Ad.  
Anthemis seu Leucanthemis odorata, Lob.  
Anthemis Leucanthemos, Lugd.  
Chamæmel odorat. Ital. simplici flore, Cam.  
Chamæm. Roman. Tab. Ger. fl. simplici, Eyst.

III Chamæmelum leucanthemum Hispanicum magno flore: quod. 1. est in Prod.

IV. Chamæmelum Chrysanthemum Hispan. odorat: quod 2. in Prod.

V. Chamæmelum nobile flore multiplici.  
an Leucanthemum Plinij, Ang.  
Leucanthemum niveum Anglorum flore multiplici, Ad. Lob. ico.  
Chamæmel leucanth. odorat. multiplex, Dod.  
Anthemis leucanthemon nivea Angl. flore multiplici, Lugd.

Chamæmelum Romanum flore multiplici,  
Cam. in Matth. Tab. Eyst.

Chamæmelum Anglicum flore multiplici, Ger.  
Floribus variat, qui altero globosus albus, ut apices lutei non conspiciantur: in altero adhuc conspiciuntur: est 3. & 4. species, Tab. aliquando flores latitudine Ducatum Ungaricum exæquant.

VI. Chamæmel. luteum capitulo aphylo.  
Chamæmelum Chrysanthemum, Dod. gal.  
Chamæmel. Chrysanth. odoratum, Eid. post.  
Anthemis Chrysanthemos herbariorum, Ad. Lob. Lugd.

Chamæmelum hort. alterum, Gesn. hort.  
Chamæmelum luteum odoratum, Eid. ap.  
Chamæmelum luteum, Tab. fig. trans.  
Chamæmelum nudum odoratum, Ger.  
Chamæm. inodor. & fœtidum, sive COTULA.

VII. Chamæmelum inodorum.  
Cotula, Brunf. Tab.  
Chamomilla fatua, & 4. Trag.  
Bupth. Fuch. Er. Cord. majus, Cord. in Diof.  
Cotula non fœtida, Dod. gal. Gesn. ap. Lugd.  
Cotula inodora, Ad.  
Cotula alba non fœtida, an Melandrium Plinij, Dod. post.

Solo odore à Chamom. vulgari distinguitur.

VIII. Chamæmelum fœtidum.  
Parthenion lephophyllum Hippocratis.  
Cotula fœtida, Parthenij 4. species Brunf.  
Chamomilla 2. & sylv. Trag.  
Cotula fœtida, Dod. gal. Er. Cordo (cui & caninum anethum Germ.) Lac. Gesn. hort. Guil.  
Lon. Lob. ico. Lugd. Cast. Cam. Eyst.  
Parthenium, Fuch. Ad. Tab. primum, Tur.  
Bupthalmum minus, Cord. in Diof.  
Cotula alba, Dod.

Κυανθέμις, Parthenium vel virginea, Lob.  
Chamæ-



Chamæmelum album seu foetidum, Thal.

Cota vulgo, Buphtal. Diosc. Gal. & Plinij, Cæs.

Flore pleno, aliquando etiam in agris reperi-

IX. Chamæmelum alpinum.

Pyrethrum alpinum, Gesn. hort.

Leucanthemum alpinum, Clus. pan. & hist.

X. Chamæmelum Leucanthemum incanum Hispanicum minus: quod 3. in Prod.



## SECTIO SECUNDA

ABROTANVM; ARTEMISIA; AMBROSIA;

BOTRYS; ABSINTHIUM.

ABROTANVM EIVSQUE SPECIES.

**A**βρότανον Dioscoridi, l. 3. c. 29. sic dictum Nicandri interpreti, διὰ τὸ πρὸς ὄψιν ἀβρὸν ἢ ἀπαλὸν φαίνεσθαι: ἔλκει ἢ διὰ τὸ ἀύαντον εἶναι: Hoc est, quod conspectu tenerum, molle & delicatum appareat: aut quod gravem, acremq; & diffilem halitum spiret.

Genera duo Theoph. urbana, 6. hist. 1. & agrestis, 6. caus. 24. Dioscoridi semina & mas. Sic Plinio l. 21. c. 7. mas, Abrotanum campestre: semina vero, montanum. At Dioscoridis seminam, Chamacyparissi id est, pumila Cupressi nomine, Plin. l. 24. c. 15. donasse videtur.

I. Abrotanum latifolium arborescens.

Absinthium del Comasco, Ang.

Abrotanum femina arborescens, Dod.

Absinthium arborescens, Lob. Lugd. Tab. Ger.

II. Abrotanum latifolium inodorum.

Abrotanum inodorum, Lob. Lugd. Ger.

Absinthium inodorum & insipidum, Dod. ico.

Abrotanum latifolium, Tab.

Artemisia tenuifolia 2. Clus. hist. ico.

III. Abrotanum mas angustifolium majus.

Abrotanum mas, Brunf. Dod. cui etiam 2. &

minus, Matth. Lac. Gesn. hort. Corn. Ad. Lob.

Cast. Lugd. Tab. (sive masculum majus) Cam. Franco, Ger. Eyst.

Abrotanum primum & minus, Trag.

Abrotanum vulgare mas, Fuch.

Abrot. nigrum seu mas, Cord. in Diosc. & hist.

Abrotanum mas Diosc. montanum Plinij, Cæs.

Abrotanum mas vulgare montanum femina nostras forte, Colum.

Abrotanum femina, Dod. gal. Ang.

IV. Abrotanum mas angustifol. maximum.

Abrotanum majus, & 2. Trag.

Abrotanum magnum camphoratum, quibusdam Incensaria, Cam.

Abrotanum mas magnum, Franco.

Abrotanum mas vulgare magnum in hortis cultum, Colum.

V. Abrotanum mas angustifolium incanum.

Abrotanum mas minus, Tab.

an Abrotanum mas incanum, Colum.

VI. Abrotanum mas angustifolium minus.

Abrotanum tertium, Dod. gal.

Abrotanum odoratum humile, Eid. Lugd.

Abrot. odorat. humile dense fruticosum, Lob.

Abrotanum humile, Tab. Ger.

VII. Abrotanum campestre.

Abrotanum syl. vel 4. Trag.

Ambrosia, Lac. Lon. Cast. altera, Matth. Lugd.

Cam. tertia, Tab.

Ambrosia tenuifolia, Lob.

Artemisia leptophyllos, Gesn. hort.

Artemisia tenuifolia, Dod. Thal. 3. Clus. hist. def.

Artemisia 3. Diosc. leptophyllon, Ad. Lob. ico.

Abrotanum campestre, Tab. Ger. (Lugd.

Duplex est: nam alteri cauliculi sunt albicantes, alteri rubentes: illud

Artemisia tenuif. 1. vel incana, Clusij in Pan. at

secunda in hist. hoc vero, 2. vel purpurascens, E-

jusdem in Pan. at in hist. tenuif. 3. esse videtur.

VIII. Abrotanum campestre incanum Carlinæ odore: in Prodomo descriptum.

an Artemisia tenuifolia, 1. Clus. hist.

Abrotanum femina vulgi.

I. Abrotanum femina folijs teretibus.

Chamacyparissus Plinij, Trag. Fuch. Eric. &

Val. Cord. Dod. gal. Tur. Gesn. hort. Lon.

Santolina, Ang. prima, Dod.

Abrotanum femina, Brunf. Matth. Lac. Ad.

Lob. Cast. vulg. 1. Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Ger. Cam. in Matth. Eyst.

Santonium minus, Cord. hist.

Centonia, Gesn. hort.

Polium, Theoph. Diosc. & Arabum, Colum.

Santo-



Sanctolina vulgo, aliis Crespolina, Cæs.

Abfinthium marinum, Tab.

II. Abrotanum fœmina flore majore, folijs villosis & incanis.

Santonicum majus, Cord. hist.

Santolina altera, Dod.

Seriphium Diof. abrotani fœm. facie, Ad. Lob.

Seriphium verum Penæ Lugd.

Abfinthium marinum 1. Tab.

Abrotanum fœmina 3. Cluf. hist.

Polij altera species major, Colum.

III. Abrotanum fœmina folijs Ericæ, vel Santolina 3. Dod.

Chamæcyparissus Dalechampij, Lugd.

Unguentaria Lutetianorum.

IV. Abrotanum fœmina folijs Cupressi.

Abrotanum peregrinum Cupressi folijs, Ad.

Santolina 4. Dod.

V. Abrotanum fœmina Sabinæ folio.

Hujus Lobelius in observationibus meminit.

VI. Abrotanum fœmina repens canescens.

Santolina 5. Dod.

VII. Abrot. fœmina folijs minus incanis.

Abrotanum fœm. 2. Cluf. hist.

Abrot. fœm. folijs magis viridibus, Cam. hort.

Polij altera species non ita incana, Colum.

VIII. Abrotanum fœmina viridis.

Abrotanum fœm. Salmantic. 2. Cluf. hisp. at 6. in hist.

IX. Abrotan. fœm. folijs rorismarini majus.

Abrotanum fœmina Salmanticensis prima, Cluf. hisp. at 4. in hist.

X. Abrotanum fœmina folijs rorismarini minus.

Abrotani fœminæ Salmanticensis 1. altera species, Cluf. hisp. & Abrot. fœmina 5. Eid. hist.

## ARTEMISIA EJVSQUE SPECIES.

**A** *Ἐπελῆτις* Dioscoridis, l. 3. c. 127. sic dicta ab *Artemisia* Manfoli Caria Regis uxore, qua hanc sibi, ut loquitur Plin. l. 25. c. 7. adoptavit, cum antea *παρθένος* id est, *Virginalis*; quod virgo Dea illi nomen dederit, vocaretur: quare Apulejus etiam *παρθένος* dici affirmat. Sunt qui ab *Artemide* *Ilythia* cognominatam putent, quoniam privatim fœminarum malis, quibus *ἄρτεως*, id est, *Diana* praeest, medeatur.

Genera duo Diof. proposuit: in quibusdam verò codicibus Græcis, ut Marcelli, Goupylij, Assulani, Saraceni, sequitur & aliud caput de *Artemisia* quod spurium videtur: quare Ruellius, in sua interpretatione omisit. Marcellus Virgilius, ut adscititium damnavit: Cornarus, ut supposititium ex textu Latino removit: non immerito, cum nec apud Galenum, Oribasium, Aeginetam, Aëtium, nec apud Serapionem, de tertiâ specie quidquam legatur, qui tamen simplicia ex Dioscoride enumerant. Sic Plinio genera duo, alterum folijs latioribus, alterum tenuioribus.

I. *Artemisia vulgaris* major.

*Artemisia*, Parthenij 8. species, Brunf.

*Artemisia*, Trag. Ang. Matth. Lac. Cord. in Diof.

Amat. Gesn. hort. Ad. Cam. communis, Dod. gal.

*Artemisia vulgaris*, Tur. Cluf. hist. Thal.

*Artemisia* major, Cord. hist.

*Artemisia latifolia*, Fuch. Lon. Dod.

*Artemisia mater herbarum*, Lob. Ger.

*Artemisia* 1. vulgaris, Lugd.

*Artemisia vulgaris*, & *Artemisia* altera polyclonos dicta, Diof. Cæs.

*Artemisia rubra* & *alba*, Tab.

Variat colore caulis & floris: una, caule & fl.

rubro purpurascente, seu subpurpurascen-  
te; altera, caule ex viridi albicante, vel subpallente  
spadiceove: hinc apud Tab. & Ger. figuræ duæ.

II. *Artemisia vulgaris* minor.

*Artemisia* minor, Matth. Cast.

Priore minor est & unum tantum caulem  
prodit.

III. *Artemisia montana*.

*Artemisia leptophyllos montana*, Lugd.

IV. *Artemisia polyspermos*.

*Artemisia monoclonos* quorundam, alijs *Ambrosia*, Lugd.

an *Ambrosia* 2. Tab.

## AMBROSIA.

**A** *Ἀμβροσία* Dioscorid. lib. 3. cap. 120. *Artemisia* subjicit, Veteribus τὸ τῶν θεῶν βρώμα, id est, Deorum  
cibus dicitur, quod mortales eam non edant: vel quod, qui eam ederint, immortales evadant, ita  
eximia fragrantia gratia, etiam Dijs expetita. Sunt qui *Ambrosiam* Dioscorid. *Conyzam* Hipp. de morbis  
mukieb. & *Artemisiam* secundam Plinij velint.

I. Ambrosia maritima.  
 Conyza Hippocratis, Ang. ut quidam nominant, Gef. hort. Cam. (Gef. hor.  
 Ambr. quibusd. dicta, Artemisiæ forsan species,  
 Ambrosia sativa hortensis, Lob.  
 Ambrosia, Dod. Ad. Cæs. Cam. prima, Tab.  
 Ambrosia hortensis procerior, Lugd.  
 Artemisia monoclonos, Eid.  
 Plerumque ramosa est, rarius uniuersalis; hinc  
 duæ figuræ in hist. Lugd.

II. Ambrosia campestris repens.  
 Ambrosia, Matth.  
 Ambrosia spontanea strigosior, Lob.  
 Ambrosia prima Matthioli, Lugd.  
 Coronopus Ruellij, Dod. gal. Gef. hor. Lugd.  
 Coronopus repens, Lob. Lugd. Tab. Cam.  
 Cornu cervi alterum repens, Dod.  
 Pseudoambrosia, Nasturtium verrucarium quibusdam, Cam. in Matth.  
 Carara, Cæs. alp.

## B O T R Y S.

**B** *Ὀτρύς* Diosc. l. 3, c. 130. quam Cappadoces Ambrosiam, alij Artemisiam vocarunt: Botrys Plin. l. 27, c. 8. quam l. 25, c. 7. cum Artemisia confundit: sic dicta à semine, quod racematim ramulis adnascitur.

I. Botrys Ambrosioides vulgaris.  
 Botrys, Trag. Matth. Fuch. Tur. Ang. Dod. Lac. Amat. Ruell. Cord. hist. Gef. Ad. Lob. Cast. Cæs. Lugd. Tab. Cornaro. Ger. Cam. cui & Patientia Italorum.

Botrys Artemisia Turcica, Eyf.  
 Botrys, altera Ambrosiæ species, cujus semen Amomum officin. quibusdam, Cord. in Diosc.

II. Botrys Ambrosioides Mexiocana: cujus semen Parote Mexiocanæ nomine missum, in horto D. D. Plateri, feliciter Anno 1619. & sequentibus crevit.

III. Botrys Chamædryoides.  
 Chamæcyparissus agrestis & Chamæpitys altera Dioscoridis, Trag.  
 Chamædryas altera, Matth. Cast. Lugd. Thal.  
 Chamædryas femina, Dod. gal. Tur. Cæs. Lugd. Cam. Ger. vera femina, Fuch. ico.  
 Trixago vera, Lon.  
 Chamædryas laciniatis folijs, Lob.  
 Chamæpitys altera, Dod.  
 Chamædryas minima, Lugd.  
 Iva moschata, Tab.  
 Aiuga, vel Chamæpitys multifidis fol. Clus. hist.

## ABSINTHIUM EJUSQUE SPECIES.

**A** *ἄνθρον* Dioscoridi l. 3, c. 26. Sic dictum quasi ἀνθρον Comicis, quasi impotabile, propter insignem amarorem, ὃ ἐν αὐτῇ τὴν πικρὰν ἀμφοτέρωθεν: unde ὀπιδύμωρον, intensa amaritudinis.

Genera tria Dioscoridi, Ponticum, Marinum sive Seriphium, & Santonicum, & Galeno & Plinio lib. 27. cap. 7. Theoph. 9. hist. 18. Absinthij in Ponto provenientis tantum meminit.

*Absinthium Ponticum.*

I. Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis.

Absinthium, Brunf. Matth. Cord. in Diosc. & hist. Lon. Cæs.

Absinthium Pontic. Ruel. legitimum, Bellon.  
 Absinth. vulgare, Trag. Fuch. ico. Lac. Gef. Guil. Ad. Lob. Cast. Tab. Lugd. seu Rom. Pontic Eyf.  
 Absinthium commune, Tur. Gefn. Cam. quod Ponticum Trincavellæ dicit.

Absinthium nostrum rusticum, Thal.

Absinthium Santonicum, Dod. gal.

Absinthium majus & vulgare, Clus. pan.

Absinthium latifolium, Dod. Ger.

II. Absinthium Ponticum montanum.

Absinthium commune minus, Gef. hort.

Absinth. mont. Cam. in Matth. seu Roman. Tab.

Absinthium tenuifolium pont. Galeni, Ger. ico.

Absinthij alterum genus, tale quale Ponticum

traditur, Cæs. alp.

Simile vulgari, nisi quod exiliora omnia, & amaritudo gratior.

III. Absinthium pont. Creticum grati odoris.  
 Absinthium in Græcia communissimum, quod ἀβουβία vocant, Ang.

Absinthium Ponticum Belli, quod ἀπὸ τῆς ἀβουβίας in Græcia vocatur: ut ad me Honorius Belli, & scripsit, & plantam misit, ut in Appendice Phytopinacis & sub 1. in Prod. videre est.

IV. Absinthium Pontic. tenuifolium incanum.  
 Abrotanum minus & 1. Trag.

Abrotanum femina, Fuch. à Cordo existimat.

Absinthij genus potius, Gef. hor. Lon. Lugd.

Abrotanum album, sive femina, Cord. in Diosc.

Absinthium Santonicum, Ruel. Cæs.

Absinthium Pontic. Matth. Fuch. ico. Dod. gal.

Fuchij Gef. hor. append. Guil. Lug. Tab. vulgare.

Clus. pan. & hist.

Abſinthium Roman. Meſuei, Tur.  
 Abſinthium tenuifolium, Dod.  
 Abſinth. Galatium Sardonium Dioſc. Ad. Lob.  
 Abſinthium Romanum vulgare, Cam.  
 Abſinthium Ponticum album, Eyſt.

Hoc medium eſt inter Abſinthium & Abro-  
 tanum, & eſt duum generum : 1. planè inca-  
 num : 2. cauliculis purpureſcentibus, folijs ſu-  
 pina parte viridioribus.

V. Abſinth. Pont. tenuifolium Auſtriacum.  
 an Abſinth. Pont. Trident. herbarior. Lob. Lug.  
 Abſinth. tenuifol. Auſtriacum, Cluſ. pan. & hiſt.  
 Abſinthium Seriphium, Dod.

an Abſinthium Nabathæum Avicennæ, Tab.  
 an Abſinthium tenuifol. ſeu Romanum, Ger.

VI. Abſinth. Pontic. repens vel ſupinum.  
 Abſinthium ſupinum, Geſn. hort.  
 Abſinth. Pont. ſupinum Herbariorum, Lob. ob.  
 Abſinthium repens, Tab.

Abſinthium marinum latifolium, Ger. ico.

VII. Abſinth. inſipidū abſinthio vulgari ſimile.  
 Abſinthium inſipidum, Geſn. hort. Lob. ob.  
 an Abſinthium dulce, Cluſ. hiſt.  
 Abſinthium inodorum, inſipidum, vel fatuum,  
 Dod. deſc.

*Abſinthium Seriphium ſive maritimum.*

I. Abſinth. maritimum Lavendulæ folio.  
 Abſinth. marinum ſive ſeriphium, Matth. Lugd.  
 Abſinthium Seriphium, Lac.  
 Abſinthium maritimum Volmaro, Geſn. ap.  
 an Abſinthium Seriphium, Amat.  
 Abſinthium marinum, Tur. Cæſ.  
 Artemiſia marina, Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.  
 Artemiſia folio Lavendulæ, Cluſ.  
 Abſinthium anguſtifolium, Dod.  
 Seriphia Paludio, Lugd. (Eyſt.)

Abſinth. latifol. marin. aromatico odore, Cam.  
 Hoc folijs ludit, ſuperioribus in aliquot laci-  
 nias diviſis, potiſſimum ſi in hortos transfera-  
 tur : & hujus peculiaris figura habetur, nomine  
 Artemiſiæ marinæ folijs ſuperior. inciſis, Lob.  
 Artemiſia marina Lobelij, Lugd.  
 Abſinth. anguſtifolij ramul. folijs ſciſſis, Dod.  
 Abſinthij marini Patavini, Cluſ. pan. & hiſt. ubi  
 ſcribit ab Artemiſia folio Lavend. differre.

Artemiſia marina minor, Tab.  
 an Abſinth. latifol. rarius Artemiſiæ folio, Col.

II. Abſinthium Seriphium Germanicum.  
 Abſinthium Seriphium, Geſn. hort.

Abſinthium marinum Miſnenſe, Seriphium  
 Belgico ſimile, Cluſ. pan. & hiſt.

III. Abſinthium Seriphium Belgicum.  
 Abſinthium Seriphium ſeu marinum, Ang.  
 Abſinthium Seriphium, Dod. gal. Lugd.  
 Abſinth. Seriph. vulg. perperam Dioſc. Lob. ico.  
 Abſinthium Seriphium, Dod. deſcript. vulgo  
 dictum, Cam. in Matth.

Abſinth. marinum ſive Seriph. in Belgicis &  
 Anglicis maritimis, Cluſ. pan. & hiſt.

IV. Abſinthium Seriphium Gallicum.  
 Abſinth. Seriphium tenuifolium Monſpelienſe.  
 Joh. Bauhino lib. de Abſinth.

Abſinth. Seriph. vulgo dictum, Cam. in Matth.

Abſinth. Seriph. Narbon. Cluſ. pan. & hiſt. Dod.

*Abſinthium Santonicum.*

I. Abſinthium Santonicum Judaicum.  
 Abſinthium Santonicum, Scheha Arabum, un-  
 de ſemen lumbricorum colligitur, Rauvv.  
 Scheha Arabum, Lugd. ap.

II. Abſinth. Santonicum Alexandrinum.  
 Abrotanum mas, Ang.  
 Semen Sanctum ſive ſementina, Matth. Semen  
 Sanctum, vel contra, Ad. (& Semen Zedoariæ,)   
 Lob. Lugd. Caſt.

Abſinthium Seriphium, Alexandrinum ſe-  
 men, aut Zinæ ſemen, Cord. in Dioſc. & hiſt.  
 Sementina, Dod. Tab. (cui & Santonicū vulg.)  
 Santonicum, Semen Sanctum, Lon. (Ger.)

III. Abſinthium Santonicum Ægyptiacum.  
 Abſinth. Seriphium Ægyptium, Matth. Lugd.  
 Abſinth. aliud peregr. ſive Ægyptium, Ad. Lob.  
 Abſinthium Ægyptium, Dod. Tab. Ger.

IV. Abſinthium Santonicum Gallicum.  
 Abſinthium Xantonicum vulgare, Lob. ob.  
 Abſinthij Santonici ſpecies, Cam. in Matth.

*Abſinthium montanum.*

I. Abſinthium Seriphium mont. candidum.  
 Abſinthij genus, in Valeſia herba alba dicta, &  
 Abſinthium Seriphium ſœmina, Geſn. hort.  
 Abſinthium album è Valeſia, Eid. ap.  
 Abſinth. externum & ſpurium primum, Dod.  
 Abſinthium Santonicum nonnullis, Cam.

II. Abſinth. alpin. incanum : quod 2. in Prod.  
 Abſinthium alpinum 2. Ponæ in Baldo Ital.  
 an Abſinthium parvum & incanum quod Geſ-  
 nero humile, Cam.

Abſinth. pumilum Camerarij, Cluſ. Pan. & rar.  
 III. Abſinth. alpinum candidum humile :  
 quod 3. in Prodr.

IV. Abſinth. alpinum umbelliferum latifol.  
 Abſin-

Abſinthium album capitulis ſquarroſis, florib.  
albis, umbella Achilleæ montanæ, Lob. ob.  
Abſinthium album, Lob. ico. Tab. Ger.  
Abſinthium album capitulis ſcabris, Lugd.  
Abſinthium Alpinum ſeu umbelliferum flor.  
albis, Pona in Balde.  
Abſinth. alp. umbelliferum, Cluſ. pan. & hiſt.  
Abſinthium pannonicum flore albo, Cam.  
Abſinthium umbelliferum, Clavenæ, Pharma-  
copæi Bellunenſis.

Hujus varietatē, ſub 4. in Prod. exhibuimus.  
V. Abſinthium umbelliferum hortenſe.  
Abſinth. umbellifer. alterum Italicum, Lob. ob.  
VI. Abſinthium alpinum umbelliferum re-  
nuifolium & minus.  
Abſinthium 3. alp. umbelliferum, Ponæ Ital.  
VII. Abſinthium montanum Chamæmeli  
flore magno.  
Abſinthium montanum abrotani ſæminæ flo-  
re, Colum. in Phytobas.



## SECTIO TERTIA.

ACHILLEA SIVE MILLEFOLIVM TERRE-  
STRE; MILLEFOLIVM AQUATICVM SIVE VIOLA  
AQUATICA; CONSOLIDA REGALIS; FVMARIA;  
CHELIDONIA; AQUILEIA; NIGELLA.

### ACHILLEA SIVE MILLEFOLIVM.

**M**illefolium χιλιόφυλλον, à foliorum multitudine. recentioribus triplex eſt. majus, minus, & aquati-  
cum. Majus αχιλλεύς, ἢ ἔχινος αἰσχροῖς Dioscoridis. lib. 4. cap. 36. cenſetur, cum umbellam floribus  
candidis & aurum emulantibus ( addit interpres & purpureis ) tribuit: quin & Achilleam, odore multo &  
medicato, dicit: quare Achilleam Dioscoridis, Tanacetum minus cenſemus. At Achillea, ab inventore Achille,  
Chironis diſcipulo nomen habet, Plin. lib. 25. cap. 5. Minus verò γραιώνας ἢ χιλιόφυλλον, Millefolium Strati-  
otes, Eidem. lib. 4. cap. 103. quod floribus parvis & candidis eſſe ſcribit. Aquaticum ipſi, lib. 4. cap. 113. μυ-  
ερίφυλλον, Millefolium, quod folijs ſit plurimis ſæniculo ſimilibus.

Plinius Achilleas ſideritides plures habet: cujus prima eadem eſt cum Dioscoridis: ſecunda μυερίφυλλον  
Dioscoridis: tertia, Sideritis Heraclea prima Dioscoridis: quarta & quinta, Sideritis Heraclea Cratæa, &  
tertia Dioscoridis: ſexta, Sideritis ſecunda Dioscoridis.

#### Millefolium terreſtre.

I. Millef. max. umbellâ alba: quod 1. in Prod.  
II. Millefolium vulgare album.  
Millefolium album, Brunf. flore albo, Eyſt.  
Millefolium vulgare, Trag. Gefn. hort.  
Stratiotes 2 Ang.  
Stratiotes terreſtris, Eric. Cord.  
Stratiotes millefolia, Fuch. Lac. Caſt.  
Militaris, ſive Millefolium flore albo, Ad.  
Stratiotes major, Lugd.  
Millefolium terreſtre majus, Cord. hiſt. Tab.  
Achillea, Dod. gal. Lon.  
Millefolium Stratiotes, Cord. in Dioſc.  
Millefolium ſive Achillea, Dod.  
Millefolium, Thal. Cam. majus, Cæſ.  
III. Millefolium purpureum majus: quod  
ſ. in Phytopinace & 2. in Prod.  
Millefolium majus, Matth.

Millefolium rubro flore, Cluſ. hiſt. Eyſt.

IV. Millefolium vulgare purpureum minus.  
Millefolium vulgare flore diluti ruberis, Trag.  
Millefolium minus, Marth. parvum, Cæſ.  
Millefolium flore purpureo, Ad.  
Millefolium terreſtre purpureis floribus, Lob.  
Millefolium purpurei floris, Dod. purpur. Tab.  
Millefol. rubro colore, Cluſ. hiſt. fl. rubro, Ger.  
Stratiotes millefolia minor, Lugd.

#### V. Millefolium incanum Creticum.

Stratiotes millefol. Hon. Belli ep. 2. ad Cluſ.  
In Phytopinace ſub 8. at in Prod. ſub 3. de-  
ſcriptum.

VI. Millefolium alp. incanum carneo flore.  
Millefolium rubrum, Gefn. hort.  
Millefolium alpinum, Cluſ. pan. & hiſt.  
an Millefolium purpureum minus ſive ſ. Tab.  
VII. Millefolium tomentosum luteum.

Stratiotes

Stratiotes vel militaris millefolia, Dod. gal.  
 Helichrysum Italicum Matth. Cam. Lugd.  
 Stratiotes lutea, Clus. hisp. Lugd.  
 Stratiotes millefolia flavo flore, Clus. hist.  
 Millefol. minus five Stratiotes Chiliophyllos,  
 Dodon.  
 Millefolium luteis floribus, Gesn. hort. Cam.  
 Millefolium luteum, Ad. Lob. Tab. Ger.  
 Tanacetum lanuginosum, Lugd.  
*Millefolium aquaticum.*

I. Millefol. aquat. umbellat. Coriandri folio.  
 Millefolium aquaticum, Matth.  
 Millefolium aquaticum alterum Coriandri fo-  
 lium, Ad.  
 Stratiotes Millefolium aquaticum, Lugd.  
 Folij Coriandri & umbella subpurpu-  
 rescente, necdum videre licuit.

II. Millefolium aquaticum umbellatum  
 capillaceo brevique folio.  
 Myrioph. Matth. Lac. Cast. prius Matthioli,  
 Lugd.

Millefolium aquatile, Dod.  
 Myriophyllum aut Maratriphyllum palustre,  
 Ad. Lob.  
 Myriophyllum alterum, Cæs.  
 Millefolium, Lon. Ger. Tab. cui & Fœniculum  
 aquaticum.

III. Millefol. aquat. f. osculis ad folior. nodos.  
 Myriophyllum aquat. minus, Clus. pan. & hist.

IV. Millefolium aquat. seu Viola aquatica,  
 caule nudo.  
 an Potamogeton Castoris apud Plin. l. 26. c. 5.  
 Myriophyllum alterum, Mat. h. Lac. Lugd.  
 Stratiotes fluviatilis, Gesn. hort.  
 Viola aquatilis, Dod. palustris, Ger.  
 Myriophyllum, Cæs. equisetifolium fluviatile,  
 Ad. Lob. ob.

Fœniculum aquaticum 2. Tab.  
 V. Millefol. aquat. equisetifol. caule nudo.  
 Myriophyllum equisetifol. palustre, Lob. ico.  
 Violæ aquatilis altera ico. Dod.  
 Viola palustris, Lugd.

Sunt qui cum priore idem velint: at illud  
 folio latiore, hoc vero angustiore multo est.

VI. Millefolium aquat. folijs abrotani, ra-  
 nunculi flore & capitulo.

Alga prima, Trag.

Alga palustris & fluviatilis, Gesn. col.

Millefolium maratriphyllon tertium, flore &  
 semine ranunculi aquatici Hepaticæ facie,  
 Lob. ico. Ger.

Fœniculum aquaticum 3. Tab.

Millefolium aquat. flore albo, Clus. hist.

Ranunculus tricophyllum aquaticus mediolu-  
 teus, vel

Ranunculus aquat. fœniculaceus *τρίφυλλον*,  
 Colum.

VII. Millefolium aquat. folijs fœniculi ra-  
 nunculi flore & capitulo.

Myriophyllum maratriphyllum palustre alte-  
 rum, Lob. ico. ubi flores omittuntur, nec capi-  
 tula rectè exprimuntur.

Fœniculus aquaticus Dalech. Lugdun. figura  
 imperfecta.

Myriophylli species coliculis fluitantib. Thal.  
 Peucedanum aquaticum, Tab.

Ne quis hoc cum præcedenti, vel cum Ra-  
 nunculo aquatico folio capillaceo, confundat:  
 nam ab illo folijs longissimis, floribus quadru-  
 plò majoribus: ab hoc, quod Ranunculo & ro-  
 tunda & capillacea sint folia: & flos minor.

VIII. Millefol. aquat. pennatum spicatum.  
 an Alga 3. Trag.

Hoc, quemadmodum & subsequens in Mat-  
 thiolo & Tab. ac pro 4. & 5. in Prodro-mo ad-  
 dita figura, descripsimus.

IX. Millefol. aquaticum cornutum majus.

X. Millefolium aquaticum cornutum mi-  
 nus, necdum descriptum.

XI. Millefolium aquat. lenticulatum.  
 Lentibularia, & Meon aquaticum, Gesn. col.  
 Millefolium aquat. flore luteo galericulato,  
 Lob. ico.

Fœniculum aquat. galericulatum, Tab.

XII. Millefolium marinum filicis folio.

Myriophyllum pelagium Cortusif; Clus. hist.

XIII. Stellaria aquatica, Lob. ico.

Fœniculum aquaticum stellatum, Tab.

## CONSOLIDA REGALIS, EJVSQVE SPECIES.

**C**onsolidam regalem, Vereres inter flores coronarios reposuere. Hyacinthum nominantes. cujus Diosc.  
 l. 3. c. 85. in Delphinio altero, quod & Hyacinthum vocitetur, meminit. Siquidem Plin. l. 21. c. 11. scribit di-  
 scurrentes notas inesse, ut Gracarum literarum figura. A. I. inscripta legatur: quod in Consolida regali horten-  
 si

observatur, cum in floribus folium sit implicatum, quod in albo characteres habet occultatos, ex virgulis caruleis duas literas. A. I. aut tres A. I. A. exprimentes. Delphinium duplex est Dioscoridi, cujus altera species Romanus Buccinum dicatur. Quare si apud Dioscoridem, vox *delphinium* ad flores referatur, tum *Consolida regalis hortensis* *delphinium* erit: at *Consolida regalis segetum*, alterum ejusdem *Delphinium*.

Variat: est major & minor, utraque flore simplici vel pleno: colore caruleo pallido, caruleo intenso, purpureo, incarnato, albo, variegato ex albo & caruleo.

I. *Consolida regalis hort. flore majore & simplici.*

*Delphinium*, Dod. gal.

*Delphinium* 4. & majus, Gefn. hort.

*Consolida regalis*, Matth. ico. Ang. Cast.

*Consolida regalis sativa*, Tab. Ger.

*Cuminum sylv. alterum*, Matth. in prim. edit.

Lac. Lugd.

*Consolida regia sive Calcaris flos recentiorum*,

Ad. Lob.

*Flos regius*, Dod.

*Delphinium elatius flore caruleo*, Clus. hist.

*Consolida regalis flore caruleo majore*, Cam.

*Flos qui vulgo in Hetruria Fior capuccio*, Cæf.

Flores communiter carulei elegantiss. aut ex caruleo purpurei, carnei, vel saturati, vel diluti, nivei vel exalbidii, cineracei, purpurei seu violacei: hinc figuræ quatuor.

1. *Delph. elatius fl. incarnato*, Bry, Svvert.

2. *Consolida regalis simpl. fl. rubro*, Eyft.

3. *Delphinium elatius purpuroviolaceum*, Svvert.

4. *Delphinium elatius flore albo*, Bry.

II. *Consolida regalis hort. flore minore.*

*Calcatrippa*, Cord. hist.

*Delphinium* 2. flore candido, & 3. flore roseo, Gefn. hort.

*Consolida regalis flore rubro*, Lob. ico.

*Consolida regalis sativa*, fl. albo: rubro, Tab.

*Flos regius flore purpureo*, Dod.

*Consolida regalis flore incarnato*, purpureo albo, Cam.

*Delphinium elatius simplici flore*, Clus. hist.

*Flos caruleus*, cinereus, albus, rubeus, incarnatus.

III. *Consol. regal. fl. majore & multiplici.*

*Delphinium elatius pleno flore*, Clus. hist.

*Consolida regalis flore pleno*, Cam.

Flores carulei, albi; nullo, aut perexiguo, calcari præditi: hinc

1. *Consolida regal. fl. pleno incarnato*, Eyft.

2. *Consolida regal. fl. pleno purpureo*, Eyft.

3. *Consol. regal. multiplici fl. argenteo*, Eyft.

*Delphinium elatius albo flore*, Bry, Svvert.

4. *Consol. regal. fl. multiplici cineraceo*, Eyft.

5. *Consolida regal. fl. pleno albo*, Eyft.

6. *Consolida regal. fl. pleno rubro*, Eyft.

7. *Consol. regal. multiplici incarnato fl.* Eyft.

8. *Consol. regal. multiplici violaceo fl.* Eyft.

IV. *Consolida regalis arvensis.*

*Consolida regalis*, Brunf. Lac. Gefn. hort. Cast.

*Consolida regia*, Trag. Fuch. Lon. Thal.

*Chamæmelum eranthemum*, Fuch.

*Buccinum & Delphinium alterum*, Dod. gal.

*Segetum consolida regia strigosior tota*, Lob.

*Flos regius* 2. vel sylv. Dod.

*Anthemis eranthemos*, sive *Consolida regalis*,

*Cuminum sylv. Gefn. hort.* (Lugd.

*Delphinium sylv. Eid. vulgare*, Clus. hist.

*Consolida regalis arvensis*, Tab. sylvestris, Ger.

*Consolida regalis flore caruleo minore*, Cam.

*Flore est caruleo*, albo, candicante, rubro & dilutius rubente, violaceo, & hoc est

*Consol. regal. arvensis fl. simpl. violaceo*, Eyft.

*Consolida regalis fl. variegato.*

*Delphinium arvense flore versicolore*, Clus. ap. alt. ad l. 6.

Flores quidam tam simplices quam multiplices media parte carulei: altera parte suaviter rubentes, vel caruleis punctis notati: sic partim carulei, partim albi: & in eadem planta flores varij coloris, ita ut vix bini flores ejusdem coloris conspiciantur: hinc

*Delphin. elatius fl. albo caruleo distincto*, Bry.

*Delphinium elatius purpuroviol. distinct.* Bry.

*Delphinium elatius pleno variegatum*, Svvert.

V. *Consolida regalis vulgaris fl. multiplici.*

*Delphinium humilius sive vulgare pleno flore*, Clus. hist.

*Consolida arvensis fl. rubro pleno vel suaverubente*, Eyft.

VI. *Consolida regalis latifolia parvo flore.*

*Delphinium Dioscoridis*, Imperato.

In Phytopinace sub 5. & in Prodromo, in Matthiolo quoque & Tabernæmontano, figura adposita descripsimus.



## FUMARIA EJUSQUE SPECIES.

**F**umaria, *ναρὶς* Diosc. l. 4. c. 110. eò quod herba succus oculis inditus, instar sumi oculos molestando, lacrymas moveat. Genera: Diosc. 1. flore purpureo, meminit: at Plin. l. 25. c. 13. Capnos duplex est; prima, quæ pes gallinaceus vocatur, & altera Capnos fruticosa, illam Fumariam bulbosam, hanc verò Capnon Diosc. censemus.

*Fumaria non bulbosa.*

## I. Fumaria officinarum &amp; Dioscoridis.

Fumus terræ, Brunf. Cam. Thal.

Fumaria, Trag. Matth. Fuch. Cord. in Diosc. Gef. hor. Dod. Lon. Cæs. Lugd. 1. & 2. flore albo, Tab.

Capnos, Ang. Ad. Lob.

Fumaria major, Cast. ico.

Fumaria purpurea & alba, Ger.

Flos coloris purpurei violacei, pallescentis, albi: alia circa Monspelium, folijs tenuissimis floribus albis reperitur.

## II. Fumaria viticulis &amp; capreolis plantis vicinis adhærens.

Fumaria phragmites, Dod. gal. Lugd.

Fumaria altera, Cæs.

Flosculi candidi, cæruleo colore aliquando distincti, circa Monspelium in sepibus ad Frontignanum: at circa Neapolim flosculis subflavis, in summitate nigricantibus.

## III. Fumaria minor tenuifolia.

Capnos minor, Ad.

Capnos tenuifolia, Clus. hisp. & hist. Lob.

Fumaria minor, Cast. ico.

Fumariæ species Myconi, Lugd.

Fumaria tenuifolia, Tab. Ger. Eyf. fl. niveo.

Fumus terræ seu Fumaria tenuifol. Hisp. Cam.

Fumaria rubra tenuifolia, Eyf.

Variat floris colore, hilari purpura rubet, est & variegato, ex rub. albo, viridi & luteo: cauliculis modo surrectis, modò procubentib. & caducis.

Similem Montispeffuli observavimus, quam Fumariam nobilem vocant.

Fumaria minor, Ad.

## IV. Fumaria minor folio oblongo capillaceo.

Fumaria altera tenerior Syriaca, Cam.

Selterays nomine ex Syria D. Paludan. attulit. an Capnos Cret. florib. candidis fuscâ macula,

## V. Fumaria lutea. (Clus. hist.)

Fumaria corydalis, quibusdam Split, Matth.

Fumaria montana, Gef. hor. Tab.

Fumaria phragmitis altera, Eid.

Fumaria lutea montana, Ad. Lob. (cui & Chelidonium capnites Aëtij) Lugd. Ger.

Split vulgo, Cæs.

Corydalis, Cast. Cam. (hæc est

Florib. commun. luteis, aliquando candidis, &

Fumaria fl. albis, Ad.

Fumaria Illyrica alba, Tab.

## VI. Fumaria claviculis donata.

Capnos Plinij & phragmites, Dod. gal. Gef. hor.

Capnos alba latifolia & Splith album quorundam, Lob. Lugd.

Fumaria altera, Dod.

Capnos altera Belgica albo flore, Clus. hist.

Folijs latioribus & angustioribus variat, floribus est albis & dilute admodum rubentibus.

Fumaria latifolia major & minor, Tab. Ger.

Fumaria Clematites & Clematis minim. Cam.

*Fumaria bulbosa.*

## I. Fumaria bulbosa radice cava major.

Capnium sive Fumaria phragmitis, Aëtio.

Aristolochia rotunda, Brunf. Eric. Cord.

Aristolochia rotunda vulgaris, Trag. Fuch. (cui & Pistolochia) Gef. hor. Cam.

Hyacinthus 3. candidus & purpureus, Trag.

Fumaria altera, Matth. Cast.

Capnos phragmitis, Tur.

Pistolochia Fuchsi, Apios species videtur, Lac.

Aristolochia phragmites, Gef. col.

Capnos chelidonia, Lon.

Capnos sive Capnium phragmites major, & Pes gallinaceus, Cord. in Diosc.

Chelidonia phragmites altera, Cord. hist.

Radix cava major, Dod. Cast. Clus. hist.

Radix cava herbariorum, Ad. Lob. Clus. pan.

Fumaria bulbosa, Lugd.

Lentopetali genus quibusd. haud planè ineptè,

Lentopetalon alterum, Cæs. (Guil.

Chelid. capnites quorundam rad. pertusa, Thal.

Aristolochia vulgaris flos purpureo, Eyf.

Est major & minor: huic folia angustiora, illi paulo latiora, sed solum loci ratione differunt.

Variat colore floris albo, pallido, subflavescente, rubro dilutiore, vel egregiè rubente: quod si flos minor sit, saturatius ruber, & pro mascula habetur: si major, languidioris coloris. Figuræ 8. apud Tab. & Ger.

Fumariæ bulbosæ purpureo flore nomine, quatuor: totidem flore albo.

Viridi flore Lobelius observavit, & nomine Radicis cavæ viridi flore, in iconib. proposuit.

Radix



Radix cava, Cast.

II. Fumaria bulbosa radice non cava major. Aristolochia rotunda vulg. radice solida, Trag. Arist. rot. altera species radice solida, Gef. hort. Capnos sive Capniū phragmites min. Cord. in Chelid. Capnites radice integra, Thal. (Diosc. Aristolochia rotunda fl. albo, Eyf.

A prima diff. radice, quæ in illa cava, in hac solida: dein in illa, folia quæ flores intercedūt, integra sunt, in hac verò incisa: tum in illa flores pauciores & majores colore variâtes: in hac minores, copiosiores, eleganti purpura rubêtes;

alterius coloris hæten. non observavi: tandem, nunquam utramque eodem loco reperimus, illa enim pinguiori solo delectatur.

III. Fumaria bulbosa radice non cava minor. Chelidonia phragmitis 1. Cord. hist.

Fabaceâ radice Capnos altera, Ad. Lob.

Radix cava minor. Dod. Cast. Clus. hist. Ger.

Capnos fabacea radice, Lugd.

Fumaria bulbosa seu tuberosa minor, Tab.

Aristol. rotunda vulgaris minima, Cam.

A majore diversa est, & florum herbaceis rudimentis variat.

## CHELIDONIUM.

**X**ΕΛΙΔΟΝΙΟΝ Dioscoridi l. 2. c. 211. cui χελιδὼν, id est, hirundo avis, nomen imposuit: vel quoddam hanc primum invenerit, oculis pullorum excecatorum, visum hæc restituens, ut ex Dioscoride, Plin. l. 25. c. 8. refert: vel ut idem l. 8. c. 27. Chelidonium visui saluberrimum hirundines monstravêre, vexatis pullorum oculis eâ medentes: quibusdam sic dictum, quod in hirundinum adventu floreât, & discessu marcescat. Apud Theoph. 7. hist. 14. Hirundinariam Gaza vertit.

Genera duo Diosc. & Plin. l. 25. c. 8. majus & minus, quæ cum figurâ multum differant: de minore alibi agem.

I. Chelidonium majus vulgare.

Chelidonia, Brunf. major, Ang.

Chelidoniū majus, Trag. Mart. Fuch. Tur. Lac.

Cord. hist. Gef. hor. Dod. Ad. (& Hirundinaria

major) Lob. Cast. Cæs. Lugd. Thal. Tab. Ger.

vulgare, Clus. hist.

II. Chelidonium majus foliis quernis.

Chelid. majus laciniato flore, Clus. hist.

In Phytopinace, Mathiolo, & Tabern. descriptus.

## AQUILEGIA.

**A**quilegia, quæ quibusdam Chelidonia sylvestris, videtur dicta quasi Aquilina, ob florum mucrones aduncos, ut sunt aquilini ungues. Veterum Pothos Costas; Jaspione Theophrasti 1. hist. 21. Casalpino: Jovis flos, Dalechampia in Athenæum: Isopyrum Dioscoridis l. 4. c. 121. Columna: at Gesnero Leontostomum dicitur. Variat potiss. flore: est communiter majore, rarius minore ex corniculis composito, colorum diversorum, rarius roseo est flore eoque, vel simplici vel pleno.

*Aquilegia simplex.*

I. Aquilegia sylvestris.

Aquilegia, Treg. Fuch. Lugd. Lon. Cæs. (columbina quibusdam) Ger. fl. cæruleo, Svvert.

Aquileia, Fuch. Er. Cord. Gef. h. Dod. syl. Thal.

Aquileia simplex, Cam.

Aquilina, Matth. Ad. Lob. Cast. Tab.

Isopyrum Dioscoridis, Colum.

Flore est cæruleo, & vix alterius quam punice

coloris, in sylvestribus reperias.

II. Aquilegia hortensis simplex.

Aquilina rubra, Lob. ico.

Aquilina. Cast. alba, Tab.

Aquileia rubra, Ger.

1. Aquilegia fl. albo simplici, Bry. Eyf.

Aquilegia alba cærulea, Svvert.

2. Aquilegia castanei coloris, Svvert.

Hæc diversorum colorum reperitur, cæruleo,

candido, incarnato, rubro, variegato ex cæruleo

& purpureo: candido, nonnullis veluti lituris

cæruleis aspersis.

III. Aquilegia mont. magno fl. quæ 1. in Prod.

IV. Aquilegia montana parvo flore, Thali-

tri folio: quæ 2. in Prod.

*Aquilegia pleno flore.*

I. Aquilegia hort. multiplex flore magno.

Aquileg. multiflora variegata, Lob. ico. & mul-

tiplici vario colore flore, Eid. pleno flore, Cam.

Aquileia multiplici flore, Dod. multiplex, Ger.

Aquilina pleno flore, Clus. hist. multiplex sive

4. 5. 6. 7. & 8. Tab.

Flos cæruleus, violaceus, cinereus, blandè

vel saturè rubens, albus, ex albo cæruleo, vio-

laceo ve variè mixtus, maculatus.

1. Aqu-

1. Aquilegia fl. cæruleo pleno, Eyft.  
 2. Aquilegia fl. albo pleno, Eyft.  
 3. Aquilegia fl. pleno incarnato, Eyft.  
 4. Aquilegia flore purpureo, Eyft.  
 5. Aquilegia flore rubro, Eyft.  
 Aquilina flore rubro, Bry. Svvert.  
 6. Aquileia variegata, Bry.  
 Aquilegia fl. variegato duplici, Svvert.  
 II. Aquilegia hort. multiplex flore parvo.  
 A priore floris magnitud. & pulle colore differt.  
 III. Aquilegia hort. multiplici flore inverfo.  
 Aquilina plenis multiplicib. flor. Lob. ico. Lug.  
 Aquilina inverfa multipl. albo colore, Lob. ico.  
 Aquilina pleno inverfo flore, Cluf. hift.  
 Aquilegia inverfa, Cam.  
 Aquilina 9. Tab.  
 Aquilina carnei coloris, Bry.  
 Aquilegia alba, Svvert.

Aquilegia cærulea inverfo flore, Eyft.  
 IV. Aquilegia flore rofeo multiplici.  
 Aquilina pleno rofeo flore, Cluf. hift. Bry.  
 Floris color communiter cæruleus, est & albus, rarissim. carneus sive blanderubens: vel albus nigris punctis aspersis: hinc  
 1. Aquilegia stellata flore purpureo, Eyft.  
 2. Aquilegia stellata rubescens, Eyft.  
 3. Aquilegia stellata flore violaceo, Eyft.  
 Aquilegia stellata cæruleo violacea, Svvert.  
 4. Aquilegia stellata flore albo minutissimis nigris punctis ornata, Eyft.  
 V. Aquilegia degener virescens: & Cam.  
 Aquilegia degener virescens. Lob. ico.  
 Aquilina degener, Cluf. hift. Bry.  
 Aquilina 10. Tab.  
 Aquilegia stellata rosea, Svvert. (rascens.  
 Flos vel viridis omnino, vel ex viridi purpu-

## NIGELLA SEU MELANTHIUM, ejusque species.

**N**igella, à nigro seminis colore communiter dicta, Dioscorid. l. 3. c. 93. *Μελάνθιον* est: de qua Theoph. 7. hift. 9. Plinio l. 20. c. 17. *Githex Græci*, alij *Melanthion*, alij *Melanspermon* vocant, & quod odoratissimum & nigerrimum, optimum est.

Genera: Dioscorides & Veteres unius meminere: nobis, sativa est & sylvestris: Sativa, simplici & pleno, magno & parvo flore: semine nigro, subflavo, luteo.

I. *Nigella arvensis cornuta*.  
 an *Melanthium* & *Gith* Dioscoridis.  
*Nigella* sylv. & 2. Trag.  
*Melanthium* sylv. Fuch. Dod. Ger.  
*Cuminum* syl. alterum, Fuch. ico. Cord. in Diosc.  
*Melanthium* sylv. alterum, Matth. Cast. Lugd.  
*Nigella* sylv. altera, Dod.  
*Melanthium capitulis reflexis aquilegiæ*, Lob.  
*Nigella cornuta*, Cord. hift.  
*Nigella vulgò dicta*, Cæs.  
*Nigella* sylv. Gesn hort. Lon. Cam.  
*Melanthium agreste*, Tab. arvense, Cluf. hift.  
 Meminit Tab. *Melanthij* agrest. alterius, quod solis capitulis magis reflexis, à priori differat.  
 II. *Nigella latifolia flore majore simplici cæruleo*: quæ 1. in Prod.  
*Melanthium Hispanicum majus*, Eyft.  
 III. *Nigella angustifolia flore majore simplici cæruleo*.  
*Nigella Damascena*, Trag. Cord. hift.  
*Nigella*, Cord. in Diosc.  
*Nigella hort. altera*, Euch. Lon.

*Melanthium* sive *Nigella*, Ad.  
*Melanthium* sylv. Matth. Lac. Lob.  
*Melanth.* sylv. quod *Damascenum* cognominatur, Cluf. hift.  
*Melanth.* sylv. prius Matthioli, Lugd. qui duas figuras habet.  
*Melanthium Damascenum*, Dod. Tab. Cam.  
*Melanthium Damascenum alterum*, Fuch. ico.  
*Melanthium sativum flore simplici*, Eyft.  
 Isopyrum, quod Matth. Durantes, Lugd. & Taber. pingunt: nil aliud censemus, nisi quod folia Anisi infernè sint adpicta, quo Dioscoridis Isoporum exprimere videatur.  
 IV. *Nigella flore majore pleno cæruleo*.  
*Nigella flore majore & numerosioribus folijs*, Suneg Egyptijs, Alpino.  
*Melanthium Damascenum pleno flore*, Cluf. hift. Eyft.  
 V. *Nigella flore minore simplici candido*.  
*Nigella hort.* Trag. sativa, Lon.  
*Melanthium sativum*, Matth. Lac. Dod. Cast. Lugd. Tab.

Melanth 1. Fuch. ico. hortense primum, Eid. fol.  
 Melanthium sive Nigella Romana odora, Lob.  
 Gir sive Nigella Romana, Tur.  
 Nigellæ alterum genus, Cord. hist.  
 Melanth. Ger. sativum simplici flore, Clus. hist.  
 Nigella, Gef. nostra, Ang. altera, Cæs.  
 Melanth. Damascenum semine pallido.

Semine est nigro, aliquando pallide flavente: semine luteo in horto habuimus: rarius candido reperitur.

VI. Nigella flore minore pleno & albo.  
 Cardamomi 3. species, & Nigella citrina, Lac.  
 Nigella citrina, Ad. flore albo multip. Lob. Lug.  
 Nigella flore candido, Cæs.  
 Semen ex Oriente adfertur, inter Cardamomi

genera, & Nigella citrina dicitur, Cæs.  
 Melanthium citrinum multiflorum, Taber. sub  
 Damasceno, Ger. ico.  
 Melanthium pleno flore, Clus. hist.  
 Melanth. sive Nigella flore pleno, albo, Cam.  
 Nigella peregrina flore multiplici, Eyst.

VII. Nigella Cretica.

Melanthium simplici flore, Creticum, Clus. hist.  
 Hujus descriptionem in Phytopinace sub 6.  
 in Prod. sub. 2. & in Matthiolo cum figura exhibuimus: in Tabern. nostro figura sub titulo Nigellæ flore pleno, malè posita fuit.

VIII. Nigella Cretica folio fœniculi.

Melanthium peregrinum sive Creticum, Ponæ in Baldo Iral.



## S E C T I O   Q U A R T A . U M B E L L I F E R Æ .

CUMINUM; FOENICULUM; ANETHUM; MEUM; PYRE-  
 THRUM; FERULA; THAPSIA; TURPETUM; PEUCEDANUM;  
 Daucus; Pastinaca tenuifolia; Gingidium; Chærophylum; Scandix;  
 Caulalis; Apium; Sison; Sion.

### C U M I N U M .

**K** *Κάμινον* Dioscoridi l. 3. c. 68. Theoph. 7. hist. 4. at Plinio l. 19. c. 8. & l. 20. c. 14. & 15. *Cuminum*.  
 Genera: Dioscoridi sativum est, cui Aethiopicum, quod Hippocrates regium vocavit, præfert: secundum locum tenet Aegyptium, reliqua sequuntur. Est & sylvestre: alterum, capitulis in cacumine rotundis: alterum, quod à singulis floribus, cornicula in sublime erecta promit. Theophrasto genera plura sunt: quare Plin. l. 20. c. 15. Sativum est & sylvestre, Aethiopicum & Africanum: at l. 19. c. 8. alterum sylvestre rusticum vocatum, alijs Thebaicum: Aethiopico, Africq; palma est: quidam huic Aegyptium præferunt.

I. Cuminum semine longiore.  
 Cuminum sativum, Brunf. Trag. Matth. Lac.  
 Cord. hist. Lob. Cast. Lugd.  
 Cuminum, Tur. Lon. Ad.  
 Cumin. Officin. Cumini syl. i. genus Diosc. Cæs.  
 Cyminum, Ang. Cord. in Diosc. (cui & Cyminum Romanum) Tab. sativum, Cam.  
 Cuminum Aethiopicum, Carnabadium Calsi Bassi & Myrepsij, Guil.

II. Cuminum semine rotundiore & minore.  
 Cuminum dulce Melitenisibus.

Hujus plantam non vidim: at cum Dalecham-  
 pij in Plin. l. 20. c. 15. notus legissemus, ex Melita  
 duplex Cuminum, utpote acre & dulce adferri:  
 & apud Megiserū in Melitæ descriptione, idem  
 invenissemus, ejus nomine ut haberemus labo-

ravimus: quare, utriusq; semen è Melita insula  
 transmissum fuit: alterum oblongum, acuminatum,  
 coloris sordidi, graveolens & sapore acri,  
 cui Cimonagero, i.e. Cuminum syl. inscriptum  
 erat: quod cum Cymino Aethiopico officinarum  
 convenit. Alterum verò multò minus, Aniso simile,  
 candidas, gustus lenioris & subdulce, quod  
 nomine Cimonagero dulce, missum. Apud Meliten-  
 ses copiosè feritur, ad panem condiendum  
 & ad mercaturam cum eo exercendam.

III. Cuminum sylv. capitulis globosis.

Cuminum sylv. i. Matth. Lugd. Cast.  
 Cuminum sylv. Ang. Dod. Ad. Lob. ico. Ger.  
 Lago chymeni, id est, leporis cubile in insula  
 Lemno, Bellon.

Cymyn. syl. sive erraticum, Tab. syl. globos. Cam  
 FOENI-

## F O E N I C U L U M.

**M** *Ἀραβὸν* Dioscoridi, l. 3. c. 81. ἀπὸ τῆς μαρμελάδας, à marcescendo, quod ejus cum inaruerit, ad condienda plurima, multus usus sit. Plinio, l. 19. c. 9. Fœniculum anguibz gratissimum, ad condienda plurima cum inaruit: & l. 20. c. 23. Fœniculum nobilitare serpentes, gustatu senectam exuendo, oculorumq; aciem succo ejus resciendo. Latinis Fœniculum, quod satum magno cum fœnore semen reddat: vel potius Græcorum imitatione, quod quasi fœnum in hyemes arefactum ac marcidum reponatur.

Genera: Dioscoridi est sativum, sylvestre, quod ἰππομαραθῶν & duplex est: alterum semine magno, Cachri simile; aliud semine Coriandri. Idem Plinius, l. 20. c. 23.

Recentioribus est vulgare sive sativum, dulce, rotundum, & erraticum, sive Hippomarathrum.

## I. Fœniculum vulgare Germanicum.

Fœnicul. Brunf. Trag. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in Diosc. Tab. commune. Gesf. hor. vulgare, Ger. Fœnicul. syl. cujus semen exilius & acrius, Cæs. Fœniculum nostrum vulgare, quibusdam Hippomarathrum putatum, Cam. hort.

Huic accedit Mediolanense, quamvis vulgato Germanico grarius sit.

Variat foliorum colore: nam commune folijs est virentioribus, altera subnigricantibus, rubentibus, aliàs non differens: quare Fœniculum 1. & 2. facit Dodonæus.

## II. Fœniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto.

Fœnicul. Matth. Lac. Cast. vulgare, cujus semen pallidum sive luteum oblongum, Lugd.

Fœniculum acre, Ang.

## III. Fœniculum dulce.

Fœniculum dulce, Matth. Lac. Ang. Gesf. hort. Ad. Cast. Ger. desc.

Fœnic. 3. Dod. solo sapore à primo distinctum. Fœnicul. sive Marath. vulgatius dulce, Ad. Lob. Fœnicul. hort. semine crasso in rotunditate oblongo, Cæs. quod anno secundo in sylv. transit. Fœnicul. dulce semine majore, gustu anisi, Lugd. Fœniculum Romanum cujus semen pallide lu-

teum, Tab. quod tertio anno in comūne transit. Fœniculum Italicum fortè hort. veterum, quod etiam in nostrum transit. Cam. ep. Matth.

Fœniculum majus, Eid. hort.

Hoc semine est vel rotundiore, quod Romanum & Florentinum dicitur: vel in rotunditate oblongo, quod omnium gratissimum & dulcissimum, & Bononia adfertur.

## IV. Fœniculum semine rotundo minore.

Fœniculum rotundum, Tab. vulgare, Ger. ico.

A vulgato sapore & odore non differt, sed humilior est, umbella candida, semenque vulgari minus & Carui forma.

## V. Fœniculum sylvestre.

Fœniculum erraticum, Matth. Lac. sponte vi-rens in agris Narbonensium, Adv. an Hippomarathrum, Ang.

## VI. Hippomar. Creticum: de quo in Prod.

an Hippomarathrum cujus semina magna cachry similia, Hon. Belli ep. 1. ad Clus.

VII. Chaa, herba in Japonia, ex cujus pulvere decoctum preciosum parant, & hospitib. dignioribus propinant: & olla in qua hujus herbæ decoctio facta, in eo apud ipsos precio, in quo apud nos Adamantes sunt: Linscot. par. 2. Ind. Orient. cap. 28.

## A N E T H U M.

**A** *Ἄντρον* Dioscorid. l. 3. c. 67. πρὸς τὸ ἀνθῆναι, quod cito crescat: Theoph. 1. hist. 18. cui 7. hist. 4. plura ejus genera, qua non recenset. Plinio l. 20. c. 18. Anethum.

## I. Anethum hortense.

Anethum, Brunf. Trag. Matthiol. Fuch. Tur. Dodon. Cord. in Dioscorid. Gesf. hort. Ang. Lac. Ad. Lob. Cast. Lon. Cæsalp. Lugd. Tab. Cam. Ger.

Abinthium dulce, Pundeſt. Monach. in Mef. Toxites.

## II. Anethum sylvestre majus.

Aneth. syl. grandius sativo, folijs fœniculi Cæs.

## III. Anethum sylv. minus: in Prod. desc.

## M E U M.

**M** *Ἡ ἐν ἀλκυοντίδων ἢ μέν, Meum Athamant.* Diosc. l. 1. c. 3. Similiter à Plinio, l. 20. c. 23. nominatum, Meum, scribit, in Italia non nisi à Medicis feritur, & ijs admodum paucis. Duo genera ejus (Macedonicum scilicet & Hispan. non quidem ea duo diversa genera sunt: utrumq; in locis plurimum gignitur: hac

addit ex Dioscoride Dalechampsius in notis) nobilior, Athamanticum vocant, illi, tanquam ab Athamante inventum; hi, quoniam laudatissimum in Athamante (monte Phthiotidis Thessalia) reperiatur.

I. Meum folijs anethi.  
Daucus Creticus, Trag. Fuch. vel alpinus, Gef. col. Lob. ico.  
Meum, Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. (cui & Anethum sylv.) Dod. Ad. Lob. Cast. Cæsalp. Lugd. Tab. Cam. Ger.  
Libanotidis 1. genus, & Fœniculus porcinus, Dod. gal.  
Seseli Creticum, Fuch. ico. Lon.  
Tordylion, Cord. in Diosc. & hist.  
Daucus, Cast. ico.

Meum vulgare tenuifolium, Clus. hist.

II. Meum Dauci Cretici facie.

Meum aliud, Lugd.

III. Meum alpinum umbella purpurascens. Muttellina vulgo in alpinis, Caros vel Daucus alpin. videtur, Gef. hor. & frac. Cam. ep. Matth. an Daucus montanus, Clus. pan. & hist.

IV. Meum latifolium adulterinum.

Meum secundum, Matth. ed. secunda.

Meum spurium alterum Italicum, Lob. Lugd.

Meum adulterinum, Tab.

### P Y R E T H R V M.

**P**υρεθρον Diosc. l. 3. c. 86. ab igne nomen habet, ob radicis ejus fervorem igneum. Salivaris Romanis, quod mansa Salivam eliciat. Apud Plin. l. 28. c. 9. Pyrethri nomen solum habetur.

I. Pyrethrum flore bellidis.  
Pyrethrum, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Dod. Lac.  
Pyrethrum Germanicum, Gefn. hort.  
Pyreth. alter. Matth. Lugd. Cæf. Cam. primum,  
Pyrethrum majus, Lon. verum, Cast. (Tab.  
Pyrethrum Officinarum, Ad. Lob. Ger. Eyst.

Pyrethrum Italicum, Gefn. hort. ap.

Pyreth. alterum, Ad. Lob. Cast. Tab. sylv. Ger.

an Pyrethrum, Cæf.

Saxifragæ species, Dod. 8.

Pyrethrum Dioscoridis 1. Cam.

Umbella variat, quæ alba: at Patavino in horto lutea, longioribusque folijs, collegimus.

III. Pyrethrum folijs anethi.

Pyrethrum Gesneri, Lugd.

II. Pyrethrum umbelliferum.  
Fœniculum montanum, Trag.  
Pyrethrum verum, Matth. Lugd.

### F E R V L A.

**N**αβης Diosc. l. 3. c. 91. νάβηξ ἢ νάβηνον, Theoph. 6. hist. 2. id est, Gaza interpretare, Ferula & Ferulago. Plin. lib. 13. cap. 22. Ferula.

Genera duo Ferule Plinio: Nartheca Græci vocant, in altitudinem assurgentem. Nartheciam verò semper humilem: & Ferula sine dubio est Thapsia, sed sui generis &c. Et l. 20. c. 23. Ferula, quæ ab uno caule dividitur in cacumine, fœmina putatur.

I. Ferula fœmina Plinij.  
Ferula, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diosc. Gefn. hort. Lon. Ad. Lob. Dod. Cast. Lugd. Tab.  
Ferula mas, Cæf. (Cam.  
Libanotis prima Diosc. ferulacea, Gefn. hort.

Ferula galbanifera, Lob. Lugd. Tab.

Ferula fœmina, Cæf.

Quibusdam Narthecia Theoph. & Thapsia Dioscoridis.

III. Ferulago tenuiore folio.

Narthecium Theoph. Ferulago Gazæ, Lugd.

Ferulago, Tab.

II. Ferulago latiore folio.  
Ferulago, Gefn. Dod. Cam.

### T H A P S I A.

**Θ**άψια, quæ in Thapso, ejus nominis Insula primum inventa, Diosc. lib. 4. cap. 157. quæ tota natura Ferula similis: meminere Thapsia Theoph. 9. hist. 8. & Plin. l. 13. c. 22.

I. Thapsia maxima latissimo folio.

Thapsia 3. Clus. hisp. & hist.

II. Thapsia latifolia villosa.

Thapsia latifolia, Clus. hisp. Tab.

Thapsia 1. Clus. hist.

Seseli Peloponense majus, Lob. peloponense ut putatur, Dod.

Seseli peloponesiacum 1. Tab. 1

Seseli peloponense folio cicutæ, Ad. Lugd.

III. Thapsia folijs libanotidis foetidissima.

Tuero, Clus. hisp.

Thapsia 4. Clus. hist.

IV. Thapsia fœniculi folio.

Thapsia Diosc. Ad. Lob. Lugd.

Thapsia

Thapsia 2. vel tenuifolia, Clus. hisp. & hist.

Thapsia angustifolia, Tab. tenuifolia, Ger.

V. Thapsia carotæ folio.

Thapsia, Matth. Ang. Lon. Lug. Cast. Cæs. cui & Turbit album Mesuei.

Thapsia major, Cord. hist.

Thapsia vera & Turbith montis Gargani, Gef. hort.

Thapsia vulgaris carotæ effigie, Ad. Lob.

An hæc Ferula Sagapenifera.

Huj. radix sæpè pro Costo, magno errore venditur, uti supra inter Costi genera ostensum fuit.

## T V R P E T V M.

**T**urbith vox Arabica est, ab Avicenna & alijs usurpata, quàmvis aliqui à turbando deducant, quòd propter magnam violentiam, purgando corpus turber. Duplex est, aliud Arabicum, aliud Indicum. Arabicum, Mesueo 2. simpl. est radix herba, folia Ferula minora ferentis & lacteo succo turgentis: quæ sanè causa, cur alij Pityuse, alij Alypi, nonnulli Tripolij Græcorum radicem esse voluerint: cujus genera varia Mesueo, domesticum, sylvestre, magnum, parvum, album, nigrum & flavum. Indicum, radice non est magna, nec longa, caule hederæ modo per solum extenso, digiti crassitudine: folijs & floribus Altheæ similibus, cujus tantum caulis pars inferior juxta radicem gummosa, utilis est, Acosta, Frag. Dodonæo ex Garzia monentibus. Quare hoc ab eo, quo in Officinis vulgò utuntur, longe aliud est, monente etiam Clusio in Garziam. Idcirco inter se differre volunt, Turbith Avicennæ, & Turbedhaut Tarbadh.

I. Turpetum Arabum, seu Turbit Officin.

Turbith Mesuæi, Matth.

Turbithum sive Turbit Arabum, Cord. hist.

Turbith Alexandrinum, Ad. Lob. ico. Ger. Cast.

Tripolium Diosc. si Serapioni credimus, nil aliud est quam Turbith, Cord. in Diosc.

Turpetum Mesues, tithymalli myrsinitis radix, Bras. at Fuch. Thapsiæ radix.

Turbith. Off. & Hispaniæ officinæ, Thapsiæ radice pro Turpeto legitimo utuntur, & multis

per Europam locis, Scammoneæ radicem concisam pro Turpeto legitimo ostendunt, Clus. in

Turpetum, Tab.

Addit Fragofus Turbit aliud genus, à paucis annis in Officinis usitatum, quo vocitent de la Tierra, quod quarundam arundinum radicem esse dicant.

II. Turpetum repens folijs Altheæ, vel Ind.

Turbith Garziæ, Acosta, Frag. Dod.

III. Pseudoturpetum Garganicum.

Turpetum, quod potius Pseudoturpetum dixeris, ex Gargano Apuliæ monte duplex, unum de Thapsiæ, alterum de Pityusæ radicibus, impostores concinnant, Garz.

Turbith ex Apulia, turbith non est, sed ex Istarijs, & secundum aliquos Thapsia, Acosta.

## P E V C E D A N V M.

**P**ενέδαον Dioscorid. l. 3. c. 92. Theoph. 9. hist. 14. etsi sint qui velint, nomen ab amaritudine sortitum esse, tamen à πέννι, quæ Lat. Pinus, dictum videtur, cum hujus folia cum Pini folijs similitudinem quandam habeant: unde & Pinastellum aliquibus nominatur. Peucedanum Plin. lib. 25. c. 9.

I. Peucedanum majus Italicum.

Peucedanum, Matth. Ang. Lac. Lugd. Cæs. Cast.

Peucedanum Italicum, Tab.

Peucedanum majus Italicum, Lobel. Lugd. majus, Ger.

Peucedanum folijs longioribus, Dod.

II. Peucedanum Germanicum.

Peucedanum, Trag. Fuch. Dod. Cord. in Diosc.

& hist. Gefn. hort. Tur. Ad. Lob. (cui & Fœniculum porcinum) Lon. desc. Lugd. Ger. Tab. cui & cauda porcina.

III. Peucedanum minus.

Saxifraga 3. Matth. Lugd. Cast.

Saxifragum, Lac.

Peucedani facie pusilla planta, Lob. ico.

Peucedanum Pannonicum, Clus. pan. & hist.

## D A V C V S.

**Δ**άυν Diosc. lib. 3. cap. 83. Daucus, Daucum, & Daucium Latinis.

Genera tria Diosc. primum Creticum folijs fœniculi: alterum apio sylvestri simile: tertium folijs Coriandri. Diocles verdè, l. 3. de salub. quartum addidit nempe Staphylinum. Plin. l. 25. c. 9. ait. Dauci genera quatuor, Petronius Diodotus fecit, cum sint differentia duæ: probatissimum in Creta fœniculi similitudine: alterum

*folijs Coriandri: si tertium genus facere libeat, est simile Staphylino, quod Pastinacam erraticam appellant. Idem, lib. 19. cap. 5. Pastinaca quartum genus, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò Daucon, cujus genera etiam quatuor fecere. De Dauco Theophrasti capite sequenti.*

**I. Daucus folijs fœniculi tenuissimis.**

Daucus 1. Matth. Lugd.

Daucus, Lac.

Daucus Cretensis verus Diosc. Ad. Lob. ico. Ger.

Daucus Creticus, Cast. desc. Gesn. Tab.

**II. Daucus alpinus multifido longoque folio, sive montanus umbella candida.**

Daucus Creticus, Gesn. hort. Cam. ep. Matth. & hort. Clus. pan.

Daucum montanum, Cæs.

Variat aliquantum: nam qui in Baldo, folijs est brevioribus compactioribus: qui verò in Helvetiorum alpi. & monte Wasserfall/ longioribus & rarioribus: & hujus Gesn. in ap. meminit, quem cum eo in Baldo eundem, aut certè similem, & earundem virium scribit.

**III. Daucus mont. multifido breviq; folio. Saxifraga Pannonica, Clus. pan. & hist.**

**IV. Daucus montan. multifido folio Selini femine.**

Selinum mont. pumilum, Clus. pan. & hist.

Oreoselinum, Tab. ico. Ger. tertium, Tab. fol.

**V. Daucus mont. apij folio major.**

Daucus 2. Trag. (cui & Sefeli 2.) Matth. Lugd.

Dauci 3. genus, Fuch.

Libanotidis alterum genus, Dod. gal. Lugd.

Libanotis nigra Dodonæi, Gesn. hort.

Sefeli peloponense, Fuch. ico. Gesn. hort. Cam.

Elaphoboscum nigrum, Lon.

Saxifraga Venetorum, Ad.

Daucus Selinoides 2. Ad. Lob.

Sefeli pannonicum 2. Clus. pan. ico. 2. montanum, Eid. hist. ico.

Libanotis nigra, communiter Cervaria nigra, Thal.

Libanotis Theoph. nigra, Tab. Ger.

Varietas: 1. est folijs pallidè virentibus & splendentibus. 2. folijs latioribus, forte obculturam, quam Pseudo-costum Cortusus nominabat. 3. folijs minus divisis, supina parte dilutius virentibus & aliquantulum splendentibus, prona subcinereis, quam Cervariæ nigræ nomine, Lipsiâ D. Jungermannus misit.

**VI. Daucus mont. apij folio minor.**

Apium mont. & Oreoselinum nigrum, Gesn. hort. Dauci secundi Selinoidis varietas, sive Selinoides Cordi, Lob. obs.

an Daucus Selinoides latifolius, Cord.

an Apium sylvaticum, Thal.

**VII. Daucus mont. apij folio albicans.**

Seli 2. mont. pannonicum, Clus. hist. desc.

Sefeli peloponensis Jenensium nomine, D. Jungermannus misit.

**VIII. Daucus mont. apij folio flore luteo: qui 1. in Proдро.**

**IX. Daucus prat. apij folio: qui 2. in Prod.**

**X. Daucus campestris apij folio.**

Dauci 2. genus Dalechampij, Lugd.

An fortè Pimpinella Saxifraga.

**XI. Daucus petroselini vel coriandri folio.**

Bunium Dalechampij, Lugd.

**XII. Daucus Cret. nodosus umbella lutea.**

Daucus 3. Cret. Belli, Ponæ & cp. 1. ad Clus.

**XIII. Daucus pratensis millefolij palustris folio.**

Daucus prat. Dalechampij, Lugd.

Hic folijs & umbellâ, quæ tamen alba est, cum Millefolio aquatico Matthioli convenit, folijs tamen inferioribus, Coriandro simili- bus, exceptis.

**P A S T I N A C A.**

**Σ** *ταφυλιν* Diosc. l. 3. c. 59. sortè à colore uræ nigricantis, cujus coloris, unius radix est: qui sylvestris, in cujus umbellæ candida medio, exiguum quid coloris purpurei, cernitur: & etiam sativi meminit. *Δαόν* Theophrasto (Pastinacam Gaza vertit) 9. hist. 15. cui Daucus specie Lauri, colore croci apud Archades nascitur: & in Patrensi agro præstantior cæteris: huic vis calefactoria est, radix nigra: & c. 22. Daucum agro Spartenfi Achajæ laudatissimam referunt: naturâ calefactoriam, radice nigram.

Pastinaca (quæ à pascendo dicta videtur, cum corpus alat) nomine, Latinis quatuor plantas significari, Plin. l. 19. c. 5. ostendit; Pastinaca, inquit, unum genus agreste, spontè provenit. Staphylinus Gracè dicitur: alterum seritur radice, vel semine: est & quartum genus in eadem similitudine Pastinacæ, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò Daucon: at l. 20. c. 5. Staphylinus, pastinacam erraticam appellant.



*Duplex est Pastinaca, tenuifolia & latifolia: de tenuifolia tam sativa, quàm sylvestri nunc: de latifolia, sectione quinta.*

**I. Pastinaca tenuifolia** syl. Dioscoridis, vel  
Daucus Officinarum.

Daucus agrestis, Gal. de alim.

Pastinaca erratica, Plinio, Fuch. Cord. in Dioscorid. Tab.

Staphylinus sylv. Trag. Dod. gal. Cæs.

Pastinaca sylv. Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. syl. tenuifolia, Dod. Ger.

Daucum Officin. usitarius, Ad.

Pastinaca sylv. genuina Diosc. Lob.

Pastinaca 2. Tur. 4. Plinij, Cam.

Dauci 3. genus, Dod. gal. Thal.

Daucus vulgaris, Clus. hist.

Differt magnitudine & parvitate: sic & ratione umbellæ, in cujus medio aliquando macula purpurea, subnigræ, aliquando crocea: folijs etiam, aliquantum latioribus, in altera multò renuioribus: quare Thalius illam, Daucum 3. Dodonæi, hanc verò Daucum 3. tenuifolium nominat.

**II. Pastinaca tenuifolia** syl. umbella majore.

Pastinaca sylv. daucoides Apula, Col.

Umbellæ est majore, obscure purpurascens, quæ non in totum, ut in priore, conglobatur.

**III. Pastinaca** sylv. hirsuta echinato fructu.

an Daucus angulosus, Cordi hist.

Daucus *ακτινικος* id est, hirsuto caule, Thal.

**IV. Pastinaca** syl. angustifol. fructu echinato.

Pastinaca echinophora Apula, Colum.

Hanc ad D. Columna accepimus.

**V. Pastin. tenuif. sativa** radice lutea, vel alba.

Staphylin. sativus & Daucus domesticus, Gal.

Staphylinus 1. & 2. Trag. luteus, Dod. gal.

Sifer, Lac. alterum, Matth. Tab.

Carota crocea malè Sifer, Guil.

Pastinaca sativa 1. Fuch. sativa flava, Lon.

Pastinaca sativa 1. & 2. Tab.

Pastinaca radicibus luteis, vel albis, Ges. hor.

Pastinaca sativa Diosc. Lob. Cord. in Diosc.

Pastinaca tenuifolia sativa, Dod. Ger.

Carotta vulgaris radice flava, Ad.

Carota radice buxei coloris, Cæs. ex albo flavescens, Cast. nostra lutea, Cam.

Pastinaca 3. Daucus Staphylinus altis & hortensis, vulgo Carotta, Cam. hor.

Variat solum radicis colore, quæ vel alba, vel pallidè lutea, vel lutea est.

**VI. Pastinaca tenuifolia sativa**, radice atrobubente.

Staphylinus sativus Dioscoridi.

Daucus radice nigra, Theophrasti.

Pastinaca sativa, Plinij.

Staphylinus 3. Trag. niger, Dod. gal.

Carota, Matth. altera, Lugd. radice sanguinei coloris, Cæs. radice rubra, Cast.

Pastinaca sativa altera, Fuch. prima, Tur. sativa rubens, Dod. Tab. atrobubens, Lob.

Daucus niger Theoph. Carotta vulgaris, Ad.

Pastinaca radicibus purpureis, Ges. hor.

Been rubrum & album, an Daucus sativus & sylv. Galeni, Ang.

Carota Italis radice rubra & alba, Been rubri & albi *αὐτὴν ἀνέμωρα* esse volunt aliqui, non malè,

Camer.

## GINGIDIUM.

**F** 1731 *Aut Dioscorides lib. 2. cap. 167. herbam sylvestri Staphylino similem dicit: & Plin. lib. 20. cap. 5. Gigidium similitimum Staphylino.*

**I. Gigidium folio fœniculi.**

Gigidium Dioscoridis, Ravv. Lugd. ap.

Gigidium Syriacum, Cam.

**II. Gigidium umbella oblonga.**

Seseli, Trag. ico.

Visnaga, Matth. Ad. Lob. Lugd. Cast. & Pastin. sylv. major.

Gigidium, Ang. Cord. in Diosc. & hist. Dod.

gal. Clus. hist. cui & Bisnaga.

Seseli Mafsilienfe, Fuch. Dod. gal. ico.

Dauci genus tertium, Fuch. ico.

Cumini sativi alterum genus, Cæs.

Gigidium alterum, Dod. tertium, Tab.

Gigidium Hispanicum, Ger.

**III. Gigidium folijs Chærefolij.**

Gigidium, Matth. Lugd. Cast. primum, Tab.

**IV. Gigidium folijs Pastinacæ latifoliæ.**

Gigidium folijs Bauciæ Syriacum, Lob. Lugd.

Gigidium primum, Dod. secundum, Tab. (& latifolium) Ger.

CHÆRO-

## CHÆROPHYLLUM.

**C** Hærophyllum Columella habet : an Plinij l. 19. c. 8. sit Cærophyllum, quod Paderota Græci vocitent, propter brevitatem asserere non licet : & potius ejusdem Anthriscus, lib. & cap. 22. fortè Theophr. 7. hist. 7. *οἰθακιδόν*, Enthuscium Gaza vertit. *οἰθακιδίων* Dioscoridis quibusdam videtur.

## I. Chærophyllum sativum.

Cherefolium, Brunf. Dod. sativum, Trag.  
Cerefolium, Matth. Cast. Lugd. vulgare, Ger.  
Cerefolium, Ang. Dod. gal. Gef. hort. Lon. Ad.  
Lob. (cui Gingidij species) Cæs. Cam. Tab.  
Oreofelinum, Ang. & Cæs. putant.  
Gingidium, Fuch. Tur. Lac.

## II. Chærophyllum sylvestre.

Dauci sylv. genus, Gef. ap.

Daucus sepiarius, Gef. col.

Anthriscus Plinij, Lugd.

Cerefolium sylv. Tab. Apium sylv. Ger. ico.

## III. Cærophyllum nonnihil simile.

Perchepier (i.e. Saxifraga) Anglorum, Ad. Lob.

Scandix minor, Tab.

(Lugd.)

Alchimilla montana minima, Col.

## SCANDIX.

**Σ** *καύδις* Dioscoridi lib. 2. cap. 168. sylvestre olus est, quod Gingidio subjungit : Theophrast. 7. hist. 8. Plinio lib. & cap. 22.

I. Scandix umbella ex apicibus coagmentata.  
Scandix, Lugd.

## II. Scandix femine rostrato vulgaris.

Pecten Veneris, Matth. Ang. Gef. hor. Ad. Lob.  
Cast. Lugd. Cam. Ger.  
Scand. Dod. Lac. Cord. in Diosc. Gef. h. Cæs. Tab.  
Pecten Veneris, *ἀγριοκαύτις* vulgo dicitur, Hon.  
Belli ep. 1. ad Clusf.

III. Scandix Cretica major : quæ 4. in Phytopin. prima in Prod.

IV. Scandix Cretica minor : quæ 3. & 5. in

Phytopin. at. 2. in Prod.

Anthriscus Plinij, Clusf. hist.

Anthriscus vulgo *τρίλιμονίδια*, quod vulvæ purgamentum significat, cum Venerem excitet, Hon. Belli ep. 1. ad Clusf.

an Scandix legitima quæ *καύτις* ἢ *σκανδινὴ* quæ comedirur, Eid. l. 1.

Anisomarathrum Apulum, Colum. & Clusf. hist. ap. alt.

an Apium sylv. Dalech. Lugd.

Duplex est odora & inodora.

## CAUCALIS.

**K** *Αυκαλὶς* apud Dioscorid. lib. 2. c. 169. Scandicem sequitur, quam aliqui Daucum sylv. nominent. Plin. lib. 21. c. 15. secutus Dioscoridem, inter Olera recensuit.

I. Caulalis maxima Sphondilij aculeato femine.

Caucalis major, Clusf. hist.

## II. Caulalis lato apij folio.

Caucalis, Matth. Lac. Cast. Lugd.

an Caulalis, Cord. in Diosc.

Daucoides majus, Cord. hist. Thal.

Caucalis vulgarior, Ad.

Caucalis flore rubro folio latiore, Lob.

Caucalis rubello flore, Clusf. hist.

Gingidium, Cæs.

## III. Caulalis arvensis echinata latifolia.

Echinophora major platyphyllos purpurea, Colum.

an Caulalis saturè rubente flore, Clusf. hist.

## IV. Caulalis arvensis echinata magno flore.

Lappa agrestis, Trag.

Lappula canaria Plinij, Ang.

Caucal. Dod. (& Daucus sylv.) Gef. hor. Tab. Ey.

Caucalis alia vulgaris, Lugd.

Caucalis albis flor. vulgaris, Lob. Ger. albo flore proximè ad Dioscoridis accedens, Clusf. hist.

Caucalis coronata umbella, Cam.

Tribulus sylv. & Lappa campestris, Lon.

Myrrhis lappa Dalechampi, Lugd.

Dauci genus arvense, Gef. car.

Daucus *ἀνανθήναρπ* seu *ἐχινόναρπ*, sive *ξανθόναρπ* minor, Thal.

Echinophora *πυρρόναρπ*, an Gingidium Dioscor. Col.

V. Caulalis arvensis echinata parvo flore & fructu.

Caucalis flore minuto, Cam.

an Echinophora leptophyllum purpurea, Col.

VI. Cau-

V I. *Caucalis Monspeliaca echinato magno fructu.*

*Lappa boaria Plinij, Lugd.*

*Caucalis secunda, Tab.*

*Daucus ἐχινόκαρπος, aut ξανθινόκαρπος major, Thal. Echinophora alt. asperior πλάσινκαρπος, Col.*

V II. *Caucalis femine aspero flosculis rubentibus.*

*Daucoides minor, Cord. hist. Thal.*

V III. *Caucalis nodoso echinato femine: quod. 7. in Phytopin. at. 1. in Prod. & in Matth. nostro depictum.*

*Scandix, Colum.*

IX. *Caucalis peregrina femine rugoso.*

*Caucalis Hispanica, Cam. Clus. hist.*

*Gingidio congener, Cæs.*

X. *Caucalis tenuifolia montana: quæ 2. in Prodr.*

X I. *Caucalis pumila maritima.*

*Caucalis pumila, Clus. cur. post.*

X II. *Caucalis folio peucedani.*

*Caucalis, Anguil. Ad. Lob. tertia, Tab.*

*Caucalis Anglica, Eid.*

*Caucalis Penæ, Lugd.*

## A P I U M.

Σ *Εἰς τὸν Dioscorides l. 3. capitibus sex 74. & seq. proposuit; hortenſe, ἐλακιστέλιον, in humidis: ἐγεστέλιον in montosis: περγαστέλιον in Macedonia: ἰπποσέλιον: tandem σάμνιον in Cilicia proveniens. Theoph. 1. hist. 4. de Selino egit, cujus plura esse genera 6. caus. 22. scribit: hæc 7. hist. 4. inter se cum folijs, cum caulibus differunt: aliud enim folio spisso, crispo, denso, aliud rariore, latiore, caule, majore: horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut versicoloris. Plinius lib. 20. cap. 11. de Apio, Hippoſelino, Eleoſelino, & Oreoſelino: & cap. seq. de petroſelino & buſelino egit.*

I. *Apium hortenſe, seu Petroſelinum vulgo. Selinon seu Apium, Theoph. & Dioſc. Apium mas, Plinij.*

*Petroſelinum, Brunf. Trag. Cord. in Dioſcor. Anguil.*

*Petroſelinum vulgare seu fativum, Lon.*

*Petroſelinum ſylv. Fuch. ico. vulgo Apium veterum, Gef. hort.*

*Oreoſelinum, Fuch.*

*Apium hortenſe, Matth. Lac. Dod. Ad. Lobel.*

*Castor. Ger. (hor.*

*Apium commune, non rectè Petroſelinum, Gef.*

*Petroſelinon vulgi, petroſelinum verum priſcorum, Guil.*

*Apium domesticum, Cæs. fativum, Tab.*

*Apium fativum vulgare ſive Petroſelinum, Col.*

II. *Apium vel Petroſelinum crispum.*

*Petroſelinum crispum, Cam.*

*Apium hortenſ. crispatum, Ad. Lugd.*

*Apium crispum vel multifolium, Tab. Ger.*

*Apium fativum Sardum, Col.*

III. *Petroſelinum Creticum.*

*Agriopastinaca vulgo in Creta, Belli ep. 5.*

*Duplex est, colore corticis radicum tantum differens: nam unius rufus, alterius niger conspicitur.*

*Buſelinon fortè Plinij l. 20. c. 12.*

IV. *Apium hortenſe latifolium.*

*an Apium verum, Ang.*

*an Apium fativum Anglicanum, Col.*

*Hoc in Phytopinace, Matth. & Prodr. descripsimus.*

V. *Apium montanum folio tenuiore.*

*Petroſelinum Dalechampij, Lugd.*

*an Petroſelini succedaneum, quod in Apulia*

*Anethum ſylv. dicitur, Col.*

VI. *Apium montanum folio ampliore.*

*Oreoſelinum ſive Veelgutta, id est, multibona, Dodon.*

*Oreoſelinum, Ad. Lobel. (ſive Petroſelinum) Clus. hist. Ger.*

*Oreoſelinum primum, Tab.*

*Apium montanum, Caſt. Lugd.*

*Variat ratione loci, nam folijs tenuius diviſis, in noſtris pratis udis Michelfeldæ reperitur.*

V II. *Apium ſylv. lacteo ſucco turgens.*

*Apium ſylv. Dod. Lugd.*

*Daucus paluſtris, Gef. hort.*

*Oſenichium, Cord. hist. Thal.*

*Thyſſelinum Plinij, Lob.*

V III. *Apium montanum nigrum.*

*Oreoſelinum Pariſienſium, Lugd.*

IX. *Apium peregrinum folijs ſubrotundis.*

*Selinum peregrinum 1. Clus. hiſp. & hist.*

*Saxifraga tertium, Cæs.*

*Daucus tertium Dioſc. 2. Plinij, Col.*

X. *Apium peregrinum cicutæ folio.*

*Selinum peregrinum 2. Clus. hiſp. & hist.*

Oreoselinum aliud, Lugd.

XI. Apium palustre, & Apium Officinatum.

Apium, Brunf. Fuch. Lon. vulgare, Trag.

Apium palustre, Matth. Fuch. ico. Gef. hor. Lac.

Cast. Lugd.

Apium sativum & palustre, sola cultura diffrens, Cord. in Diosc. & hist.

Eleoselinum, Tur. Dod. Lob. Ger. spontan. Col.

Paludapium, Ad. Tab.

Apij aliud genus, Cæs.

XII. Apium Macedonicum.

Petroselinum Macedonicum, Matth. Ad. Lob.

Dod. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Apij alterum genus peregrinum, Cæs.

Daucus secundus Dioscoridis, Col.

XIII. Hipposelinum Theophr. vel Smyr-  
nium, Dioscor.

Petroselinum Alexandr. Trag. Macedonicum  
verum, Ger.

Smyrnum, Matth. Cord. in Diosc. Gef. hor. Cast.

Lugd. Cam. Col. qui Dioscoridis vult.

Hipposelinum, Ang. Dod. Fuch. Lac. Cord. hist.

Gef. hor. Ad. (sive Olusatrum) Lob. Tab.

Alexander, Tur.

Olusatrum, Cord. in Diosc. Gef. hort. (quibus-  
dam Petroselinum Macedonicum) Lon. Cæs.  
& Macerone vulgi.

XIV. Smyrnum peregrinum rotundo folio.

Smyrnum Creticum, Matth. Cast. Lugdun. Ca-  
mer. Ger.

Smyrnum Creticum putatum, Col. cui Hippo-  
selinum aliud Diosc.

Smyrnum, Dod. gal. Ad. Lob. Tab. verum, Gef.  
hor. Lugd.

Smyrnum Amani montis, Dod.

Olusatri alterum genus peregrinum, Cæs.

Perfoliata altera, Lugd.

XV. Smyrnum peregrinum folio oblongo:  
hoc in Prodromo descripsimus.

Pingit Columna sub titulo an Hipposelinon.

## S I S O N.

*Σίσων Dioscoridi lib. 3. cap. 64.*

Sison, quod Amomum Officinis nostris.

Amomum Germanicum, Trag.

Amomum Officin. falsò dictum, Gef. hort.

Sison, Ang. Tur. Gef. hort. Lugd. Tab. Cam.

Sison sive Sison, Cord. in Diosc. & hist.

Petroselinum Macedonicum, Fuchsij, Dodon.  
Lon.

Anmi parvum, Gef. hort.

## S I O N.

*Σίσων Diosc. lib. 2. cap. 154. ἀπὸ τῆς οἰσίν, quod in aquis vacillando, ab aquis præterlabentibus succutiatur: vel potius ab excutiendis calculis. Plinio l. & c. 22. Sion fortè ejusdem l. 26. c. 8. Laver.*

I. Sion sive Apium palustre folijs oblongis.

Sion odoratum, Trag.

Sium, Cord. hist. Gef. hort. Dod. primum mi-  
nus, Taber.

Sium verum, Matth. Thal. Lugd. cui & Sium  
Cratæ majus.

Sij primum genus quod Laver, Fuch.

Laver, Dod. gal. Tur.

Apium palustre, Fuch. ico. Gef. col. Lon. Lugd.

Silaum Plinij, Ang.

Sium sive Laver Diosc. Olusatri folio, sive aqua-  
rica pastinaca, Ad. Lob.

Crescione vulgo, Cæs.

II. Sium latifolium.

Sium majus latifolium vel 3. & Sium medium,  
vel 2. Taber.

Sium majus, Ger.

III. Sium erucæ folio.

Sium alterum, Dod. Olusatri facie, Lob.

Sium alterum erucæ folio, Lugd.

Sium majus angustifolium, Tab.

Cicuta maxima quorundam, Eyst.

an Crescionis alterum genus, Cæs.



## S E C T I O Q U I N T A.

PASTINACA LATIFOLIA; SISARVM; ANGELICA; IMPERATORIA; LASERPITIVM; PANAX; SPONDYLIVM; LIBANOTIS; CARVI; CORIANDRVM; ANISVM; AMMI; PIMPINELLA; Myrrhis; Cicuta & Cicutaria; Sefeli; Ligusticum; Bulbocastanum; Oenanthe & Filipendula; Pedicularis seu Fistularia, & Barba Capræ.

## P A S T I N A C A L A T I F O L I A.

**E** *Ἀρπύβορον Dioſcoridi, lib. 3. cap. 80. & Plinio, lib. 6. cap. 22. id est, pabulum cervi, hoc enim pabulo cervos serpentibus resistere fama est, Dioſc. & Plinio auctoribus.*

## I. Pastinaca sativa latifolia.

Pastin. sativa, Trag. Lac. ico. Lug. Gef. hor. Cam.

Pastinaca vulgaris, Dod. gal. Cæf.

Pastinaca domestica, Matth. Ang. Cast. Ad. Lob.

Pastinaca latifolia sativa Dod. latifolia syl. Ger.

Sifarum sativum magnum, Fuch. Tur.

Sifer Dioſcoridis, Col.

Elaphobosum sativum, Tab.

## II. Pastinaca sylv. latifolia.

Pastinaca, Brunf. sylv. Trag. Ang. Cord. Gefn.

hort. Thal. Cam. spontè nata, Cæf.

Sifer sylv. Fuch. Tur.

Elaphobosum, Matth. Dod. gal. Cast. syl. Lac.

Baucia, Pastinaca syl. Arabum, an Elaphob. Ad.

Elaphosum erraticum, Tab.

Pastinaca sylv. gallica, Cord. in Dioſc.

Pastinaca latifolia sylv. Dod.

Spondylium, Ger.

## S I S A R U M.

**Σ** *ῥόσπον Dioſc. l. 2. c. 139. vulgo cognitum, cujus radix elixa, ori grata est. Sifer Plinio, l. 19. c. 5. quod olim in Germania cibi causa serebatur, quare eam quotannis à Germanis Tib. Cæsar, Plinio scribente, flagitavit.*

## I. Sifarum Germanorum.

Sifer, Brunf. Matth. Cord. in Dioſc. Gef. hor. Lon.

Sifer alterum, Lac.

Sifer sativum, Fuch. minus, Tur.

Sifarum, Trag. (& Rapunculus hortensis) Dod.

Ang. Ad. Lob. Tab. Ger. majus, Lugd.

Sifer Germanicum, Cæsalp. cui Elaphobosum

Dioſc. & Plinij.

Elaphobosum Dioſcoridis, Col.

## II. Sifarum Syriacum.

Secacul Arabum & Maurorum sive Pastinaca

Syriaca, Rauvv. Lugd. ap.

## A N G E L I C A.

**A** *ngelica, quam aliqui ad Smyrnum, alij ad Laserp. sive Silphium Cyrenaicum referunt: etiam S. Spiritus radix dicitur, vel à radicis suavissimo odore, vel à facultate singulari, qua contra venena valet.*

## I. Angelica sativa.

Angelica, Brunf. Ang. Gefn. hort. Lac. Ad. Lob.

Cast. Tab.

Angelica major, Dod.

Angelica sativa, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal.

Lon. Lugd. Cæf. Ger.

Angelica odorata, Gefn. col. Cam.

Smyrnum, Cord. in Dioſc. & hist.

Laserpitium, Lac.

Variat radice; nostra enim crassior, Bohemica minor & nigricans: illa citius, hæc tardius corrumpitur,

Huc referenda est Angelica Scandiacæ, sive Archangelica Tabernæmontani, quæ umbella est flava, semine rotundiore, & ex Norvegia ac Pomerania adfertur.

## II. Angelica sylvestris major.

Angelica sylv. Trag. Matth. Fuch. Dod. Lon.

Ad. Lob. Lugd. Thal. Cam. Tab. Ger.

In locis humidioribus, folijs est tenuioribus.

## III. Angelica syl. minor sive erratica.

Pycnocomos, Brunf.

Angelicæ vitium (& Osteritium sylv.) Trag.

Lon. Herba Gerardi, Dod. Ger.

Elaphoboscœ similis, Cord. in Diosc.  
 Corchorus quibusdam, Gesn. hort.  
 Podagraria, Ad. Lob. Cast.  
 Angelica erratica, Thal. sylv. communis, Cam.  
 Ægopodium, Tab.  
 Foliorum incisuris mirè variat.  
 IV. Angelica sylvest. hirsuta inodora : in  
 Prodr. descripta.  
 Herba Podagrariæ cognata, Franco.

V. Angelica sylv. montana.  
 Archangelica, Clus. pan.  
 Angelica, Cæs. Huc etiam referenda  
 Angelica minor montana, Tab.  
 VI. Angelica aquatica.  
 Archangelica, Lob. Dod. Clus. pan. & hist. Cast.  
 Lugd. Cam.  
 Angelica aquatica, Gesn. hort. & col.  
 Angelica altera, Cæs.

### IMPERATORIA.

**I**mperatoria, quæ ob raras & præstantes facultates, sic nominata fuit, inter Laserpitium & Panacem media videtur.

I. Imperatoria major.  
 Astrantia, Brunf. Gesn. hor. & col. Dod. Clus. hist.  
 Smyrnion hortense, Trag. Gesn. hort.  
 Laserpitium Germanicum, Fuch.  
 Laser sive Laserpitium, Tur.  
 Struthion, Cord. hist.  
 Ostrutium, Dod. gal. Lon.

Imperatoria, Matth. Gesn. hort. & fra. Lac. Ad.  
 Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.  
 Ligusticum, Ang.  
 Herba rena vulgi, Cæs.  
 Magistrantia, Cam.  
 II. Imperatoria minor.  
 Imperatoria vel Astrantia alpina, Cam. ep.

### LASERPITIUM.

**L**aserpitium, Σίλφιον Dioscoridi, lib. 3. cap. 94. cujus caulis ferulaceus μάστιγιν appellatur, folia sunt apio similia, semen verò lutum: ex cujus caulibus & radice incis, ὄπθ, i. e. succus colligitur: quibusdam caulis σίλφιον: radix, μαχρίδαρις, & folium μάστιγιν dicuntur: sic Theoph. 6. hist. 3. Silphium cujus folium maspetum vocant: Et Plin. lib. 19. cap. 3. Laserpotium, quod Græci Silphion vocant, in Cyneraica provincia repertum, cujus succum Laser vocant: Avicenna planta Laserifera Altiht dicitur, interpretum aliqui Asam reddunt, fortè voce ex Laser corrupta.

I. Laserpitium veterum.  
 Silphion, Dioscoridis & Theophrasti.  
 Laserpitium, Plinio.  
 Altiht Avic. Afa quibusdam.

II. Laserpitium Gallicum.  
 Laserpitium, Ad. Lob. (sive Silphium) Lugd.  
 Laserpitium Massilioticum, Tab.

### PANAX.

**Π**άναξ, quasi πᾶσιν ἀνθ, omnibus remedium adserens, cujus Theoph. 9. hist. 10. genera quatuor: 1. Syriacum: 2. Chironium: 3. Aesculapicum: 4. Herculanum: Chironium, folio rumici simili: Aesculapium, folio Thapsia: Herculanum, folio magno & amplo, ut quoquo versus tres palmas perficiat. Dioscoridi, lib. 3. cap. 55, 56, 57. tria genera sunt: πάνανθος ἡράκλειον, ex quo Opopanax colligitur, folijs ficulneis, quinquepartitis: πάνανθος ἀσκληπιῖς, folijs fanticuli: πάνανθος χαρόδιον, folio amaraci.

I. Panax Pastinacæ folio, an Syriac Theoph.  
 Sagapenum existimatum, Gesn. hort.  
 Panaces peregrinum, Dod.  
 Panax altera recentiorum Olufatri aut Pastinacæ folio, Ad. Lob.  
 Panax Chironium, Lugd. Herculeum 2. Tab.  
 Panax herculeum majus, Ger.  
 an Panacis heraclei alterum genus, Cæs.

Σαγάπινον Sagapenum & Serapinum in Officinis, an hujus foræ lachryma, cum sit plantæ

ferulacæ in Media provenientis, medio inter succum Silphij & Galbanum colore, Dioscor. lib. 3. cap. 95.

II. Panax costinum.  
 Costus, Matth. Lon. vulgaris, Cam. ep.  
 Costus spurius, Matthioli, Lob. ob. Cam.  
 Pseudocostus, Matth. Lugd.  
 Herba costa, Cæs. alp.  
 Panax Chironium Theoph. Cam.  
 Panaces costinum & Costus Illyricus, Tab.

III. *Panax sphondylii folio sive Hera-  
cleum.*

*Panaces Heracleum*, Matth. Ang. Gesn. hort.  
Lac. Cast. Lugd.

*Panax Heracleum Herculeum*, sive *Heraclia*  
fronde pastinacæ, Ad.

*Panax Heracleum*, Lob. Dod. Ger.

*Panax Herculeum*, Cæs. primus, Tab.

*Sphondylium alterum*, Dod. 8.

*Floribus est albis, luteis dicit Diosc. tales se  
vidisse, Lobelius testatur.*

IV. *Panaci Heracleo similis Ungarica.*

*Tataria Ungarica*, Clus. hist. (bari.

an Baltracan in Tartaria nascens, Josephi Bar-

Hujus radice, Ungari Agriæ vicini, alterius

panis penuria vescuntur: & Tartari, folio-

rum in aqua decoctum refrigeratum, Vini in-

star bibunt.

## SPHONDYLIIUM.

*Σφονδύλιον folia habet platano similia ad Panacis foliorum effigiem accedentia. Dioscoridi lib. 3. cap. 90.  
Spondylium Plumo, lib. 12. cap. 26 & l. 24. c. 6. sic dictum fortasse ob odoris gravitatem, à Spondyle insecti  
genere, odoris gravis, ut Pena tradidit.*

I. *Sphondylium vulgare hirsutum.*

*Branca ursina*, Brunf. Trag. Cord. in Diosc.  
(cui & *Bupleuron Nicandri*) Germanica,  
Dod. gal.

*Acanthus vulgaris sive Germanica*, Fuch.

*Sphondylium*, Matth. Lac. Gesn. hort. Lon.

Cast. Cæs. Tab. vulgare, Dod. 8.

*Sphondylium*, Ad. Lob. Dod.

Variat ratione loci, prout in montosis &  
planis provenit, hinc duæ apud Tabern. ico-  
nes: aliquando ita ludit, ut in caulis summo,

folia sint breviora quidem, attamen in ternas  
& quaternas lacinias divisa. Floribus est com-  
muniter albis: Sed & purpureis, licet rarius,  
reperitur.

II. *Sphondylium hirsutum folijs angustio-  
ribus*: hoc in Prodr. primo loco descriptum est.

III. *Sphondylium alpinum parvum*: quod  
2. loco in Prodr. describitur.

IV. *Sphondylium alpinum glabrum*: quod  
in Phytopinace sub. 2. in Prodr. sub. 3. propo-  
nitur.

## LIBANOTIS.

*Λιβανotis, quod radix ἑσπεριδίων thus redoleat, duplex est, latifolia & serula folio: latifolia Theoph. l. 9.  
c. 12. genera duo fecit, alterum sterile, alterum fertile, & alterum tam fructu. quam folio utile, alterum  
tantum radice: fructiferum, folium palustri apio simile, sed majus. habet: sterile, folio lactuca amara con-  
stat. Plin. l. 19. c. 12. de Libanotide confuse egit, sicut & l. 20. c. 16. cum Conyctis miscuit.*

I. *Libanotis latifolia major.*

*Rosmarinus Theoph.* Ang.

an *Ligusticum alterum*, Matth. Cast.

*Libanotis Theoph. major*, Lob. Lugd. Ger.

*Libanotis alba major*, Tab.

*Elaphoboscum album*, Lon.

*Seseli æthiopicum* 2. Clus. pan. & hist.

II. *Libanotis latifolia altera sive vulgarior.*

*Seseli primum*, T. ag. æthiopicum, Matth. ico.

Fuch. ico. Tur. Lac. Gesn. hor. Lon. Lugd. Clus.

pan. & hist.

*Dauci alterum genus*, Fuch. Tur. Lugd.

*Libanotis alba*, Gesn. hort. Tab.

*Libanotis tertia Dodonæi*, Lugd.

*Libanotis Theoph. Dodonæo gal. Ad. Lobel.  
altera*, Thal.

*Libanotis minor*, Ger.

*Seseli æthiopicum herba*, Dod.

III. *Libanotis latifolia minor semine cri-  
spo*: hæc 2. in Prodomo.

IV. *Libanotis minor apij folio.*

*Daucus anguloso caule*, Cord. hist.

*Libanotis Theoph. minor*, Lob.

*Libanotis alba minor*, Thal.

*Libanotis panacea*, Tab.

V. *Libanotis apij folio semine aspero.*

*Rosmarinus folijs Selino similibus*, quæ Liba-

notis legitima Theoph. perperam Siler Creti-

cum, Hon. Belliep. 1 ad Clus.

VI. *Libanotis latifolia aquilegiæ folio*,  
quæ 1. est in Prodomo.

*Seseli æthiopicum alterum*, Cam.

VII. *Ligusticum vulgare*: an *Libanotis  
fertilis Theophrasti?*

*Levisticum*, Brunf. Lob. & *Laserpitium Ger-  
manicum*, vulgare, Matth. Dod. Ad. Cæs.



Ligusticum, Brunf. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Laferpitium, Ang. Ger.  
 Lon. Tab. sativum, Trag. Cord. hist. vulgare, Smyrnum, Lac. Fuch.  
 Dod. gal. Cam. Hipposelinum, Lugd.  
 Libylliticum vulgare, Fuch. ico.

## LIBANOTIS FERULÆ FOLIO

&amp; Panax Asclepias.

**A**lxoris Dioscoridi, l. 3. c. 87. duum est generum: unum fecundum, cujus semen rotundum, angulosum, acre, linguam exurens, & αἰγῆς vocatur, folijs fœniculis cui alterum consimile, semine lato, minimè exurente. Sterile illorum similitudinem refert, sed neque caulem, neque florem, neque semen promit.

- I. Libanotis ferulæ folio semine anguloso. Libanotis 2. Dod. Tab.  
 Libanotis seu Rosmarinum, Matth. Lac. Lugd. Libanotis nigra, Cæs.  
 Rosmarinum 1. Ang. Cast. IV. Libanotidi secundæ similis seu Panax  
 Libanotis 1. Dod. vel cachryfera, Cam. Asclepium primum.  
 Rosmarinum ferulaceum, fertile, Diosc. cujus Panaces Asclepium, Matth. Lac. Cast. Lugd.  
 semen Cachris dicitur, Ad. V. Panax Asclepium umbella lutea.  
 Cachrys verior Libanotis Galeno, Lob. Panax Asclepium alterum, Lugd.  
 Libanotis candida, Cæs. VI. Panax Asclepium semine folioso.  
 II. Libanotis ferulæ folio & semine. Panax Asclepium Apulum, Col.  
 Panax Asclepium ferulæ facie, Ad. Lob. VII. Libanotis minor umbella candida.  
 Panaces Asclepium, Dod. Cæs. Tab. Libanotis Septentrionalium herbariorum, Ad.  
 III. Libanotis fœniculi folio semine foliaceo. Libanotis minima, Lugd. (minor.  
 Rosmar. alt. ferulaceum Dioscoridis, Lob. ob. VIII. Libanotis tenuif. German. major &  
 Panax Asclepium, Ang. Cam. Libanotis vespertinae major & minor, Thal.

## CARUI

**K**arpos Dioscoridi, lib. 3. cap. 66. καρόπον, Aëtio, καρπώδης Simeoni Sethi, lib. de alim. Careum Plin. lib. 19. cap. 8. à Caria regione in qua laudatissimum nascitur.

- I. Cuminum pratense, Carui Officinarum. Cuminum equinum & syl. Trag.  
 Caros, Brunf. Trag. Dod. gal. Gesn. hor. Fœniculum erraticum alterum, Lon.  
 Careum, Fuch. Peucedanum, Eid. ico.  
 Carum, Tur. Cord. in Diosc. Matth. Lac. Ang. Hippomarathrum, Bot. Franc.  
 Lob. Dod. Cast. Lugd. Tab. Ger. Fœniculum sylv. Loniceri, Lugd.  
 Carui, Lon. Ad. Cæs. Thal. Alia latioribus, alia angustioribus folijs est.  
 II. Carui alpinum: in Prodromo descript. IV. Podi farina seu flosculus quo flatus  
 III. Caruifolia. ventris exigunt: par. 4. Ind. Orient. 7.

## CORIANDRUM

**K**οριανδρον ἢ κορίανδρον Diosc. lib. 3. cap. 71. dictum putant, quod folia & caules cimices redoleant. Κορίανδρον, Theoph. 7. hist. 1. & 4. caus. 3. cujus genera plura esse 4. hist. 7. dicit. Coriandrum Plinio, lib. & cap. 20. quod inter sylvestria non inveniat.

- I. Coriandrum majus. Semina in calidiorib. regionib. majora sunt.  
 Coriandrum, Brunf. Trag. Fuch. Matth. Ang. II. Coriandrum minus testiculatum.  
 Cord. hist. Gesn. hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Cast. Coriandrum alt. minus odorum, Lob. Lug. sub  
 Cæs. Cam. Tab. Ger. Coriandri alterius iconè, Dod.  
 Coriandrum, quod recens frigidum, exsicca- Coriandrum 2. inodorum, Tab.  
 rum verò calefacit, Guil. III. Coriandrum sylvestre foetidissimum.  
 Coriander, Tur. Coriandrum sylv. Myconi, Lugd.

## A N I S U M.

**A** *Nicov* Diosc. lib. 3. cap. 65. Anisum, quidam auctore Plinio, lib. 20. cap. 17. quasi ἀνιστον vocare, quia appetentiam cibi præstaret, & forsan sic dictum, ἐτι ἀνιστοιτὰς ἐμπνουνμαζώσας, quod tensiones flatulentas internas & externas remittat & laxet.

I. Anisum herbarijs.  
Absinthium dulce, Roës.

Bohemos habetur.

II. Anisum peregrinum.

Majore est semine & minore, hocque apud Anisum Philippinarum Insularum, Clus. hist.

## A M M I.

**A** *Mus* Dioscorid. lib. 3. cap. 70. quod νέμνον αἰθιοπικὸν καὶ βασικὸν vocitant. Plinio lib. 20. cap. 15. Ammi quod Græci vocant, Cumino est simillimum: quidam Cuminum Aethiopicum esse existimant: Hippocrates regium appellat.

I. Ammi majus.

Ammi, Brunf. Trag. Tur. Cord. in Diosc. & hist. Gef. hort. Lon. Lugd.

Ammi commune sive vulgare, Dod. Cam. Ger.

Ammi vulgarius, Lob.

Ammiofelinum, Tab.

Quibusd. Bubon. Hipp. alijs Bupleuron Plin.

Variat fol. plurim. incisus & nonnihil crispis.

II. Ammi alterum semine apij.

Ammi majoribus & ferratis folijs semine apij, Gesn. hort.

Ammi Creticum aromaticum, Ad. Lob.

Ammi tertium Creticum, Tab.

III. Ammi parvum folijs sceniculi.

Ammi, Matth. Ang. Lac. Cast. Cæs. Lugd. Cam.

Ammi verum, Gef. hort.

Ammi parvum, Dodon. gal. alterum parvum, Eidem f.

Ammi perpufillum, Lob.

Ammium primum Alexandriacum, Tab.

IV. Ammoides.

Ammi pufillum, Cæs.

## P I M P I N E L L A.

**P**impinella & Bipinella à recentioribus, a foliorum binis ordinibus, pennatim sive plumatim digestis, nominata, veteribus indite existimantur: quæ etiam Bipennula & Pampinella vocantur. Hæc duplex est. Pimpinella saxifraga, seu saxifragia, a facultate calculorum à rebus expellendorum: altera Pimpinella Sanguisorba, vel Sorbastrella, quod sanguineos fluxus sistat: quæ πικνιδα Myrsio, & quibusd. Sideritis 2. Diosc. censetur.

I. Pimpinella saxifraga maj. umbellâ candidâ.

Pimpinella, Brunf. Cord. in Diosc. Lon. Trag.

Fuch. Tur. Gef. hor. Lob. Cast.

Pimpinella nostras communis major, Thal.

Bipinella, Saxifraga major, Ad.

Pimpinella saxifraga, Matth. Ger. major, Cam.

Bipennula, Lac.

Saxifragia major, Dod. gal. Saxifraga 1. Cæs.

Saxifraga, Cord. hist. magna, Dod. hircina major, Gef. hor. vulgaris major, Clus. pan.

Tragofelinum majus, Tab.

Folia in una atrovirentia, splendentia: in altera minime: invenitur & in lacinias divisa. Ad

hujus radicem quibusdam in locis, grana reperiuntur, quorum medulla in colorem rubeum

mutatur, cujus ad tincturam carmesini usus est,

monentibus Lacuna & Anguillara, & Coccus

radicum quibusdam dicitur.

Fragosus l. 3. c. 15. videtur Cocchenilla existi-

masse: Cocchinilla, inquit, quædam grani species adfertur ex Peru, quod nascitur in certis plantis parvis Pimpinellæ vulgari similibus, cujus radicibus adhæret, similitudine uvarum sylvestrium: quidam putarunt falsò, esse Cocconidium verum: alij esse Chermetes Arabum, à Cocco Baphice Græcorum differens, quod manifestè falsum est, hæc ille. At Oviedus, ex arbore colligi vult, ut suo loco dicitur.

II. Pimpinella saxifraga major altera.

Pimpinella secunda species, Trag.

Tragofelinum minus, Tab.

Bipinella sive saxifraga minor, Ger.

Cauliculi & foliorum venæ, interdum purpurascent: hæc fervore & acrimonia primum genus superat.

III. Pimpin. saxifraga major umbellâ rubente.

Saxifraga major in alpib. flore rubente, Gef. h.

Pimpinella major umbellâ purpureis, Gef. fra.

IV. Pim-

IV. *Pimpinella saxifraga minor*.  
*Pimpinella* 3. species, Trag.  
*Pimpinella minor*, Fuch. Tur. Cam. ep.  
*Pimpinella saxifraga minor*, Lugd. Cam.  
*Pimpinella nostras communis minor*, Thal.  
*Bipinella*, *Saxifraga hircina*, Ad.  
*Pimpinella*, *Saxifraga hircina minor*, Lob.  
*Saxifraga minor* alt. Dod. gal. *Saxifrag.* 2. Cæs.  
*Saxifraga hircina minor*, Gef. hort. Cam.  
*Saxifraga parva*, Dod.  
*Saxifraga vulgaris minor*, Clus. pan.  
*Saxifraga pimpinella Germanica minor*, Clus. histor.  
*Daucus Selinoides*, Cord. hist.  
*Dauci* 3. genus, Lugd.  
*Tragofelinum petræum*, Tab.  
*Tragium Dioscoridis*, Col.

Folia interdum laciniata, interdum incisuris angustioribus & oblongis divisa: aliquando folijs petroselinii.

V. *Pimpinella saxifraga tenuifolia*: in Prodromo descripta.

VI. *Pimpinella Sanguisorba major*.  
*Pimpinella Italica* 2. genus, Trag.  
*Pimpinella seu Sanguisorba major*, Matt. Cast. Lugd. Cam.

*Pimpinella major*, Dod. gal. sylv. Dod.  
*Pimpinella Italica major*, Clus. hist. Thal.  
*Sanguisorba major*, Fuch. Cord. hist. Tab.  
*Sanguisorba altera major*, Ad. (five *Pimpinella*) Lob.  
*Pimpinella sylv.* Ger.  
*Sideritis secunda* Diosc. major, Col.

VII. *Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta*.  
*Pimpinella Italica*, Trag. Lon. minor, Thal.  
*Pimpinella*, Ad. Lob. Cæs. minor. Dod. gal. Lug.  
*Pimpinella sylv. hirsuta*, Gef. hor.  
*Pimpinella sanguisorba*, Dod. minor, Matth. Cast. Cam.  
*Pimpinella hortenensis*, Ger.  
*Sanguisorba minor*, Fuch. Cord. hist. Tab.  
*Sideritis* 2. Ang. Guil. quæ *Pimpinella Italica*.  
*Sideritis* 2. Diosc. minor, Col.  
 an *Sideritis altera* Diosc. l. 4. c. 34. & *Sisytietris* Plinij l. 4. c. 17.

Hæc apud Monspelienfes minor & valdè pilosa reperitur.

VIII. *Pimpinella sanguisorba minor levis*.  
*Pimpinella fativa lævis*, Gef. hor.

Culturâ solum à priore differre videtur, cum in usum acetariorum ab Italis in hortos feratur.

IX. *Pimpinella sanguisorba inodora*: in Prod. descripta.

## M Y R R H I S.

**M**ύρρη, five μύρρα Dioscoridi lib. 4. cap. 116. *Myrrhis*, quæ alijs *Smyrrhiza*, alijs *Myrrha* dicitur, Plinio lib. 24. cap. 16.

I. *Myrrhis major*, vel *Cicutaria odorata*.  
*Myrrhis*, Matth. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lac. Ad. Lob. Dod. Cast. Lugd. fativa, Cam.

*Seseli Peloponense*, Ang.  
*Cicutaria tertia*, Cæs.  
*Cerofolium Hispanicum*, Tab.  
*Cerofolium magnum* & *Cicutaria tenuif.* Ger.

II. *Myrrhis minor*.  
*Myrrhis altera*, Ad. parva, Lob. Lugd.

*Cicutaria secunda*, Cæs.  
*Myrrhis fativa minor*, Cam.  
*Myrrhis montana*, Tab.

III. *Myrrhis sylv. feminibus lævibus*.  
*Myrrhis*, Fuch. Dod. gal. Tur. Lugd. sylv. Cam.  
*Cicutaria*, Gef. hor. Lon.

IV. *Myrrhis sylv. feminibus asperis*.  
*Myrrhis sylv. nova* Æquicolorum, Col.

V. *Myrrhis Broccenbergensis*, Thal. quid?

## CICUTA ET CICUTARIA.

**K**ύττα Theoph. 1. hist. 8. c. 6. ejusd. 2. Diosc. l. 4. c. 79. Etymologicus ita nominatum tradit, ἀπὸ τὸν γινόμενον εἰλιγμὸν, ἢ σφόδρον τοῖς πίνεσι. Quare Gal. lib. quod animi mores 3. quod cicuta epota stultitiam pariat, νένεον dicta, desumpto nomine ab eo affectu, quia corpus ipsum torquetur. Plin. l. 25. c. 13. *Cicuta*, cujus caulem viridem à plerumq; ediscribit: verum qui sapiunt, ab hujus esu, Socrateo exemplo moniti, abstineant.

I. *Cicuta major*.  
*Cicuta*, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. Tur. Lac. Ad. Lob. Lon. Cast. Lugd. Cæs. Tab. Ger.  
*Cicuta major*, Cord. hist. Cam. vera, Gef. h. Thal.

*Cicutaria vulgaris*, Clus. hist.  
 Variat folijs aliquando latioribus, aliquando tenuioribus.

II. *Cicuta minor petroselino similis*.

Petro-

Petrofelini vitium, Trag.

Cicuta minor, Cord. hist. Cam.

Apijcomes vitium, Gef. hort.

Dauci inutilis genus, Gef. col.

Sifon, Lon.

Apium cicutarium, Thal.

Cicutaria fatua, Ad. (quæ minus fœtida) Lob.

Petroselinum caninum, Tab.

III. Cicutaria latifolia fœtida.

Sefeli Peloponenſe, Matth. Gef. hor. Lac. Caſt. Lon. Lugd.

Cicutaria latifolia fœtidiffima, Lob. Lugd.

Cicutaria, ſive Cicutaria Myrrhis, Thal.

Cicutaria, Caſt. ico. fœtida, Tab.

Cicuta latifolia fœtidiffima, Ger.

IV. Cicutaria latifolia tertia.

Cicutaria maxima Brancionis, Lob.

V. Cicutaria paluſtris latifolia alba.

Cicutaria alba, Lugd.

Cicutaria paluſtris fl. candido, Cam.  
an Meum Sileſianum, Ejusd.

VI. Cicutaria paluſtris latifolia rubra.

Cicutaria rubra, Lugd.

Cicutaria paluſtris fl. purpureo, Cam.

VII. Cicutaria paluſtris tenuifolia.

Ligifticum ſylv. Trag.

Fœniculum ſylv. Eid.

Cicuta paluſtris, Cord. in Dioſcorid. aquatica,  
Gef. hort. Thal.

Cicutaria paluſtris, Lob. Tab. Ger.

Cicutaria paluſtris alia, Cam.

Phellandrium, Dod. Lugd.

Silaus Plinij, Cæſ.

Phellandrium eſt Plin. l. 28. c. 12. alijs Silaum l. 27.

VIII. Cicutaria bulbosa. (c. 8.)

Cicutaria pannonica, Cluſ. pan. & hiſt.

Bulbocastanum coniophyllum, Cam.

Myrrhis cicutaria, Tab.

## S E S E L I.

Σ Εἰς Dioſcor. l. 3. c. 60. quatuor generum, καὶ ἀλλοτρίων, folijs fœniculi: αἰθιοπικόν, folijs hederæ: πελοποννησιακόν, folijs cicuta latioribus: κρητικόν ſive τordύλιον: Plin. l. 8. c. 32. ex Ariſtoteleſi l. 9. hiſt. Cervas ante partum, purgari herba quadam qua Sefelis dicitur, ſcribit: & l. 25. c. 8. Sefeli cervæ enixa à partu monſtrare: & l. 20. c. 22. Tordylion, eſt ſemen ex Sefeli.

I. Sefeli montanum Cicutæ folio glabrum: Tordylum majus alt. luteum λεῖον κρητικόν, Col.  
an Peloponneſiacum Dioſc.

Ligifticum alterum Belgarum, Lob. Lugd.

Ligifticum 2. herbariorum, Tab.

Sefeli mont. 1. vel alpinum, Cluſ. pan. & hiſt.

Latoribus folijs ex horto Cl. Contareni habemus.

II. Sefeli mont. Cicutæ folio ſubhirfutum: quod in Prodromo deſcriptum eſt.

III. Sefeli Creticum majus.

Tordilium ſive Sefeli Cretic. majus, Lob. Lugd.

Pimpinellæ Romanæ alterum genus ſyl. Cæſ.

Sefeli Creticum majus, Cam. 2. Tab.

IV. Sefeli Creticum minus.

Ordilium Nicandri & Tordylion Dioſc. Ang.

Sefeli Cretici ſpecies, Eid.

Caucalis, Bellonio, Gef. hor. Belli ep. 1. ad Cluſ.

Tordylion & Gordilium, Dod. gal. Gefn. hort. Lugdun.

Sefeli Creticum, Lac. Ad. Lob. Dod. Caſt. Tabern. Ger.

Sefeli Creticum minus, Cam.

Pimpinella Romana vulgo, Cæſ.

Tordilium Creticum, Eyſt.

V. Sefeli Creticum fructu majore.

VI. Sefeli Creticum minimum.

Tordylum minimum Apulum, Col.

VII. Sefeli Æthiopicum ſalicis folio.

Sefeli Æthiopicum alterum, Matth. Gef. hort.

Sefeli Æthiopicum, Ang. Ad. Lob. Caſt. Tab. verum, Lugd. Cam.

Sefeli Æthiopicum frutex, Dod. Ger.

Herba quæ pro Sefeli Æthiopico oſtenditur, Cæſalp.

VIII. Sefeli Maſſilienſe ferulæ folio.

Sefeli Maſſilienſe ferulæ aut Dauci Cretici facie, Lob. ob.

Sefeli Maſſilienſe, Matth. Lac. Gefn. hort. Lon.

Caſt. Lugd. Tab. nuperorum, Lob. ico.

Siler montanum Officin. Ger.

IX. Sefeli Maſſilienſe fœniculi folio, quod Dioſcoridis cenſetur.

Sefeli Maſſil. Ang. Dod. Lugd. Cæſ. Sefeli Maſſilienſe fortè, Cluſ. hiſp. nonnullorum. Cam.

Sefeli Maſſilienſe folio fœniculi craſſiore, Ad. Lobel.

Sefeli Maſſilienſe Dioſcoridis, Cluſ. hiſt.

Fœniculum tortuoſum, Lugd.

Fœniculum petræum, Tab.

Variat in foliorum crassitie, tenuitate, longitudine, breuitate & diuifura: in omnib. tamen glauca sunt. Aliàs nomine Seseleos Mass. habemus, de quib. cum adhuc dubitemus, ut & alijs umbelliferis, de ijs in Theatro, si Deus voler.

X. Sefeli montanum fœniculi folio. Sefeli mont. 3. vel mont. angustifol. Clus. pan. & hist. qui vult à Libanotide Diosc. altera fructifera, non multùm differre.

XI. Sefeli palustre lactescens. Sefeli palustre, Cam.

XII. Sefeli pratense, Silaus fortè Plinio lib. 26. cap. 8.

Ligusticum Matthioli censet, Gef. hor. Pastinaca pratensis Theoph. Cord. in Diosc. Pastinaca nigra sylv. Cord. hist. Sefeli prat. Monspeliens. Ad. Lob. Lugd. Cam. Siler alterum pratense, Dod. Hippomarathrum primum Tab. sub Fœniculo dulci, Ger. ico.

XIII. Sefeli prat. tenuif. siue Daucus pratensis tenuifolius: pro 2. in Prodr. descriptus.

## LIGUSTICUM.

**L**ιγυστινόν (Galeno λιβυστινόν) ut plurimum in Liguria nascitur, quare à λιβύη nomen traxit, in monte scil. Apennino dicto: incolis πανάκις dicitur. Diosc. l. 3. c. 85. Ligusticum sylvestre est, in Liguria sua montibus: panacem aliqui vocant. Plin. l. 19. c. 8. & l. 20. c. 15. Siler nunc appellant nomine à Sile deducto, quia pro Sefeli semine utuntur, at Veteres ipsum Sefeli, etiam Sili & Seli vocabant.

I. Ligusticum quod Sefeli Officinarum. Siler montan. Trag. Guil. Ad. Lob. Dod. Clus. h. Ligustic. Matr. Lac. Cast. Lugd. verum, Dod. gal. Gef. hor. Tab. sub Levistico vulgari, Ger. ico. Sefeli Mafsilioticum, Cord. in Diosc. Sefeli, vulgò Siler montanum, cum nullo Sefeli conueniens, Gef. hort.

Sefeli Italicum, Cast. Ser montanum, Sefeli peloponense, Cæs. Semine latiore & brevior variat.

II. Ligusticum folijs cicutæ. Siler Creticum, Cam.

III. Ligusticum siue Siler montanum angustifolium: in Prodr. descriptum.

## BULBOCASTANUM.

**B**υλβοκαστίον, cuius Trallianus l. 7. c. 2. meminit, à radicis figura bulbosa, & sapore castaneas exprimentis, nomen habet. Bάνιον Diosc. l. 4. c. 124. aliqui censent, cui & ανδοστριον, seq. cap. subjungit.

I. Bulbocastanum majus folio apij. Oenanthe prima, Matth. Cast. Lugd. Bunium, Dod. gal. Lac. Gef. hor. Apios, Tur. Bulbocastanum, Gef. hor. Dod. Cast. Tab. Ger. Bulbocastanum grandius, Lugd. Bulbocastanum mas Tralliani, Lugd.

Nucula terrestris Septentrionalium, Ad. Lob. Pancafeolus vulgo, Cæs.

II. Bulbocastanum minus. Ornithogali species, Lon. Bulbocastanum alterum, Cam.

Hoc ratione loci, folior. incisuris variat: quod ex Angl. ex Pyren. & monte Calcaris habemus.

## OENANTHE ET FILIPENDULA.

**O**νανθή Diosc. l. 3. c. 135. quasi flos vinosus, quòd odore & quadantenus colore, non sint viri dissimiles: vel potius, quod cum vite floreat: & ανανθων, a florum candore, quos producit: cuius radix magna, in multa rotunda capitula extuberans. Plinio l. 21. c. 23. Oenanthe radice magna numerosa, &c. Recentiorum Oenantes subjungamus, ut & Filipendulas, quæ cum Oenanthe viribus aliquantum conueniunt Filipendula, à numerosis illis & rotundis in radice capitibus, quæ velut ex filo quodam pendere videntur, nomen habet.

I. Oenanthe apij folio. Oenanthe secunda, Matth. Lugd. Oenanthe angustifolia, Lob. species, Lugd. Filipendula, Cast. ico. 2. vel tenuifolia, Tab. Filipendula angustifolia, Ger. Cyminum bulbosum Plinij, Col. (plicis.

II. Oenanthe pastinacæ syl. fol. semine atri-

Oenanthe species altera, Lugd.

III. Oenanthe chærephylli folijs.

Oenanthe tertia, Matth. Lugd.

Oenanthe cicutæ facie, Ad. Lob. Lugd.

Filipendulæ altera species, Gef. hor.

Filipendula 3. Oenanthe felinophyllos, Tab.

IV. Oenanthe aquatica.

Oenan-

Oenanthe 4. Matth. Lugd.  
 Oenanthe aquatica, Lob. aquat. repens, Cam.  
 Laver minus, Lon.  
 Bulbocastanum fœmina, Lugd.  
 Sifer palustre, Lugd.  
 Petroselinum sylv. vulgo, Cæs.  
 Filipendula aquatica vel palustris, Tab. Ger.  
 Juncus odoratus aquatilis, Dod.

Differentiæ ratione magnitudinis & parvitatatis, multæ reperiuntur: sic aliquando bulbulis carens, quemadmodum Dod. pingit, & Lobel. duas alias icones subjungit: sic apud Monspelienfes, capitulo est majore, per omnia hispidiore: apud nos minore, nec hispido.

V. Oenanthe hederæ folijs.  
 Oenanthe Myconi, Lugd.  
 VI. Oenanthe prolifera Apula.  
 Oenanthe Cretica, Ponæ in Bal. ital.

VII. Filipendula vulgaris, an Molon Plin. lib. 26. cap. 7.  
 Filipendula, Trag. Dod. Matth. Cord. hist. Ang. Gefn. hort. Lon. Thal. Cast. Lugd. Tab. (cui & Saxifraga rubra) Ger.  
 Oenanthe, Fuch. Lac. Cord. in Diosc. Lob.  
 Oenanthe vulgaris, Ad.  
 Filipendula vulgaris, Eyst.

VIII. Filipendula minor: in Prod. descripta.  
 IX. Filipendula montana fl. pediculariæ.  
 Filipendula mont. Dod. Tab. Ger.  
 Oenanthe sive Filip. alt. mont. Ad. Lob. Lugd.  
 Alektorolophos 1. vel alp. major, Clus. pan. & h.  
 Oenanthe alia Myconi, Lugd.  
 Crista quædam in alpinis, Cæs.  
 X. Filipendula montana altera.  
 Alektorolophos alpinus 2. Clus. pan. & hist.  
 Floribus est modò pallidis, modò purpureis.

### PEDICULARIS SEU FISTULARIA.

**P**edicularis, ab effectu nomen habet; si enim à pecoribus inter cetera pabula devorata fuerit, pediculorum ingentem copiam procreat. Α'λεκτοροφος seu Crista apud Plin. l. 27. c. 5. censetur, cui folia similia gallinaceæ cristæ tribuit. Imò ob florum congeriem, multiplicis & densæ Gallinaceæ cristæ modo fastigiatam, sic posteriores dici putant: aliqui Fistulariam nominant, quod ad fistulas & sinuosa ulcera utilis esse credatur.

I. Pedicularis alpina lutea.  
 Filipendula alpina, Lugd.  
 an Oenanthe, Cæs.  
 II. Pedicularis alpina filicis folio major.  
 Pedicularis major alpina, Lugd.  
 In hac varietas occurrit.  
 III. Pedicularis alpina filicis folio minor.  
 Alektorolophus alpin. minor, Clus. pan. & hist.  
 IV. Pedicularis alpina folio ceterach.  
 Herba folijs aspleno perfoliatis, Gefn. fra.  
 V. Pedicularis pratensis purpurea.  
 Pedicularia campestris prior, Trag.  
 Alektorolophus, Dod. gal. Thal.  
 Pedicularis, Lob. Cast. Tab. altera, Lon.  
 Fistularia, Dod.  
 Alektorolophi 3. genus, Clus. pan. & hist.  
 Crista galli altera, sive Phthirion, Lugd.

Ruta pedicularis, Tab.  
 Floris color vel purpur. vel carn. vel candid.  
 VI. Pedicularis prat. lutea, vel Crista galli.  
 Pedicularis campestris 2. Trag.  
 Alektorolophus, Ang.  
 Crista gallinacea, Dod. gal. Lugd. Clus. hist.  
 Crista galli, Lob. Dod. Thal. simplici caule, Cæs.  
 Pedicularia lutea, Tab.  
 Mimulus Plinij quibusdam: mimmuli herba in prato pessima l. 18. c. 28. quamvis alij Nummulum legant, Nummulariam dictam censentes.  
 Variat magnitudine & foliorum latitudine, caulium numero: floribus luteis, rarius candidis: semine nigro, aut subluteo.  
 VII. Crista galli umbellata.  
 VIII. Crista galli angustifolia montana: illa pro 1. hæc pro 2. in Prodromo descripta.

### B A R B A C A P R Æ.

**B**arba capræ, à florum figura, que barbam caprinam aliquo modo refert, nomen obtinuit: & prima Melandryon Plinij, l. 26. c. 7. censetur, cujus descriptio talis: Melandryon nascent in segete ac pratis flore albo, odorato. Altera ejusdem l. 24. c. 19. Rhodora: herba, inquit, quam Galli Rhodoram vocant, caulem habet virge siculneæ modo gemulatum, folia urtica, in medio exalbidæ, eadem procedente tempore tota rubentia, florem argenteum.

I. Barba capræ floribus oblongis.  
 Barbula capræ & barba caprina sylv. Trag.  
 Barba capri, Fuch. Dodon. gal. ico. capræ, Lugdun. Eystett.  
 Barba caprina, Gefn. hort. altera, Lon.  
 Potentilla 2. Ang.

Drymopogon 1. Tab.

II. Barba capræ floribus compactis.

Barbula caprina prior, Trag.

Barba capri, Dod. gal. desc.

Potentilla 1. Ang.

Medefusium (à Ger. Medisūß) Cord. hist.

Barba caprina 1. Lon.

Barbi capra, Ad. Lob.

Regina prati, Dod. Ger.

Ulmaria (à foliorum forma) Gefn. cat. Clus. pan. & hist. Lugd. Cam. Tab.

Argentilla major, Thal.



## SECTIO SEXTA.

### VALERIANA; NARDVS.

**V**aleriana Dioscoridi, l. 1. c. 10. φῶς ἡ βοῦς & ἡ γαίη, eo quòd radices cum quadam odoris gravitate Nardum emulenter: imò & viribus Nardo similes, Galeno & Aegineta auctoribus. Plinio, l. 12. c. 12. Nardum Creticum, aliqui agriam vocant, alij phu folio olusatris, &c. & l. 21. c. 20. Nardus quod Phu appellavimus. Officinis & herbaris Valeriana, à multis quibus valet facultatibus: quare & Theriacaria dicitur.

Genera duo, una descriptione Dioscorides proposuisse videtur: folia namque olusatris, majori Valeriana: folia Elaphobosci, media: radices prioris, floris color, media convenit.

I. Valeriana hortensis: Phu folio Olusatris Dioscorid.

Valeriana vera, seu Nardus agrestis, Trag.

Phu magnum, Fuch. Matth. Tur. Lac. Lon. Lug.

Phu majus, Matth. Cord. hist.

Phu verum, Cord. in Diosc. Fuch. hortense, Gefn. hort.

Phu ponticum, Tab.

Valeriana major, Ang. Ad. Lob. Cam. Eyf.

Valeriana optima, Cæf. horrensis, Dod. Ger.

Carpesium, Cast.

II. Valeriana folijs Calcitrapæ.

Valeriana annua seu æstiva, Clus. hist.

III. Valeriana peregrina purpurea albave.

Valeriana Indica, Clus. hist.

Valeriana peregrina ocimi folio, Col.

In Phytopinace, sub 4. in Prod. sub 6. & in Matth. figurâ additâ, descripsimus.

IV. Valeriana sylv. major.

Phu similitudine Elaphobosci, Dioscoridi.

Valeriana, Brunf. Gefn. hort. altera, Cæf.

Valeriana vulgaris, Trag. Cord. in Diosc. Lac.

Valeriana sylv. Ad. Lob. Dod. Cam. Eyf. prima, Clus. hist.

Valeriana major, Dod. gal. Lugd. Thal.

Phu Dioscoridis, Brunf. Colum. vulgare, Fuch. Tur. Tab.

Phu Germanicum, Fuch.

Phu majus commune, Gefn. hort.

Phu parvum, Matth. Lac. Cast.

Valeriana major, Tab. major sylv. Ger.

V. Valeriana sylv. major montana.

Valeriana 3. Trag.

Valeriana montana & 3. Tab.

VI. Valeriana palustris major: quæ 1. in Prod.

VII. Valeriana cærulea.

Phu græcum, Dod. gal. Lugdun. peregrinum, Gefn. hort.

Valeriana peregrina, Ad. Lob. Cam.

Valeriana græca, Dod. Tab. Ger.

Pseudovaleriana dici potest, nam præter foliorum similitudinem, nil cum Valeriana commune habet: flore est communiter cæruleo, aliquando albo.

Valeriana Græca fl. cæruleo &

Valeriana Græca fl. albo, Eyf.

VIII. Valeriana palustris minor.

Valeriana exigua vel 4. Trag.

Valeriana min. sive pal. Thal. Ger. minor, Ad.

Valeriana minor syl. Lob. Lugd. minima, Dod. sylv. sive palustris min. Cam.

Phu parvum, Dod. gal. minus, Gefn. hort. Lon. Tab. minimum, Matth. Cast. Lugd. Cam. ep.

IX. Valeriana palust. media parum lacinia- ta: quæ 2. in Prod.

X. Valeriana alpina prima: quæ pro 4. in Phytop. pro 3. in Prodr. describitur.

XI. Valeriana alpina altera.

Phu saxatile seu petræum, Gefn. hort.

Valeriana sylv. alpina 1. latifolia, Clus. hist.

XII. Valeriana alpina scrophulariæ folio: quæ 6. in Phytop. 4. in Prodr.



an Valeriana inodora 1. Cæs.

XIII. Valeriana montana subrotundo folio.

Valeriana montana, Lugd.

XIV. Valeriana montana inodora.

Valeriana inodora altera, Cæs.

Valeriana annua ex Ilva, Cam.

XV. Valeriana alpina Nardo celticæ similis.

Valeriana sylv. alpina 2. saxatilis, Clus. hist.

XVI. Valeriana alpina minor : quæ 5. in Prodr.

XVII. Valeriana rubra.

Polemonij altera species, Dod. gal. Gesn. hort.

Limonium Monspelienfium, Gesn. hort.

Ocymastrum Valerianthos, Ad. Lob.

Valeriana rubra, Dod. Tab. Cam. Ger. Eyft.

Valeriana inodora 3. Cæs.

Phu peregrinum, Cam. ep.

Sunt qui Narcissum Virgilij & Columellæ in hortis : alij Behen rubrum : alij Struthium : alij Condurdum Plinij, l. 26. c. 5. velint.

XVIII. Valeriana rubra angustifolia : quæ

7. in Prodr.

XIX. Valeriana campestris inodora major.

Bupleuron Hipp. apud Plin. l. & c. 22. videtur.

Locusta quibusdam, Gesn. hort.

Phu minimum alterum, Lob. Lugd.

Album olus, Dod.

Polypremon Cassiani : Chalceum Plinij, l. 26.

c. 7. à foliorum colore, Lugd.

Valeriana campestris, Cam.

Lactuca agnina, Tab. Ger.

Bupleuron, Cæs.

an Valerianella altera nudo umbilicato & brevi semine, Col.

Variat magnitudine, folijs angustioribus, latioribus & integris : quare figuræ duæ apud Tab. & Ger. reperiuntur, & abortiva, floris explicatione ab insectis prohibita.

XX. Valerianella echinata.

Valerianella cornucopoides echinata, Col.

XXI. Valerianella semine stel'ato.

Phu minus petræum, Tab.

Valeriana petræa, Ger.

Valerianella altera tenuifolia semine Sabiosæ stellato, Col.

XXII. Valeriana sylv. folijs tenuiss. divisis.

Phu minimum, Ad. Lob. Lugd.

## NARDUS MONTANA ET CELTICA.

**N**ardus montana, *ναρδος ὀρεῖν & θηλαίτης*, Diosc. l. 1. c. 7. at Celtica, quæ Spica Celtica, vel Romana Officinis, Eid. cap. 8. *ναρδος ὀρεῖν, ἡ ἀλίσγη* five Saliunca, & l. 6. c. 19. *ορεῖν* dicitur. Saliunca Plinio l. 21. c. 7. & 20. & Nardus Gallica, l. & c. 12. & l. 21. c. 20.

I. Nardus montana radice olivari.

Nardus montana, Matth. Ang. Ad. Lob. Lugd.

Clus. hist. Cæs. Cam. Tab.

Radices binas, ternas & quaternas asphodeli modo, habet.

II. Nardus montana radice oblonga.

Nardus mont. longius radicata, Cam. ep.

III. Nardus Cretica filipendulæ radice.

Nardus Cretica Valerianæ simillima, Hon. Belli ep. 4.

Nardus Cretica Belli, Pon.

IV. Nardus Celtica Dioscoridis.

Nardus Celtica, Matth. Cord. hist. Gesn. hort.

Tur. Guil. (cui & Saliunca) Ad. Lac. Lob. Cast.

Cam. Tab. Ger.

Nardus alpina feu celtica, Clus. pan. & hist.

Nardum gallicum, Cæs.

Spica Celtica, Lugd.

V. Nardus Celtica altera.

Spica celtica, fastigiato flosculorum ordine, Cam. ep.

Spica celtica, Tab.

Nardus celtica repens, Ger.

VI. Nardus ex Apulia.

Saliunca Neapolitana, Lugd.

Phu minus Apulum, Tab.

VII. Nardo celticæ similis inodora : in Prodromo descripta.

VIII. Nardo Celticæ similis hirculus.

Hirculus, Ad. Lob. Cam. ep. Cæs. Tab. Ger.

Hirculus veterum, Clus. in Gar. Lugd.

Hirculus & Nardus Samphoritica, Ang.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER QUINTVS.

## SECTIO PRIMÆ.

SOLANVM; MANDRAGORA; HYOSCYAMVS; NICOTIANA; PAPAVER; HYPECOON; ARGEMONE.

### SOLANUM.

*Solanum*, ὑπόχρον Graci vocant, quod vitem, vel acinum, aut tale quid signat. Theoph. 19. hist. 12. 14. & 21. duo genera habet, ubi Gaſa Veficariam reddidit: ad Dioſc. l. 4. c. 71. genera 4. recenſuit: 1. ὑπόχρον ὑπὸ πᾶσι, *Solanum hortense*: 2. ἑλκιδάβον ἢ φουαδιδά, *halicacabum*, aut *Veficarium*: 3. ὕπνωτον, *somniferum*: 4. μανικὸν *manicum*. Plin. l. 27. c. 13. *Solanum*, inquit, Graci *Strychnon* vocant: & l. 21. c. 31. *Strychni* genera 4. enumerat.

#### *Solanum bacciferum.*

##### I. *Solanum Officinarum.*

*Solanum*, Brunf. vulgare, Trag. minus, Cæſ.  
So'anum, Lon. hort. Matth. Fuch. Ang. Dod.  
Gefn. hort. Lob. Lugd. Cam. Ger. fativum, Tab.  
*Solanum nigrum*, Cord. in Dioſc. & hiſt. quod  
edendo eſt.

*Cuculus* & *Cacubalum* Plinij, Ang.

*Solanum hort.* Circeæ aut Phaeoli folio, Ad.

Variat folijs magis laciniatis, ut Fuch. figura:  
alia *halicacabi*, ut Lob. exprimit: acinis nigri-  
cantibus & fufcis: puniceis, quod *Solanum*  
puniceum Cord. hiſt. rubris, luteis, quod *Sola-*  
*num luteum* Gefn. hort. Sic in arenofis Michel-  
feldæ vix palmam excedens, reperitur.

II. *Solanum veficarium*, quod folliculi ve-  
ficæ inflatæ ſimiles: vel ut Plin. l. 21. c. 31. quo-  
niam veſicæ & calculis proſit.

*Saxifraga rubra* & 4. Brunf.

*Solan. halicac.* Trag. Matth. Lac. Ad. Lob. Lugd.

*Halicacabum*, Ang. Caſt. vulg. Fuch. Tur. Eyſt.

*Halicacabum*, *veſicarium*, Cam.

*Veficaria*, Cord. in Dioſc. Gefn. hort. Cæſ.

*Veficaria vulgaris*, Dod. gal. prima, Caſt.

*Solanum veficarium*, Gefn. hort. Dod.

*Halicacab.* ſive *veſicaria*, Cord. hiſt. Gefn. hort.  
Alkekengi, Lon.

##### III. *Solanum veficarium Indicum.*

*Halicacabum* ſive *Solanum Indic.* Cam. Eyſt.

##### IV. *Solanum μελανοκέραιον.*

*Solanum hortense nigrum*, Trag.

*Mandragora*, Theoph. Dod. gal. Ang. Guil. mo-  
rion, Fuch. ico. Lon. tertia ſpecies, Cord. in Dioſc.

*Solanum majus*, Matth. Caſt. Cæſ. Cam.

*Solanum ſomniferum*, Fuch. Tur. Ad. Lob. Lug.

*Solanum lethale*, Dod. Cluſ. hiſt.

*Solanum ſylvar.* Gef. hor. ſyl. ſive lethale, Thal.

*Belladonna*, Cluſ. pan.

Duum eſt generum: 1. folijs amplioribus &  
flore majore: 2. folijs & floribus minoribus.

##### V. *Solanum ſomniferum bacciferum.*

*Solan. ſomnifer.* alt. Matth. Gef. hor. Lug. Cam.

*Solani lethalis* aliud genus, Dod.

*Solanum ſomniferum*, Lon.

*Solanum de Hiericho*, Caſt.

##### VI. an *Solanum manicum* ex Guinea.

Fruſtus minor 8. Paludani, Cluſ. ex l. 2. c. 20.

##### VII. *Solanum ſomniferum verticillatum.*

*Solan. ſomnifer.* Matth. Guil. Gef. hor. Lac. Cl.

hiſp. & hiſt. Dod. Ad. Lob. Caſt. Lugd. Cæſ. Cam.

Acini in folliculis hirsutis, per maturitatem  
nunc rubri, nunc ex rubro crocei ſunt.

VIII. Herba à militib. ad civitatem Philippi  
evulſa & guſtata, eos prope ad furorem & inſa-  
niam redegit, qui tamen affectus paulo poſt mi-  
rior redditus: par 9. Ind. occid. addit. quid eſt?

##### IX. *Solanum fruticosum bacciferum.*

*Strychnodendron*, Gefn. hort. Ad. Lob. ob. Eyſt.

*Amonum*, Gefn. hort. Lob. ico. Plinij, Ger.

*Solanum arboreſcens*, Caſt. Cæſ. Cam.

*Solanum fruticosum*, Gefn. hort. Tab.

*Solanum Americanum*, Lugd.

Pseudocapsicum, Dod.

X. Solanum quadrifolium bacciferum.

Aster sed non Articus, Trag.

Herba paris, Matth. Ang. Dod. Cast. Cæs. Lugd. Thal. Ger.

Paris herba, Lon. Cam.

Aconium Pardalianches, Fuch. Tur.

Aconitum sive Pardalianches monococcon, Cord. in Diosc. & hist.

Solanum tetraphyllum, Gef. hor. Ad. Lob.

Aconitum salutariferum, Tab.

Folia habet communiter quatuor, aliquando tria, quinque, & sex.

XI. Solanum triphyllum Brasilianum: 3. loco in Prodromo describitur.

XII. Solanum scandens seu Dulcamara.

Dulcis amara, Trag. Dulcamara, Dod. Lugd.

Amarum dulce, Cord. in Diosc.

Amara dulcis, Gef. hor. Ang. Lob. ic. Lon. Tab.

Viris sylv. Matth. Lac. Cast. Cam. (Ger.

Solanum γλυκύπικρον, Thal.

Salicastrum Plinij, Guil. the. Cæs.

Circæa Monspeliensium, Ad. Lob. ob. Cam.

Videtur quibusdam ἀμπελος ἀρχία Diosc. l. 4. c. 183.

sed muscosum florem suæ Viti tribuit. Salicastrum Plinij lib. 22. c. 1. Alijs Cyclaminus altera Diosc. & Melotron Theophrasti.

Floris color communiter cæruleus, rarius albus est.

Dulcis amara flore pleno, &

Dulcis amara flore cæruleo vulgatio, Eyst.

XIII. Solanum tuberosum esculentum, sub 19

in Philop. sub 1. in Prod. & Matth. descriptum.

Piconomus Dioscoridis, Cortuso.

Papas radix ex qua edulium Chunno dictum conficitur: Joseph. Acofta l. 4. c. 17. imò panis locoutuntur, quem Chunno vocant: Eid. l. 3. c. 20.

an Pape radices genus tuberum specie, sed exiguï saporis: part. 6. Ind. Occid. c. 20.

Arachidna Theoph. Papas Peruvian. Clus. hist.

Papas Peruanorum, Eyst.

Hujus aliud genus in calidioribus fundis, ex quo fercula Locro appellata parant: Joseph. Acofta l. 4. c. 17.

XIV. Solanum racemosum cerasorum forma: pro 2. in Prod. descriptum.

Solanum pomiferum.

I. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.

Lycopersicon Galeni, Ang.

Poma amoris, Dodon. gal. Ad. Lobel. Cam. ep. Tab. Ger.

Pomum amoris, Lugd. Cam.

Malum & pomum aureum, Gef. hor.

Aurea mala, Dod. Cast.

Solani pomiferi genus aliud, Gef. hor.

Tumatle Americanorum, Guil. pap.

Mala insana, Cæs.

Aliqui ad Solan. furiosum referunt: alijs Glaucium Dioscorid. est. Vide de Lycopersico, Dod.

Fructus communiter lutei, auricolores, aliquando pulchre rubentes: rarius albi: est & suriectis cubitalib. cauliculis, quod per omnia minus est.

Poma amoris fructu luteo, &

Poma amoris fructu rubro, & Mala Peruv. Eyst.

II. Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro.

Solanum pomiferum, Lob. Lug. Tab. Ger. Eyst.

Mala Æthiopica, Dod. Lugd. Ger.

Capsicum rotundum Dalechampij, Lugd.

Folia magis minusve sinuosa: in caule aliquando ut & in folijs, modo infernè, modo superne, parvi aculei.

III. Solanum peregrinum fructu rutundo.

Hyoscyamus peregrinus Dalechampij, Lugd.

I. Solanum pomiferum fructu oblongo.

Mala insana, Trag. Fuc. Dod. Lac. Lon. Tab. Ger.

Malum insanum, Gef. hor.

Melongena, Matth. Cord. hist. Ad. Lobel. Cast.

Lugd. Cam. & Verengena Toletanorum.

Solanum hortense & Pyra insana, Cæs.

Melanzana fructu pallido, Eyst.

Videtur Strychnon hort. Dioscoridis, urbanum Theophr. Esculentum Galeni, & terrium

genus Plinij.

Variat flore purpureo, albo: fructu, albo, purpureo, luteo: figura quandoque oblonga, aliquando instar mali rotunda.

V. Solanum pomiferum fructu incurvo.

Melantzana, Arabum Melongena & Bedengian, Rauvv. Lugd.

Variat colore fructus, qui flavus, cinereus, & purpureus.

Solanum pomiferum fructu spinoso.

I. Solanum pomiferum fructu nigro spinoso

Melantzana nigra, Bathschain, Æthiopica,

Rauvv. Lugd.

Fructu est longo, rotundo: atro, subnigro.

II. Solanum spinosum fructu rotundo.

Pomum

Pomum Hiericonicum, Imper.

III. Solanum pomiferum folio rotundo tenui.  
Cachos Indorum Monardi, Lugd.

IV. Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore.

Stramonía sive pomum spinosum, Trag.

Nux metella, Matth. Cast. Acoft. Cam.

Nux methel Avicennæ, Ang. Fuch. Gef. hor.

Hyofcyamus Peruvianus, Cord. hist.

Tatula Turcarum, Guiland. pap.

Paracoccalon sive barycoccalon, Græcis recentior. Melospinus Veneris: Malus Peruviana

Callis: corona regia quibusdam: Solanum Romanum Monspel. Guiland. l. c.

Stramonía, Fuch. Dod. Gef. hor. Lac. Lugd. Dodon. Cam. Eyft.

Stramonium peregrinum, Ad. (an Solanum manicum) Lob. Ger.

Hippomanes Cratevæ, Ang. Gef. hort.

Solani pomiferi genus 3. Gef. hor.

Solanum spinosum, Tab.

Solani pomiferi genus 3. Cæf.

Malum spinosum, Cæf.

V. Solanum fœtidum pomo spinoso oblongo. an Manicum Diosc. ex hoc Muslac fieri ajunt.

Tatoula, quæ Nux methel Arabum: Græcis, Solanum somniferum, Bellon.

Datura, Garziæ, Acoft. Cast. Lugd. prima, Cast.

Nuci metellæ congener, Cam. ep. Tatula, Ei. hor.

Solanum manicum, Col.

Stramonium spinosum, Ger.

Datura Turcarum, Eyft.

Dutroa, Linsc. part. 2. Ind. Or. c. 33. part. 3. c. 1. & part. 4. c. 17.

Dutroa, Hispanis, Burlatoria: Arabibus: Marana: Persis & Turcis, Datula, Palud. in. Linsc.

Variat floris colore: est vulgari flos albus magnus: alterius flavus: tertij, Hyofciam floribus accedit: quare tres Daturæ, Costæo: nunc & purpureo habetur.

IV. Solanum fœtidum pomo spinoso rotundo semine pallido.

Datura Ægyptiaca flore pleno, Pon. Ital.

Stramonía Ægyptiaca flore gemino altero alteri innato, C Bauhini, du Bry.

Communiter duo flores alteri innascuntur.

VII. Solanum Ægyptiacum flore pleno.

Stramonía Ægyptiaca flore pleno extrinsecus purpurascens, intrinsecus albicante C. Bauhini, du Bry.

*Solanifolia.*

I. Solanifolia Circæa dicta major.

Lappa sylv. Trag.

Ocimastrum verrucarium, Gef. hort.

Circæa Luteriana, Lob. Dalech. Lugd. Ger.

Helxine sylvestris, sive fluviatilis, Thal.

Herba D. Stephani, Tab.

Circæa, Eyfset.

II. Solanifolia Circæa alpina.

Circæa minima, Col.

III. Solanum Mexiocanum flore magno.

Magnæ admirationis herba Peruviana, Lobel. Castor.

Marabillas, del Peru & Hachal Indi, Clus. pan.

Admirabilis Peruviana, Eid. hist.

Gelsemium rubrum & Mandragora Theoph. Cæsalp.

Gelsemium sive Jasminum Indicum, Cam.

Jasminum rubrum Dalechampij, Lugd.

Viola Peruviana, Tab.

Mirabilia Peruviana, Ger.

Jasminum Indicum seu flos mirabilis Peruanus, Eyfset.

Jasminum Indicum flore rubro & variegato, Eidem.

Flores purpurei seu Kermesini coloris, latericei, flavi aut pallentes, obsoletè rubentes, exalbidii, binis coloribus ex purpureo & luteo mixtis: sic ex rubro, luteo, albo, in uno flore magna varietas: nonnunquam albo & purpureo simul dimidiatim in eodem flore tingitur: sive inæqualibus vel latis, vel minutis maculis purpureis tam punctatim, quàm virgatim album colorem intercurrentibus, quandoq; radijs flavis per longitudinem flores distinguuntibus.

IV. Solanum Mexiocanum flore parvo: sub Solano 4. in Prodomo describitur.

V. Solanum Indicum hirsutum corymbiferum.

Solani Indici genus, Clus. exot. l. 4.

## M A N D R A G O R A.

**M**ανδραγόρας, ἢ αὐτίμανλον, ἢ κερμαίν Dioscor. l. 4. c. 76. Mandragora, quod ad mandras pecorum, aliasq; spéluncas proveniat. Circæa, nomine à Circe deducto, quoniam radix ad amatoria conducere videatur.

Genera

*Genera Diosc. nigra fœmina, quæ βειδανίας, & candida mas, νόειον vocitata: tertium νόειον, quod mari quidem simile, sed omnibus partibus minus est. Plinio l. 29. c. 13. Mandragora alia candida mas, alia nigra fœmina. At Theophr. 6. hist. 2: 9. hist. 9. & 6. caus. 4. Mandragora, à prædictis diversa est.*

## I. Mandragora fructu rotundo.

Mandragora mas, Trag. Fuch. Matth. Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Lugd. Cam. masculus, Tur.

Mandragora, Ang. Mandragoras, Gef. hor. Cæs. Mandragoras albus seu masculus, Cord. hist. Mandragora mas vel alba, Cam.

## II. Mandragora fructu pyri.

Mandragoras fœmina, Trag. Matth. Cordo in Diosc. Lac. Ad. Lob. Dod. Lugd. Cæs. Cam.

Mandragor. niger seu fœmina, Cord. hist. Cam.

III. Mandrag. flore subcæruleo purpurascente. Mandragora fœmina, Clu. hisp. & hist. Cast. Eyst. Mandragora, Lon. altera, Cæs.

## H Y O S C Y A M U S.

**Y** *ὄσυμα & Dioscorid. lib. 4. cap. 69. id est, faba suilla, vel porcina, quod apri ejus pastu resolvantur & convellantur, præsentis mortis periculo, nisi aqua copiosa, statim se foris & intus polluerent, ut Aelianus prodidit. Dioscorides differentias tres proposuit: unam semine nigro, floribus penè purpureis: alteram semine subflavo, floribus luteis: tertiam mirissimam, candidi floris & seminis. At Plin. lib. 25. c. 4. Apollinaris genera plura sunt: unum semine nigro: alterum candidius: tertium Irionis semini simile: quartum candidi seminis in maritimis: item rufi seminis.*

## I. Hyoscyamus vulgaris vel niger.

Hyoscyamus, Brunf. Tur. Matth. Lac. Lug. Cæs. Hyoscyamus vulgaris, Gef. hort. Thal. Eyst.

Hyoscyam. 1. Ang. Tab. secundus Galeni, Trag.

Hyoscyam. niger, Dod. Lon. Ad. Lob. Cast. Ger.

Hyoscyamus flavus, Fuch. niger vulg. Clu. hist. Apollinaris, Cord. in Diosc.

Folia integra, dissecta, in lacinias acutas divisa.

II. Hyoscyamus albus major, vel 3. Dioscor. & 4. Plinij.

Hyoscyamus candidus, Trag.

Hyoscyamus albus, Matth. Dod. Gef. hort. Tur. Lac. Ad. Lob. Lon. Cast. Lugd. Cam. Ger. Eyst. secundus, Tab.

Hyoscyami alterum genus in maritimis, Cæs. Apollinaris 3. Cord. in Diosc.

## III. Hyoscyamus albus minor.

Hyoscyamus alter, Ang.

Hyoscyamus albus minor, Lob. ico. alb. vulgaris, Clu. hist.

IV. Hyoscyamus Creticus luteus minor.

Hyoscyamus 4. vel albus Creticus, Clu. hist.

V. Hyoscyamus Cretic. lut. major: hic sub 5. in Phytopinace, in Prod. etiam & Matthiolo descriptus & pictus.

Hyoscyamus Creticus alter, Clu. hist.

VI. Hyoscamus rubello flore.

Hyoscyamus peregrin. rubello flore, Clu. pan. Hyoscyamus Syriacus, Cam.

Alterum Camerarius addit, Hyoscyami peculiaris nomine, qui sola foliorum latitudine à prædicto differt.

VII. Hyoscyamus cauliculis spinosissimis. Ægyptiacus.

Hyoscyamus Ægyptiacus, Clu. hist.

## N I C O T I A N A.

**N** *icotiana à Jo. Nicotio Regis Gallia consiliario dicta, cujus opera, Anno 1560. Gallijs innotuit, quam Ulysipona, dum legati munereungeretur, à Belga è Florida Insula allatam, accepit.*

## I. Nicotiana major latifolia.

Hyoscyami tertia species, Gef. hor.

Sana Sancta Indorum, Ad. Lob. Ger.

Tabacum (ab ejus nominis Insula) Monar. Fra.

Tabacum latifolium, Cam. Eyst.

Perum, Theu. latifolium, Clu. ad Monar.

Hyoscyamus Peruvianus, Dod. Cam. ep.

Nicotiana, Lon. Lugd. major, Tab.

Perebecenuc, Oviedo, Lugd.

Tornabona, qui à Tornabonio missa, Cæs.

Herba S. Crucis fœmina, Cast.

Tubac & Tubacka: par. 5. Ind. Or. & par. 6. & 8.

Tabacum, Tabaco & Tabacca: par. 8. & 9. Ind. Occid.

Uppónvoc, Virgineæ indigenis: desc. Virgin.  
 Petum Brasiliensis, Stadio, l. 2. c. 13.  
 Arbutum cujus folia exsiccant & accensorum  
 fumo inebriantur, Benzoni, l. 1. c. 26.  
 Lerijs afferit Nicotianum licet apud nos Pe-  
 tum nominetur, attamen verum Petum Bra-  
 siliensium non esse, seque ne quidem in hortis  
 Galliæ vidisse, & apud nos ob cœli inclemen-  
 tiam ægrè adolescere posse credat.

Ex hujus herbæ fumo, octo aut novem die-  
 rum famem tollerare posse, in par. 3. Amer. ep. 1.  
 scribitur: at Lerijs per triduum aut quadriduum.

II. Nicotiana major angustifolia: & Eyst.  
 Herba Sancta sive Tabacum minus, Lob. ob.  
 Tabacum sive herba Sancta minor, Lob. ico.  
 Petum angustifolium, Clus. ad Monar.  
 Hyoscyamus Peruvianus alter, Dod.  
 Herba Sanctæ Crucis mas, Cast.  
 Tabacum angustif. Cam. alterum minus, Lugd.

III. Nicotiana minor: & Eyst.  
 Hyoscyamus niger vel 3. Matth. Cast. Lugd.

Hyoscyamus luteus, Dod. Ges. hort. Lon. Cam.  
 Ger. multum cum 2. Diosc. convenit, Ang.  
 Hyoscyamus dubius luteolus Solanifolius, Ad.  
 Lobel.

Hyoscyamus Peruvianus, Tab.  
 Priapeja, à forma fructus, Ges. hor.  
 Petum quartum, Clus. ad Monar.

Tornabonæ congener, Cæs.  
 Nicotiana minor seu Hyoscyamus luteus, Eyst.

IV. Nicotiana minima.  
 Tabacum sive sana Sancta minima, Lob. Lugd.  
 Tabacum minimum, Cam.  
 Petum tertium, Clus. ad Monar.

V. An Nicotianæ species in Insula Mambo-  
 nit, pyratæ herbam quandam comedunt, quâ  
 inebriari & dementari, omnia pericula post-  
 ponunt: par. 7. Ind. Or. 20.

VI. Cassina herba è cujus succo portionem  
 conficiunt in Florida, quam bibunt ubi in lo-  
 cum periculosum se conferunt, quo famem & si-  
 tim per horas 24. tollunt: part. 2. Amer. navig. 4.

## P A P A V E R.

**M**ήνων ἀ μὴ νορεῖν, non ministrando, quod vescentes suis munijis fungi non possint. Latinis Papaver,  
 Dioscorid. lib. 4. cap. 64. 65. & 66. quinque genera proposuit: I. Μήνων ποῖος, papaver erraticum, à  
 flore protinus deciduo, qui puniceus, interdum albus. II. Μήνων ἡμερῶ papaver sativum, quod semine can-  
 dido, quod θαλασσίτις. III. Sylvestre duplex, unum nigro semine, quod πῖβις & quibusdam ποῖος, quod è  
 scapo succus lacteus emanet: alterum majus sylvestre & ad medicinas valentius. IV. Μήνων νεφελίτις, οἱ δὲ  
 παρὰ λίον papaver corniculatum, à calyculo in corniculorum modum inflexo, aut marinum. V. Μήνων ἀφρώ-  
 δης papaver spumeum, quia herbula tota est spumosa, quibusdam ἡράκλειον Heracleum. Theophrastus sativi  
 1. hist. 15. & 9. hist. 8. meminit: Sylvestris verò genera 9. hist. 13. plura notavit: ut corniculatum: nigrum: er-  
 raticum flore ruffo: Herculanum folio Struthij. Plinius l. 20. c. 18. sativum album & nigrum proposuit, & ex  
 hujus scapo inciso, opium colligi monet: at cap. 19. inter sativa & sylvestria medium genus, Rheas sive errati-  
 cum constituit. Sylvestrium unum genus Ceratitis, quod aliqui glaucion, alij paralion vocant: alterum est  
 heracleon, ab alijs aphron: tertium genus est rithymalon, mecona vocant, alij paralion.

I. Papaver hortense semine albo: sativum  
 Diosc. album, Plinio.

Papaver, Brunf. Ang. Lon.

Papaver sativum, Matth. Dod. gal. Lugd. Tab.

Papaver sativum purpureum, Tur.

Papaver album, Trag. Dod. candidum, Ad. Cæs.

Papaver album sativum, Gesn. hort. Lob. Cast.  
 Gerard.

Papaver sativum semine candido, Fuch.

Flos candidus, vel leviter purpureus: ali-  
 quando flore est cinereo, ungue purpureo: vel  
 candido, rubris maculis infecto & semine fla-  
 vo; & hoc

Papaver tertium & luteum est, Trago.

II. Papaver hort. nigro semine: sylv. Dio-  
 scoridi: nigrum, Plinio.

Papaver nigrum, Brunf. Cast. minus, Ges. hort.

Papaver sativum alterum vulgo nigrum, Cord.  
 in Dioscor.

Papaver sativum semine atro, Fuch.

Papaver nigrum sativ. Dod. flore malvæ hor-  
 tensis aut Pæoniæ, Ad. Lob. Lugd.

III. Papaver vulgare cujus capitula forami-  
 nibus hiant, semine incano, ἀργυρίτερον, Dio-  
 scoridi.

Papaver vulgare & 1. Trag.

Papaver tertium, Dod. descr.

Papaver patulum, Ad.

*Papaver spontaneum* sylv. Lob.

IV. *Papaver flore rubro femine fusco.*

*Papaver rubrum*, Trag. Gesn. hort.

*Papaver sylv.* Dod. gal. Lugd.

*Papaver nigrum*, vel 2. Dod.

V. *Papaver cristatum floribus & femine album.*

*Papaver candidum alterum*, vel 6. Trag.

*Papaveris fat. species folijs dissectis*, Dod. gal.

*Papaveris albi altera species florum folijs crenatis*, Gesn. hort.

*Papaver Memphiticum*, floribus multifidis, Gesn. ap.

*Papaver sativum* 4. Dod.

*Papaver fimbriatum aut cristatum album*, Ad. Lob. Lugd.

*Papaver flore fimbriato*, Cæs. flore nivco, Tab.

*Papaver sativum nigrum*, Ger.

VI. *Papaver cristatum floribus rubris, femine nigro.*

*Papaver rubrum alterum*, vel 7. Trag.

*Papaveris rubri species folijs florum crenatis*, Gesn. hort.

*Papaver sativum nigrum cristatum*, Ad.

*Papaver fimbriatum aut cristatum nigrum*, Lob.

*Papaver* 2. folijs dissectis, Dod.

*Papaver sativum rubrum fimbriatum*, Lugd.

Hæ duæ species floris colore variant, subinde albus, frequenter rubeus, quandoque ex utroque mistus: & qui rubet, aliquando colore purpuræ, aliquando dilutius rubet: hinc *Papaver flore pleno rubeum.*

*Papaver flore multiplici incarnato.*

*Papaver flore multiplici purpurascente.*

*Papaver flore miniato pleno.*

*Papaver flore pleno argentei coloris.*

*Papaver multiplex album oris rubicundis*, ex hort. Eyf.

VII. *Papaver pleno flore album.*

*Papaver flore multiplici*, Gesn. hort. Cam. ep.

*Papaver polyanthos*, Tab.

*Papaver alb. polyanthon seu multifi.* Lob. Ger.

*Papaver flore multiplici numero denso*, Cæs.

Est majus & minus: floris colore purpureo, rubro, rubeo saturato, albo, violaceo & mixto: hinc septem figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum habentur.

VIII. *Papaver pleno flore nigrum.*

*Papaver nigrum polyanthon*, Lob. Ger.

IX. *Papaver laciniatis floribus.*

*Papaver laciniatum rubrum, aliud unguibus purpureis, aliud unguibus albis*, Eyf.

X. *Papaver errat. majus*: *polar* Dioscoridi, Theoph. Plinio.

*Papaver rubrum*, Brunf. erraticum, Eid.

*Papaver erraticum*, Matth. Cord. in Dioscorid. Gesn. hort. Lac. Lon. Dod. Cast. Cæs. Thal. Tab. rubrum, Eyf.

*Papaver erraticum primum*, Fuch.

*Papaver Rhœas*, Lob. Ger. prius, Lugd. alterum, Dod. gal.

*Papaver rhœas sive caduco flore puniceo*, Ad. Lob. ico.

Flore est puniceo, rarissimè albo.

XI. *Papaver erraticum pleno flore.*

*Argemone multiplex*, Trag.

*Papaver rhœas flore pleno*, Cam.

XII. *Papaver errat. Pyrenaicum flore flavo*: quod pro primo in Prodromo describitur.

XIII. *Papaver erraticum minus.*

*Argemone exigua*, & 2. Trag. Lugd.

*Argemone*, Lac. Lon.

*Papaver rhœas*, Dod. gal. rhœas minus, Lugd.

*Papaver erraticum alterum*, Fuch. Dod.

*Papaver erraticum minus*, Tab.

XIV. *Papaver corniculatum luteum*: *καρλίτης* Diosc. Theoph. sylv. ceratitis, Plinio.

*Papaver sylv. corniculatum*, Trag.

*Papaver corniculatum*, Matth. Lac. Ad. Lobel. Cast. Cæs.

*Papaver corniculatum primum*, Tab. majus, Dodon.

*Papaver corniculatum luteum*, Fuch. Tur. Eyf.

*Papaver corniculat. flavo flore*, Clus. hist. Eyf.

*Papaver cornutum*, Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lon. Lugd. Cam.

XV. *Papaver cornic. phœniceum hirsutum.*

*Papaver cornutum rubro flore*, Gesn. hort. Ger. flore phœniceo, Ad. Lob. Clus. hist.

*Papaver cornutum alterum floribus rubris*, Cam.

*Papaver corniculatum, rubrum*, Dod.

*Papaver corniculatum alterum*, Lugd. Tab.

Flos interdum intensè rubens, interdum languidus, aliquando pallidus.

XVI. *Papaver corniculatum phœniceum glabrum.*

*Papaver corniculat. phœniceum alterum*, Lob. ico. phœniceo pallescente flore, Clus. hist.

XVII. *Papaver spinosum*: quod sub 15. in Phytopinace, sub 2. in Prodr. & in Matthiolo



descriptum & pictum : quo etiam nomine postea Clus. in sua hist. & Eyst. proposuere.

Ficus infernalis Italarum.

an Glaucium Dioscoridis : γλαύκιον succus est herbæ folijs ferè papaveris corniculati, quæ crocei coloris succo copioso prædita sunt Dioscorid. lib. 3. cap. 100. Et hujus papaveris folia, succo flavescente, instar Chelidonij majoris, abundant.

XVIII. Papaver corniculatum violaceum, Papaver cornutum flore violaceo, Gesn. hort. Ger.

Papaver corniculatum violaceum, Lob. Dod. Lugd. Cast. violaceo flore, Clus. hist.

Anemone Narbonensis major corniculata, Advers.

Anemone major corniculata Penæ, Lugd.

Flores cærulei, & nigræ violæ æmuli.

## H Y P E C O O N.

**Y** *ἵπεκον* οἱ δὲ ἱπέρειον, papaveri Dioscorides, lib. 4. cap. 68. subijcit, cum eadem ei sit natura, quæ succo papaveris. Et Plin. lib. 27. cap. 11.

### I. Hypecoum.

Cuminum sylv. alterum, Matth. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Hypécoon, Gesn. hort. Dod. Clus. hisp.

Hypécoon legitimum, Eid. hist.

Cumino siliquoso persimilis, Ad.

Cuminum sylv. alterum Dioscorid. Italarum, Lob. ob.

Cuminum sylv. alterum siliquosum, Eidem icon.

Cuminum corniculatum, Ger.

### II. Hypecoi altera species.

Cuminum alterum Diosc. siliquosum, Ad.

Cuminum alterum Dioscor. sylv. siliquosum, Lob. icon.

Cuminum sylv. siliquosum Penæ, Lugd.

Cuminum sylv. 3. & siliquosum minus, Tab.

Cuminum siliquosum, Ger.

A priore differt folijs angustioribus, longioribus, glaucis, siliquis deorsum recurvis.

## A R G E M O N E.

**A** *Ἀργεμόνη* in totum papaveri sylv. simile Dioscorid. lib. 2. cap. 208. radicem rotundam tribuendo, quod nostra non convenit. Sic dicta, quod ἄργεμα oculorum & nubeculas expurget. Plinio, lib. 25. cap. 9. Argemonia : nostri tria genera faciunt, & id demum probant, cujus radix thus redoleat. Sed videtur Plinius quatuor genera agnoscere, ut lib. 21. cap. 23. Anemonem, quam Argemonem vocari dixit : 2. genus hoc est : 3. genus, lib. 24. cap. 19. lappam Canariam, cujus radix jucundum odorem, thuri similem spirat, Argemonem nuncupari tradit : 4. genus statui potest, Inguinaria, quam lib. 26. cap. 9. etiam Argemonem appellari testatur.

### I. Argemone capitulo brevior.

Anemone minor, Coriandri folio, flore Pulsatillæ, capitulis hirsutis, Ad.

Argemone capitulo torulis canulato, Lob. Ger.

Argemone minor capitulis brevioribus, Lugd.

Argemone, Cast. prima, Tab.

Anemone minor Penæ, Lugd.

II. Argemone capitulo longiore, an Argemone, Cord. hist.

Anemone Narbonensis major corniculata, Ad.

Argemone capitulo longiore, Lob. Lugd. Ger.

Papaver erraticum alterum, Cæf.

Argemone 2. Tab.

III. Argemone alpina folijs Scandicis lactea : in Prodr. descripta.

IV. Argemone alpina Coriandri folio.

Argemone lutea, Penæ Ital. qui in Baldo collectam transmissit.



## SECTIO SECUNDA.

## ANEMONE; PULSATILLA; ADONIS.

## ANEMONE.

**A** *Ἄνεμών* Dioscoridi, lib. 2. cap. 207. Anemone, Plinio, l. 21. c. 23. ἀπὸ τῆς ἀνέμου, à vento, quòd floatantum vento flante aperiatur, unde & Herba venti quibusdam.

Genera duo Diosc. & Plinio, sylvestre & sativum : hujus, inquit, multæ species, phæniceo flore, altera candicante, aut lacteo, aut purpureo.

*Anemone latifolia simpliciflore.*

I. Anem. Cyclamini seu malvæ folio lutea.

Anemone latif. Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Anem. hort. latifol. 1. simpl. flavo flore, Clus. hist.

Flos 10. aut pluribus folijs constans, externè flavus, internè aureus.

II. Anem. Geranei rotundo fol. purpurascens.

Anemone latifol. altera, Clus. hisp.

Anemone hort. latifol. simpl. flore 3. Eid. hist.

Anemone 1. Dod. Cæs.

Anem. tuberosa bulbocastani radice, Lob. Ger.

Anemone papaveracea, Tab. Ger.

Anemone stellata purpurea & alba, Eid.

Geranium 1. quorundam Dalech. Lugd.

Flos ex 12. aut 15. folijs, foris cineraceis hirsutis, interius rubedine purpurea nitentibus componitur : quare in dilutiore purpura rubet : aliàs interius intensiore, exterius remissiore : rarius totus albet.

III. Anemone Geranei rotundo folio dilutè purpurascens.

Anemone hort. latifolia 4. simpl. flore, Clus. hist.

Flos externè ex albidis obsoleti coloris, internè ex purpura dilutiore albicat.

IV. Anem. Geranei rot. folio dilutè rubens.

Anemone hort. latifol. 5. simpl. flore, Clus. hist.

Floris folia octona foris obsoletè rubent, lanugine pubescunt : interius dilutiore rubore & ad carneum tendente nirent, unguib. albicant.

V. Anemone latifol. simplicifloro carneo flore.

Anemone hort. latifol. 6. simpl. flore, Clus. hist.

Flos 10. aut 12. foliorum purpurei ferè coloris, unguibus albicanribus.

VI. Anemone latifolia flore purpureo saturato.

Anemone hort. latifol. 8. simpl. flore, Clus. hist.

Flos 8. foliorum, coloris purpureo saturati, exterius splendentis unguibus magnis & ad pediculum purpureis.

VII. Anemone latif. purpureo violaceo flore.

Anemone hort. latif. 12. simpl. flore, Clus. hist.

Flos octo folijs constans, externè dilutè purpurascens splendet ; internè violaceus, unguibus magnis & argentei coloris.

VIII. Anemone latifolia flore purpureo violaceo altera.

Anemone hort. latifol. 13. simpl. flore, Clus. hist.

Flos qui ex 12. folijs constat : foris ex purpureo albescit & splendet : interius ex violaceo purpureo splendet, unguibus albis.

IX. Anemone latifolia violaceo flore.

Anemone hort. latif. 9. simpl. flore, Clus. hist.

Flos octo vel plurium foliorum, externè subpurpureus & splendens, internè ex purpura violaceus, unguibus rubescentibus, orbe albicante cinctis.

X. Anemone latif. fl. violaceo saturato colore.

Anemone hort. latifol. 11. simpl. flore, Clus. hist.

Flos sex folijs præditus, violacci saturatioris coloris, unguibus majorib. magisq. candidis.

XI. Anemone latifolia flore variegato.

Anemone hort. latifolia 7. simpl. flore, Clus. hist.

Flos qui octifolius, foris ex purpureo saturatius rubet, interius ad unguem usque albus saturatus purpura & quasi Kermesina nitet : oris coccineis, in quæ radij purpurascences sparguntur : ungues magnos & albos habet.

XII. Anemone latifolia punctato flore.

Anemone hort. latifol. 10. simpl. flore, Clus. hist.

Flos octifolius violaceus, interna parte maculis albis aspersis.

XIII. Anemone latifolia flore carneo.

Anemone hort. latifol. 14. simpl. flore, Clus. hist.

Floris modò majoris, modò minoris, octo folia extrinsecus nonnihil purpurascunt, intrinsecus ferè carnei, vel saturatioris, vel dilutioris, unguibus albis.

XIV. Anemone latifolia Saniculæ folio.

Anem. simplex latif. dilutè purpurascens, Eyft.

XV. *Anemone latif. flore orangei coloris.*  
*Anemone hort. latif. 15. simpl. flore, Clus. hist.*

Floris octo vel novem folia, externè carnei coloris, unguibus saturatè purpurascens, internè carnei diluti: Habetur major & minor.

XVI. *Anemone latifolia flore coccineo.*  
*Anemone latifolia coccineo flore, Clus. pan.*  
*Anemone hort. latif. 16. simpl. flore, Clus. hist.*

Floris octo folia, internè elegantissimo coccineo nitent, unguibus orbis pallescens ambit, externè quadam lanugine pubescunt: huc pertinet *Anemone latifolia fl. coccineo simplici, Eyft.*

Flos coccinei coloris, medium è fusco nigricans & capitulum multis folijs staminulis pallidè virentibus septum.

XVII. *Anemone latif. flore magno coccineo.*  
*Anemone hort. latif. 17. simpl. flore, Clus. hist.*

Floris octo folia internè elegantissimo coccineo colore fulgent, nullis unguibus apparentibus, externè color dilutior; & lanuginosa.

XVIII. *Anemone latifolia flore coccineo phœniceo.*

*Anem. latif. Byzantina coccin. colore, Clus. pan.*  
*Anemone hort. latif. 18. simpl. flore, Eid. hist.*

Flos amplius octifolius, coloris ex coccineo phœnicei, ut in Rhœade, unguibus parvis subpallidis.

*Anemone tenuifolia simplici flore.*

I. *Anemone Geranei Ropertiani folio cærulea: an Dioscoridis?*

*Anemone tenuifolia tertia, Clus. hisp.*

*Anemone hortensis tenuifolia simplici flore 1. Eid. hist.*

*Anemone 2. Dod. Lugd.*

*Anemone tuberosa Geranifolia, Lob.*

*Anemone montana, Cæs.*

*Anemone Ropertiana, Tab. geranij folia, Ger.*

Flos ex 14. aut 15. foliolis mucronatis compositus, coloris est cærulei, vel rubri, vel ex utroque mixti: est externa parte subcærulei, interna albi: sic flore nunc cæruleo, nunc rubro, nunc albo reperitur: quare Tabern. tres species, alba, cærulea & rubra.

II. *Anemone tenuifolia flore multifido dilutè purpurascens.*

*Anemone hort. tenuif. 9. simpl. flore, Clus. hist.*

Flos ex 14. & plurib. foliolis dilutè purpureis, & quasi carnis, nullis unguum vestigijs constat.

III. *Anemone œnanthes folijs flore violaceo hexaphyllo.*

*Anemone tenuifolia altera, Clus. hisp.*

*Anemone hort. tenuif. simpl. flore 2. Eid. hist.*

*Anemone tertia, Dod. Lugd.*

*Anemone bulbosa radice, Ad.*

*Anemone tuberosa radice, Lob. ob. Ger.*

*Anemone, Cast. angustifolia, Tabern. tenuifol. Cam. at. 1. in epist.*

*an Anemone altera, Cæs.*

*Anemone tenuifol. fl. purpureo violaceo, Eyft.*

Flos, qui ex 6. interdum 7. & 8. folijs compositus est, communiter est purpureus seu violaceus, externa parte lunuginosus: est ruber seu phœniceus, vel ex purpura rubens: est & albus: quare apud Tabernæmontanum.

*Anemone corallina violacea & alba: &*

*Anemone angustifolia, & 4. & apud Gerard. figurâ tres.*

IV. *Anemone tenuifol. fl. pallidè coccineo.*

*Anemone hort. tenuif. 16. simpl. flore, Clus. hist.*

Flos hexaphyllus, foris tenui lanugine pubescens, coloris dilutè rubescentis, internè coccinei valdè diluti, unguibus amplis albis.

V. *Anemone tenuif. coccineo fl. hexaphyllo.*

*Anemone hort. tenuif. 3. simpl. flore, Clus. hist.*

*an Anemone alterum genus, Cæs.*

Flos floridi coccinei coloris, unguibus magnis, ex pallido, fusco & albo mixtis.

VI. *Anem. tenuif. coccineo flore octophyllo.*

*Anemone hort. tenuif. 4. simpl. flore, Clus. hist.*

Flos internè coccineus, unguibus albis, & externè coccineus, tenui lanugine pubescens & splendens.

VII. *Anemone tenuifolia flore magno coccineo hexaphyllo.*

*Anemone tenuif. coccineo flore simp. Clus. pan.*

*Anemone hort. tenuif. 5. simpl. flore, Eid. hist.*

Flos intus elegantissimus coccineo colore nitet, foris lanugine pubescit: unguibus albi sunt.

VIII. *Anem. tenuif. flore coccineo sanguineo.*

*Anemone hort. tenuif. 7. simpl. flore, Clus. hist.*

Flos 5. 6. interdum 7. foliorum, coloris coccinei, ad sanguineum vergentis, unguibus magnis exalbidis, purpureis venis distinctis: aliquando flos ad costæ lateris colorem accedit, nec splendet.

IX. *Anem. tenuif. flore sanguineo coccineo.*

*Anemone hort. tenuif. 8. simplici flore, Clus. hist.*

Floris sex folia, externè lanugine obducta, coloris sunt sanguinei saturatioris & splendentis, internè sanguinei coccinei permixti.

X. *Anem.*

X. *Anemone tenuifolia* flore sanguineo coccineo altera.

*Anemone hort. tenuifol.* 20. simp. flore, Clus. hist.

Flos major hexaphyllus, sanguineo colore, vel inter coccineum & cochinelium medio, unguibus minoribus, & albicantibus.

XI. *Anemone tenuifolia* flore ex sanguineo & coccineo medio.

*Anemone hort. tenuifol.* 19. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, coloris ex sanguineo & coccineo medij, diluti, ei prorsus similis quem vulgus cochinelium appellat: unguis magni, albi & quasi argentei.

XII. *Anemone tenuifolia* flore amplo sanguineo hexaphyllo.

*Anemone hort. tenuifol.* simp. flore 6. Clus. hist.

Flos coloris sanguinei elegantissimi, unguibus magnis albis.

XIII. *Anemone tenuifolia* flore amplo atrorubente.

*Anemone hortensis tenuifolia* 17. simplici flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, coloris sanguinei ex atrorubentis & quasi sericei panni villosi Kermesino colore præditi, cærulei.

XIV. *Anemone tenuifolia* fl. rubro saturato.

*Anemone hort. tenuifol.* 16. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, ruber, seu potius sanguineus, unguibus magis saturis, venis albicantibus distinctis.

XV. *Anemone tenuifolia* flore niveo.

*Anemone hort. tenuifol.* 13. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus niveus, cujus unguibus carnei quid aspersum: apicibus ex obscura purpura nigricantibus.

XVI. *Anemone tenuif.* flore amplo candido.

*Anemone hort. tenuifol.* 12. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, prorsus candidus, unguibus externè virefcentibus, apicibus nigris.

XVII. *Anemone tenuifolia* Cretica flore magno albo: quæ in Prodr. sub 1. descripta est.

XVIII. *Anemone tenuifolia* fl. albicante.

*Anemone hort. tenuifol.* 15. simp. flore, Clus. hist.

Flore est hexaphyllo candicante, staminibus albis, apicibus subcæruleis.

XIX. *Anemone tenuifolia* flore exalbido majore.

*Anemone hort. tenuifol.* 10. flore simp. Clus. hist.

*Anemone tenuifolia* carneo flore, Clus. pan.

Flos magnus, hexaphyllus, coloris primum,

exalbidi virefcentis, dein ad carneum tendentis, unguibus externè virefcentibus, internè albis, staminibus carnei coloris.

XX. *Anemone tenuifol.* fl. exalbido minore.

*Anemone hort. tenuifol.* 11. simp. flore, Clus. hist.

Flos minor ex 6. 8. & pluribus foliolis compositus, coloris extrinsecus carnei albo mixti: intrinsecus verò prorsus ferè albi: unguibus & venis ex albo paululum virefcentibus.

XXI. *Anemone tenuif.* flore furvo albicante.

*Anemone hortensis tenuifolia* 21. simplici flore, Clus. cur. post.

Flores cineraceo sive furvo, albicans, & tenui velut rubedine perfusus, ut ferè est Capucinatorum pannus.

XXII. *Anemone tenuif.* flore carneo striato.

*Anemone hort. tenuifol.* 14. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllos externè carneus, oris albicantibus: internè exalbidus, venis carneis ad medium folium sparsis, staminibus purpurascens, apicibus nigricantibus.

XXIII. *Anemone tenuifolia* flore magno suaverubente, unguibus albis.

*Anemone tenuifolia* flore suaverubente Caccini: ad Clus. cur. post.

Has varietates, satiatione fieri credibile est, cum in alijs quibusdam plantis etiam contingere observatum sit. Nam natura, in floribus Anemonum coloribus, non minus quàm in Tulipis & Iridibus ludit: ita ut plusquam triginta discrimina in colore, aut unguum varietate, aut foliorum numero observata fuerint.

*Anemone Matthioli.*

Omnes Anemonum singulares caules, interdum duos aut tres, vel pures, nullis ramis præditos proferre observatum fuit, nisi fortè id naturæ lusu contingat, uno alterove ramulo inter superna folia summum caulem amplectentia, enato. Quare, quid Matthiolus suis Anemonibus quatuor propositis velit, non assequimur: omittere ramen nolimus.

I. *Anemone prima*, Matth. Lugd.

II. *Anemone secunda*, Matth. Lugd.

an Ranunculus flore globoso.

III. *Anemone quarta*, Matth. (at in edit. secunda, 1.) Cast. Lugd.

*Anemone, Lac. Anemon. ramosa purpurea*, Tab.

IV. *Anemone quinta*, Matth. (at in edit. secunda *Anemone altera*) Cast. Lugd.

*Anemone altera, Lac.*

Anemone ramosa lutea, Tab.

V. Anemone varia radice fibrosa peregrina.

Anemones genera varia, floris rosei, lutei, purpurei varietate distincta, aspectu pulchra: vario floris colore, aliàs rubro, aliàs purpureo, nonnunquam luteo, observavit Rauvolfius in suo Itinere Hierosolymam versus, & obiter Lugd. herb. attigit.

*Anemone flore pleno.*

I. Anemone latifolia maxima versicolor.

Anemone latifolia flore multiplici, Clus. hisp. & pan. Lugd.

Anemone hort. latifol. pleno flore 1. Eid. hist.

Anem. max. polyanthos Chalcedon. Lob. Ger.

Anemone Chalcedonica major, Tab.

Folia florum externa & majora dena aut duodena, viridia sunt, eorum mucronibus coccineo colore leviter & virgatis infectis: interna minora & angustiora, dilutiora purpura ex rubro nirent.

Aliquando, ex prædicto flore uncialis pediculus, minorem florem ex octo latiorum foliorum partim viridium, partim coccineorum compositum, sustinet, quam pro quarra posuimus.

II. Anemone latifolia flore coccineo.

Anemone hort. latifol. pleno flore 2. Clus. hist.

Differt à priore, quod in hac floris umbellum glomerata & reflexa folia non occupant.

III. Anemone latifolia coccineo flore duplo vel etiam triplo densiore & pleno, quam prior sit, Clus. cur. post.

IV. Anemone latifolia Pavo dicta major 1.

Anemone hort. latifol. Pavo major 1. Clus. hist.

Flos unicus 20. 30. aut pluribus folijs constans, eleganti, saturato splendidoque coccineo colore præditis, unguibus sanguineis, orbe pallido cinctis.

V. Anemone latifolia Pavo dicta major prolifera.

Anemone pavota latifolia multiplex flore miniato, Bry.

VI. Anemone latif. Pavo minus polyphylla.

Anemone hort. latifol. Pavo major 2. Clus. hist.

Anemone hort. fl. pleno coccineo variegata latifolia, Eyst.

Hæc flores minus plenos profert, interdum simplici, octo, novem, aut decem foliorum serie constantem.

VII. Anemone latifolia flava.

Anem. hort. latif. duplo flore flavo, Clus. hist. Eyst.

an Anemone multifido & lanuginoso folio, quod in Apulia luteo flore reperiatur, Ang.

VIII. Anemone tenuifolia multiplex rubra.

Anemone multiplex rubra, Clus. hisp.

Anem. flore polyphylla tenuifolia, Eid. pan.

Anem. hort. tenuifolia pleno flore, Eid. hist.

Anemone 4. Dod.

Anemone flore multiplicato coccineo, Lob. colore tenuifolia, Eyst.

Anemone coccinea multiplex, Ger.

Flore est rubro, cæruleo, albo.

IX. Anemone tenuifol. multiplex purpurea.

Anemone tenuifolia pleno purpureo flore Caccini, Clus. cur. post.

Est etiam quæ purpureo cæruleum florem, alia quæ suaverubentem & nitidum profert.

X. Anem. tenuif. multip. atropurpurea. Anemone tenuifolia pleno flore ex atropurpurea, Clus. cur. post.

XI. Anemone Geranei rotundi folio plena, Anem. latif. purpurorubescens plena, Eyst. desc. ab Anemone hort. latifolia 3. Clusij sola multiplici foliorum serie differt.

*Anemone sylvestris.*

I. Anemone sylvestris alba major.

Anemone 3. Math. Cast. Lugd. flore albo, Lob.

Anemone alpina, Ges. fra.

Anemone pannonica, Dod.

Anem. sylv. 1. Clus. pan. & hist. Lob. ad. par. 2.

Anem. syl. flore candido, Thal. syl. fl. albo, Eyst.

Anemone major alba, Tab.

Ranunculi 11. species, Cord. hist.

Aconito cognata videtur, Ges. hor.

II. Anem. syl. alba minor: pro 1. in Prod. desc.

III. Anem. alpina alba major: quæ 2. in Prod.

IV. Anem. alpina alba minor: quæ 3. in Prod.

V. Anemone nemorosa flore majore.

an Anemone λεμώνια, Theoph.

Sanicula minor quibusdam, Brunf.

Ranunculus candidus, Trag.

Ranunculi 4. species, Fuch. Cord. hist. Lugd.

Ranunculus 6. Tur. 8. Lon.

Ranunculus parvus, Dod. gal.

Ranunculus phragmitis, Ges. hor.

Ranunculus nemorosus, Ad. Lob. Tab.

Eneaphyllon, Ang.

Ranunculus sylvarum, Clus. hist.

Anemone 5. Dod. sylv. vulgaris, Clus. pan. montana, Cæs.

Anem. nemorum alba, purpurea, coccinea: Ger. Ranun-

Ranunculi 3. tertium & quartum genus, Thal.

Flore est candido, aut ex purpura rubente, modo dilutiore, modo intensiore colore, subcæruleo, carneo, roseo: hinc Taber. tres figuras habet, Ranunculi albi, purpurei, & ex rubro purpurei nomine, & Thalius tertio generi quod flore est candido, species tres tribuit, folijs & floribus majoribus, minoribus & medio modo donatis: quartum è candido rubet, & ratione foliorum majus & minus est.

VI. Anemone nemorosa flore minore: hæc in Prodomo r. est.

an Ranunculi tertij generis species min. Thal.

VII. Anemone nemorosa sterilis folijs pubescentis.

Ranunculi tertij quintum genus, Thal.

Ranunculi nemorosi vitium *γινώσκουλα*, Cat. Altorff.

VIII. Anemone nemorosa flore pleno albo.

Anemone limonia pleno albo flore, vel Ranunc. sylvar. pleno albo flore, Clus. hist. Eyff.

IV. Anemone nemorosa flore pleno purpur.

Anemone limonia pleno purpureo flore, vel Ranunculus sylvar. pleno flore purpurascens. Clus. hist.

Ranunculus nemorosus flore pleno, Eyff.

X. Anemone nemorosa affinis peregrina 1. candido aut purpurascens flore.

Anemone *λεμόνια* peregrina 1. Clus. hist.

XI. Anemone nemorosa affinis peregrina 2. flore herbacei coloris.

Anemone *λεμόνια* peregrina 2. Clus. hist.

## PULSATILLA.

**A** Nemones alterum genus quæ Limonia vocatur, Plin. l. 21. c. 11. ex Theophr. 6. hist. 7. Anemone genus (Gaza Fremium vertit: Plin. l. 21. c. 23. Phemon habet) quod Leimonion vocant: hanc sunt qui Pulsatillam esse velint. Pulsatilla nominatur, quod seminum tremuli pappi levissimo flatu, huc atq; illuc agitentur, unde & Herba venti dicitur, quare *ἐβρυγερ* dici potest.

I. Pulsatilla folio crassiore & majore flore.

Rüchschell/Brunk.

Herba venti, Trag. Lon.

Pulsatilla Matthiol. Gefn. hort. Cast. Dod. Ad.

Lugd. Tab.

Pulsatilla vulgaris, Lob. Ger. recentiorum, Cæ-

salp. communis, Cam.

Pulsatilla vulgaris dilutior, Clus. pan. & hist.

Herba Sardo, Dod. gal.

Anemone sylv. Fuch. communis, Tur. montana, Gefn. hort.

Anemone species, Gef. hor. Thal.

Anemone 10. vel leptophyllon, Cord. hist.

Anemone limonia & Samolus Plinij, Dalech. in Plin.

Ranunculus 2. Lac. Diosc. 2. species, Gef. hor.

Colore ut plurimum violæ nigrae purpureo, & obsoletiore intensiore & remissiore pro loci ratione: in umbrosis dilutiore, in apricis coloratiore: pleno etiam flore reperiri significatum.

II. Pulsatilla folio tenuius inciso & flore minore, sive palustris: hæc in Prodomo primo loco describitur.

III. Pulsatilla flore minore nigricante.

Pulsatilla altera, Dod. Lugd.

Pulsatilla flore clauso, Lob. ico.

Pulsat. vulg. saturatiore flore, Clus. pan. & hist.

IV. Pulsatilla apij folio vernalis flore majore: quæ 2. in Prodomo.

V. Pulsatilla apij folio vernalis flore minore: quæ 3. in Prodr.

VI. Pulsatilla apij folio autumnalis: quæ 4. in Prodr.

VII. Pulsatilla folio Anemones secundæ, sive subrotundo: quæ 5. in Prodomo.

VIII. Pulsatilla flore rubro obruso.

Pulsatilla rubra, Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger. an Anemone 4. Cam. ep.

IX. Pulsatilla flore albo.

Anemone alpina, Gefn. fra.

Anem. syl. 2. Clus. pan. & hist. Lob. ad. part. 2.

Pulsatilla alba, Lob. Lugd. Tab. Ger. flore candido, Dod.

Flos intus lacteus, exterius nonnihil purpurascens.

X. Pulsatilla lutea apij hortensis folio.

Pulsatilla secunda alpina, Lugd.

XI. Pulsatilla lutea pastinacæ sylv. folio.

Pulsatilla lutea, Gef. hor. Ad. Cam. ep.

Pulsatilla tertia alpina, Lugd.

Anemone sylv. tertia, Clus. hist.

XII. Pulsatilla lutea alpina hispidior.

Pulsatilla prima alpina, Lugd.

an Anemone lutea, Ang.



## A D O N I S.

**A** *Dondis floris meminit Ovidius 10. Metamorph. qui Anemone esse à multis creditur: alij huic sequenti tribunt. Verum quia ratione capituli cum Ranunculis conveniat, inter Anemones & Ranunculos reponimus: Quibus dum  $\phi\lambda\alpha\gamma$  Theoph. à floris flammeo igneoq; colore: & 6. hist. 6. inter vernos flores recenset.*

## I. Adonis hortensis.

Anemone hort. Trag. Lugd. Anemone, Lon.

Argemone tertia, Tab.

## II. Adonis flore majore.

Anthemis eranthemos Dalechampij, Lugd.

## III. Adonis hort. flore minore atrorubente.

Adonis recentiorum, aut Adonium Poëtarum, species Anemone, Ad.

Adonis recentiorum, Lob. ob. flos Adonis, Eid. ico. Cam. Ger.

Flos Adonis vulgo, Clus. hist.

Eranthemum, Dod.

Adonium, Tab.

Flos habetur miniati, lutei coloris: hinc

Adonium & Adonium luteum, Tab. (rib.

## IV. Adonis syl. fl. phæniceo ejusq; fol. longio-

Anemone agrestis, Trag.

Anemone tenuifolia, Cord. in Diosc. Gef. hist.

Anemone tenuifolia, Cord. hist.

Adonis, Match. Lugd.

Chamæmelum eranthemum vel purpureum,

Dod. gal. rubrum, Gef. hort.

Aculeata, Lon.

Ranunculus arvensis flore rubicundo, Cæs.

Chamæmelum purpureum, Tab.

Variat floris colore phæniceo, luteo, pallido & albo; hinc

Anemone tenuifol. alt. flore pallido, Cord. hist.

Adonis flore pallido, Cam. ep. Lugd. Tab.

Adonis 2. & 3. inter segetes, Tab.

Eranthemum flore flammeo, &

Eranthemum folio rubro, Eyft.



## S E C T I O T E R T I A.

## RANUNCULUS EJUSQUE SPECIES.

**B** *Ἀνράχιον Dioscorid. l. 2. c. 206. ῥανούκλιον ἔχρειν, Ranunculus & Apium agreste. Ranunculus, quod ranarum more humidis limitibus & opacis marginibus latetur: aut quod rana, inter ejus frutices frequenter inveniuntur. Apium, quod solijs apium amuletur.*

Genera complura Dioscoridi: 1. Coriandri solijs (& ad malva latitudinem accedentibus, Plinio) flore luteo, interdum purpureo: 2. lanuginosus (foliosus Plinius) quod syl. apium appellant: 3. minimum flore aureo: 4. huic simile flore lacteo. Idem habet Plin. l. 25. c. ultimo.

## Ranunculus nemorosus.

## I. Ranunculus nemorosus luteus.

Ranunculi sylv. alterum genus, Trag.

Ranun. 3. species, Cord. hist. tertij genus 2. Thal.

Ranunc. 4. species lutea, Fuch. Dod. gal. Lugd.

Ranunculus phragmites luteo flore, Gefn. hort. nemorosus luteus, Lob. ico. Tab.

Ranunculus 7. Tur. 9. Lon.

Ranunculus nemorosus flore luteo, Ad. Eyft.

Anemone 6. Dod. Lug. mont. colore luteo, Cæs.

Anemone nemorum lutea, Ger.

Major est & minor, Thal. Flore communiter unico, aliquando duobus & tribus.

## II. Ran. nemorosus vel sylvat. folio rotundo.

Ranunculus dulcis, sub sylv. descrip. Trag.

Ranunculus 1. species, Fuch. Tur. Lon. Lugd.

Ranuncul. auricomus, Dod. gal. Lob. ico. Thal.

Ranunc. nemorosus, Ger. dulcis nemor. Tab.

Polyanthemum, Ang.

## III. Ranunculus nemorosus Thaliætri folio.

Ranunculus Thaliætri folio, Clus. pan. Cam.

Ranunculus præcox 2. Thaliætri folio, Eid. hist.

Aquilegia minor Dalechampij, Lugd.

## IV. Ranunc. nemorosus Muscatellina dictus.

Aristol. rotundæ concavæ similis herbula, Trag.

Aristol. vulg. alt. radice oblonga, Gef. hor.

Capnos Plinij, Tur.

Moschatella, Cord. hist. Thal. Cam.

Ranunculus minimus Septentrionalium herbidomuscoflo flore, Ad. Lob. ico.

Denticulata, à radice forma, Lugd.

Fumaria bulbosa tuberosa minima, Tab.

Radix cava minima, Ger. ico.

## Ranunculus pratensis &amp; arvensis.

## I. Ranunculus pratensis erectus acris.

Ranunculus luteus, Trag.

Ranunculus pratensis surrectis cauliculis, Lob.

Ranunculus hortensis 2. Dod. Lugd.

Ranun-



*Ranunculus sylvestris*, & 2. Tab.

*Ranunculi lævis*, Cæf.

*Ranunculus batrachoides*, Ger.

*Ranunculus polyanthemus maculatus*, Thal.

In folij medio sæpè macula reperitur, & hic *Ranunculi* alter. species maculis notata, Trag. quâ communiter destituitur. Hic magis minusve hirsutus occurrit.

II. *Ranunculus pratensis erectus dulcis*.

*Ranunculus pratensis*, vel 1. Trag.

*Chrysanthemum simplex*, Fuch.

*Polyanthemum simplex*, Dod. gal. Lugd.

*Ranunculus* 7. Lon. dulcis, Tab.

*Ranunculus surrectis cauliculis*, Ger.

*Ranunculus hortensis erectus flore simplici luteo*, Eyf.

Hic cum latioribus quoque folijs reperiatur, idcirco apud Tab. & altera figura

*Ranunculi holeracei* majoris nomine : & apud Ger. sub titulo *Ranunculi auricomi*.

III. *Ranunculus pratensis repens hirsutus*.

*Ranunculi* 8. species, Cord. hist.

*Ranunculus pratensis reptante cauliculo*, Lob.

*Ranunculus polyanthemus* 1. Dod. Thal.

*Ranunculus hortensis* 1. Dod. Lugd.

*Ranunculus vinealis*, Tab.

*Ranunculus pratensis etiamque hortensis*, Ger.

Variat magnitudine, nam in hortis, quibus præcæteris spontè tamen proveniens, familiarior, latioribus multo quam in pratis folijs reperitur : & nonnunquam veluti quædam maculæ inalbicant.

IV. *Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda*.

*Crus galli*, Brunf. Coronopus parvus, Eid. 4.

*Ranunculus exiguus*, & 1. Trag.

*Ranunculus* 5. Matth. Tur. Lac. Lon. Lugd.

*Batrachion Apuleij*, Dod. gal.

*Ranunculus minor* vel 3. Fuch. vel 9. Cord. hist. minor, Tab.

*Ranunculus flammula dictus*, Gesn. hort.

*Ranunc. bulbosus*, Ad. Lob. Cam. Thal. Ger.

*Ranunculus tuberosus*, Dod. Lugd.

*Ranunculus lanuginosus* 1. Cæf.

Magnitudine variat, nam in saxosis, vix duarum triumve unciarum reperitur: contrâ in hortorum areolis spontè nascens, cubitum excedit: in pratis mediæ altitudinis reperitur.

V. *Ranunculus arvensis parvus folio trifido*.  
*Ranunculus minimus Apulus*, Col.

*Ranunculus hortensis flore pleno*.

I. *Ranunculus hortensis erectus flore pleno*.

*Ranunculus luteus*, vel 3. flore multiplici, Trag. *Ranunc. multiplex*, Fuch. tertius, Tur. quartus, Lon.

*Ranunculi* 7. species coronaria, Cord. hist.

*Ranunculus sylv.* 2. Dod. Lugd.

*Ranunc. polyanthemus*, Ad. Lob. polyanth. 3. erectus, Cam. at. 2. epit.

*Ranunc. erectus hortensis fl. pleno luteo*, Eyf.

Major & minor habetur : & ille dicitur

*Ranunculus multiflorus maximus*, Tab.

*Ranunculus maximus multiplex*, Ger.

Flores, Bellidum plenarum orbiculos imitantur, sæpius geminatim combinantur, ac quandoque sobolem aliam ex se emittunt.

II. *Ranunculus hortensis inclinans*.

*Ranunculus hort. reptante cauliculo*, Lob.

*Ranunc. repens flore multiplici luteo*, Gesn. hort.

*Ranunculus polyanthos luteus repens*, Cam.

*Ranunculus hort. flore pleno*, Eyf. cui major & minor est.

III. *Ranunculus dulcis flore pleno*.

*Ranunculus pratensis cultura multiplex*, Trag.

*Polyanthemum multiplex*, Dod. gal. Lugd.

*Ranunculus dulcis multiflorus*, Tab.

*Ranunculus maximus multiplex*, Ger.

IV. *Ranunculus bulbosus flore pleno*.

*Pes corvi flore pleno*, Brunf. Coronopus, Eid.

*Coronopus quorundam multiplici luteo flore*, Gesn. hort.

*Ranunculus radice bulbosa flore pleno*, Cam.

*Ranunculus bulbosus major*, Eyf.

V. *Ran. radice tuberosa fl. pleno & prolifero*.

*Ranunculus tuberosus flore multiplici*, Dod.

*Ran. magnus Anglicus polyanthos*, Lob. ico.

*Ranunculus* 3. Cam. ep.

*Ranunculus tuberosus Anglicus*, vel 25. Tab.

Sæpius ex uno flore, unus & alter prodit.

VI. *Ran. folio aconiti flore albo multiplici*.

*Ran. mont. magnus flore multiplici*, Gesn. hort.

*Ranunculus niveus polyanthos*, Lob. Lugd.

*Ranunculus pleno flore albo*, Clus. hist. Eyf.

*Ranunculus albus multiflorus*, Tab. Ger.

*Ranunculus leucanthemos flore pleno*, Cam.

*Ranunculus echinatus*.

I. *Ranunculus arvensis echinatus*.

*Ranunculus albus sive echinatus*, Dod. gal.

*Ranunc. fativus*, Tur. arvensis, Gesn. hort. Tab.

*Ranunculus arvorum*, Lob. ico. Ger.

Ranunculus hortensis simpl. 1. species, Fuch. Ran. in aquis nascens folio parum scisso, Cæs. Lugd. altera species, Fuch. ico. quinta species Ranunculus fluviatilis, Tab. vel segetalis, Cord. hist.

Ranunculus sylv. tertius, Dod. Lob. ob.

Folio est aliquando latiore, aliquando angustiore, pro ratione folii pinguioris: hinc Ranunculus arvensis latifol. & angustif. Tab.

II. Ranunculus stellatus echinatus Creticus.

Ranunculus echinatus Creticus, Pon. Ital.

III. Ranunc. rotundifol. repens echinatus.

IV. Ranunculus palustris echinatus: ille

sub 2. hic sub 3. in Prod. descriptus.

Ranunculus Apuleij quibusdam, Clus. hist.

*Ranunculus palustris & aquaticus.*

I. Ranunculus palustris apij folio lævis.

Ranunculus & Sardonia, Diosc.

Ranunculus, strumca & apiastrum, Plin.

Scelerata, Apuleio.

Apium aquaticum, Trag.

Apiastrum, Cord. in Diosc.

Ranunculus 1. Matth. Gesn. hort. Lac. Cast.

Lugd. 4. Tur. 3. Lon.

Ranunc. aquaticus, Fuch. ico. palustris, Cord.

hist. Dod. f. Lugd. Thal. Cam. Tab. Ger.

Herba Sardoa, Guiland.

Ranuncul. palustris rotundiore folio, Ad Lob.

Ranunc. alter hirsuto semine folijs apij, Cæs.

Folij & caulibus est alibi majoribus, alibi minoribus, floribus luteopallidis; at Cordus, & purpureis observavit.

II. Ranunc. palustris apij folio lanuginosus.

Ranunculi 2. species, vel Sardous Ranunculus, Cord. hist.

Ranunculus Sardonicus, Ang.

Ranunculus 2. Matth. Lugd.

Differt à priori, quod lanuginosus, pluribus foliorum incisuris spectetur.

III. Ranunc. aquaticus hederaceus luteus.

Ranunculus hederaceus Dalechampi, Lugd.

IV. Ranunc. aquaticus cotyledonis folio.

Cotyledon aquatica, Dod. gal. palustris, Eid. f.

Herba rotundo folio, aliquibus Acetabulum, Cord. in Diosc.

Cotyledon aquat. acris Septentrionalium, Lob.

Ranunculus aquaticus umbilicato folio, Col.

V. Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo.

Polyanthenum palustre aut aquatic. Dod. gal.

Ranunculus 3. Gesn. hort.

Ran. aquatilis, Dod. Ger. aquat. hepaticæ facie,

Hepatica aquatica, Lugd. palustris, Thal.

In nostro duplicia folia observantur, quæ sub aqua multifida, capillacea; quæ extra aquam rotunda & crenata: quare Cæs. folia alteri parum scissa, alteri in capillaceam tenuitatem fissa tribuit: addens, se vidisse quoddam utrumque genus foliorum habens, initio integrum, procedente tempore capillaceum: at in nostro foliorum diversitas simul conspicitur.

VI. Ranunculus aquaticus capillaceus.

Ranunculus in aquis folijs in capillaceam reunitatem scissis, Cæs.

Ran. trichophyllum aquaticus mediol. Col.

*Ranunculus folio longo tam palustris quam montanus.*

I. Ranunculus longifolius palustris major.

Ranunculus infectus 1. Cæs.

Lingua Plinij, Lugd.

Ranunculus πλατύφυλλοι, Thal.

Ranunculus lanceolatus major, Tab. flammeus major, Ger.

Folia prima aliquando subrotunda sunt, ad Chelidoniæ minoris, aut Cochleariæ formam accedentia: quemadmodum Ranunculi latifolij nomine, hist. Lugd. exprimere videtur.

II. Ranunculus longifolius palustris minor.

Ranunculus 1. Ang. 12. Cord. hist.

Ran. flammeus aquatilis angust. Ad. Lob. Lug. Flammula ranunculus, Dod.

Ranun. aquaticus ἀργυροστέφυλλοι major, Thal.

Ranunculus lanceatus minor, Tab. flammeus minor, Ger.

Ægolethron Plinij, l. 21. c. 13. quibusdam: alijs Enneaphyllum, Eiusdem, l. 27. c. 9.

III. Ranunculus palustris ferratus.

Flammula, Dod. gal. aquatica, Lugd.

Flammula ranunculus folio ferrato, Dod.

Ranunculus alter, Gesn. hort.

Ranunc. aquatilis angustifolius ferratus, Lob.

Ran. lanceatus ferratus; Tab. flamm. ferrat. Ger.

IV. Ranunculus mont. folijs plantaginis.

Ranunculus Pyrenæus albo fl. Cius. hisp. ap. 2.

an Ranunculus phœniceus Myconi, ob similitudinem cum palmæ folijs, Lugd.

V. Ranunculus montanus folio gramineo.

Ranunc. pumilus gramineis folijs, Ad. Lob. ico.

Ranunculus gramineus, Tab. Ger.

Hydropiper lanceolatum, Lugd.

VI. Ra-

VI. Ran. mont. folio gramineo multiplex. Ranunculus folio graminis, Dod.

Ranunculus gramineus 2. multiplex, Tab.

VII. Ranunculus gramineo folio bulbosus.

Ranunculus leptomacrophyllon bulbosus, vel

Ranunculus bulbosus gramineus mont. Col.

*Ranunculus grumosa vel etiam Asphodeli radice.*

I. Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice major.

Ranunculus Illyricus major, Clus. hist.

II. Ranun. lanug. angustif. grum. rad. minor.

Ranunculus Pannonicus, Clus. hisp.

Ranunculus grumosa radice 4. Eid. hist.

Ran. Illyricus, Dod. Lob. Tab. Cam. Ger. Eyf.

Ranunculus peregrinus alter, Cæs.

III. Ranunculus lanugin. apij folio asphodeli radice.

Ran. alter saxatilis mont. asphodeli radice, Col.

IV. Ranunculus grumosa radice folio ranunculi bulbosi: hic 4. est in Prodomo.

V. Ranunculus grumosa radice flore phæniceo minimo simplici.

Ranunc. Tripolitanus phæniceo fl. Clus. pan.

Ranunc. Asiaticus grumosa radice 1. Eid. hist.

Floris foliola 5. aut 6. rarius 3. aut 4. foris phænicei, internè miniati coloris staminib. rubris.

VI. Ranunculus grumosa radice ramulosus.

Ranunculus Asiaticus *πολύκλων* sive grumosa radice 2. Clus. hist.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore phæniceo ruberrimo, Eyf.

VII. Ranunc. grumosa radice fl. flavo vario.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flavo rubris venis distincto, Clus. cur. post Eyf.

VIII. Ranunculus grumosa radice fl. albo.

Ranunc. peregrinus grumosa radice 1. Clus. hist.

Flos quinquefolius albus suaviter rubente colore per oras mixto.

IX. Ranunculus grumosa radice flore albo, leviter crenato.

Ranunculus peregr. grumosa radice 2. Clus. hist.

X. Ranunculus grumosa radice flore niveo.

Ranunculus peregr. grumosa radice 3. Clus. hist.

Ranunculus Creticus grumosa radice flore niveo, Eid. hist. ap. alt. & Eyf.

XI. Ranunculus asphodeli radice Creticus.

Ranunculus Creticus latifolius, Clus. hist.

XII. Ranunculus latifolius bullatus asphodeli radice.

Clusius in hist. duas habet figuras, magno &

parvo flore, nulla in descriptione facta mentione: ille vocatur

Ranunculus grumosa radice 1. Clus. hist.

Ranunculus Lusitanicus Clusij, Lob. ico, Ger.

Ranunculus Lusitanicus 2. Tab. hic verò

Ranunculus autumnalis, Clus. hisp. Ger.

Ranunc. grumosa radice 1. species 2. Clus. hist.

Ranunc. Lusitanicus autumnalis, Lob. ob.

Ranunc. Lusitanicus, Dod. Lugd. primus, Tab.

XIII. Ranunculus cherophyllos asphodeli radice.

Ranunculus montanus leptophyllos Asphod. radice, Colum.

*Ranunculus grumosa radice flore pleno.*

I. Ranun. asphodeli radice flore sanguineo.

Ranunculus Constantinopolitanus, Clus. hisp. Dod. Lugd. Cam.

Ranunc. polyphyllus flore coccineo, Clus. pan.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore, Eid. hist.

Ranunculus sanguineus multiplex, Lob. Ger.

Ranunculus Turcicus sive sanguineus, Tab.

an Ranunculus primi generis purpurei floris apud Dioscor. quem simplici flore etiam nasci verisimile est.

II. Ranunculus asphodeli radice flore subphæniceo rubente.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore 2. Clus. hist.

Ranunculus pleno flore ruberrimo, Eyf.

Flos ex centrum & trigintra folijs, foris subphænicei, dein miniati, intcrius elegantis rubri miniati ad coccineum tendentis.

III. Ranunculus asphodeli radice prolifer miniatus.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore 3. Clus. hist.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore pleno sanguineo prolifero, Eyf.

*Ranunculus montanus.*

I. Ranunc. rutaceo folio flore suaverubente.

Ranunculus præcox 1. rutæ folio, Clus. hist.

Ranunculus alpinus Coriandri folio, Pon.

II. Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore minore.

Ranunculi montani primi species 1. Clus. pan. & hist.

III. Ran. alp. humilis rotundif. flore majore.

Ranunculus montanus minimus, Gesn. hort.

Ranunculi mont. primi species 2. Cl. pan & h.

Ranunculus montanus, Dod. ed. belg.

Flos interdum duplici foliorum serie constat.

I V. Ranunculus mont. hirsutus albus altior.

Ranunculus alpinus albo flore, Clus. pan.

Ranunc. mont. 2. vel secundi species 1. Eid. hist.

V. Ranunculus montanus hirsutus humilior Narcissi flore.

Ranunculi 2. alterum genus, Clus. pan.

Ran. montani secundi species altera, Eid. hist.

VI. Ranunculus montanus hirsutus purpureo flore.

Ranunculus montanus 3. Clus. pan. & hist.

Aconitum candidum ἀκανθον Dalech. Lugd.

Multum convenit cum Caryophyllata alpina quinquefolia majore: verum Caryophyllata radice est odora, flore pallide luteo in papum abeunte.

VII. Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore.

Ranunculus 4. Matth. Lac. Ges. hor. (dentur.

Aconiti 5. nomine Matth. & Lug. exprimere vi-

Ran. albus major, Ges. fr. syl. simp. fl. Ges. hor. ap.

Ranunculus maximus leucanthemon Thal.

leucanth. folio aconiti, Cam.

Ranunc. montanus 3. Cæs. 4. Clus. pan. & hist.

VIII. Ranunculus montanus Aconiti folio albo flore majore.

Ranunc. flore albo, vel Ranunc. 4. externus, Dod.

Ranunc. albus flore simplici, Lob. albus, Tab.

Ranunc. mont. albus, Lugd. alpinus albus, Ger.

Ran. montani quarti species alt. Cl. pan. & hist.

Aconitum batrachoides, Ad. Lob. ico.

Ranunculus 4. Diosc. esset, nisi magnitudo obstarer, Dod.

IX. Ran. mont. Aconiti folio flore globofo, Ranunculus sextus, Matth. Lugd.

Aconitum 3. Matth. Lac. Thal. Tab. cui & 5.

Aconitum lycoctonum 3. Lugd.

Anemone montana quædam, Gesn. hort.

Trollius flos, Gesn. fr. Clus. pan.

Ran. flore globofo, Dod. fr. Lug. Eyst. glomerato

flore, Cl. hist. globosus, Ger. sive montan. Cam.

Ranunc. mont. alp. glomeratus, Lob. mont. alter,

Ranunculus alpinus luteus, Tab. (Cæs.

Major ampliore fl. & quasi aureo: alter humilior, fl. minore, colore ex viridi pallescente albo reperiri scribit Tab.

Ranunculum alpinum album nominans.

X. Ranunc. mont. fol. Aconiti magno flore.

Ranunculus mont. major flore luteo, Eyst.

XI. Ran. geranij tuberosi fol. qui 5. in Prod.

XII. Ranunc. mont. latissimo folio hirsutus.

Ranunc. platyphyllos flore luteo, Clus. pan.

Ranunculus montanus 5. Eid. hist.

XIII. Ran. mont. subhirsutus geranij folio.

XIV. Ran. mont. lanug. folijs ranunc. prat. repentis: ille pro 6. hic pro 7. in Prod. describitur.

Ranunculus saxatilis.

I. Ranunculus saxatilis magno flore.

II. Ranunculus saxatilis folijs subrotundis: ille pro 8. hic pro 9. in Prodromo describitur.

III. Ranunc. saxatilis minimus hirsutus.

I V. Ranunc. villosissimus Monspeliascus: ille pro 10. hic pro 11. in Prodromo describitur.



## SECTIO QUARTA.

ACONITUM; DORONICUM; HELLEBORUS NIGER;  
HELLEBORUS ALBUS, ET HELLEBORINE.

### ACONITUM.

**A**κόνιτον Diosc. l. 4. c. 77. & 78. Aconitum Plinio, l. 27. c. 3. dictum, quoniam in nudis cantibus, quas aconas nominant, nascatur. Alij hanc nominis rationem attulere, quoniam vis eadem in morte esset qua cotibus ad ferri aciem deterendam statimq; admota velocitas sentiretur. At Theoph. 9. hist. 16. ἀκόνιτον appellat uni ab Aconis, pago quodam Mariandynorum, quoniam ibi precipue proveniat.

Genera duo Dioscoridi: alterum solijs Cyclamini, aut Cucumeris, quod παραλαίανχες, οἱ δὲ καμμήρον, οἱ δὲ θυλόφονον, οἱ δὲ μουκρόνον, οἱ δὲ θυροφόνον vocent. Alterū solijs effigie Platani, crebris divisuris, quod μυκρόντερον, alij λουκρόντερον appellant: cujus tria genera: unum quo venatores utuntur: alia duo, qua Medici in suum usum vertere, è quibus tertium Ponticum nominatur. Theoph. l. c. Aconiti unius folio intubacco, (forsan pro πικρῶδες, legendum βατρεχιδές) meminit. Plin. l. 27. c. 2. & 3. de Aconito egit: describit solijs cyclamini aut cucumeris: cammaron dici, propter radicem cammaro marino similem (forte rectius καμμήρον, quasi πακόμογον perniciōsum, ut est apud Homerum) alijs theopphoro: aliquibus scorpion, quia radix scorpionum modo incurritur: quibusdam mycelonon, quoniam nunc es o dōc necet.

1. Aconi-

I. *Aconitum unifolium luteum bulbosum*. Bulbosus unifolius aut bifolius batrachoides, elleboracea herbula, Ad.

*Bulbus parvus unifolius*, aut bifolius batrachoides, Lugd.

*Aconitum lycoctonum* lut. min. Dod. Lugd.

*Aconitum hyemale* Belgarum, Lob.

*Aconitum* 3. & *hyemale*, Cam. ep.

*Acon. hyemale* & *Ranun. monophyllos*, Cam.

*Aconitum aliud Dalechampi*, Lugd.

*Elleborine*, Cæsalp.

*Aconitum hyemale Ponticum*, Eyst.

II. *Aconitum lycoctonum luteum*.

*Luparia*, Trag.

*Aconitum secundum*, Matth. Lac. Lugd. Tab.

*Aconitum lycoctonon*, Cord. in Diosc.

*Aconitum* 2. vel *lycoctoni species* 1. Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum*, Lon. luteum, Fuch. Tur

Cam Thal. Eyst. majus, Dod. Lugd. *lycoctonum Ponticum*, Dod. gal.

*Aconitum lycoctonum vulgatius*, Clus. hist.

*Acon. luteum*, Gef. fr. Pontic. Ad. Lob. Tab. Ger.

*Napelli primum genus*, Cæf.

In montibus ampliore caule & folijs, alibi humiliore ac folijs minoribus: flos ex pallido luteus, interdum etiam pallidior.

III. *Aconitum lycoct. albis pallidisve florib.*

*Aconitum secundum flore albo*, Gef. hor.

*Aconitum sextum*, Cam. ep.

an *Aconitum sextum*, Matth. Lugd. Tab.

Matthiolo. flos purpureus: Camerario, albus. quibusdam pallidus, venulis livescens.

IV. *Aconitum lycoctonum folijs ferratis filiquis oblongis.*

*Aconitum lycocton. ex Cod.* Cæf. Dod. Lugd.

V. *Aconitum cæruleum hirsutum flore consolidæ regalis.*

*Aconitum cæruleum aliud*, Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum primum*, Clus. pan.

*Aconit. lycoct. fl. delphinij* 1. Eid. hist. Cam. Eyst.

VI. *Acon. cærul. glabrum fl. consolidæ regalis.*

*Aconiti genus floribus cæruleis*, Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum fl. Delphinij*, Dod. Lob.

*Aconitum secundum*, Clus. hist.

*Aconitum lycoctonum cæruleum* 1. fl. Delphinij, Lugd. an *Aconitum* 4. Matth. Lac. Lugd.

Matth. florem aureum; Cam. cæruleum tribuit.

VII. *Aconitum cæruleum napelli flore.*

*Aconitum lycocton. cæruleum secundum*, Dod.

*Acon. lycoct. 7. vel autumnale*, Clus. pan. & hist.

VIII. *Aconit. coma inflexa folijs angustiorib.*

*Aconitum* 7. Matth. Lugd.

*Acon. lycoct. 4. vel Lynceæanū*, Clus. pan. & hist.

IX. *Aconitum inflexa coma maximum.*

*Aconitum* 9. Matth. Lugd.

*Aconitum lycocton. coma nutante* 5. Clus. pan. octavum, Eid. hist.

X. *Aconitum cæruleum seu Napellus* 1.

Wsenhüttein/ Brunf. Trag.

*Napellus*, Matth. Lon. Dod. Cast. Lugd. Cam. arboreus, Eyst.

*Napellus verus cæruleus*, Ad. Lob.

*Napellus major latifol. & angustifol.* Tab.

*Napellus reticulatus*, Cæf.

*Aconitum lycoctonum cæruleum*, Dod. gal.

*Aconit. 2. vel lycoctoni species altera*, Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum* 6. Clus. hist.

*Aconitum cæruleum*, Gef. col. Thal.

Folij est latiorib. angustioribus, flore communiter cæruleo, aliquando purpureo, roseo, albo, & è cæruleo & albo colore variegatus, qui *Napellus flore variegato*, Eyst.

XI. *Acon. violaceum seu Napellus secundus.*

*Acon. lycoct. 2. vel præcox Tauricum*, Clus. pan.

*Aconitum lycocton. 4. Tauricum*, Eid. hist.

XII. *Aconitum purpureum seu Napellus* 3.

*Aconit. lycocton. 3. vel Neubergense*, Clus. pan.

*Aconitum lycocton. 5. Neubergense*, Eid. hist.

XIII. *Aconitum cæruleo purpur. flore maximo, sive Napellus* 4.

*Aconit. lycoct. 6. vel Judenbergense*, Clus. pan.

*Aconitum Judenbergense*, Eid. hist.

*Aconit. flore cæruleo, Napellus serotinus*, Cam. an *Lycoctonum sativū pentacarpon*, Cord. hist.

XIV. *Acon. cærul. minus, sive Napellus minor.*

*Aconitum lycocton. cærul. parvum*, Dod. Lugd. facie *Napelli*, Lob.

*Aconitum lycoctonum* 10. Clus. hist.

*Thora Italica*, Eid. pan. Cam.

In editioribus locis exilius provenit.

XV. *Aconitum ramosum parvo flore.*

*Aconitum octavum*, Matth. Lugd.

Floribus est luteis: Matth. purpurascens nitet: at Camerario rubescentibus.

XVI. *Aconitum racemosum: an Aëta Plin.* 1. 27. c. 7. Christophoriana, Gef. hor. Dod. Ad. Lob. Clus. hist. Tab. Cam. Ger. Eyst. & Costus niger quorundam.

*Barba capri* quibusdam, Cæf.

*Napellus racemosus*, Lugd.

XVII. Aco-

## XVII. Aconitum salutiferum, seu Anthora.

Anthora dicta quasi *ἀνθ' ἰσθμῶν*, quod Thoræ Alexipharmacum sit. Avicen. Napellus Moyſis & herba Napello similis, ejusq; veneno repugnās. Anthora, Matth. Gef. hor. Lon. Cæs. Cast. Cam. Anthora, Ad. Lob. Dod. Taber. Ger. vulgaris, Clus. hist.

Aconitum salutiferum, Gef. hor.

Flore est luteo: Tab. secundæ meminit, quæ solo floris colore cæruleo à priore differt: habet & tertiam ex Pandeſtario, folijs aſari crenatis, radice rotunda amara: sed quid est?

## ACONITUM PARDALIANCHES.

I. Aconitum pardalianch. i. seu Thora major. Pſeudoaconitum pardalianches, Matth.

Aconitum i. seu pardalianches majus, Gef. hor. Aconitum Ghini, Ang.

Limeum Plinij, Ang. Lugd.

Herba thora, limeū vocari falſo creditur, Guil. Tora venenata, Gef. lun. (pap.

Pthora Valdenſium, Ad. Lob. ico. Clus. hist.

Thora Valdenſis, Clus. pan. Caſt. Lugd. Cam. mas & ſœmina. Tab. Ger.

Tora major, Cam. ep.

Foliorum exortu, ſitu & numero variat: enaſcitur enim uno folio, duobus, idq; vel ſtatim à radice, vel nullo à radice, ſed in caule duobus majusculis, vel tribus, vel quatuor, vel quinq; ad ſummum: hinc Taber. ſœminam quatuor, marem duobus folijs magnis pingit.

## II. Acon. pardalianches alter. ſive Thora min.

Aconitum primum minus, Gef. hor.

Thora minor, Gef. de acon. Cam. ep.

Thora Valdenſis, Dod.

(Ger. Thora Sabaudica & Thora montis Baldi, Tab.

Limeum pardal. genus uno folio, Lugd.

Ranunculus grumofa radice 3. Clus. hist.

Hujus folia breviora ſupernè latiora & magis incifa, quàm Thoræ Valdenſis, vel è monte Baldo: hujus flos, Cluſio quinis folijs, illorum, quaternis dundaxat folijs exprimitur.

III. Aconitum pardalianches Dioſcoridis creditum Matthiolo.

Aconitum pardalianches, Matth. Lac. Dod. gal. Caſt. Lugd. Tab.

Aconitum Matthioli, an in rerum natura ſit dubitat, Gef. hor. & lun.

In Lugd. hist. primum Matthioli figura exhibitur: dein in append. iconi prius propoſitæ, ramulus floribus onuſtus adpingitur. Quod aliqui commentitium exiſtitant: Lug. hiftoriæ author, plantam in Allobrogibus naſci ſcribit: quid ſit ignoramus.

## Herba venenata &amp; earum antidota.

I. Ourari.

I. Turara.

II. Aparæpo.

II. Wape.

III. Coraſſi.

III. Cuturapama.

IV. Parapara.

IV. Macatto.

Hæ ſolo nomine, part. 8. Ind. Occid. propoſuntur, ſed quid?

## DORONICUM.

**D**oronici vox ab Arabibus petita, qui Doronigi ſive Durungi dicunt: hoc aliqui inter Aconita referunt, eò quod illo canes interficiantur: aliqui ab Aconito ſeparant ſiquidem ſine noxa uſi ſint: & licet canes interficiat, dantur & alia quæ brutis, non tamen hominibus obſunt; ut vulpes, Aloë ſaluberrima & Amygdalis amaris necari, Plutarchus auctor eſt.

## I. Doronicum radice dulci.

Acon. pardalianches Theophr. Matt. Lug. Tab.

Doronicum Auſtriac. alterum, Clus. pan. Cam.

Doronicum 3. Auſtriacum 2. Clus. hist.

Doronicum 2. longifolium, Tab. minus, Ger.

Doronicum radice repente, Eid.

## II. Doronicum radice ſcorpij brachiata.

Aconitum pardalianches Plinij, Matt. Dod. gal.

Lugd. Tab. alterum, Dod.

Doronicum brachiata radice, Lob. Lugd. Ger.

an Doronicum radice nigra, Col.

## III. Doronicum radice ſcorpij.

Aconitum pardalianches minus, Matth. Lugd.

Caſt. primum, Dod.

Doronic. Ang. Cord. hist. Gef. hor. Lon. Cæs. Eyſt.

Doronicum Romanum, Gef. hor. Lugd.

Doronicum alterum, Ad.

Doronicum primum, Tab. minus, Cam.

Doronicum majus, Ger.

Doronicum latifolium, Clus. pan. & hist.

Doronici tertij varietas, Ad. Lob.

Ob triplicem hanc Aconiti pardalianohis differentiam, triplicem eſſe Doronici varietatem, non ſine cauſa ſuſpicari licet.

## IV. Doronicum plantaginis folio.

Doronicum primum, Ad.

Doronicum minus officinarum, Lob. Lugd.

Doronicum anguſtifolium, Clus. hist.

V. Do-



V. *Doronicum plantaginis folio alterum.* Alisma, Matth. Cast. Cam. Eyst. alpinum, Gesn. hort. Thal.  
*Caltha alpina*, Gesn. hort. Tab.  
*Calendula alpina*, Ger.  
*Nardus Celtica altera*, Ad. Lob. Lugd.  
*Chrysanthemum latifolium*, Dod. Lugd. Ger.  
*Doronicum quintum Germanicum & 6. Pan-nonicum*, Clus. hist.  
*Damafonium sive Alisma*, Lugd.  
*Parmica montana*, Lugd.  
*Damafonium primum Diosc.* Tab.

Alij glabris, alij hirsutis folijs pingunt: ha-  
 tenus magis minusve hirsutis, licet diversis lo-  
 cis natus observavimus: sic floris color albus  
 est Matthiolo, ex pallido albicans, Cast. alijs lu-

teus, & rectè: in Styriæ pratis floribus cæruleis  
 reperitur.

VI. *Doronic. longifolium hirsutæ asperum.*  
*Doronicum primum vel minus*, Clus. pan.  
*Doronic. 2. Austriacum minus sive 1. Eid. hist.*

VII. *Doronicum latifolium flore magno.*  
*Doronicum Austriacum 3. Clus. pan.*  
*Doronicum 4. Striacum*, Eid. hist.

VIII. *Doronicum maximum folijs caulem*  
*amplexantibus.*

*Doronic. Austriacum 5. sive maximum*, Clus. pan.  
*Doronicum 7. sive Austriacum 3. Eid. hist.*

IX. *Doronicum Helveticum incanum.*

X. *Doronicum Helveticum humile, crassius*  
*folijs: illud pro 1. hoc pro 2. in Prodromo de-*  
*scribitur.*

## HELLEBORUS.

**E** ἡλὶβορ secundum Etymologicum dicitur, παρὰ τὸ ἐλεῖν τὴ βορὰ quod esu perimat.

Genera duo sunt Dioscoridi l. 4. c. 150. & 151. albus, folijs plantaginis, aut betæ sylvestris: niger qui & *μελαμπεδον* (quoniam *Melampus* caprarum pastor, suæ in se præti filias, hoc primus purgasse & sanasse fertur) folijs platani, Theoph. 9. h. 11. *Elleborus niger & candidus* æquivocè dicitur, cum alijs facie similes, sed radicis colore candido & nigro inter se differre censeant. Alij folium nigri laureum: candidi porraceum reddiderunt, radices autem similes, colore excepto. Niger ubiq; nascitur, sed optimus Helicone: et candidus locis paucissimis exit: optimi verò & usitatissimi quatuor sunt, Oetum, Ponticum, Eleaticum, Massalioticum. Et quàmvis formâ convenient, vires tamen proprias sortiuntur: nigrum, ab eo qui comperit & primo succidit, *Melampodium* quidam appellant; hæc Theophrastus. Plin. l. 25. c. 5. Genera prima duo sunt, candidum & nigrum: hoc de radicibus tantum intelligi tradunt pleriq;: alijs folia nigri, platano similia, sed minora nigrioraq; & pluribus divisuris scissa: albi, betæ incipientis, &c. Latinus *Veratrum* quod mentem vertat.

### HELLEBORUS NIGER.

#### I. Helleborus niger foetidus.

*Enneaphyllon* Plinij l. 27. c. 9. quod longa folia novena habere videtur.

*Pedicularia foetida* 3. Trag.

*Elleborus niger sylv. adulterinus*, Trag. Fuch. Lugdun.

*Lycostonum primum*, Dod. gal.

*Consiligo*, Ruel. Gesn. hor. Lon. Ger.

*Consiligo sylvestris*, Tur.

*Pulmonaria Vegetij*, Gesn. hort.

*Helleborus niger alter, vel Helleborine major*, Cord. hist.

*Veratrum nigrum tertium*, Dod. Clus. hist.

*Sesamoides magnum* Cordi, Lob.

*Helleboraster*, Ad. maximus, Lob. Ger.

*Helleborastrum magnum*, Tab.

*Enneaphyllon* Plinij, Cæs.

Magnitudine variat: hinc *Helleborastrum*  
*magnum & minus*, Tab. at Ger. sub *Consiligine*

*Ruellij & Helleboro maximo* proponit.

#### II. Helleborus niger hort. flore viridi.

*Consiligo* Plinij l. 26. c. 7. videtur.

*Helleborus niger*, Brunf.

*Elleborus niger adulterinus domesticus*, Trag.

*Elleborus niger adulterinus hortensis*, Fuch.

*Elleborus niger alter*, Matth.

*Elleborus niger vulgaris*, Gesn. hor. Cæs.

*Pseudohelleborus niger*, Dod. gal.

*Consiligo*, Tur. minor, Lugd.

*Helleborus niger nostras*, Cord. hist.

*Veratrum nigrum*, Cord. in Diosc. secundum,  
*Lac. Dod. Clus. pan. & hist. Tab.*

*Elleborus niger tertius Dodonæi & Matthio-*  
*li*, Lugdun.

*Helleboraster alter*, Ad.

*Helleborastrum*, Lob. Ger.

Hujus radice multi in Medicina utuntur.

#### III. Helleborus niger hortensis alter.

*Veratrum nigrum 4. peregrinum*, Clus. hist.



Hujus folia atriora, florum oræ ex purpura nigricant.

IV. *Helleborus niger* flore roseo.

*Elleborum nigrum*, Matth. Cast. Lugd. Cam.

*Planta leonis*, Dod. gal.

*Elleborus niger* fl. magno purpureo, Gef. hor.

*Helleborus niger*, Ad. Lob. *niger* 2. *Dodonæi*, Lugdun.

*Veratrum nigrum*, Dod. legitimum, Clus. pan. *Stiriacum*, Tab.

*Ellebori nigri* alterum genus, Cæs.

*Elleborus niger annuus*, Ang. *niger legitimus*, Clus. hist. *niger verus*, Ger.

Flore est purpureo, candido: sic flos initio albidus, dein purpurascens, postremo virens; & qui albo flore marcescens purpurascit: flos albescit cum aliqua diluta rubedine.

V. *Helleborus niger* *Saniculæ* folio major.

*Osteritium montanum*, Trag.

*Sanicula* foemina adulterina, Eid.

*Sanicula* foem. Fuch. Gef. hor. Lugd. Clus. hist.

*Veratrum nigrum* *Dioscoridis*, Dod. Lac. Eyst. *nigrum* 2. Clus. pan.

*Astrantia nigra*, Gef. hor. Ad. Lob. Ger.

*Imperatoria nigra*, Tab.

*Elleborus niger* *Dodonæi*, Lug. verus *Dioscoridis* *Dodonæo*, sed fallitur, Gef. hort.

VI. *Helleborine* *Saniculæ* folio minor, in Prodomo describitur.

VII. *Helleborine* *Saniculæ* facie.

*Epipactis*, Matth. Lac.

*Elleborine*, Matth. Lugd. Tab.

*Helleborine* *Matthioli* commentitia, Ad.

*Elleborine alpina* *Saniculæ* & *Ellebori nigri* facie, Lob.

VIII. an *Elleborinæ* nigrae species.

*Polyrrhizos* *Plinij* *Dalechampi*, Lugd.

IX. *Helleborus niger* tenuifolius *Bupthalmi* flore.

*Elleborus niger verus*, Trag. Lon.

*Pseudoelleborum*, Matth. Lugd.

*Bupthalmum*, Ang. *Dodon.* Clus. pan. & hist. Lugd. Cam.

*Helleborine tenuifolia*, Cord. hist.

*Elleborastrum nigrum*, Gef. hor. Cam.

*Helleborus ferulaceus*, Ad.

*Helleborus niger ferulaceus* *Theoph.* Ad. Lob.

*Elleborum alterum*, Cast.

*Helleborus Hippocratis*, Tab.

*Sesamoides minus*, Cord. in *Diosc.* Gef. hor.

*Ellebori nigri* species quibusdam, Gef. hor.

HELLEBORUS ALBUS.

I. *Helleborus albus* flore subviridi.

*Elleborus albus*, Brunf. Trag. Fuch. Cord. hist. Gef. hort. Ang. Lon. Lugd. Cam. Clus. hist. fl. herbaceo, Eyst.

*Helleborum album*, Matth. Ad. Lobel. Cæs. alp. Castor.

*Veratrum album*, Dod. gal. Tur. Lac. Cord. in *Dioscorid.*

*Helleborus candidus* *Græcorum*, est *Confiligo* *Vegetij*, *Abfyrri*, *Columel.* & *Plinij*, Guil.

Flore est in viridi albescente *Taber.* qui iconem sequentis habet: dein flore pallide flavescente, & alterum eodem colore, nisi quod flos racemi instar coactus sit, quem *Elleborum album* foeminam.

*Helleborum album* præcoccem Ger. nominat. Mas durior, foemina mollior.

II. *Helleborus albus* flore atrorubente.

*Helleborum album* floribus atrorubentibus præcox, Lob.

*Helleborus albus* alter fl. nigricantibus, Dod. flore ex purpura nigricante, Clus. hist.

*Ellebori albi* alterum genus, Cæs.

*Hellebor. albus*, Ger. flore atrorubescens, Eyst. mas, Tab. ico.

Ex radicibus *Ellebori albi*, Hispani venenum conficiunt, de *Balestera* & de *Jerva* vocatum, quod idem quod *Pharicum* dictum, aut parum omnino ab eo differens. Et *Limeum* herbam à *Gallis* appellatam, ab *Elleboro* non discrepare, suspicari possumus. Guil. pap.

HELLEBORINE.

I. *Helleborine* latifolia montana.

*Satyrion octavum*, Trag.

*Helleborine*, Dod. Ad. Lob. Lugd. Ger. 1. Tab. recentiorum 2. Clus. hist.

*Damaconium* *Calliphyllo*, Cord. hist.

*Epipactis* sive *Elleborine*, Cam. ep.

*Sigillum Salomonis*, Cæs.

*Epipactis latifolia*, Eyst.

Foliorum amplitudine (& quod altera folijs oblongis acutis, altera verò subrotundis est) & floris colore variat.

II. *Helleborine* altera atrorubente flore.

*Alisma botryodes* seu racemosum, Thal.

Variat foliorum amplitudine: florum colore atrorubente, rarius candido.

III. Helle-

III. Helleborine angustifolia palustris sive pratenfis.

Elleborine 2. Clus. pan. recentiorum 3. Eid. hist.

IV. Helleborine flore carneo.

Elleborine 3. Clus. pan. 4. Eid. hist.

Sigillum S. Mariæ alterum, Cæf.

V. Helleborine flore albo, vel Damafonium montanum latifolium.

Alisma quorundam, Cord. hist.

Alisma cymbalanthemon, Thal.

Helleborine albo flore, Tab. Ger.

Epipactis angustis folijs, Eyst.

VI. Helleborine montana angustifolia spi-

Elleborine 4. Clus. pan. 5. Eid. hist.

VII. Helleborine montana angustifolia

purpurascens.

Damafonium tenuifolium, Cord. hist.

Elleborine 5. Clus. pan. 6. Eid. hist.

Alisma tenuifolium, Thal.

Damafonium alpinum, Lugd.

Sigillum S. Mariæ 3. Cæf.

Helleborine angustifolia, Tab. Ger.

Flore luteo reperiri Lugd. auctor est.

VIII. Elleborine 7. Clus. hist.

IX. Helleborine fl. rotundo, sive Calceolus.

Alismatis species flore ferrugineo, Gefn. hort.

Lonchitis prior, Dalech. in Diosc. Ama.

Damafonium nothum, Dod. gal.

Calceolus Marianus, Dod.

Pseudodamafonium, Clus. pan.

Calceolus Mariæ, Ad. Lob. Eyst.

Elleborine recentiorum 1. Clus. hist.

Elleborine ferruginea Dalechampij, Lugd.

Alisma *ωάνθημον* aut *κοιλάνθημον*, Thal.

Flore est luteo, sed folia adjuncta ferruginea: reperitur & albo & utriculo purpureo: apud Helvetios flore est duplo majore, quam apud Noricos.

X. Helleborine Indica floribus candidis.

Elleborines fortè genus, Clus. exot. l. 4. c. 20.



## SECTIO QUINTA.

GENTIANA; PLANTAGO; HOLOSTIUM;  
CORONOPUS; PSYLLIUM.

### GENTIANA.

**G**ENTIANA Dioscoridi, l. 3. c. 3. quæ ab inventore Gentio Illyriorum rege, qui primus in bello ejus vires reperit, denominata. Diosc. est folijs juglandi, plantaginive similibus: at Plinio. l. 25. c. 7. folijs fraxini.

Verùm Gentiana alia sunt radice perenni, alia fugaci: illa, flore & semine prolato, interire non solent, sed singulis annis ex eadem radice, nova germina produciunt: hæ verò, flore emarcido, & semine disperso, hyeme intereunt, & ex semine renascuntur.

*Gentiana alpina major.*

I. Gentiana major lutea.

Gent. Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Dod.

Cord. in Diosc. & hist. Gefn. Lon. Cæf. Cast. Lug.

Gentiana major, Matth. Gefn. hort. ap. Ad. Lob.

flore luteo, Cam.

Gentiana veterum, Clus. hist.

Gentianæ 1. species, Trag.

Reperitur quoque florib. flavis, imò & albis, punctis carentibus campanulæ forma, in Pyre-

II. Gentiana major purpurea. (uæis.

Gentianæ 2. species, Trag. Dod. gal.

Gent. punicea, Gefn. fr. purpureis floribus, Lob.

Gentiana major alia, Cam. ep. (ob.

Gent. major fl. purpureo, & 1. Clus. pan. & hist.

III. Gentiana major flore punctato.

Gent. major pallida punctis distincta, Clus. pan. & hist.

Variat floris colore pallido: reperitur & cæruleo, quæ

Gentiana major cæruleo flore, Clus. hist.

IV. Gentiana asclepiadis folio.

Gentiana 3. Trag. Dod. gal.

Gentiana folijs hirundinariæ, Gefn. hort. sive

Asclepiadis, Clus. pan.

Gentiana 2. cæruleo flore, Clus. hist. Tab.

Gentiana minor altera, Dod.

Vincetoxicum 1. Cæf.

Flore est cæruleo saturato, nunc purpureo, nunc delicatiore & velut cinerei coloris.

*Gentiana alpina minor sive Gentianella.*

I. Gentianella alpina larifolia magno flore, quæ in Prodromo descripta est.

II. Gentianella alpina angustif. magno flore,

Gentiana 4. Trag.

Gentianella alpina, Gefn. hort. pumila, Gefn. car.

Gentianella campanulæ flore purpureo, Ad.  
Gentiana 5. & Gentianella verna major, Cluf.  
pan. & hist.

Gentianella Helvetica, Lob. ico.

Gentianella minima latifolia, Lugd.

Helleborine Dalechampia ad Diosc.

III. Gentianella alpina verna major.

Hippion, id est, Viola equina, Cord. ob. Gesn.

Calathiana verna, Gesn. hort. (hort.

Gentianella verna minor, Cluf. hisp. & hist.

Gentiana 6. Cluf. pan.

Gentianella alpina, Lob. Bavarica, Cam. hort.

Gentianella angustifolia, Lugd.

Gentianella minima verna fl. cæruleo, Eyf.

Vincetoxici species pusilla, Cæs.

Flos plerisque cæruleus, quibusdam candidans.

IV. Gentianella alpina verna minor.

Gentianella minor, Cam. hort.

an Gentianella purpurea minima, Col.

V. Gentianella alpina æstiva centaureæ minoris folijs.

Gentiana fugax 5. seu Gentiana 11. Cluf. pan. & hist.

Gentiana minor, Tab.

Calathiana verna Dalechampij, Lugd.

VI. Gentianella brevis folio.

Gentiana minima, Ad. Lob. Cast.

Gentiana fugax 4. vel Gent. 10. Cluf. pan. & hist.

Vulneraria herba, Cast. ico.

VII. Gentianella cærulea oris pilosis.

Gentianella cærulea fimbriata angustifolia autumnalis, Col.

VIII. Gentianella omnium minima: in Prodromo descripta.

#### *Gentiana pratensis.*

I. Gentiana cruciata.

Herba fullonum, Brunf.

Cruciata, Trag. Fuch. (cui & Gentianæ species) Dod. Ang. Gesn. hort. Lac. Lon. Lugd. Eyf.

Gentiana cruciata, Gesn. hort.

Gentiana minor, Matth. Ad. Lobel. Cast. Tab. media, Cam.

Gentiana 3. quæ duplex, Cluf. pan. & hist.

Cruciata gentianella, Thal.

Vincetoxicum alterum, Cæs.

Altera est procumbens & minor: altera erecta & major: alterius flores intensè cærulei: est & tertia radice non pertusa,

II. Gentiana autumnalis ramosa.

Gentiana fugax sive annua 1. vel Gentiana 7. Cluf. pan. & hist.

Gentiana 7. Tab.

Viola calathiana altera, sive polyanthemus, Thal.

Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo purpurascens, Eyf.

Flore est cæruleo purpurascens, rarius candido.

III. Gentiana pratensis flore lanuginoso.

Gentiana fugax altera sive Gentiana 8. Cluf. pan. & hist.

IV. Gent. pratensis flore brevior & major. Gentiana fugax 3. sive Gentiana 9. Cluf. pan. & hist.

V. Gentiana utriculis ventricosis.

Gentianella cærulea cordata, Col.

VI. Gent. angustifolia autumnalis major.

Pneumonanthe, Lob.

Calathiana viola autumnalis minor, Gesn. hort.

Calathiana autumnalis, Gesn. cat.

Campanula autumnalis, Dod. Eyf.

Gentiana 4. sive angustifolia 2. Cluf. pan. & hist.

Flore est cæruleo dilutior: est nigro: rarius albo.

VII. Gentiana angustifolia autumnalis minor, floribus ad latera pilosis.

Pneumonanthe, Cord. hist. desc. Ad.

Viola calathiana autumnalis prima, Thal.

Gentianella autumnalis folijs centaureæ minoris flore cæruleo, Eyf.

#### *Gentiana palustris.*

I. Gentiana palustris angustifolia.

Gentiana minima, Matth. Cast. desc.

Calathiana viola in pratis udis, Dod. gal. Lugd.

Calathiana viola autumnalis, Gesn. hort.

Pneumonanthe (in humentib. ericetis) Lob. ob. Tab. Ger.

Gentiana angustifolia, vel 4. Cluf. pan. & hist.

Cruciata sive Gentiana minima, Lugd.

Campanula pratensis, Lugd.

Floris color cæruleus, violaceus, purpureus.

II. Gentiana palustris latifolia flore punctato.

Gentiana 12. & punctata, Cluf. pan. & hist.

Alisma folio glabro, in Phytopinace.

Floribus est subcæruleis, purpureis, violaceis, punctis aspersis.

## P L A N T A G O.

**P** *Lantago ἀνόγλωσσον* Diosc. lib. 2. cap. 153. à forma, id est, lingua agnina dicitur: alijs πολύνευς & multinervia & ἐπῆπλευς & septinervia. Latinis, plantago, à planta ducto nomine.

*Plantago latifolia.*

I. *Plantago latifolia glabra*: quæ 1. in Prod.

II. *Plantago latifolia sinuata.*

*Plant. rubra*, Brunf. Trag. (vel major & 1.) Lon.

*Plantago major*, Matth. Fuch. Tur. Gesn. hort.

Dod. Cast. Tab. Cam. major latifolia, Ang.

*Plantago latifolia*, Cord. in Diosc. Ger. latif. lævis, Ad. Lob. ico. vulgaris latifol. Eid. obs. Lugd.

*Plantago* & *Centinervia*, Cæf.

*Plantago πολύνευς* & major sive rubra, Thal.

III. *Plantago latifolia incana.*

*Plantago major*, Brunf. Matth. Lon. Lug. Cam.

*Plantago latifolia*, vel media & 2. Trag.

*Plantago media*, Fuch. Dod. Gesn. hort. Thal.

*Plantago major incana*, Ad. Lob. Clus. hist.

*Plantago minor*, Tur. minor Dioscoridis, Tab.

*Plantago incana*, Ger.

*Cynoglossa* quorundam, Lugd.

IV. *Plantago latifolia rosea*, flore expanso.

*Plantago rosea*, Cam. Ad. Lob. ico. Eyst.

*Plantagini* majori florem addidit, Camer. in

*Plantago rosea* exotica, Cer. (Matth.

V. *Plantago latifolia rosea*, floribus quasi in spica dispositis.

*Plantago rosea*, Ad. Lugd.

*Plantago multiplex*, Tab.

*Plantago rosea spicata*, Ger. Eyst.

Hujus spicam, Cam. in Matth. *Plantagini*

majori, & Lob. in icon. *Plantagini* roseæ ad-

jecit. Unam esse, & differentiam in flore-  
ndi solum tempore consistere, censemus.

VI. *Plant. latifolia spica multiplici sparsa.*

*Plantago major altera*, Dod. gal.

*Plantago major spica multiplici*, Dod.

*Plantago paniculā sparsā Sarothrodes* & *Co-*

*rematophora*, sive *Scoparia*, Gemmæ, Lob.

*Plantago rosea* Lobelij, Lugd.

VII. *Plantago Indica.*

Payco, herba ex Peru, Monar. Lugd.

VIII. *Plantago peregrina sinuosa.*

*Plantago umbilicata*, latifolia & convoluta,

Lob. ad. par. 2.

IX. *Plantago latifolia incana spicis varijs.*

*Plantago peregrina latifolia* Gareti, Clus. hist.

Capitula varia: quædam rosam æmulantur,

quædam spicam: quædam ex media rosa bre-  
vem spicam producant: in alijs ex spicæ parte  
infima, alia capitula dependent.

X. *Plantago villosa*, seu incana lanuginosa.  
*Plantago Salmaticensis*, *Cynoglossum* fortè  
Diosc. Clus. hisp. & hist.

XI. *Plantagini Hispanicæ* similis.

*Planta* quæ *Alexipharmacum* est: in Epist. ad  
Monard.

XII. *Plantago latifolia glabra minor.*

*Plantago latifolia minor*, Tab. Ger.

XIII. *Plantago latifolia hirsuta minor.*

*Plantaginis* mediæ genus minimum, Thal.

*Plantago angustifolia.*

I. *Plantago angustifolia major.*

*Plantago minor*, Brunf. Fuch. Dod. Gesn. hort.

Lac. Lon. Lugd. media, Cast.

*Plantago lanceolata*, Trag. Ang. Tab.

*Plantago longa*, Matth. Lugd.

*Plantago quinquenervia*, Ad. Lob. Ger. πένθεν-  
ς & Thal.

*Lanceola* major, Cæf.

Variat: spicis aliquando bifidis: aliquando  
loco spicarum sunt capitula, mirè variantia.

II. *Plantago angustifolia major*, caulium  
summitate foliosâ.

*Plantago quinquenervia rosea*, Ger.

III. *Plantago angustifolia prolifera.*

*Plant. angustifol.* Gazetti, vel exotica, Clus. hist.

IV. *Plant. angustifolia ferrata* Hispanensis.

*Plantago angustifolia altera*, Clus. cur. post.

V. *Plant. angustif. fruticans*, Clus. cur. post.

VI. *Plantago angustifolia minor*, Tab. Ger.

*Plantago pentaneuros minor*, Thal.

*Lanceola* minor, Cæf.

VII. *Plantago pilosa bulbosa.*

*Plantago Apula laciniata bulbosa*, Col.

VIII. *Plantago angustifolia paniculis la-*  
gopi, quæ 4. in Prod.

an *Planta peregrina plantagini acutæ* similis,  
quæ Græcis *καλάνχνη* dicitur, Rauvv. Lugd.

Variat, modo paniculis lagopi est: modo ca-  
pitulis rotundis, hirsutis, albis.

IX. *Plantago trinervia* fol. angustissimo:  
3, in Prod.

X. *Plantago trinervia montana.*

*Plantago altera minima trinervia montana incana, Col.*

*Plantago aquatica.*

I. *Plantago aquatica latifolia.*

*Plantago aquatica, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Gefn. hort. Lon. Ad. Lob. Cast. Thal. Cæf. Lugd. Tab. Ger.*

*Limonium, Ang.*

*An huc referendum*

*Alisma five Damasoniū, quæ Fistula pastoris &*

*Plant. aquatica Germanis, Cord. in Dios. Lon?*

II. *Plantago aquatica angustifolia.*

*Plant. aquat. humilis angust. & longifolia, Lob.*

*Plantago aquatica minor, Cæf. Tab.*

*Plantago aquatica humilis, Ger.*

III. *Plantago aquatica stellata.*

*Alisma pusillum angustifoliū muricatum, Lob.*

*Plant. aquatica minor altera, Lob. ico. (ob.*

*Damasonium stellatum, Lugd.*

IV. *Plantaginella palustris.*

*Plantago aquatica minima, Clus. hist.*

## H O L O S T E U M.

**O** *Λόγιον Dioscorides, lib. 4. cap. 11. descripsit : & Plinius, lib. 27. cap. 10. inquit, Holosteum sine duritia est herba ex adverso à Græcis appellata, sicuti fel dulce.*

I. *Holosteum hirsutum albicans majus.*

*Holosteum Salmaticum prius, Clus. hisp. majus, Eid. hist. Lob.*

*Holost. Salmaticense Clusij, Lugd. Cam. Ger.*

*Holosteum majus, Tab.*

*Holosteum quorundam, Cam. in Matth.*

*Plantago angustifolia albida, Dod.*

II. *Holosteum hirsutum albicans minus.*

*Holosteum Salmaticense minus, Clus. hist.*

*Holost. parvum Monspeliense, Ad. Lob. Ger.*

*Holosteum Monspelianum, Tab.*

III. *Holosteum hirsutum nigricans.*

*Holosteum quorundam, Lugd.*

*an Lanceola montana, Gefn.*

IV. *Holost. five Leontopodium Creticum:*

*in Phyt. & Prod. descriptum*

*Leontopodium Creticum, Clus. hist.*

*Leontopodium legitimum, quod Catanance creditum, Imperato.*

*Leontopodium, Catanance non est, Belli ep. 1. ad Clus.*

V. *Holosteum Creticum alterum.*

*Leontopodium Creticum aliud, Clus. hist.*

*Habbures, Cam.*

*Gorne albi catartici nomine Alpinus misit.*

*an Planta Plantagini similis, Lugd. ap.*

VI. *Holosteum strictissimo folio majus.*

*Coronopus five Serpentina, Matth.*

*Coronop. syl. Matth. Gefn. Lob. Lug. Cast. Tab.*

*Serpentina, Dod. Ad.*

*Plantago marina, Cam.*

*Coronopus, Ger. ico. montanus, Cæf.*

VII. *Holosteum strictissimo folio minus.*

*Serpentaria omnium minima, Lob. Dod. Lugd.*

*Coronopus altera, Cæf. minor, Tab.*

*Coronopus five Serpentina minima, Ger.*

VIII. *Holosteum Mafsilienfe.*

*Coronopi & Sedi montani media planta Mafsilienfium, Ad. Lob.*

*Coronopus Mafsilienfium, Lugd. Tab.*

*Coronopus five Serpentina minor, Ger.*

IX. *Holosteo affinis, Cauda muris.*

*Coronopus sylvestris, Trag.*

*Myosuros, Dod. gal. Lob. ico. quorundam, Thal.*

*Cauda muris, Dod. Ad. Lob. Lug. Tab. Cam. Ger.*

*Holosteon, Lon. Lugd. Cam. Thal.*

## C O R O N O P U S.

**K** *Κορώνπος Dioscoridi, lib. 2. cap. 158. & Theophrasto 7. hist. 9. ubi Gaza Silaginem vertit : Plinio, lib. 21. c. 16. & l. 22. c. 19. Coronopus dicitur. Latinus, pes cornicis à foliorum forma : & cornu cervi, nominatur.*

I. *Coronopus hortensis.*

*Coronopus, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.*

*Lon. Ad. Tab. Eyft.*

*Coronopus sativus, Cord. hist. Cast. Cæf. Cam.*

*verus, Cord. in Diosc. Gefn. hort.*

*Pseudocoronopus, Dod. gal.*

*Cornu cervinum, Lob. Ger.*

*Herba stella, five cornu cervinum, Dod.*

II. *Coronopus sylvestris, hirsutior.*

*Coronopus sylvestris, Cæf.*

*Coronopus Prochytae, Col.*

III. *Coronopus maritima major.*

*Plantago marina, Dod. gal. Ad. Lob. Tab. Ger.*

*Plantago maritima, Gefn. hort. Lugd.*

*Plantag.*

Plantago angustifolia, Dod.

Bibinella, Cæf.

Coronopus marinus, Cam.

IV. Coronopus maritimus tenuifol. lævis.

Coronopus minimus tenuifolius maritimus, Colum.

V. Coronopus maritimus minimus hirsutus: in Prod. descriptus.

## P S Y L L I U M.

**ΨΥΛΛΙΟΝ** Dioscorides lib. 4. c. 70. folijs Cornopo non dissimilibus scribit, hisutis, longioribus: sic dictum quod ψύλλας, id est, pulices, si virens domum importetur, in ea gigni non sinat: vel ut Dioscoridi & Plinio, à semine pulici simili. Theophrasto 7. hist. 8. νύκτα dicitur: oculum canis & canariam Gaza vertit, Plinium fortè imitatus, qui l. 25. c. 11. Psyllium & Cynicides nominavit, Latinis pulicaria.

I. Psyllium Dioscoridis, vel Indicum crenatis folijs: pro 1. in Prod. descriptum.

Psyllium primum, Ang.

II. Psyllium majus supinum.

Psyllium alterum, Matth. Cast. Lugd. Tab.

Psyllium perenne, Gef. hist. an Cam.

Psyllium Plinianum fortè, majus radice perenni supinum, Ad. Lob.

Psyllium tertium, Ang. majus, Cæf.

Psyllium semper virens, Ger.

III. Psyllium majus erectum.

Psyllium, Trag. Matt. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. & hist. descr. Dod. Gef. hor. Ad. Lob. Cast. Ger.

Cynops Theophrasti, Gef. hort.

Pulicaris herba, Lugd.

Psyll. minus, Cæf. secundum, Ang. primū, Tab.

IV. Psyllium minus, quod Gottne rubri & Botrio rubro nomine accepimus, & pro 2. in Prodr. descr.

an Kaly 3. Alpini, minus rectè pictum.

\*\*\*\*\*

## S E C T I O S E X T A.

PYROLA; BISTORTA; LIMONIUM; POTAMOGETON; NYMPHÆA; TRIBULUS AQUATICUS; SAGITTA; DRACONTIUM;

Arum; Arisarum; Afarum; Tussilago; Petalites;

Cacalia & Lappa.

## P Y R O L A.

**Pyrola**, nomen à folio, quod pyri folium referat, accepit: quam aliqui Limonium, alij Britannicam volunt.

I. Pyrola rotundifolia major.

Pyrola Brunf. Matth. Ang. Dod. Gef. hort. Ad. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger. Eyf.

Pyrola vulgarior, Clus. hist.

Limonium, Fuch. Tur. sylvestre, Trag.

Limonium & Pyrola, Lon.

Beta sylvestris, Cord. in Diosc.

Pyrola major sive Beta sylv. Thal.

Pyrola alia in campestribus, Cæf.

Hæc folio est vel ampliore molliorque: vel minore & duriore.

II. Pyrola rotundifolia minor.

Pyrola quarta minima, Clus. pan. & hist.

Pyrola minima, Eyf.

III. Pyrola folio mucronato serrato.

Ambrosia, Dalech. in Diosc. montana, Lugd.

Pyrola 2. & tenerior, Clus. pan. & hist.

Pyrola minor, Thal.

Pyrola pannonica 2. Cam.

IV. Pyrola alfine flore Europæa.

Herba orientalis, Cord. ob. Franc.

Alsinanthes, Thal.

Alfine alpina, Svvenck.

Major est & minor, ut & sequens.

V. Pyrola alfine flore Brasiliana: in Prod. descr.

VI. Pyrola frutescens arbuti folio.

Pyrola 3. vel frutescens, Clus. pan. & hist.

BISTOR-



## B I S T O R T A.

**B**istorta dicitur, quod radice in se contorta & convoluta constet: quam alij Limonij, alij Britannica, alij Behen rubri speciem faciunt. Hujus Plinius l. 24. c. 16. & l. 25. c. 11. inter Dracontia meminisse videtur: forè ejusdem l. 25. c. 13. Molybdana, id est, Plumbago, quod plumbum, oculi virium tollat.

I. Bistorta major radice minus intorta.  
Colubrina & Dracunculus major, Brunf.  
Bistorta foemina, Eidem.  
Bistorta major, Trag. Dod. gal. Ang. Gef. col. Ad.  
Thal. Tab. Ger. Cluf. hist.  
Bistorta, Cord. in Dioscor. & hist. Matth. Dod.  
Cæs. Cast. Lugd.  
Bistorta Britannica, Lob.  
Serpentaria foemina & Colubrina, Fuch.  
Colubrina, Lon.  
Limonium, Gef. hort.  
Bulaparthum seu Bistorta, Fracast.  
II. Bistorta major radice magis intorta.  
Colubrina & Dracunculus minor, Brunf.  
Bistorta mas, Eidem.  
Colubrina minor, Trag.  
Serpentaria mas seu Bistorta, Fuch.  
Bistorta, Lon. minor, Dod. gal. Gef. ho. Lac. Tab.

Bistorta media, Ang.  
Bistorta latifolia, Ger.  
Bistorta major, Eyst.  
In folijs & radice differentiae: folia alteri  
majora & rugosa: alteri minora & laevia: &  
hujus radix magis intorta: illius major, minus-  
que complicata.  
III. Bistorta alpina maxima: in Prod. desc.  
& Schvvenck.  
IV. Bistorta alpina media.  
Limonij species minor, Gef. hort.  
Bistorta minor, Ad.  
Bistorta minor seu alpina, Camerar. in Mat-  
thiolo.  
V. Bistorta alpina minor.  
Bistorta minor, Ang. Cluf. pan. Ger.  
Bistorta alpina minor, Cluf. hist.  
Bistorta minima alpina alia, Cam.

## L I M O N I U M.

**Λ**ιμόνιον, νερποειδής Dioscoridi l. 4. c. 16. quod εἰ λεμῶσι in pratis (quamvis & in palustribus) proveniat.  
Plinio l. 20. c. 8. Beta sylvestris, quam Limonium vocant, alij neuroides.

I. Limonium maritimum majus.  
Limonium, Matth. Lac. (cui & Been rubrum)  
Ad. Lob. Cæs. Cast. Lugd. Ger.  
Been rubrum, Limonio seu Bistortæ cognata,  
Gefn. hort.  
Behen rubrum officinarum, Guil.  
Valerianæ rubræ similis, Dod.  
Limonium primum, Tab. Cam.  
II. Limonium alterum, Matth. Lugd. Tab.  
cui & Pyrola: quid est?  
Limonium Matthioli secundum, Ad.  
III. Limon. maritimum minus oleæ folio.  
Limonium parvum Narbonense oleæ folium,  
Ad. Lob. ico. Tab.  
Limonium parvum Narbonense, Lugd. Cam.  
Limonium alterum exiguum, Cæs.

Limonium parvum, Ger.  
In hoc magna varietas occurrit.  
IV. Limon. parvum bellidis minoris folio.  
Limonium pumilum, Cluf. hist.  
V. Limonium maritim. minus foliolis cor-  
datis: quod 1. in Prod.  
VI. Limonium maritim. minimum: quod  
2. in Prodr.  
VII. Limonium peregrinum folijs asplenij.  
Limonij elegans genus, Rauvv. & Lugd. ap.  
Limonium peregrinum, Cluf. cur. post.  
Limonium Syriacum, Eyst.  
Cichorium globulare, Imper.  
VIII. Limonium peregrinum folijs forma  
flore Aristolochiæ.  
Limonio congener, Cluf. hist.

## P O T A M O G E T O N.

**Π**οταμογενών, quasi fluminibus vicina, quod palustribus & aquosis nascatur, Diosc. l. 4. c. 101. & Aeliano,  
l. 6. anim. c. 46. quo herinaceum interfici scribit, Σταχύτης, quasi spicata, ob caulem, quem floribus & se-  
mine spicatum ex se mittit. Plinio, l. 26. c. 8. Potamogeton folijs Beta & c. subjungit: Castorem hanc aliter novisse  
tenui folio veluti equinis setis, thyrso longo & laevi, in aquosis nascentem: hoc Myriophyllum aquaticum videtur:

I. Pota-



I. Potamogeton rotundifolium.  
Potamogeton, Trag. Matt. Fuch. Ang. Lac. Lon.  
Cæs. Cast. Lugd. Tab.  
Potamogeton, Dod. gal. latifolium, Ger.  
Potamogeton, *Λιόφυλλον*, Thal.  
Potamogetoni similis rotundiore folio, Cord.  
in Diosc.

II. Potamogeton, Salicis folio.  
Phyllitis lacustis, Cord. hist.  
Potamogeton, Dod.  
Potamogeton, sive fontalis & spicata, Ad. Lob.  
icon.  
Potamogeton 2. Dalechampi, Lugd.  
Potamogeton *ιτιόφυλλον*, Thal.  
Potamogeton angustifolium, Tab. Ger.

III. Potamogeton longo ferrato folio.  
Lapathi genus sylvestre, Ges. hort.  
Oxylapathum aquaticum, Lugd.

IV. Potamogeton folijs laris splendentibus.  
Potamogeton altera, Dod.  
Potamogeton *μικροφυλλον*, Thal.  
Habetur major & minor species.  
V. Potamogeton folijs angustis splenden-  
tibus.

Potamogeton alterum, Dod. ed. belg. & post.

VI. Potamogeton folijs crispis, sive Lacu-  
ca ranarum.

Alga secunda, Trag.

Fontilapathum pusillum, Ad. Lob. ico.

Tribulus aquaticus minor, Clus. pan. & hist.

Potamogeton *ι λιόφυλλον* seu crispum, seu fimbri-  
atum, Thal.

an Alga Hydrolapathi folio, Ges. col.

Hæc duplex: altera sarmentis planis, altera  
rotundis, & hæc brevioribus, mucronatis, &  
minimè in ambitu serratis: utriusque Clusius  
meminit.

VII. Potamogeton ramosum angustifo-  
lium.

Tribuli aquatici minimi nomine, D. Francus  
misit: quod 1. in Prodr.

VIII. Potamogeton gramineum ramosum.  
Fontilapathi graminei nomine, à D. Bursero ex  
Austria: quod 2. in Prodr.

IX. Potamogeton minimum capillaceo fo-  
lio: quod 3. in Prod.

X. Potamogeton capillaceum capitulis ad  
alatrifidis: hoc 4. est in Prod.

## N Y M P H Œ A.

**N** *Νυμφαία* Theophrasto 9. hist. 13. Dioscoridi 1. 3. c. 148. cui sic dicta, quoniam aquosa amet. At Plinio 1. 25.  
c. 7. natam tradit ex Nymphæ Zelotypia erga Herculem, unde quibusdam Heracleon dicatur. Officinis  
Nenuphar. Genera duo Dioscoridi & Plinio: altera flore albo, radice nigra: altera flore luteo, radice alba.

### Nymphæa alba.

I. Nymphæa alba major.  
Nenuphar album, Brunf.  
Nymphæa alba, Brunf. Matth. Ang. Dodon.  
Cord. hist. Lon. Ad. Lobel, Taber. Thal. Ger.  
Clus. hist.  
Nymphæa candida, Trag. Fuch. Tur. Cæs.  
Nymphæa major alba, Lugd. Cast. Eyf.  
Lotus Ægyptia, Alpini.

Nymphææ folia D. Sigfridus Helmstadio ad  
me misit, quæ latissima, tenuissima, pallide vi-  
rentia: an talia sint prima Nymphææ folia, &  
quæ sub aqua latrant, quæ dein extra aquam  
duriora & crassiora reddantur, ut cum mariti-  
mis sit, considerandum.

Addit Eyf. et. aliam quæ nullatenus primi sit  
dissimilis, nisi quod omnia minora habeat.

Nymphæa alba minor, Eyf.

II. Nymphæa alba minor.

Nymphæa parva, Matth.

Nymphæa altera lutea minor, Lugd. ico.

Nymphæa alba minor, Ad. Tab. Ger.

III. Nymphæa alba minima.

Morsus ranæ, Dod. Ad. Lob. ico. Cast. ap. Tab.

Nymphæa minor alba, Lugd.

Nymphæa parva, Cæs.

Florem ex tribus foliolis subrotundis & gla-  
bris observavimus: at hist. Lugdun. florem ex  
quinque foliolis oblongis & subhirsutis com-  
positum, pingit.

IV. Galum radix aquatica in Sunda valde  
refrigerans: par. 4. Ind. Ord. 8. quid?

### Nymphæa lutea.

I. Nymphæa lutea major.

Nenuphar luteum, Brunf.

Nymphæa lutea, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur.

Dod. Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. Eyf.

Nymphæa lutea major, Lugd. Clus. hist.

Nymphæa altera, Cord. in Diosc. flore ex toto  
luteo, Cæs.

Nymphæa citrina, Cord. hist.

II. Nymphæa lutea minor magno flore.

Nymphæa lutea minor, Lug. Ger. Dod. ed. belg.

Nymphæa secunda, Tab.

III. Nymphæa lutea minor parvo flore.

Nymph. lutea minor Septentrion. Ad. Lob. ico.

Nymphæa altera lutea, Lugd.

an Nymphæa parva alia, Cam. in Matth.

IV. Nymphæa lutea minor flore fimbriato.

Nymphæa alia minor, Lugd.

## TRIBULUS AQUATICUS.

**T**ρίβολος ἐνὺδα & Dioscoridi l. 4. c. 15. Theophrasto 4. hist. 11. (id est Tribulus aquaticus) à triplici cuspide, ad similitudinem machinularum ferrearum, qua forma trigona sunt, dicitur.

Genera duo Dioscoridi & Theophr. 6. hist. 5. alter terrestris folijs effigie portulacæ, vel ut Theoph. ciceris folio: alter palustris vel aquaticus. Plinio l. 22. c. 10. Tribuli unum genus in hortis, alterum in fluminibus tantum: qui l. 21. c. 16. scribit Tribulum non nisi in palustribus nasci. folio ad Ulmi effigiem: at in reliquo orbe genera duo, uni Cicercula folia, alteri aculeata esse.

Tribulus aquaticus: & Trag. Matth. Dod. Ang.

Lac. Cord. in Diof. Ges. hort. Lon. Ad. Lob. Cæ-

salp. Cast. Lugd.

Butomos Damocratis, Ang.

Tribulus lacustris, Cord. hist.

Tribulus aquaticus major, Clus. pan.

## SAGITTATA.

**S**agitta, à foliorum forma tricuspidi, supernè in unam, infernè in duas desinentium, nomen habet. Phleum Theophrasti 4. histor. 9. & 11. esse volunt: Notandum tamen apud Theophrastum Phleum & Phleos differre: nam Phleum genere neutro, palustris planta est: at Phleos & Stæbe 6. hist. 1. idem sunt, & fortè Poterium erit. Plinio lib. 21. cap. 17. Magopistanam dicit à Gracis vocari, quam inter ulvas Sagittam vocamus.

I. Sagitta aquatica major.

Sagitta major, Matth. Dod. Cast. Tab.

Pistana Magonis sive Sagittaria aquatica Plinij, Ad. (cui an Stæbe fœmina) Lob.

Phleos mas latifolia, Lugd.

Barba sylvana recentioribus, Cæs.

Sagittaria major, Ger.

II. Sagitta aquatica minor latifolia.

Sagitta minor, Matth. Dod. Ad. Lob. Lugd. Ca-

stor. Tab.

Pistana Plinij, Ang.

Sagitta & Sagittalis, Cord. hist.

Sagittaria minor, Lob. ico. Ger.

III. Sagitta aquatica minor angustifolia.

Phleos sive Stæbe Theoph. angustifolia, Lugd.

Sagitta minor angustifolia, Tab. Ger.

## DRACUNTIIUM.

**Δ**ρακόντιον Dioscoridi lib. 2. cap. 196. à maculis purpureis, qua in caule visuntur, ita ut anguem planè, ut Diosc. loquitur, referat: sic & Theophr. 7. hist. 11. & 9. ejusd. 22. At Plinius lib. 24. cap. 16. de Dracunculo & Dracuntio egit.

Genera: in quibusdam vetustis Dioscoridis codicibus majoris minorisq; Dracunculi historia, speciatim divisis capitibus, adnotata, reperitur: Major quidem folijs rumicis sibi invicem implicitis, caule bicubitali, versicoloribus, draconum maculis notato, purpureis tamen eminentibus. Minor verò, folio est hederaceo magno, candidis notis insignito, caule versicolore anguis effigie, maculis purpureis repleto. Verùm Galenus, Aegineta & Serapio, qui in simplicium materia Dioscoridem secuti sunt, unius tantum meminere, quare prius caput aliqui ut supposititium remonent. Plinius tria fecit: primum, folijs Beta Aro simili: alterum radice longa articulosa: tertium, folio majore quam cornus radice arundinacea nodis geniculata: at lib. 25. cap. 3. alium Dracunculum, versicoloribus viperarum maculis notatum proponit: de quo sic Theophr. sunt qui genus quoddam Dracunculi Arum vocent, quod ejus caulis varietatem quandam habeat.

I. Dracunculus bistortæ folio.

Dracunculus major, Matth. Dod. gal. Cast.

Dracontium majus, Tab. Ger. Eyf.

Serpentaria major, Lugd.

Hunc nec dum vidimus, de quo Dod. edit. lat. an in rerum natura sit, dubitat, & si sit, Bistortæ speciem esse: at Adversaria inveniri negant. Guil. in suo Theo. quæsito prætextu, ut doctior videretur, Matthiolum effinxisse scribit.

II. Dracunculus polyphyllus.  
Dracontium majus, Brunf. Dod. Ger. Eyf.  
Dracunculus, Fuch. Tur. Gefn. hort. Cæs.  
Dracunculus major, Trag. Lac. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Lon. Cam.  
Dracunculus minor, Matth. Cast. Tab.  
Dracunculus polyphyllus, Cord. hist.  
Serpentaria Dracunculus major verus, Ang.  
Anguina dracontia, Ad. & Serpentaria colubrina, Lob.

Dracunculus sive Serpentaria major, Lugd. cui & Serpentaria minor Matthioli.

III. Dracunculus sive Serpentaria triphylla Brasiliana, in Prod. descripta.

IV. Dracunculus palustris, sive radice arundinacea, Plinij.

Dracunculus Plinij 3. Fuch.

Hydropiper rubeum, Eid. ico.

Dracunculus aquaticus, Matth. Dodon. Cast. Cam. Ger. Eyf. sylv. Tur.

Dracunculus palustris, Dod. gal. Lugd. minor, Lon.

Aron palustre, Gefn. hort.

Anguina aquatica sive Dracunculus, Ad. Lob.

Dracontij genus in palustrib. Germaniæ, Cæs.

## A R U M.

**A** <sup>Por apud Syros Λόφρα vocatum, folijs est</sup> Dracunculi Dioscoridi, lib. 2. cap. 197. Aron cui folium cum latitudine cavum atque cucumeracium ( de vulgo dicta Colocasia intelligendus ) Theophrasto 7. hist. 12. Verum Plinius, lib. 24. cap. 16. scribit, quosdam Aron eandem cum Dracontio dixisse. Glaucias satum discevit, Dracontium sylvestre Arum pronuntiando: aliqui radicem, Aron appellaverunt, caulem verò, Dracontium. Aron feminam in cibis prætulerunt, quoniam mas durior sit, & in coquendo lentior. At lib. 19. cap. 5. inter bulbi genera esse ait, quod in Aegypto Aron vocent Scille proximum, amplitudine folijs lapathi, & c. radice mollioris naturæ, quæ edatur & cruda. Observavimus Aron vulgatum, communiter nullis maculis notatum: aliquando lituris nigricantibus vel purpureis signatum. Sic aliud folio majore & acutius, aliud rotundius, durius, per totam æstatem virante. Illius folia aliquando maculis albis asperguntur, aliquando foliorum vena omnes albicant. Et pistillus colore variat, alteri purpurei, alteri ex albo lutei coloris est.

## I. Arum venis albis.

Arisarum, Matth. Dod. gal. Ad. Cast. majus, Gef. hort. prius Matthioli, Lon. Lugd.

Arisarum latifolium Matthioli, Tab. Ger.

Dracunculus alter, seu henicophyllos, Cord. hist. descript.

Dracunculus minor, Gefn. ap. Lac.

Dracontium minus, Dod.

Arum maculatum, Cord. schol.

Aron aliud folio maculato, Thal.

Arum majus Veronense, Lob.

Callæ primum genus Plinij, Dalech. in Plin.

II. Arum maculatum, maculis candidis, vel nigris.

Ari tertium genus, Trag.

Arum nigricantibus lituris signatum, Dod.

Arum, Matth. Lugd. Eyfett. majus folijs albis maculis notatis, Cast.

Arum offic. Lob. quoad ico.

Arum maculatum, Tab.

Gicherum sive Gigarum vulgo folijs maculosis, maculis candidis vel nigris, Cæsalp.

## III. Arum vulgare non maculatum.

Aron, Brunf. Gefn. col. Eyf.

Ari primum genus, Trag.

Arum, Fuch. Tur. Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hort. Lac. Lon. Thal. Tab. vulgare, Cam.

Arum Dioscoridis, Ang.

Arum majus, Ger.

IV. Arum minus, Matthioli. Cast. Lugdun. Tab. Ger.

V. Arum Byzantinum, Clus. hist.

Variat folijs quibusdam, maculis nigris exilibus distinctis, alijs minimè: flos etiam colore variat: nam quod folijs est maculatis, penicillum folliculo inclusum habet, alia candicantem.

VI. Aron maximum Ægyptiacum, quod vulgo Colocasia.

Arum Ægyptium, Matth. Gefn. hort. Ægyptijs Cast. Lugd. Camer. (qui vulg. Colocasia dici) Col. Lugd. Clus. hisp. &

Colocasia, Gefn. Bb 2 hist. Eyf.

Faba

Faba Ægyptia, Bellonio, cui & Lotus & Faba Ægyptia.

Colocasía quæ faba Ægyptia non est, Ang.

Colocasia, an Aron Ægyptium putatum, Ad.

Culcas, Faba Ægyptia, Alpi.

Aron magnum, Colocasía vulgo. Pampina Paradyfi, Cæs.

Talasse, Javanensibus: Lolade, Malayce: Colcaz. par. 4. Ind. Orient. c. 6. fig. 15.

Nec fructum nec florem ferre Bellonius asserit: at Lugd. ex Mycone cum flore pingit, qui imaginarius potius, ut rectè Doctiss. Columna: Horti Pisani olim præfectus Casaubonus florem observavit, qui odoratissimus fuit, cum aliarum Aaronis specierum flores fœteant.

VII. Colocasía, sive Faba Ægyptia veterum, Diosc. l. 2. c. 128. *κύαμῶς ἀγυπτιῶς* Faba Ægyptia, quam aliqui ponticam vocant, folium habet amplum instar petasii florem roseum: radix harundinis radice crassior, quæ *πολλοκάρδιον* vocatur, &c.

Et Theophrastus 4. hist. 10. inter cætera scribit, fabam Ægyptiam in paludibus, caput super caulem esse favo orbiculato vesparum non ab simile, inque singulis cellis singulas fabas contineri, paulo super id eminentes, multitudine plurimum terdenas: radicem habere validam spinis subhorrentem, &c. Et Plinius, l. 21. c. 15. in Ægypto nobilissima est Colocasía, quam cymon aliqui vocant. Hanc à Nilo metunt, &c. folijs latissimis, etiam si arboreis comparentur, ad similitudinem eorum, quæ Personata in nostris amnibus vocamus: adeoque Nili sudoribus gaudent, ut implexis Colocasíæ folijs

in variam speciem vasorum, potare gratissimum habeant.

Ex his liquet, Fabæ Ægyptiacæ radicem, Colocasiam veteribus dictam fuisse, & minimè à Faba hac Colocasiam separandam: dein radicem non fuisse bulbosam, qualis est Colocasíæ recentiorum, sed arundinaceam & asperam. Quare rectè Doctiss. Columna, Aron Ægyptium (sive Colocasía recentiorum) non est Colocasía, seu Faba Ægyptia veterum: Et Cordus in Diosc. rectè, dum Fabæ Ægyptiacæ radicem, Colocasiam dicit. At dum Anguillata, Colocasiam, Fabam Ægyptiam non esse asserit, de Colocasía recentiorum intelligendus est. Verum Matthiolus ne videretur (ut rectè Columna) Fabam Ægyptiam ignorasse, quàm aliàs rectè ab Aro Ægyptio diversam fecit, ex idæa affabre depictam iconem historiæ accomodatam proposuit, non animadvertens vesparum favum minimè rectè fuisse expressum, ut Ciborium (*κύβητον ἢ κισσῶρον* quasi loculamentum Dioscoridi) exprimeret, quod etiam genus vasculi & poculi esse apud antiquos, Athenæus refert. Hunc secuti sunt Lac. Lugd. Cast. Durantes, Fabam Ægyptiam vocantes & pingentes: Lonicerus item & Durantes, sed Colocasiam nominantes. Et Guilandinus vult Matthiolum pro Faba Ægyptia Ari genus, quod in multis Italiæ locis frequens, perperam proposuisse.

VIII. Fabæ Ægyptiacæ Dioscoridis affinis. Fructus peregr. an Faba Ægyptia, Diosc. Clus. exot. lib. 2. cap. 13.

Fabæ Ægyptiacæ fructum peregrinum Clus. belle responder, Colum.

## ARISARUM.

**A**ρισάρον Dioscoridi, lib. 2. cap. 198. exigua herbula est, cujus radix olivæ magnitudinem implet: majoris quam Aron acrimonia. Plinio, lib. 24. cap. 16. Arisarum similis Aro, minor tantum, minoribusque folijs & utriusque radice, quæ tamen olivæ grandis magnitudinem implet.

Genera duo Plinio: alba, inquit, geminum caulem: altera unum tantum emittit: utraque medetur ulceribus manantibus, &c.

I. Arisarum latifolium majus.

Arisarum latifolium alterum, Clus. hisp. & hist.

II. Arisarum latifolium alterum.

Arisarum alterum, Ang.

latifolio Clusij, inense, Ad. an idem sit cum latifolio Clusij, ab.

Arisarum primum, Clus.

Arisari alt. genus, Cæs. an potest.

Arisarum alt. genus, Cæs. an potest.

Callæ alterum genus Plinij, Dalech.

III. Arisarum, Thal. in sua Hercynia recenset, quod ab alijs Arisari speciebus à Matthiolo exhibitis, diversum sit; quid sit ignoramus.

IV. Arisarum angustifolium, Dioscoridis, fortè.

Arisarum, Gesn. ap. Lac. Cæs.

Arisarum primum, Ang. alterum, Matth. Dod.

gal. Lon. Lugd.

Arisarum

Arifarum angustifolium, Ad. Clus. hisp. & hist.  
Lob. Dod. Lugd. Tab. Ger.  
Arifarum tenuifolium, Cam.  
Pseudoarifarum, Cast.

Variat folijs latioribus aliquando: corniculo item purpurascente, aliquando viridi, vel ex purpureo virescente.

## A S A R U M.

**A** *ἄργυρος* Dioscoridi, l. 1. c. 9. quod in coronas non addatur Plinio, l. 21. c. 6. monente: quibus & *ἄργυρος* Nardus sylvestris, eò quod odore Nardum amuletur: vel, ut Plinius, quod Nardi vim habeat.

## I. Asarum.

Asarum, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. (Perpenfa, Vulgago) Lac. Cord. in Diosc. & hist. Tur. Gef. h. Lon. Cæs. Cast. Lug. Thal. Tab. Ger. Eyft.  
Asarum baccaris sive Baccatus, Ad. Lob. ico.

Speciem quandam majorem reperiri ajunt,

nescio quam verum, Gefn. hort. & Camerario, Asarium aliud multo majus usitato & odoratius ju Einsidlen/ Gesnero teste.

## II. Asarina folijs asari.

Asarina, Matth. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Tussilaginem alpinam, Clus. in hist. suspicatur.

## T U S S I L A G O.

**B** *ἡχίον* Dioscoridi, lib. 5. cap. 126. quod tussi medeatur: unde Latinis Tussilago dicitur. Plinio, l. 26. c. 6. Bechion, qua & Tussilago.

Genera: Plinio duo sunt, sylvestris, folijs majusculis quam edera, quinque aut septem, subalbidis à terra, supernè pallidis. sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui: quidam eandem esse Bechion, & alio nomine Chamaleucen putant. & c. Altera à quibusdam Salvia appellatur, similis verbasco. Sunt qui Plinium posteriori loco, Aethiopida, alij Orminum, alij Sphacelum, intelligere existiment.

## I. Tussilago vulgaris.

Ungula caballina, Brunf. Trag.

Ungula asinina & Lactuca ustularia Germanorum, Ericio Cord.

Tussilago, Matth. Anguil. Fuch. Tur. Cord. in Dioscor. (& Farfarella) Lac. Gefn. hort. Lon. Dodon. Ad. Lobel. (& Farfara) Cæs. alp. Cast. Lugd. (& Tiphium Theoph. quibusdam) vulgaris, Cam.

Bechion, Dod. gal. Cord. hist.

## II. Tussilago alpina rotundifolia glabra.

Tussilago alpina 2. Cl. pā. an Asarina Mat. Cl. h. Tussilago montana minima, Lob. (qui hanc & sequentem sub uno titulo pinxit) Lugd.

## III. Tussilago alpina rotundifolia canescens.

Tussilago, Gefn. frac.

Tussilago alpina 1. desc. 2. ico. Clus. pan.

Tussilago alpina 1. flore aperto, Clus. hist.

Tussilago alpina 1. flore candido, Eid.

Tussilago altera alpina Clusij, Lugd.

## IV. Tussilago alpina folio oblongo: in Phytopinace &amp; Prod. descripta.

## P E T A S I T E S.

**P** *Πετασίτης* Dioscoridi, l. 4. c. 108. à forma folij, quod *πετασίδης*, galeri modo amplum. Plin. l. 24. c. 15. Chamaleucen appellasse videtur: his verbis: Chamaleucen apud nos farranum, sive farsugium vocant: Nasctur secus fluvios folio populi. sed ampliore: At l. 26. c. 6. asserit, quosdam putare Bechion alio nomine Chamaleucen dici.

## I. Petasites major &amp; vulgaris.

Petasites (costi genus, Galerita) Trag. Fuch.

Ang. Tur. Dod. Cord. hist. Gefn. hort. Lac. Ad.

Lon. Lob. (cui an Personata & Perfolata Plinij) Cæs. Lugd. Tab. Ger. Clus. hist.

Petasites flore punicante, Thal. mas, Cam.

Tussilago major, Matth. Cast.

## II. Petasites minor.

Petasites flore albo, Cam. ep. Clus. hist. candido, Thal.

Petasites odoratus, Lugd.

Petasites foemina & Leucanthemos, Cam.

## C A C A L I A.

**K** *Ἀνὰδία* qua & *Ἀνὰδία* Dioscor. l. 4. c. 125. folia profert candida & praegrandia, florem Bryonia similem: post excussum florem, grana subnascuntur: Et Plinio, l. 25. c. 11. Cacialia sive Leontice. inter folia grandia, semen margaritis minutis simile dependet: & l. 26. c. 15. Cacialia, grana minuta tribuit. Licet folia magna, & candida, & locus natalis, quem ipsi in montib. tribuunt, competant: quia tamen nostra flores in pappum abeunt,

in quo semen, quod non margaritis simile, sed oblongum, latet, num de nostra intelligendi sint, dubitamus: nisi velimus assentiri Dalechamio, qui in florum umbilico, granum rotundum niveum, margaritæ simile promittere (cui rectè Plinius comparavit) quod excusso flore nudum nitidumq; dependeat, scribit.

I. Cacalia tomentosa: in Phytop. & Prod. descripta.

II. Cacalia folijs crassis hirsutis.

Cacalia Ghini, in desc. Pilati, Lugd. du Choul.

Cacalia 1. & vulg. incano folio, Clus. pan. & hist.

Cacalia, Ang. Cæf. Lugd.

III. Cacalia folijs cutaneis acutiorib. & glabris. Cacalia, Dalech. in Diosc. Ad. Lob. (bris.

Cacalia 2. vel Cacalia glabro folio, Clus. hist.

Tussilago alpina, sive montana, Dalech. Lugd.

cujus flores luteos dicit. (quid?

IV. Cacaliæ congener planta, Cl. pan. & hist.

## LAPPA SIVE ARCIUM.

**A**ρτιον sive προσωπίς aut προσωπίον (id est Personata, quasi Larva) folia habet cucurbitæ, majora tamen, duriora, nigriora, & hirsuta, &c. Dioscorid. l. 4. c. 107. Personata Græci Arcium vocant folia habet majora, cucurbitinis hirsutiora, nigriora & crassiora, &c. Plin. l. 25. c. 9. Genera duo Galeno 6. simp. primū Verbascum simile, quod Diosc. l. 4. c. 106. Ἀρτίον ἢ Ἀρτίον vocat: & Plin. l. 27. c. 5. Arction: Alterum folijs cucurbitæ, quod Dioscoridis est Ἀρτιον & Plinij Persolata, & etiam Personata, cui folio nullū sit latius, & grandes lappas fert. At vulgo alia est major, quæ & Arciū & Arctiū est Diosc. alia minor, quæ Diosc. l. 4. c. 138. Ἐάρθιον (quod flavos capillos reddat) dicitur, & χοιραδόλεθρον, quasi strumarū pernicies: hinc quibusdā Strumaria nominatur.

I. Lappa major, Arcium Diosc.

Lappa major, Brunf. Trag. Tur. Cæf.

Personata, Lac. Lon. Ad Lob. Lugd.

Personata major, Matth. Cast.

Personaria, Fuch. Fracast.

Bardana sive Lappa major, Dod. desc.

Arcium, Ang. Dod. gal. Cord. in Diosc.

Arction personata, Thal.

II. Lappa rosea: in Prod. descripta.

III. Lappa major montana, capitulis tomentosis, sive Arctium Dioscoridis.

Personata seu Lappa major altera, Matth. Lug.

Bardana sive Lappa major, Dod. ico.

Arction montanum, an Persolata Plinij, Ad.

Arctium mont. & Lappa minor Galeni, Lob.

Arctium, Cæf. p.

IV. Lappa montana altera lanuginosa.

Arctium quorundam, Lugd.

V. Arctium ex cod. Cæf. Dod. Lugd. quid?

VI. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis.

Lappa minor, Brunf. Trag. Ericio Cordo.

Xanthium, Matth. Ang. Dod. ut: Fuch. Tur.

Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lac. Lon.

Thal. Cæf. Cast. Tab. Lugd.

Xanthium sive Strumaria, Ad. Lob.

Bardana minor, Ger.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER SEXTVS.

## SECTIO PRIMA.

VIOLA; LEUCOIUM; HESPERIS; LYCHNIS  
ET SAPONARIA.

### VIOLA MARTIA.

**V**iola, Ion Diosc. l. 4. c. 122. αἰγίς, Ion πορφύρεα, Viola purpurea, à floris colore. Theoph. 1. hist. 15. Ion, & 1. hist. 21. Ion μέλαν ἢ μελαίνιον, nigram violam, à florum colore nigricantis purpurea, vocat. Plin. l. 21. c. 6. Ex Violis quæ spontè apricis & macris locis proveniunt purpurea, latiore folio statim ab radice carnosio exeunt, sola q; Græco nomine à cæteris discernuntur, appellata Fa, ut ab his Fanthina vestis. Ion Græcis vocatum in Geoponicis Nicander credidit, Hermolaο referente, quod Nympha quadam Fonia, florem eum Fovi primum munere dederint. Alij Ion volunt dici, quod cum Jupiter puellam Fo adamatam in vaccam convertisset, terra florem hunc pabulo ejus produxerit, qui propter ipsam factus, ab ipsa nomen acceperit. Hinc Latinis Viola, quasi vitula.

Genera



*Genera plura Plinio, purpurea, lutea, alba: sed de purpureis primum, quarum unum genus apud Dioscoridem & Plinium.*

*Viola Martia rotundifolia.*

I. *Viola martia purpurea flore simplici odoro.*  
Viola sativa, Brunf.

Viola Martia odorata nigra seu purpurea, Trag.

Viola purp. Fuch. Matt. Lac. Ad. Cæs. Cast. Lug.

Viola nigra, Dod. Cord. in Diosc. Ger. Clus. hist.

Viola, Lon. & Viola nigra, Ges. hort.

Viola Martia purpur. Tab. præcox purpur. Lob.

Flos communiter coloris in cæruleo subnigro purpurei: qui cultura grandior fit: quandoq; folijs latioribus Calthæ æmulis, quæ

Viola Matronalis flore purpureo, Eyf.

II. *Viola Martia inodora sylvestris.*

Viola sylv. Brunf. Ang. inodora, Dod.

Viola purpurea sylv. live canina, Trag.

Violæ nigrae sylv. species, Ges. hor.

Viola canina, Lon. Tab. sylv. Ger. desc.

Viola can. cærulea inodora sylv. serotina, Lob. ic.

Viola Martia sylv. Thal. Martia canina, Eyf.

Flos cæruleus, aliquando pallidus: duplex est, altera major folijs majoribus & rotundioribus: altera minor, folijs mucronatis oblongis ac strictioribus: & Gesnerius in monte fracto meminit montanæ, quæ solum folijs minoribus & solidioribus à vulgari differat: est &

Viola Martia flore rubro purpurascente, Eyf.

III. *Viola Martia alba.*

Viola alb. Brunf. candida, Dod. Cæs. fl. albo, Ger.

Viola Martia candida, Trag. alba, Tab. Eyf.

Viola sylv. albo flore, Ges. hort.

Viola Martia alba hort. & camp. odora, Lob. ico.

Hæc aliquando odora: aliquando nullo aut languido odore: & hæc folijs est gracilioribus.

IV. *Viola Martia multiplici flore.*

Viola nigra flore pleno, Dod. gal.

Viola dasypodion, dasiphyll. malim, Ger. hor.

Viola Martia purpurea, Lob. ico.

Viola purp. & alba multiplex, Tab. Ger. Eyf.

Viola flore multiplici, Dod. fl. pleno, Cast. Cam.

Viola cærul. fl. numerosis folijs constantib. Cæs.

Variat floris colore purpureo, rubello, candido, ex purpureo & albo variegato. hinc

Viola Martia alba, flore multiplici albo: flos albus, exterius purpurascens, ut Viola variegata

dici possit, Eyf. est & biflora. Violæ species Byzantij colitur, Martiæ similis, sed flore infinitis

foliolis constructo, & Rosam Damascenam æ-

quante, non solum magnitudine, sed & odore

nostrates superante: Costæus in Mesuë, & Cam.

V. Viola alpina folio in plures partes dissecto. an Viola montana laciniato folio, Clus. hist.

VI. Viola alpina purpurea exiguis foliis.

Viola montana 2. Clus. pan. & hist. (Lun.

an Viola Martia folio min. & solidiore, Ges. de

VII. Viola alpina rotundifolia lutea.

Viola luteola minore flore, Ges. hort.

Viola montana fl. luteis, Lob. obs.

Viola montana. 1. Clus. pan. & hist.

Viola lutea, Lob. ico. Cæs. Cast.

Viola Martia lutea inodora alpina, Cam.

Gramen Parnassi aliud, Lugd.

*Viola Martia folijs oblongis.*

I. Viola montana pumila angustifolia flore niveo inodoro.

Viola montana pumila, Clus. cur. post.

II. Viola Martia arborescens purpurea.

Viola arboref. Matt. Cast. Tab. vel potius recta,

Viola fruticosa, Ges. hort. (Cam.

Marer Violarum, Dalech. Lugd.

Viola elatior, Clus. hist.

Viola erecta flore cæruleo, &

Viola erecta flore albo, Eyf.

Flore est ex cæruleo purpurascente, vel ex cyaneo albescente.

III. Viola tricolor erecta, an Jovis flos Theophrast. 6. hist. 6.

Viola affurgens tricolor, Dod. Ger.

Violæ purpureæ varietas, Ad.

Viola martia surrectis cauliculis, Lob.

IV. Viola montana tricolor odoratissima.

Viola montana 3. five tricolor, Clus. pan. & hist.

Viola flamm. major violaceo colore mixta, Eyf.

V. Viola tricolor hort. repens: an  $\phi\lambda\acute{\alpha}\varsigma\ \eta\ \phi\lambda\acute{\alpha}\varsigma$   $\eta\ \phi\lambda\acute{\alpha}\varsigma$ , Theoph. 6. hist. 6.

Herba Trinitatis, Brunf. Fuc. Lon. sativa, Trag.

Jacea five flos Trinitatis, Matth.

Jacea major five Viola tricolor, Cast.

Viola flammea, Dod. gal. Cæs.

Violæ nigrae persimilis, flos Trinit. vel heptachrum, Ges. hort.

Viola tricolor, Dod. Clus. Ger.

Viola flammea, coloria, calida, Ad. Lob.

Viola flammea seu tricolor major, Lugd.

Viola Trinitatis 1. Tab.

Flos colore & magnitudine variat: est flore purpureo & cæruleo: albo & luteo: cum pallido cæ-



do cæruleo, purpureus & luteus etiam permiscetur: quandoque lituris quibusdam notatur: raro flore penitus albo reperitur, quæ est Viola trinitatis 2. Tab.

Datur quæ duplo majore flore est coloris unius, nigræ purpuræ, & instar holoserici nitente, vel pallido, hinc

Flos trinitatis major violaceus, &  
Flos trinitatis pallidus major, Eyf.

V I. Viola bicolor arvensis.

Herba Trinitatis sylv. Trag.

Jacea altera, Matth.

Jacea minor, Cast.

Violæ nigræ similis arvensis minor, Gef. hor.

Viola sylvestris, Lob. ico.

Viola flammea minor, Lugd.

Viola trinitatis minor petræa, Tab.

Viola tricolor petræa, Ger.

Haftenus trium colorum non observavimus, sed candido & luteo, cæruleo & luteo, cæruleo & candido: aliquando tamen vel totus luteus, vel totus albus occurrit: Alia est valde parva, Augusto florens.

V II. Viola montana lutea grandiflora: & Camer.

Violæ nigræ per similis mont. lutea, Gef. hor.

Violæ mont. 3. aliud genus, Clus. pan. & hist.

Viola flammea lutea, Lugd.

Viola Martia arborefcens lutea, Tab.

Viola flammea major pallido colore mixta, Eyf.

Flore est luteo, sed magna ex parte lineis purpureis intermixtis: aliquando sine lituris: rarius flore albo reperitur.

V III. Viola montana lutea folijs non crenatis.

Viola sylv. longifolia, Tab.

Viola martia lutea, Ger. desc.

## LEUCOIUM NON BULBOSUM.

**A** Evnctior Dioscoridi l. 3. c. 138. id est, Viola alba, non ratione florum, sed potius à canitie cinericeove foliorum colore: quàmvis differentiam in floribus ostendat, siquidem aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei reperiantur. Plin. l. 21. c. 6. Violas luteas & albas agnoscit.

*Leucoium incano folio hortense.*

I. Leucoium incanum majus.

Viola candida, Trag.

Leucoium album, Matt. Lob. ob. Lug. Tab. Ger.

Leucoion, Dod. gal. Gef. hor. Ad.

Viola matronalis alba, Fuch. Tur.

Viola domestica, Ang.

Leucoium candidum majus, Dod.

Viola alba, Lob. ico.

Viola alba, quæ & matronalis, Cæf.

Leucoium album hortense fruticosum, Cam.

Leucoium flore albo simplici, Eyf.

Flore est albo, vel cinericeo.

II Leucoium purpureum vel rubrum.

Viola purpurea, Trag. Lob.

Viola matronalis purpurea, Fuch. Tur.

Leucoium purpureum, Mat. Dod. gal. Lug. Tab.

Leucoium rubrum & purpureum, Cam.

Viola matronalis floribus rubentibus, aut ad purpuram inclinantibus, Cæf.

Leucoium flore rubro simplici, Bry. Eyf.

Flore est rubente, ex purpura puniceo, violaceo, ex cæruleo purpureo, in summa ob colorem dilutiorem & saturatiorem differentiae aliquot sunt: hinc

Viola matronalis purpurea, alia punicea, Fuch. Tur. Lugd.

Leucoium purpureum, & aliud violaceum, Tab.

At cærulei coloris in hoc genere haftenus non vidimus, licet Dioscorides auctor sit, nisi fortè id verbum superfluum fuerit.

III. Leucoium incanum minus.

Viola alsiola & minor, Trag.

Leucoium candidum minus & annuum, Dod.

Floribus est candidis, rubentibus, puniceis, à prioribus magnitudine differentibus, & quod hoc annuum sit.

IV. Leucoium incanum majus multiplex.

Leucoion duplis floribus, Ad.

Leucoium sive Viola purpurea, fl. pleno, Lob. ic.

Leucoium multiplici flore, Dod.

Flos est vel saturatoris, vel dilutioris purpuræ, vel purpuroviolacei, vel albi: hinc

1. Leucoium flore rubro pleno, Eyf.

2. Leucoium flore purpureo pleno, Eyf.

3. Leucoium sive Keyri purpuroviolaceum pleno flore, Svert.

4. Leucoium flore albo pleno, Bry. Eyf.

V. Leucoium incanum majus variegatum simplici flore.

Hoc varium est & permixtum maculis in albo rubris, vel purpureis, aut quasi strijs in æqualibus notatum: hinc

1. Leucoi. varieg. alb. rubris maculis, Bry. Eyf.

2. Leu-

2. Leucoium varieg. purpureis maculis, Eyft.  
VI. Lecoium incanum majus variegatum  
pleno flore.

Leucoium sive Keyri viola purp. variegata, Svv.  
Et hoc varium est:

1. Leucoium purpureum variegatum sangui-  
neis maculis signatum, Bry.

Leucoium purpureū variegat. flore pleno, Eyft.

2. Leucoium sive Keyri violaceo purpureum  
pleno flore, lineis viridibus distinctum, Ssver.

3. Leucoium pleno flore album, sanguineis  
maculis signatum, Eyft.

4. Leucoium pleno flore album purpureis  
maculis signatum, Eyft.

VII. Leucoium lividè rubente colore.

Leucoium melancholico colore, Eyft.

*Leucoium incanum maritimum.*

I. Leucoium maritimum latifolium.  
Tripodium, Ang.

Leucoium marinum alterum latifol. Lob. Lug.

Leucoium marinum cæruleo purpureum, Tab.

Leucoium marinum latifolium, Ger. marinum  
aliud, Cam.

an Leucoium maritim. minus, Hesperis quo-  
rundam, Lugd.

II. Leucoium maritimum sinuato folio.

Leucoium marinum purpureum, Ges. hor. Ger.

Leucoium maritimum majus, Ad. Lob. ic. Clus.  
hisp. & hist. desc. Lugd. Cam.

Leucoium marinum majus purpureum, Tab.

Flos dilutioris purpuræ, ad vini rubri facem  
tendente.

III. Leucoium maritimum angustifolium.

Leucoium marinum minus, Clus. hisp. & hist.  
Ad. Cam. Tab. Ger.

Leucoium angustifolium, Lob.

Leucoium sylv. angustifolium, Dod.

Flores sunt dilutè purpurei, quandoq; rubri:  
& luteos reperiri Lob. & Tab. scribunt: hinc

Leucoium marinum minus luteum, Tab.

Leucoium marinum minus, Ger.

IV. Leucoium maritimum repens.

Viola marina repens, Eyft. ico.

An ex semine prioris in horto natum: cum  
in hortis satum longioribus quidem sit cauli-  
culis, sed in terram reflexis, folio latiore, flore  
purpureo, tota que æstate floreat.

V. Leucoium maritimum candidum.

Keiri marinum flore candido, Lob. ico.

Leucoium marinum majus, Clus. hist. ico.

VI. Leucoium maritimum minimum, quod  
6. est in Prodr.

VII. Leucoium saxatile thymi folio hirsu-  
tum cæruleo-purpureum.

Lithoreoleucoion minimum supinum, Col.

*Leucoium Creticum.*

I. Leucoium Creticum thlaspi folium.

Leucoium marinum Creticum 1. Clus. hist.

Flos rubet mox ex cæruleo purpura scit.

II. Leucoium Cretic. folijs oblongis crenatis.

Leucoium marinum Creticum 3. Clus. hist.

III. Leucoium Creticum floribus minoribus.

Leucoium marinum Creticum 2. Clus. hist.

In hoc flores prioris dimidio minores, pro-  
fus albi, paulatim purpureum contrahentes.

IV. Leucoium Creticum spinosum incanum  
luteum.

Leucoium Creticum spinosum, Clus. hist.

Glastivida Cretensium, Belli, ep. 3. & 4. ad Clus.

Clus. hist. ap. alt. ad.

Glastivida prima Cretica, Ponæ.

V. Leucoium Creticum minimum folio sub-  
rotundo.

an Leucoium Creticum, Ponæ Ital.

Hæc quinto loco in Prod. describitur.

*Leucoium luteum folio hirsuto.*

I. Leucoium alyssoides clypeatum majus.

Lunaria aspera, Ges.

Alysson Dioscoridis, Dod. Cam. Lugd. cui &

Alyssum Dalechampij fig. duplici.

Alysson Diosc. puratum, Lob.

Alyssos, Ges. hort. & Lunariæ Græcæ similis.

Lunaria Græca terria, Cæs.

Leucoium montanum lunatum, Col.

Minoris & congeneris plantæ Columna me-  
minit.

II. Leucoium alyssoides clypeatum minus.

Leucoium peltatum Romanum minus, Col.

III. Leucoium incanum siliquis rotundis.

Eruca peregrina, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Leucoium marinum Patavinum, Lob.

Leucoium marinum luteum majus, Tab. Ger.

IV. Leucoium luteum erucæ folio.

Leucoium terrestre majus, Col.

V. Leucoium luteum sylv. hieracifolium,  
quod 3. in Prodr.

Leucoij lutei sylv. species, Thal.

Leucoium sylv. in odor. fl. parvo pallidiore, Eyft.

VI. Leucoium luteum montan. serrato folio.

Leucoium luteum montanum, Ponæ Ital.

*Leucoium folio viridi.*

I. *Leucoium album* odoratissimum folio viridi: quarto loco in Prod. descriptum.

*Leucoium rarius* flore albo odorato, Cam.

*Leucoium fruticosum* fol. viridi, flore albo odorato Camerarij, Eyf.

II. *Leucoium luteum* maxim. folijs tuberculis obsitis.

*Flos Cheyri Eystettenfis* maximus, Eyf.

Flores amplitudine thalerum Philippicum superant.

III. *Leucoium luteum* magno flore 1. loco in Prodr. desc.

*Flos Cheyri simplex* medius, Eyf.

IV. *Leucoium luteum* serrato folio fl. grandiore: 2. in Prodr.

V. *Leucoium luteum* vulgare.

*Leucoium*. Brunf. Cord. in Diosc. Lac.

*Viola lutea*, Trag. Fuch. Dod. gal. Cæs. Ger.

*Viola petræa lutea*, Tab.

*Leucoium aureum*, Matth. Lugd.

*Leucoium luteum*, Fuch. ico. Dod. Ad. Lob. Caftor. Camer.

*Leucoium sativum luteum*, Clus.

Keiri vel Cheiri, Gef. hor. Lon.

*Flos Cheiri simplex* minor, Eyf.

Quibusdam ~~ex~~ Theophr. quod totus flos flammæ, id est, lutei coloris sit: luteum enim colorem flammæ dici, ex Plin. lib. 22. cap. 8. colligunt.

VI. *Leucoium luteum* pleno flore majus.

*Viola lutea multiplex*, Lugd. Ger.

*Leucoium flore luteo* pleno majus, Eyf.

VII. *Leucoium* pleno flore minus.

*Leucoium* sive Keiri duplici flore, Ad. Lob. ico.

*Leucoium luteum* flore multiplici, Dod.

*Viola petræa lutea multiplex*, Tab.

*Leucoium flore luteo* pleno minus, Bry. Eyf.

VIII. *Leucoium luteum* syl. angustifolium.

*Viola lutea* sylv. Trag.

*Leucoium* sylv. minus, Gef. hort.

*Leucoium* sylv. Clus. pan. & hist. Cam. Taber. Ger.

*Leucoium* sylv. flore luteo, Bry.

IV. *Leucoium palustre* flore subcæruleo.

*Gladiolus palustris*, Clus. cur. post.

## VIOLA MATRONALIS SELI HESPERIS.

**V**iola Matronalis, quod à Matronis in hortis colatur dicta, apud Plinium l. 21. c. 7. Hesperis censetur, cum hac Viola noctu magis oleat, quod sua Plinius tribuit, addens, inde nomen invenisse.

I. *Hesperis hortensis*.

*Viola alba*, persica Hermolai, Trag.

*Leucoium & Viola purpurea*, Fuch.

*Leucoium* Diosc. album, purpureum, Fuch. ico.

*Viola alba*, Tur.

*Viola matronalis*, Gef. hor. Dod.

*Viola purpurea & alba*, Lugd.

*Viola matronalis* sive Damascena, Ad. Lob.

*Viola* sylv. alba & purpurea, Cæs.

*Hesperis* 3. Clus. hist. ico. nostra, Cam.

*Viola Damascena* flore purpureo, Svvert.

Variat colore floris, candido, dilute purpureo, rubro: habetur & tera minor floribus albis & suavissimi odoris: hinc

1. *Viola hyemalis* flore purpureo, Tab. Ger.

*Viola matronalis* flore purpureo, Eyf.

2. *Viola hyemalis alba*, Tab. Ger.

*Viola matronalis* flore albo, Eyf.

II. *Hesperis* hort. flore viridi: hæc magnitudine, quoad omnes sui partes, à vulgata differt, flore est viridi & inodoro.

III. *Hesperis montana* pallida odoratissima. *Hesperis prima & montana*, Clus. pan. & hist.

*Viola* sylv. species, Cæs.

*Hesperis pannonica*, Cam.

Variat ex semine nata, nonnulli flores maternum colorem retinent, alij aut dilutius pallescunt, aut magis obsoletum acquirunt, crebris venis ex atro purpurascensibus discurrentibus.

IV. *Hesperis* sylv. inodora.

*Hesperis* 2. vel altera pannonica, Clus. pan.

*Hesperis* tertia, Eid. hist. desc.

V. *Hesperis* sylv. flore parvo: 1. in Prod.

VI. *Hesperis peregrina* filiquis articulatis.

*Hesperis Syriaca*, Cam. Clus. hist.

*Leucoium Syriacum*, Cam.

*Leucoium melancholicum* quibusdam.

*Hesperis Syriaca* Rauvvolffij, ab hac non videtur aliter differre, quam quod strigosior sit, quod fortè loci ratione contingit.

VII. *Hesperis* filiqua corniculata fl. obsoleto.

*Leucoium corniculatum* saxatile, Col.

VIII. *Hesperis villosa* flore obsoleto filiqua brevi.

IX. *Hesperis sylvestris* hirsuta folijs Hieracij: 2. in Prodr.

**V**iola ratione florum, Lunaria verò à siliquarum forma dicitur, quæ lata, planæ & propemodum rotunda sunt, & Lunam non falcata, sed prope completam referunt: vel à siliquarum splendore, quæ per siccitatem videntur.

I. Viola Lunaria major siliqua rotunda.

Viola latifolia, Dod. Clus. pan. Lugd.  
Bulbosa foliata, Officinarum Bolbanac, Ad.  
Lunaria Græca, Lon. Cæs. Lob. Cast. rotunda,  
Lunaria major, Cam. (Gefn. hort.)  
Bulbonach (à radicibus bulbosis) Gefn. hort.  
Viola lunaris 1. Tab. Ger.  
Thlaspi montanum, Gefn. hort.  
Lunaria Græca annua, Eyf.  
Thlaspi alterum Cratevæ quibusdam.

Variat florum colore & odore: colore purpureo, subcæruleo: odore, uni flores odorati, alteri inodori sunt.

II. Viola Lunaria major altera: & Cam.

Viola latifolia altera, Dod. Lugd.

Præcedente minor & flore albo est.

III. Viola Lunaria major siliqua oblonga.

Lunaria Græca siliquis longis, Gefn. hor. Thal.  
Lunaria Græca siliquis oblongioribus, Thal.  
Lunaria odorata, alijs Lunaria Græca major, Gefn. hort.

Lunaria Raphanitis, sive Bolbonac, radice rediviva, Lob. ico.

Lunaria Græca altera, Cæs.

Viola latifolia, Clus. hist.

Viola lunaris 2. Tab. longioribus siliquis, Ger.

Lunaria Græca perennis, Eyf.

Flores ex albo subcærulei siliquæ longiores, laminosæ, ita ut aliquando tres membranulæ separatæ suis seminibus annexæ divelli possint.

LYCHNIDES.

**L**yxnis, id est, Lucernula. Dioscoridi, l. 3. c. 114. & 115. duas species, altera λυχνίς σιφανομακτινή, Lychnis coronaria: altera λυχνίς ἀγρία. Lychnis sylvestris dicitur. Primam, Lychnidem coronariam à recentioribus nominatam, videtur Theoph. 6. hist. 7. Lychnidem vocasse: & Plinij, l. 21. c. 4. Lychnis & Rosa Græca censetur: cujus Lychnis agria, Antirrhinum est. Recentiores, Lychnidis nomen plurimis imposuere, de quibus ordine.

Lychnis flore coccineo.

I. Lychnis hirsuta flore coccineo major.

Ocymoides peregr. Gefn. hort. vel flos Hierosolymitanus, alijs Creticus: vel Croceus, Eid. ap.  
Flos Constantinopolitanus, Dod. Lugd. miniatus, Eyf.

Lychnis Chalcedonica sive Constantinopolitana miniata, Ad. Lob.

Lychnis fortè aliquorum coccineo colore splendens, Cæs.

an Flos Scarlati, Lon.

Lychnis Chalcedonica, Tab. Ger.

Lychnis Constantinopolitana, Cast. ap. Cam.

Lychnis byzantina minuto flore, Clus. hist.

Colore variat, communiter coccineo colore splendet: vel croceo est floris Calendulæ colore, vel lilij purpurei, subinde candidi: etiam incarnatus: hinc

Flos Constantinopolitanus albus, &

Flos Constantinopolitanus incarnatus, Eyf.

Aliquando variegato: rarius flore pleno. Alia est flore ex puniceo purpurascens, folijs lævibus ac mollibus: est & miniato, quæ

Lychn. Chalcedonica colore orengiaca, Svvert.  
Flos Constantinopolitanus miniatus, Eyf.

Hæc quibusdam veterum est λυχνίς: alijs φλέξ Theoph. 6. hist. 6. Alijs πύλον apud Theoph. 6. hist. ult. cujus duo genera: unum cui flos hyacintho similis: alterum decolor, album. Idem & Plin. lib. 21. cap. 6. habet: sunt etiam qui Rosam Græcam Plinij velint.

II. Lychnis flore coccineo minor.

Ocymoides peregrini species minor, Gefn. hor.

Flos Constantinopolitanus minor, Dod.

Flos coccineus, Lugd.

Lychnis coronaria.

I. Lychnis coronaria Diosc. fativa.

Rosa mariana fativa, Trag.

Lychnis, Matth. Lac. Cam.

Verbascum montanum, Cord. in Diosc.

Lychnis fativa, vel coronaria, Dod. gal. Cæs. h.

Lychn. coronaria, Lon. Ad. Lob. Dod. Cæs. Lug.

Flamma vel Flammula Jovis, Gefn. hort.

Jovis flos Theoph. Eidem.

Flos colore variat: est rubro veluri flammeo fulgens, est dilutè rubente: habetur & albo: Item floribus albis, lineis vel punctis rubris variegatis: & incarnatis punctatis: hinc

I. Lychnis candida, Lob. ico.

Lychnis coronaria alba, Tab. Ger.

*Lychnis coronaria* fl. albo simplici, Eyft.

2. *Lychnis coronaria rubra*, Tab. Ger.

*Lychnis coronaria* flore rubro simplici, Eyft.

*Lychnis rubra*, Lob. ico.

3. *Lychnis coronaria* flore incarnato punctato, Eyft.

4. *Lychnis coronaria* flore incarnato non punctato, Eyft.

II. *Lychnis coronaria* sativa multiplex.

*Lychn. altera rubra*, Lob. ico. flore pleno, Cam.

*Lychnis coronaria* floris foliolis multiplicatis, Dod.

*Lychnis flore rubro pleno*, Bry.

*Lychnis*, Svvert.

*Lychnis coronaria* flore rubro pleno, Eyft.

Solum eam quæ flore rubro est multiplicem notavimus.

III. *Lychnis coronaria sylvestris*.

*Lychnis sylvestris*, Matth.

*Lychnis coronaria ruri nata*, Ad.

*Lychnis sylv. urbanæ similis*, Cast.

Jovis florem sylv. reperiri ait Matth. Gesn. hort.

Hanc in Rhætiæ alpebus, flore hortensi odoratiore inveniri, Gesn. hort. meminit.

IV. *Lychnis sylvestris alba simplex*.

*Rosæ marianæ similis tertia*, Trag.

*Ocymastrum* seu *ocymoides*, Matth. Lac. Tab.

*Ocymoides*, Gesn. horr.

(Cast.

*Ocymoides majus*, Cæs. Lugd.

*Lychnis sylv. alba*, Dod. gal. Cam.

*Lychnis sylv. altera*, Ad.

*Struthio similis* Waldfenraut/ Lon.

*Basilicum sylvestre*, Cast. ep.

V. *Lychnis alba multiplex*.

*Lychnis sylv. multiflora*, Ad.

*Lychnis multiflora Anglica*, Penæ, Lugd.

*Lychnis alba sylv.* Lob. ico.

*Ocymastrum multiflorum*, Ger. Tab.

*Lychnis flore albo*, Bry & Svvert.

*Lychnis sylv. flore pleno albo*, Eyft.

VI. *Lychnis prolifera flore viridi*.

*Lychnis agrestis abortiva*, multiplici viridi flore, Lob. ico.

*Ocymastrum fl. pleno viridi*, Cam. ep. Matth.

VII. *Lychnis syl. sive aquatica purp simplex*.

*Rosæ marianæ similis quarta*, Trag.

*Ocymoides purpureum*, Gesn. hor. rubrum, Thal.

*Ocymastrum rubrum*, Tab.

*Lychnis syl. purpurea*, Dod. Lugd. rubra, Cam.

*Lychnis sylv. rubello flore*, Ad. Lob.

*Melandryum Plinij genuinum*, Clus. hist.

*Lychnis sylvestris*, Eyft.

Mas in hoc genere, cui apices è medio flore prominent: femina cui nulli, idque in utroque colore: nam & mas albus purpureusque reperitur, & femina similiter, Gesn. hort.

VIII. *Lychnis purpurea multiplex*.

*Lychnis sylv. in hortis plantata flore pleno*, Dod. & Gesn. in Ocimoide.

*Lychnis agrestis multiflora*, Ad. Lob. ico.

*Ocymoides flore pleno*, Cam. ep. Matth. & hort.

*Lychnis flore rubro pleno*, Svvert.

*Lychnis sylv. flore pleno rubro*, Eyft.

*Lychnis segetum*.

I. *Lychnis segetum major*.

*Nigella*, Brunf. vulgaris, Lac.

*Githago Rosæ marianæ* 6. genus, Trag.

*Lolium*, Fuch.

*Lolium quibusdam flore parvæ rosæ*, Cord. in Diosc.

*Anthemon*, Dod. gal.

*Pseudomelanthium*, Matth. Lac. Lon. Ad. Lob.

Cast. Lugd. Thal. Ger.

*Nigellastrum*, Dod.

*Lychnis alia inter triticum*, Cæs.

*Lychnis arvensis*, Tab.

Flore est communiter rubescente, rarissime albo: hinc

*Pseudomelanthium flore rubescente*, &

*Pseudomelanthium flore albo*, Eyft.

Nec *Lolium*, nec *Mel. nthium* est: quibusdam *αὐθιμον* quondam Theoph. 7. hist. 9.

II. *Lychnis segetum minor*.

*Alfine corniculata*, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast.

Lugd. Tab. Ger.

III. *Lychnis segetum rubra folijs perfoliatæ*.

*Polygonaton* sive *Sydweich*/ Trag. ico.

*Thamecnemon*, Cord. hist.

*Vaccaria*, Dod. Gesn. hort Ger.

*Lychnis quibusdam, nonnullis perfoliata rubra*, Gesn. hort.

*Glastum*, Ang.

*Glasto similis inter segetes*, Cæs.

*Ifatis sylv. Vaccaria dicta*, Ad. Lob. Lugd.

*Vaccaria rubra major & minor*, Lugd.

*Myagrum*, *Vaccaria quorundam*, Tab.

*Condurdum Plinij quibusdam*, l. 26. c. 5.

Variat magnitudine: folijs item latioribus & angustioribus: floris colore rubro, pallido: hinc tres figuræ apud Lugdunenses.

*Lychnis*

*Lychnis sylvestris.*I. *Lychnis* sylv. quæ Been album vulgo.

Lupinus. &amp; Smilax hortensis, Brunf. ico.

Polygonaton &amp; Rosa mariana ꝑ. Trag.

Polemonium, Dod. gal. Lac. Cast. Lugd. Thal.

Polemonia, Cæf.

Polemonium pratense nostrum, Gesn. hort.

Been album, Gesn. hort. Dod. Ger.

*Lychnis* sylv. Lon. Eyst. ico.Papaver spumeum (propter asperginem sputo similem) Ad. Lob. (cui & *Ocymastrum* alterum,) Cam.

Herba articularis, Tab.

Melandrium Plinij quorundam, Clus. hist.

Duum generum: 1. in pratis albicante flore:  
2. in montibus, flore ex viridi purpurascente.  
Est etiam alia folijs latioribus, alia angustioribus & acutioribus.

II. *Lychnis* syl. latif. caliculis turgidis striatis.*Lychnis* sylv. 3. Clus. pan. at 2. in hist.*Lychnis* syl. 3. caliculis striatis, Lob. Lug. Tab.*Lychnis* caliculis striatis, Ger.III. *Lychnis* sylv. angustifol. caliculis turgidis striatis.*Lychnis* sylv. altera incana caliculis striatis, Lob. Lugd.IV. *Lychnis* flore obsoleto autumnalis caliculis turgidis.V. *Lychnis* frutescens myrtifolia, Been albo similis.*Ocymoides* fruticosum, Cam.*Lychnis* sylv. semper virens, sive *Ocymoides* arboreum semper virens, Clus. hist.VI. *Lychnis* noctiflora.

*Ocymoides* noctiflorum, Cam. quod noctu tantum  
florem odorem explicet per æstatem: autumno  
verò in odorem.

*Ocymastrum* noctiflorum, flore albo, Eyst.VII. *Lychnis* syl. pluribus folijs simul junctis.*Lychnis* sylv. prima, Clus. hisp. Lobel. Lugd. Tab. Ger.*Lychnis* sylv. octava, Clus. hist.VIII. *Lychnis* maritima repens.*Lychn. marina* Anglica, Ad. Lob. Lug. Tab. Ger.*Lychnis viscosa.*I. *Lychnis* montana viscosa alba latifolia.

Floris cuculi syl. genus, Trag.

Hohersteinbrech/ id est, Saxifraga elatior, Lon.

*Polemonium* petræum, Gesn.*Lychnis* sylv. 2. vel albo flore. 1. Clus. pan. at sylv. 9. in hist.*Lychnis* syl. Tab. flore albo, Eyst.*Ocymoides* minus sive album, Lugd.*Lychnis* alba album, Thal.*Odontis* quorundam flore candido, Cam.II. *Lychnis* viscosa alba angustifolia major.*Caryophyllus* minimus humilis alter exoticus, flore candido amœno, Lob. ico.*Lychnis* sylv. 3. vel albo flore 2. Clus. pan. at sylv. 10. in hist.III. *Lychnis* viscosa alba angustifolia minor.*Lychnidis* sylv. tertiæ secunda species, Clus. pan. vel 10. alba species, Eid. hist.IV. *Lychnis* syl. viscosa rubra angustifolia.*Lychnis* sylv. 1. vel flore rubro, Clus. pan. sylv. 4. Eid. hist.*Lychnis* sylv. purpurea, Tab.*Lychnis* sylv. Hesperis quorundam, Thal.*Lychnis* viscosa sylv. flore incarnato, Eyst.V. *Lychnis* sylv. viscosa rubra altera.*Muscipula*, Adv. Lobel. cui & *Silene* Theophr. Aldroandro.*Lychnis* sylv. 4. Clus. hisp. Lugd. Tab.*Lychnis* sylv. 3. Clus. hist.*Viscaria*, Cast.*Viscago* major, Cam.*Lychnis* sylv. incana, Ger. ico.VI. *Lychnis* viscosa purpurea latifolia lævis. an Flos Constantinopolitanus alter minor, Gesn.*Armerius* flos ꝑ. Dod. 8. at in folio 4.*Lychnis* sylv. 2. Clus. hisp. Lugd.*Lychnis* sylv. 1. Clus. hist.*Muscipula*, sive *Armoraria* altera, Lob. Lugd.*Alfene* purpurea, Lugd.*Lychnidis* fortè antiquorum 3. genus, Cæf.*Muscipula*, Cam.*Viscaria* sariva, Tab.

Alijs Been rubrum: alijs *Centaureum* minus  
purpureum viscosum: rectè ad *Lychnidem* refertur,  
cum Diosc. lib. 3. cap. 9. *Centaureum* dicat  
flore *Lychnidis*.

Variat floris colore, communiter est purpureo,  
rarius albo reperitur: hinc

*Muscipula* flore rubro, &*Muscipula* flore albo, Eyst. (asperfis.VII. *Lychnis* viscosa folijs brevibus lanugine*Lychnis* syl. 1. ex semine nata, Clus. hist.VIII. *Lychnis* viscosa floribus foris purpurascens, intus albis.

*Lychnis sylv.* 2. ex semine nata, Clus. hist.

IX. *Lychn. viscosa fol. lanuginosis, fl. carnis.*

*Lychnis sylv.* 3. ex semine nata, Clus. hist.

X. *Lychnis viscosa flore muscolo.* (Ad.

*Muscipula* sive *Viscaria altera flore muscolo,*

*Muscipula altera flore muscolo, Lob. Lugd.*

*Muscipula sive Armoria altera, Lob. ico.*

*Sesamoides magnum Salmanticum, Clus. hisp.*

& hist. Tab. Cam. Ger.

*Κραυρόφιλον, Thal.*

*Viscago, Cæs. major, Cam.*

*Orites, Lychnidis sylv. genus, Tab.*

Eodem semine duæ nascuntur: 1. flore majusculo, quæ sterilis: 2. seminifera, minore flore.

XI. *Lychnidi præcedenti affinis folijs lini.*

*Sesamoides Salmanticum parvum, Eyst.*

an *Sesamoidis Salmantici* secundum genus, quod Behen floris parvi appellatione accepit, Clus. hist.

XII. *Lychnis plumaria Tab. quid? an Muscipula flore muscolo.*

XIII. *Lychnis auriculæ Ursi facie: 1. in Prod. Lychnis sylv. latifolia, Clus. hist.*

*Lychnis hirsuta.*

I. *Lychnis sylv. campanulæ flore.*

*Lychnis sylv. species Myconi, Lugd.*

II. *Lychnis sylv. lanuginosa major.*

*Lychnis sylv. 5. Clus. hisp. & hist Lugd. Tab.*

*Lychnis sylv. hirta, Lob. Ger.*

III. *Lychnis hirta angustifolia Cretica.*

*Lychnis sylv. 7. Clus. hist.*

*Ocimoides minus flore rubro Candiz à Cabona.*

IV. *Lychnis sylv. lanuginosa minor.*

*Lychnis sylv. 6. Clus. hisp. & hist. Lugd.*

*Lychnis sylv. hirta minima, Lob. Ger.*

*Lychnis sylv. minima, Tab.*

V. *Lychnis sylv. minima exiguo flore: pro 2. in Prod. describitur.*

VI. *Lychnis incana repens.*

*Ocimoides Lychnitis, Col.*

*Lychnis alpina.*

I. *Lychn. vel Ocimoides repens montanum.*

*Cneoron, Matth. cui & Cneoron album.*

*Cneoron aliud Theoph. Matth. Lugd.*

*Myuros Aëtij, Ang.*

*Ocimoides alpinum, Gesn. hort.*

*Ocimoides repens, Cam. polygoni folio, Adv. Lob. Lugd.*

*Ocimoides alterum genus parvum, Cæs.*

*Saponaria minor, Dalech. Lugd.*

II. & III. *Ocimoidis angustifolij flore rubello: & alterius flore suaverubente, ex monte Arba meminit Cam. sed quid?*

IV. *Lychn. alpina pumila folio gramineo, sive Muscus alpinus Lychnidis flore.*

*Muscus floridus, Gesn. epist. & Fracto.*

*Caryophyllus pumilio alpinus, vel 7. Clus. pan. at in hist. sylv. 9.*

*Ocimoides muscosus, Ponæ.*

Flos colore variat, est carnei sive rubri dilutioris: reperitur & totus niveus.

## SAPONARIA.

**S**aponaria dicta, quod Saponis vicem prabeat ad pannos purgandos: Quibusdam *Struthium* Diosc. l. 2. c. 193. qui vulgo notum scribit, quo fullones purgandis lanis utantur. Plin. l. 19. c. 3. Radicula lavandis lanis succum habet, mirum quantum conferens candore mollitię: addit *Struthion* Græcos vocare, florere astate, gratam aspectu: verum siue odore, spinosam, & caule lanuginoso: semen ei nullum esse (cui *Columella* versus repugnat: à *Syrioq.* venit quæ semine radix) radicem magnam, quæ concidatur ad dictum usum. Et l. 24. c. 11. tingentibus & Radicula ramos præparat, quam *Struthium* vocari diximus à Græcis. Hæc *Saponaria quarta* convenirent, nisi spinosam diceret. Nonnulli *Urceolaris* Plinij, l. 22. c. 16. Sunt qui *Alisma* Diosc. l. 3. c. 169. censeant, cum multas *Alismatis* notas habeat.

I. *Saponaria major lævis.*

*Saponaria, Trag. Lac. Gesn. hort. Dod. Ad. Lob.*

*Cæs. Tab. Cam. Ger. Eyst.*

*Viola agrestis, Trag.*

*Struthium, Fuch. Lon. Thal. Lug. fativū, Fuch.*

*Saponaria major, Lugd.*

Floris color communiter dilute purpureus, aliquando ex roseo rubet: nonnunquam candidus est: interdum pro floribus sunt copiosiores ramuli foliacei, paucis floribus intermixtis.

II. *Saponaria concava Anglica: in Prod. de Gentiana concava, Ger.* (scripta.)

III. *Saponaria frutescens oleæ folio.*

*Saponaria altera fruticosior ex Sicilia, Cæs.*

an *Saponaria Apula, Claudino.*

IV. *Saponaria Lychnidis folio flosculis albis, an Conditi Arabum.*

*Struthion* Diosc. sive Radicula & *Lanaria* vulgo Neapoli, quia succo foliorum & radicū ad lanas purgandas utuntur, Imperato, qui ad nos misit.



## S E C T I O S E C U N D A.

## DE CARYOPHYLLEIS FLORIBUS SIVE ARMERIIS.

**C**aryophyllum florem ab odore Caryophyllorum, recentiores nominarunt: Hunc alij Cantabricam Plinij l. 25. c. 8. que in Hispania à Cantabris Divi Augusti tempore reperta fuit, esse volunt. Alijs est Vetonica sive Betonica altera, inter notha Dioscoridis: nec fortè ineptè. Alijs herba tunica: quibusdam Iphium Theoph. 6. hist. 2. & 7. ejusd. 12. sed malè. Quidam inter Saxifragias numerant, præsertim sylvestre genus, quam Gal. 5. tuend. sanat. Sarxiphagon appellasse videtur: nam & sylvestris nostra calculum frangit & educit, quod Gale- nus de Cestri seu Betonica in Gallia proveniente, testatur, Hermolao notante. Fortè & Theoph. 6. hist. 1. & 6. per Joris florem, inter coronarios frutices minutus folijs conditum, cujus flos sine odore tantum in coronarum usu, sylvestrem Caryophyllæam intellexit. Armerij flores dicuntur, à Gallico nomine Armoires & Armoiries.

Genera summa duo sunt: Altilis & Sylvestris. Altilis species multa, magnitudine, colore & foliorum numero differentes: flores namq; sunt vel minores vel medij, vel majores, vel maximi: vel multiplici, vel simplici florum textura, majoribus vel minoribus foliolis constantes. Sunt colore nivi, vel dilutè purpuræ candicantes, croceorutilantes, mimati: aut versicolores, ut candidi & crocei, candidi & rubei, candidi rubris punctulis aspersi: rubentes, aut violaceo admixto purpurei, aut rubei lacteis notis aspersi, sicq; guttati, aut rosei sylvestr. colore. Sic ex uno caule duo florum genera, partim candidi, rubrisq; maculis aspersi, partim crocei: sæpè etiam uno pediculo, flores diversi colores videas: aliquando unus ex alio medius excrecere conspicitur: aliquando in una planta flores trium colorum: in summa mangonio & arte in his floribus magna varietas fit. Sylvestrium quoq; magna diversitas existit, & in magnitudinis, & coloris, & floris, & calycis figura, pleriq; tamen simplici flore sunt.

## Caryophyllus pleno flore.

## I. Caryophyllus maximus ruber.

Caryophyll. maximus plenus flore rubro, Eyf.

## II. Caryophyllus maximus variegatus.

Caryophyllus major rub. & albicans flore pleno, Lob. ico.

Caryophyllus multiplex maximus, Tab. Ger.

Caryophylli, Cast. ap.

Caryoph. multiplex max. variegatus, Eyf.

## In hoc varietates:

1. Caryophyll. maxim. & plenissimus, colore mixto carneo, quibusdam cornicul. lacteis, Bry.

2. Caryophyllus maxim. & plenissim. colore vario in diversis folijs, Scarlatino, dilutius rubente, albo, Bry.

3. Caryoph. max. & pleniss. colore rubro saturiore, itaminulis tribus niveis in medio, Bry.

## III. Caryophyllus altilis major.

Caryophyllæa, Frag.

Betonica altilis, Fuch. Gef. col. coronaria, Lac.

Vetonica altilis, Dod. gal. coronaria, Gef. hor.

Viola flammea Scaligero, Gef. hor.

Cantabrica, Tur.

Caryophyllus domesticus, Matth. Cam. Cast.

Flos garyophyllorum, Lon.

Caryophylli nostrates, an Cantabrica Plin. Ad.

Caryophyll. Lob. multiplex, Lob. ico. Tab. Ger.

Caryophyllus altilis, Lugd.

Flos Garioflus, alijs Viola Damascena, Cæf.

Caryophyllus flore majore. Eyf.

Caryophylli flores etiam in Senarum regione, sed non ita odore grati, Garz.

Herba tunica quibusdam.

## Varietas multiplex.

1. Caryophyllus multiplex flore albo, etiam rubro & carneo, Eyf. & apud Svvert.

Caryophyllus totus albus.

Caryophyllus rubeus & sanguineus.

Caryophyllus incarnatus.

2. Caryophyllus pleno flore coloris albi, mixta & sparsa rubedine, Bry.

Caryoph. albus lineis & notulis rubris distinctus, Svvert.

3. Caryoph. alb. flammulis ruberrimis, Svve.

4. Caryophyll. albus lineis rubris subtilissimè distinctus, Svvert.

5. Caryoph. multiplex flore ex purpura rubescente, Eyf.

9. Caryophyll. flore majore partim carneus partim albus, rubris strijs ac punctulis variegatus, Eyf.

7. Caryoph. multiplex singulis florum folijs è rubro & albo colore dimidiatim divisus & punctatis, Eyf. qui

Caryo-

Caryoph. hortorum multiplex major, Lob. ico.

8. Caryoph. plenus colore umbilicotenus rubescens instar florum Persici mali, folijs latioribus, Eyft.

9. Caryoph. plenus purpurascens, punctatis folijs, Eyft.

10. Caryoph. purpureus punctulis intense purpurei coloris, Svver.

10. Caryophyllus subviridis flore, Svver.

IV. Caryophyllus altilis medius.

1. Caryoph. albus lineis cremesini coloris, & Caryophyl. minor albus lineis purpuroviaceis distinctus, Svver.

2. Caryoph. miniatus medio albescens, Eyft.

3. Caryoph. pleno flore colore violaceo, Bry.

V. Caryoph. pleno flore mali arantij colore. Caryoph. pleno fl. Silesiacus miniatus, Cl. hist. Caryoph. plenus miniato colore, Eyft.

Varietas.

1. Caryophyllus dimidia parte arantij colore, altera candida & permista, Bry.

2. Ex semine libenter provenit, sed alij flores nativum eumque saturatiorem aut dilutiorem retinent: alij albi, alij rubri fiunt: nonnulli simplici quoq; foliorum serie constant, Cl. hist.

VI. Caryophyllus pleno flore minor.

Caryoph. hortorum multiplex minor, Lob. ico. Caryophyl. pleno flore species exigua, coloris carnei, Bry.

VII. Caryophyllus supinus flore pleno rubro argenteis micis aspersis.

Caryophyllus 7. pleno flore, Clus. hist.

Caryophyllus flore minore pleno rubescens punctus, Eyft.

VIII. Caryophyllus multiplex laciniatus. Caryophyllus purpureus flore multiplici profunde laciniato, Lob. ico.

Varietas.

1. Caryophyl. multiplici laciniat. flore incarnato, Eyfter.

2. Caryoph. purpureo flore multiplici profunde laciniato, Eyft.

3. Caryoph. purpureo flore multiplici laciniato, Eyfter.

Caryoph. purpur. flore multiplici, Bry. & Svver.

*Caryophyllus hortensis simplex.*

I. Caryophyllus hortensis simplex flore majore.

Caryoph. sylv. major vulgatiore, Lob. ico.

Caryophyllæi flos simplex, Dod.

Caryophyllus simplici flore, Svvert.

Varietas magna in colore: est enim simplex miniatus, est pallide purpurascens, vel incarnatus: est versicolor, ob guttarum & rubrarum macularum asperginem: est variegatus, cujus folia albescencia stigmatibus rubris aspersa sunt: duo posteriores in Eyft. proponuntur, nomine Caryophylli simplicis hortensis versicoloris, & Caryophylli majoris sylv. variegati.

II. Caryophyl. arborescens Cret. i. in Prod. descriptus.

III. Caryophyllus simp. fl. minore pallide rubente.

Caryophyllus sylv. 3. flore pallido suaverubente, Lob. ico.

Caryophyllus hortulanus, Tab.

Caryoph. syl. simplex suaverubens, Ger.

IV. Caryoph. simp. minor flore punctato.

Caryoph. alter minimus, flore simplici micis aureis asperso, Lob. ico.

Habetur & repens flore parvo punctato.

V. Caryoph. simplex supinus latifolius.

Caryophyll. minimus pulchellus supinus, maculis aureis argenteisve aspersus, Lob. ico.

Caryophyllus sylv. 7. Clus. hist.

VI. Caryoph. simp. supinus angustifolius.

Caryophyllus virgineus, Tab. Ger.

*Caryophyllus barbatus & prolifer.*

I. Caryophyllus barbatus flore multiplici.

Armeria alba & rubra multiplex, Lob. ico. Bry. Svvert.

Armerius pleno flore, Clus. pan. & hist.

Caryophyllus Carthusianorum 3. Tab.

Armeria rubra latifolia, Ger.

Armerius pleno rubro flore, Eyft.

Duplex est: vulgatiore rubro flore, rariore albo: Hujus præter rubrum & album adhuc differentia apud Svvertium, quæ Armeria alba multiflora.

II. Caryophyllus barbatus flore roseo.

Armeria multis & separatim positis floribus duplicibus & magnis, coloreque ruberrimis, Svvert.

III. Caryophyl. barbatus hortensis latifolius.

Lychnis monachorum, Gef. hort.

Armeria alrera, multis in latum orbiculum congestis floribus, Lob. ico.

Viola barbata latifolia, Lugd.

Caryophyllus Carthusianorum 1. Tab.

Armeria suaverubens, Ger.

an *Lychnis* fortè antiquorum altera, Cæf.

*Flos Scarletii*, Lon. Gef. ap.

Flore est communiter rubro, habetur albo maculis lactei coloris notato: est & diversicolor, ex albo rubro & medio: hinc

1. *Armeria simplex* flore rubro, Bry, & Svver.

*Flos armerius ruber*, Eyst.

2. *Armeria* flore albo, Bry, Svver.

*Flos armerius albus*, Eyst.

3. *Flos armerius variegatus*, Eyst.

IV. *Caryoph. barbatus* hortens. angustifolius.

*Armeria altera* suaverubente flore, Lob. ico.

*Armerius flos alter*, Dod.

*Armerius simpliciflore* pannonicus, Clus. hist.

*Caryophyllus Carthusianorum* 2. Tab.

*Armeria rubra*, Ger.

Hujus differentiae quinque: 1. eleganti est flore, eoq; aut planè rubro, aut lactei candoris maculis asperso, aut niveo, oris carnei coloris: 2. omnino niveo: 3. flores pauciores dilutius rubentes & carnei coloris: 4. flos purpurascens, oris albis: 5. flores die primo & secundo quo aperti sunt, lactei prorsus candoris, sequentibus paulatim albedine evanescente, tandem omnino purpurascunt, sic ut in eadem umbella flores lacteos, alios exalbidos, & media ex parte purpurascens, alios omnino purpureos conspiciere liceat.

V. *Caryophyllus barbatus sylvestris*.

*Armeria* sylv. altera, Lob. ico.

*Viola barbata* angustifolia, Lugd.

*Caryophyllæa* sylv. prima, Thal.

*Flos Gariofilus* syl. minimi floris saturatae purpureae, Cæf.

VI. *Caryophyllus* sylv. proliferus & Eyst.

*Caryophyllæa* sylv. quarta, Thal.

*Armeria prolifera*, Lob. ico.

*Armerius flos proliferus*, Cam.

*Caryophyllus* sylv. minimus, Tab.

*Viscaria*, Ger. ico.

Huic ex capitulo, sæpè septem, octo, aliquando novem flores prorumpunt.

VII. *Caryophyllo* prolifero affinis, unico ex quolibet capitulo flore.

*Caryophyllæa* syl. quartæ, alia species, Thal.

*Caryophyllus sylvestris*.

I. *Caryophyllus* sylv. vulgaris latifolius.

*Dondernaegelii*, Brunn.

*Caryophyllæa* sylv. Trag.

*Caryophyllæa* sylv. Matth. Lugd. Cast.

*Betonica* sylv. prima, Fuch.

*Vetonica*, Dod. gal.

*Cantabrica* sylv. Tur.

*Tunica* sylv. Lon.

*Caryophyllæa* sylv. 3. Thal.

*Armerius flos primus*, Dod. Lugd.

*Armeria* sive *Caryophyllus minor* sylv. minus odoratus folijs latioribus, Ad. Lob.

*Flos gariofilus* sylv. Cæf.

*Caryophyllus montanus primus*, Tab.

*Armeria alba*, Ger. ico.

*Caryoph. minor* sylv. flore simplici, Eyst.

Flore est odore & inodoro purpureo: simplici & pleno: hinc

*Caryophyllus minor* sylv. flore pleno, Eyst.

*Caryophyllus montanus multiflorus*, Tab.

*Caryophyllus montanus purpureus*, Ger.

II. *Caryophyllus* syl. vulgaris angustifolius.

*Caryophyllus montanus albus*, Tab. Ger.

III. *Caryophyll. sylv. biflorus*: 3. in Prod.

IV. *Caryoph. pumilus latifolius*: 4. in Prod.

V. *Caryoph. syl. flore magno inodoro hirsuto*.

*Caryophyllus* sylv. 2. Clus. pan. & hist.

VI. *Caryophyllus* sylv. humilis flore unico.

*Armerius flos terrius*, Dod.

*Caryophyllus repens humilis minimus vulgarissimus rubellus*, Lob. ico.

*Caryophylli* sylv. Cast. ico.

*Caryophyllus* sylv. 1. Clus. pan. & hist.

Singuli cauliculi unicum florem, diluta purpura rubentem odorem sustinent.

VII. *Caryophyll. albus parvus repens*, Cam. Osteocallon Absyrti Italici, Eidem.

VIII. *Caryoph. cæruleus Monspeliensium*.

*Aphyllanthes Monspeliensium*, Ad. Lob. ico.

*Caryophyllus cæruleus*, Tab. Ger.

Rarius flore niveo reperitur.

IX. *Caryophyll. sylv. repens multiflorus*: 2. in Prodr.

X. *Caryophyllus* sylv. *Carinthiacus ruber*.

*Caryoph. syl. 4. vel Tauricus*, Clus. pan. & hist.

XI. *Caryoph. alpinus calyce oblongo hirsuto*.

*Caryophyllæus pumilio Tauricus*, sive 8. Clus. pan. sylv. 7. Eid. hist.

*Caryophyllus montanus terrius*, Tab.

*Caryophyll. mont. Clusij*, Ger.

*Caryophyllus simplex laciniatus*.

I. *Caryophyllus* flore tenuissimè dissecto.

*Superba*, Trag. Lon. Thal. Cam.

*Diosanthos Theophrasti*, Ang.

*Vetonica altilis minor*, Dod. gal.

*Vetonica sylv. tertia*, Gef. hort.

*Betonica sylv. altera*, Fuch.

*Caryophyllatæ genus*, Gef. col.

*Caryophyllæus minor*, Dod.

*Superba recentiorum*, Ad.

*Superba alba media corolla purpureo violacea*,

*Bry: obsoleta cincta*, Lob. ico.

*Armeria, Vetonica coronaria*, Lugd.

*Caryophylli sylv. 5. species 3. Clus. pan. & hist.*

*Caryophyllus plumarius albus*, Tab. Ger.

*Caryophyllus sylv. flore albo picto*, Eyft.

*Superba alba, corollâ purpureo rubrâ*, Svver.

Flos nunc alb. nunc dilutius rubens & carne<sup>9</sup>.

II. *Caryoph. syl. flore laciniato albo inodoro.*

*Superba major flore albo*, Lob. ico. Svvert.

*Caryophyllus sylv. plumarius albus*, Tab. Ger.

III. *Caryop. syl. alter fl. laciniato odoratissimo.*

*Armerius flos quartus*, Dod.

*Caryophyllus minor alter*, Eid.

*Caryophyllus sextus*, Clus. pan. & hist.

*Superba Austriaca*, Lob. ico.

*Carioph. sylv. flore laciniato carneo*, Eyft.

*Caryoph. species altera flore carneo*, Bry.

*Carioph. sylv. flore purpurascens, & alter flore incarnato*, Eyft.

Flos aut candidus, aut purpurascens, suavis odoris.

IV. *Caryoph. syl. tertius flore laciniato, staminibus corniculatis odoratis.*

*Caryophyllus 5. vel sylv. 1. albo flore*, Clus. pan. sylv. 5. Eid. hist. (odoro.

V. *Caryoph. syl. fl. laciniato, sine corniculis,*

*Caryophyllæus syl. 3. fl. rubro*, Clus. pan. & hist.

*Caryop. syl. fl. simplici, laciniato rubro*, Lob. ic.

VI. *Caryop. syl. floribus lanuginosis hirsutis.*

*Superba altera & suavcrubens*, Lob. ico.

*Caryophyllæi syl. 5. species alt.* Clus. pan. & hist.

*Caryoph. plumarius purpureo cærul.* Tab. Ger.

*Caryophyllus sylv. flore albo*, Eyft.

Flos candidus est: alterius flores purpurascens lanugine hirsuti.

VII. *Cariophyllus pratensis flore laciniato simplici, sive Flos cuculi.*

*Flos cuculi prat.* Trag. *Flos cuculi*, Lon. Gef. col.

*Vetonica sylv.* Dod. gal.

*Odontitis Plinij*, Gef. hor. quorundam, Cam.

*Odontitis simplici flore*, Clus. hist.

*Armerius sylv.* Dod.

*Armeria prat.* sylv. Lob. 2. sylv. Lugd.

*Armoraria sylv. pratensis*, Ad.

*Cariophyllus pratensis*, Tab.

*Armeria pratensis mas & fœmina*, Ger.

*ῥέοναυλ* & altera, Thal.

Flore est rubello, rarius albo.

VIII. *Caryophyllus pratensis flore pleno.*

*Odontitis flore pleno*, Cam. Clus. hist.

*an Caryophyllus mont. multiflorus*, Tab.

*Odontitis Plinij*, Eyft.

*Caryophyllus holostius arvensis.*

I. *Caryophyllus arvensis hirsutus fl. majore.*

*Caryophyllus holostius*, Lob. ico. Ger.

*Holostium caryophyllæum*, Tab.

II. *Caryophyllus holostius tomentosus latifolius: qui 9. in Prodr.*

III. *Caryophyllus holostius tomentosus angustifol. hic 10. in Prod.*

IV. *Caryop. arvensis umbellatus folio glabro.*

*Holostæum caryophyllæum arvense*, Tab.

*Caryophyllus holostius arvensis*, Ger.

*Alfine verna Dalechampij*, Lugd.

Caulis aliquando rubet, aliquando viret, ramulis aliquot erectis, aliquot verò cum floribus reflexis: communiter flos albus, aliquando subpurpurascens.

V. *Caryophyll. arvensis glaber flore majore.*

*Euphrasia gramen*, Trag.

*Cratægonum fortè*, Dod. gal.

*Gramen, Fuch. Lac. leucanthemon*, Dod. Thal.

Lugd. Ger.

*Gramen alterum*, Matth.

*Holostium Dios. fl. albis vel ὁλόγιον* Æginet. Ad.

*Holostium Ruellij*, Lob.

*Euphrasia major*, Lon.

*Gramen floridum*, Cam. in Matth. majus, Tab.

VI. *Caryophyllus arvensis glaber fl. minore.*

*Holostij Ruellij diversitas*, Lob. ico.

*Gramen floridum minus*, Thal. Tab.

*Gramen leucanthemum alterum*, Ger.

Quandoq; è medio florû staminula rubra exeût.

VII. *Caryophyllus arvensis glaber minimus: hic 11. est in Prodr.*

*Caryophyllus holostius alpinus.*

I. *Caryoph. holost. alpinus latifol. 5. in Prod.*

II. *Caryophyll. holostius alpinus angustifolius purpurascens: 6. in Prodr.*

III. *Caryoph. holost. alpinus gramineus: 7. in Prodr.*

IV. *Caryophyllus holostius montanus angustifolius alter: 8. in Prodr.*

*Caryophyllus montanus.*

I. *Caryophyll. mont. major flore globofo.*  
*Gramen polyanthemum majus, Dod.*  
*Gramen marinum majus, Clus. pan. Tab.*  
*Caryophyllo marino similis, Ad.*  
*Caryophyllus mont. Lob. mediterraneus, Ger.*  
*Statice, à sistendo sanguine, Lugd. Cam. cui vi-*  
*detur Britannica, Ang.*  
*Armerius mont. tenuifol. major, Clus. hist.*

II. *Caryophyllus montanus minor.*  
*Pseudomoly, Dod. gal. Gefn. hort. Lugd.*  
*Gramen polyanthemum minus, Dod.*  
*Gramen marinum minus, Clus. pan. Tab.*  
*Caryophyllus marinus minimus, Ad. Lob. Ger.*  
*Armerius mont. tenuifol. minor, Clus. hist.*

*Hic caule est aliquando prolifero.*

*Caryophyllus saxatilis.*

I. *Caryophyllus saxatilis folijs gramineis,*  
*umbellatis corymbis.*  
*Symphytum petraeum, sive Gypsophyton ma-*  
*jus, Thallio.*

II. *Caryoph. saxatilis folijs gramineis minor.*  
*Symphytum petraeum sive Gypsophyton mi-*  
*nus, Thallio.*

III. *Caryophyllus saxatilis filiquosus: qui*  
*Caryophyllus 14. in Prod.*

*Gypsophyti filiquosi nomine à D. Fürero acce-*

IV. *Caryophyllus saxifragus. (pimus.*  
*Saxifraga magna, Matth. Lob. Lugd. Cam.*  
*Saxifraga 5. Cast.*

*an Saxifraga Bavarica, Cam. Ponæ.*

V. *Caryophyllus saxifragus strigosior, vel*  
*Caryophyll. sylv. flore minimo. (ico.*

*Saxifraga sive Saxifraga antiquorum, Ad. Lob.*

VI. *Caryophyllus saxatilis Ericæfolius um-*  
*bellatis corymbis: 12. in Prod.*

VII. *Caryophyllus saxatilis Ericæfolius*  
*ramosus repens: 13. in Prod.*

VIII. *Caryophyllus saxatilis floribus ru-*  
*bris: 13. altera species in Prod.*

IX. *Caryophyllus minimus muralis.*  
*Tunica minima, Lugd.*



## SECTIO TERTIA.

ANTIRRHINUM; LINARIA; LINUM; POLYGA-  
 LA; ONOBRYCHIS; GLAUX; STOECHAS;  
 LAVENDULA; ROSMARINUS.

## ANTIRRHINUM.

**L** Ichnidem agriam Plin. l. 25. c. 10. ipsum Antirrhinum ex Galeno (cui λυχνίς ἀγρία & βουγαίνιον vocant.  
 quia flore sit Leucoij, minore tamen ut Diosc. l. 4. cap. 133. loquitur. Quare post Lychnides & Caryo-  
 phyllæos flores, Antirrhinum (cum & ipsum flore placeat) subiungere volumus.

Ἀντίρρινον ἢ ἀνάρρινον Dioscoridi, l. 4. c. 133. dictum, quod fructu sit vituli narium simili. Theophrasto 9.  
 hist. 21. ἀνάρρινον fructum tanquam nares vituli parit. Plinio loco citato Antirrhinon sive Anarrhinon, sive  
 Lychnis agria. Sunt qui velint ab eodem, l. 30. c. 2. Cynocephalum herbam dici, id est, canis caput, quod se-  
 minis conceptaculum canis calyam, cute & carne exutam representer. Veteres unius tantum meminisse vi-  
 dentur, at recentioribus plures sunt differentia.

I. Antirrhinum majus rotundiore folio.  
*Cynocephalus Plinij, Lugd.*  
*Antirrhinum majus flore roseo, Cam. hort.*

II. Antirrhinum majus alter. folio longiore.  
*Antirrhinum 2. Matth. Lugd. (Cam.*  
*Antirrhinum magnum, Dod. gal. Lugd. majus,*  
*Antirrhinum, Gefn. h. Dod. Ad. (vulgo caput ca-*  
*nis & caput vituli) Lob. Tab. cui Antirrhinū &*  
*Antirrhinum album: at Ger. purpureum & al-*  
*Os leonis vulgo, Cæf. (bum.*  
*Antirrhinum flore rubro & flore albo, Eyst.*

*Flore habetur roseo, rubente, aliquando ma-*  
*culato, ex candido dilute purpurascens: can-*  
*dido: an hoc, quod flore est albo, sit*

*Antirrhinum 4. Matth. Lugd.*

*Est & flore albo, oris tantum rubris, vel ru-*  
*bentibus, vel luteis, & dicitur*

*Antirrhinum flore albo oris rubentibus, &*

*Antirrhinum flore albo oris rubris.*

*Antirrhinum flore albo oris luteis, Eyst.*

*Folij quoq; variat latioribus & angustioribus.*

III. *Antirrhinum luteo flore. (bus.*

*Antirrhinum flore luteo, Gefn. hort. Ad. Lob.*  
*ico. subluteo, Dod. luteo grandi, Cam.*

*Antirrhinum luteum, Tab. Ger.*

*Hoc à priore & floris colore & folio variat:*  
*quod verè flore est albo non item.*

IV. *Antirrhinum folio dissecto: hoc inter*  
 Dd 2 plantas

plantas ficas Monspessuli collectas apud fratrem Joh. Bauhinum p. m. vidimus.

V. Antirrhinum arvense majus.

Antirrhinum, Eric. Cord. (cui & Rhinoceros) Tur. Lac. Lon.

Antirrhinum 1. Matth. 4. Lugd. Cam. ep. Matth. Orontium, Dod gal.

Antirrhinum Cynocephalæa & Bucranion, Cord. in Diosc.

Antirrhinum minus, Gesn. hort. (vel folijs hyllopi, Eid. col.) Tab. Ger.

Antirrh. minimum, Ad. (forsan Archigenis Orontium, vel Aurantium) Lob. medium, Cam.

Antirrhinum parvum, sive caput Simiæ, Lugd.

Antirrhinum sylv. (sive Phyteuma) Dod. Eyll.

Phyteuma *χρυσά* Cydoniæ, Belli ep. 12. ad Clus.

Osleonis alterum, Cæs.

Antirrhinon rubrum arvense, Thal.

Hoc quibusdam Phyteuma Dioscoridis, l. 3. c. 130. alijs Orontium Archigenis, quasi Aurantium, quod auriginem morbum levet: quod aliquando procerius, aliquando brevius pro ratione folii reperitur.

VI. Antirrhinum arvense minus.

Antirrhinum 3. Matth. Lugd.

Antirrhinum arvense, Gesn. col.

Antirrhinum minimum, Thal. Cam.

Antirrhinum alterum minimum repens, Lob. icon.

Antirrhinum sylv. Cast.

Osleonis in vineis, Cæs.

VII. Antirrhinum saxatile, folijs serpylli: quod in Prodr. describitur.

## LINARIA EJUSQUE SPECIES.

**C**um *linaria* quibusdam *Antirrhini* species videatur, & an *Antirrhinum* Plinij sit quidam dubitent, hic proponemus. Quibusdam *Osyris* censetur, ex qua. Galeni seculo, ut & nunc in Italia, scopæ consuebantur. *Osyris* folijs est lim initio nigris, dein rubescentibus, &c. Dioscoridi, l. 4. c. 143. & Plin. l. 27. c. 12. *Osyris* folijs est nigris ceulini, semine initio nigro, dein rubescente, &c. *Linaria* latinis, quod folijs lim sit.

*Linaria erecta latifolia.*

I. *Linaria latifolia* Dalmatica magno flore: quæ 1. in Prod.

II. *Linaria Americana*, parvo flore luteo: quæ 2. in Prod.

III. *Linaria latifolia triphylla* major: 3. in Prodr.

*Linaria Cretica latifolia*, Clus. hist.

IV. *Linaria triphylla minor* lutea.

*Linaria Valentina*, Clus. hisp. Dod. Lob.

*Linaria Hispanica* 1. Clus. hist.

V. *Linaria triphylla cærulea*.

*Linaria cærulea* Apula, Col.

VI. *Linaria tenuifolia*, æruginei coloris.

*Linaria Hispanica* 2. Clus. hist.

VII. *Linaria bellidis folio*.

*Linaria odorata*, Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.

*Linaria purpurea*, Ad. odorata, Lob. Ger.

*Osyris odorata purpurea*, Tab.

*Linaria erecta angustifolia.*

I. *Linaria scoparia*.

Belle videre, Gesn. hort.

*Scoparia*, Gesn. hort. Ad. Lob. Lugd. Ger.

*Osyris*, Ang. Dod. Cast. Cam.

*Linaria magna*, Lugd.

*Herba studioforum*, Tab.

*Osyris* græcorum quibusdam: alijs id negantibus, quamvis hodie in Græcia *ἀγρίος* nominetur: alij an *Chamæcyparissus* Plinij sit dubitant.

II. *Osyris frutescens baccifera*. (ep.

*Cassia* poetica Monspeliensium, Ad. Lob. Cam.

*Cassia* quorundam, Clus. hisp. & hist. Tab.

*Cassia lignea*, Cæs.

*Cassia lignea maritima*, Lugd. (Plin.

*Polygonum* 4. Plinij quibusdam, Dalech. iii

Variat: communiter atrovirens, aliquando

tota rubet & ramis & folijs, ideo quidam

*Genistam* rubeam vocant, Cæs.

*Osyris* Plinij, lib. 27. cap. 12. videtur, quæ ut

habet ramulos fert nigros, tenues, lentos, & in

ijs folia nigra ceu Lini, semendq; in ramulis ni-

grum initio, dein colore mutato, rubescens:

smegmata mulieribus faciunt ex his: Galenus

8. simpl. ex *Osyride* *νορίμα* fieri tradit, quæ alij

interpretantur smegmata, ut Plinius, alij sco-

pas, alij *νόσση* *αἰμακωπία*.

III. *Linaria vulgaris lutea* flore majore.

*Linaria* (& *Pseudolin.*) Brunf Ger. 1. Dod. Lon.

*Linaria vulgaris*, Trag. Cam. Eyll. vulgo, Gesn.

hort Cæs.

*Osyris*, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc.

Tur. Lac. Ad. Lob. Lugd. Cast. major, Tab.

Floris

Floris color luteus, luteopallidus, rarius albus: flore minore etiam, in agris reperiri Traugus asserit.

IV. *Linaria lutea montana* Genistæ tinctoriæ folio: hæc ad montem S. Bernhardi, floribus aureis, mediæ magnitudinis, reperitur.

V. *Linaria lutea flore minimo*: hæc in agris Provinciæ Galliæ, brevibus & angustis folijs & minutissimis flosculis luteis, occurrit.

VI. *Linaria folioso capitulo luteo major*. *Linaria* 3. & *Heliochrysos*, Trag. quarta, Lon. *Linaria aurea* Tragi, Lobel. Lugdun. Tab. Ger. Eystett.

*Linaria Austriaca*, Cam. *Osyris Austriaca*, Clus. pan. & hist. *Chrysocome Diose.* & Plinij, Guil. Col. *Linofyris nuperorum*, Lobel. recentiorum, Lugd.

VII. *Linaria folioso capitulo luteo minor*. *Linaria aurea minor*, Tab. *Osyris purpureo cærulea*, Ger. ico.

VIII. *Linaria flore pallido rictu aureo*. *Linaria pannonica* 1. Clus. pan. & hist. Tab. *Linaria purpurea altera*, Ger. ico. an *Osyris alba*, Lob. ico.

IX. *Linaria flore pallido rictu purpureo*. *Linaria flore albicante inodoro*, Cam. *Linaria flore albicante*, Eyst.

X. *Linaria purpurea major odorata*. *Osyris altera*, Dod. gal. *Linaria altera purpurea*, Dod. *Linariæ purpureæ varietas*, Lob. *Linaria cærulea*, Cast. Lugd. Cam. *Linaria purpurea elatior*, Eyst.

Varia flosculis purpureis, purpureo violaceis albis & cæruleis: folijs etiam magis minusve angustis.

XI. *Linaria capillaceo folio odora*, quæ 4 in Prod.

*Linaria caryophyllata*, Cam.

Flore est albicante: ex cæruleo & albo mixtis, rictu linea flavescente distincto.

XII. *Linaria capillaceo folio altera*. *Linaria tenuifolia* Lugd.

Flos primum hiet, rubet; cum apertus est ex rubro albicat: est & coloris varij ex albo, cæruleo & albo mixtis.

XIII. *Linaria folijs angustis ex viridi canescentibus*.

*Linaria Hispanica* 3. Clus. hist.

Flos utunque odoratus: externè ex albidus, internè purpureus, rictu ex flavo albicante, labio purpureo.

XIV. *Linaria arvensis cærulea*: 5. in Prodromo.

Flore est cæruleo, est & violaceo.

XV. *Linaria montana flosculis albicantibus*.

*Anonymos tenuifolia*, Clus. pan. & hist.

*Anthyllis montana*, Lugd.

*Linaria montana sive sylvatica*, Thal.

*Linaria adulterina*, Tab.

*Linofyris nuperorum*, Ger. ico.

XVI. *Linaria quadrifolia exiguis flosculis cinereis*.

*Linaria Cretica angustifolia*, Clus. hist.

XVII. *Linaria quadrifolia lutea*.

*Linaria tetraphylla lutea minor*, Col.

XVIII. *Linariæ aureæ affinis*: quæ 6. in Prod.

*Linaria pumila seu repens*.

I. *Linaria pumila supina lutea*.

*Linaria pumila*, Clus. hisp.

*Linaria Hispanica* 5. Clus. hist.

*Osyris flava sylv.* Lob. ico.

*Osyris minor*, Tab.

*Linaria Valentina*, Ger. ico.

II. *Linaria pumila foliolis carnosis, flosculis minimis flavis*.

*Linaria* 2. Moravica 1. Clus. hist.

III. *Linaria folijs carnosis cinereis*.

*Linaria Hispanica* 4. Clus. hist.

Flos cærulei dilutioris ad cineraceum tendentis, rictu flavo.

IV. *Linaria cærulea repens*.

*Osyris purpureo cærulea repens*, Ad. Lob. ico.

*Linaria altera floribus purpurascens*, Cæf.

*Linaria minor Dalechampij*, Lugd.

*Linaria parvo flore cæruleo*, Cam.

*Linaria* 4. Moravica 2. Clus. hist.

Floris color cæruleus, ex violaceo purpurascens.

V. *Linaria quadrifolia supina*.

*Linaria alpina*, Gesn. hort. & ep.

*Linaria pannonica* 2. Clus. pan.

*Linaria alpina pumila*, Tab.

*Linaria* 3. Styriaca, Clus. hist.

*Linaria Styriaca repens*, Eyst.



## LINUM EJUSQUE SPECIES.

*À*ver Dioscoridi, lib. 2. cap. 125. Theoph. 8. hist. 7. qui 3. caus. 21. in *Lolium mutari* scribit. *Linum* Plinio, lib. 19. cap. 11. *cujus generatione loci natalis* recenset.

*Linum latifolium.*I. *Linum sativum.*

*Linum*, Brunf. Matth. Fuch. Cord. in Dioscor.

Tur. Lac. Lon. Cæs. Lugd. Cast.

*Linum sativ.* Trag. Dod.

*Linum* vulgare cæreuleum, Ad. Lob.

II. *Linum arvense.*

*Linum* sylvestre, Trag. Tur.

Caulibus & folliculis crassioribus à priori differt, & inter avenam reperitur.

III. *Linum syl. latifol. hirsutum cæreuleum.*

*Linum* sylv. 1. Clus. pan. Dod.

*Linum* sylv. latifol. Lob. ico. Clus. hist.

Flos cæreuleus, aut vegetior, aut dilutior.

IV. *Linum sylv. latifol. hirsut. candidum*, purpureis venis distinctum.

*Linum* sylv. latifol. 1. Clus. hisp. at 2. in hist.

*Linum* sylv. latifol. folijs hirsutis Tithymali helioscopij, Lugd.

V. *Linum fruticosum niveum.*

*Linum* sylv. fruticosum, vel 3. Clus. hisp. at in hist. 7. fruticosum.

*Linum* sylv. 2. flore albo, Lugd.

VI. *Linum sylv. latif. caule viscoso floribus* rubro: ex montibus Bononiensibus & Sumano habemus, quod & circa Ingolstadtium reperitur.

VII. *Linum sylv. cæreuleum flore aureo*: quod 2. in Prod.

VIII. *Linum sylv. latifolium luteum.*

*Linum* sylv. 2. Clus. pan. at 3. in hist.

*Linum* sylv. pannonicum, Tab.

*Linum sativum*, Ger. ico.

IX. *Linum sylv. luteum folijs subrotundis*. Campanula lutea linifolia, Ad. Lob. Lugd.

X. *Linum luteum ad singula genicula floridum*.

*Linum luteum* sylv. latifolium, Col.

XI. *Linum fruticosum subflavum*: quod 1. est in Prod.

XII. *Linum maritimum luteum.*

*Linum* sylv. Matth. Dod. Cæs. Cast. Lugd. Cam.

*Linum marinum luteum*, Adv. Narbonense, Lobel.

XIII. *Linum Virginianum.*

*Linum* spontè prodit, ab Anglico caule & fo-

lijs diversum, materia tamen perinde bona: in desc. Virgin.

*Linum sylv. angustifolium.*

I. *Linum sylv. angustifolium flore magno*.

*Linum* sylv. 4. Clus. pan. sylv. 5. angustifol. 2. Eid. hist.

*Linum* sylv. 3. Dod. Tab. Cam. ep.

*Linum* sylv. floribus albis, Lob. Ger.

*Linum* sylv. 2. floribus albis, Lugd.

*Linum* sylv. tenuifolium, Cam.

Flore est cæreuleo intenso, violaceo, albo, albo lineis purpureis distincto. Reperitur colore cæreuleo in candidum languescente & veluti cinereo, capitulis etiam longè amplioribus, quod Lini sylv. angustifol. albi aliud genus, Clus. pan. & hist.

II. *Linum sylv. angustifol. floribus dilutè purpurascentibus, vel carneis*.

*Linum* sylv. angustifol. vel 2. Clus. hisp. Dod.

Lini sylv. 4. species 3. Clus. pan. at 6. in hist.

III. *Linum sylv. angustis & densioribus folijs flore minore*.

Linaria, 4. Trag.

*Linum* sylv. 3. Clus. pan. Lugd.

*Linum* sylv. tenuifolium, Lob. Tab. Ger.

*Linum* sylv. cæreuleo flore, Cam. ep. Eyf.

*Linum* sylv. 4. angustifol. 1. Clus. hist.

Flos ex diluta purpura albicat, & quasicarneus.

IV. *Linum syl. angustifol. folijs rarioribus*.

*Linum* sylv. 2. Tab. sylv. tenuifolium, Ger.

Flore est cæreuleo; reperitur & albo.

V. *Linum sylv. minus.*

*Linum* sylv. 5. Clus. pan. at 8. in hist.

Chamælinum, Lob. Lugd. cæreuleum, Tab.

Chamælinum perpallidum, Ger.

*Linum* pusillum candicantibus floribus, Cam.

Flore est candido, vidimus & luteo.

VI. *Linum minimum stellatum*: quod 3. in Prodromo, & quibusdam dicitur.

Passerina minor saxatilis.

VII. *Linum pratense flosculis exiguis*.

*Linum* sylv. pusillum candicantibus floribus,

Linocarpos, Thal.

*Linum* sylv. exiguum, Cam. ad Thal.

(Cam. POLY-

## POLYGALA EJUSQUE SPECIES.

**Π**ολύγαλον frutex brevis est, palmi altitudinem petens, folijs Lenticula, gustu subacerbo (astricte Plinio) potus lactis abundantiam facere creditur (facit Plin.) unde nomen habet, Dioscoridi, l. 4. c. 142. Plinio l. 27. c. 12. Sunt qui nostram intellexisse velint, cum nostra potius ad Onobrychidem Diosc. referenda videatur.

## I. Polygala major.

Polygala vulgaris major, Clus. pan. &amp; hist.

Polygala major, Tab.

Variat flore, qui modo dilutioris purpuræ,

modo cæruleus, modo albus; hinc tres figuræ

Polygala major alba: cærulea: purpurea, Tab.

Polygala purp. flore cæruleo: rubris florib. Ger.

## II. Polygala vulgaris.

Polygalon, Trag.

an Thesion, Ang.

Polygala, Dod. gal. Tur. Lon. Thal. Cam. Tab.

Ger.

Polygala recentiorum, Ad. Lob.

Onobrychis vera Dioscoridis, Eid.

Flos ambervalis, Dod.

Amarella, Gefn. ep.

Crucis flos, Eid. col.

Polygala vulgaris minor, Clus. hist.

Floribus est cæruleis, violaceis, dilutioris

purpuræ seu rubris, vel berfilici, vel sanguinei

coloris: rarius niveis albisque: hinc tres figuræ

Polygala recent. rubris floribus: albis floribus,

Lobel.

Polygala cærulea: purpurea: alba, Tab.

Polygala obsoleto flore: albis floribus, Ger.

Polygalon flore rubro purpurascens: &amp; flore

cæruleo, Eyst.

Est &amp; alia foliolis circa radicem rotundiori-

bus, flore cæruleo, sapore admodum amaro, qui

in cæteris nō ita insign. animadvertitur, Thal.

III. Polygala acutioribus folijs Monspeliaca.

Onobrychis 3. Lugd.

IV. Polygala lutea.

Polygala, Ang. Cam.

V. Polygala repens nivea.

Polygala, Cast. repens, Lob. Lugd. Tab. Ger.

VI. Polygalæ affinis.

Chamæmyrsine quorundam, Lugd.

## ONOBRYCHIS.

**Ο**νοβρυχίς folia habet Lentis serè longiora, caulem dodrantalem, florem panicum, radicem exiguum, Dioscoridi, l. 3. c. 170. Alij Polygalæ vulgatæ, non ad eò malè: alij Capiti gallinaceo, de quo inter Vitia agitur: alijs sequentibus tribuunt, & ab asini ruditu nomen habere volunt.

I. Onobrychis 4. lutea, Dalech. Lugd. quid?

Onobrychis altera Belgarum, Lob. Eyst.

II. Onobrychis arvensis: vel Campanula arvensis erecta.

Elatine, Cæsal.

Onobrychis, Dod. gal. prima, Lugd.

Speculum Veneris, Ger.

Avicularia Syloij, Gef. col.

Viola anonymos inodora, Eid.

Campanula parva tertia, Dod. 8.

Campanula arvensis minima, Dod.

Folij ludit, superioribus latioribus caulem amplexantibus, inferioribus longioribus, nullis crenatis, sed quibusdam crispatis: hinc apud Tab. duæ figuræ, nomine

Violæ arvensis, &amp; Violæ pentagoniæ.

## GLAUX.

**Γ**λαῦς folijs Cytiso aut Lenticula similis est, superne virens, inversa candicans: ramulis quinque sensive à terra, tenuibus, à radice dodrantalibus: flores violæ albæ. purpurei exeunt, at minores: nascitur juxta mare: in sorbitione lactis ubertatem intermissam restituit, Dioscorides lib. 4. cap. 141. Plinius lib. 27. cap. 9. cui Glaux antiquitus engalacton. Fortè γλαῦς quasi γάλαξ lac. Glaucis nomen, Tragus Polygalæ flore rubro tribuit: at eam quæ flore est albo, Polygalam Dioscorid. facit. Sunt qui Glaucis nomen enidam leguminosæ, de qua suo loco, tribuant.

## I. Glaux maritima.

Glaux, Dod. gal. Lugd. Cam.

Glaux exigua maritima, Ad. Lob. Ger.

Glaux marina minor, Tab.

II. Glaux latiore folio Thuringiaca,

Glaux, Cord. in Diosc. altera, Cam.

Varie-

Varietas in hac: alia enim major, folijs modo delapsa, ceu geniculato: qualis circa Egram do latioribus, modo angustioribus: alia minor locis nitrosis provenit: Similem ex Scotia habentis cespitibus, cauliculo inferius ob folia bemus.

### STOECHAS ARABICA.

**Σ**ΤΥΧΑΙ, ab Insulis ejusdem nominis, è regione Masilia, ubi nascitur, cognomentum accepit, teste Dioscoride l. 3. c. 32. Plin. l. 28. c. 12. Sunt qui rectius Stachyn, quasi spicam, dici existiment.

I. Stœchas purpurea.  
Stœchas, Trag. Matth. Gef. hor. Lac. Ad. Lobel.  
Lon. Cast. del. Lugd.  
Stichas, Fuch. Dod. gal. Tur.  
Stichas Arabica, Cord. in Diosc. & hist.  
Stœchas Arabica, Camer.  
Spica Italica sylv. Cæs.  
Stœchas brevioribus ligulis, Clus. hist.  
Variat: namea, quæ ex Arabia adfertur, densioribus est ramulis.  
II. Stœchas cauliculis non foliatis.  
Stœchas, Cast. ico. Dod. 8. in Belgio nata, Eid. fol.  
Stœchas nudis cauliculis summis, Lob.  
Stœchas capitulis foliatis, Lugd.

Stœchas longioribus ligulis, Clus. hist.  
III. Stœchas latifolia flore albo.  
Folij est Lavendulæ flore magno albo: in Murena Castiliæ D. Albinus legit.  
IV. Stœchas folio ferrato: & Dod. Ger.  
Stœchas prima, Clus. hisp.  
Stœchas folio ferrato & crispo, Lob.  
Stœchas ferrata, Tab.  
Stœchas crispo folio, Clus. hisp.  
Succudus Avicennæ Myconi, Lugd.  
Ex horto Clarissimi Contareni accepimus.  
V. Stœchadi ferrati affinis.  
Tragium alterum Dioscor. Secudus & Sucudus Avicennæ, Rauvvolff. & Lugd. ap.

### LAVANDULA.

**L**avandula, quod lavacris expetatur, huc refertur, & propter formam & propter nomen, cum Stœchas Arabica à Mesuæo dicatur. Pseudonardus Plinij l. 6. c. 12. censetur. Alij Stœchadi veterum cognatum faciunt: alij Cneorum, sive Cassiam albam Theophrasti volunt: quidam Iphium Plinij suspicatur.

I. Lavandula latifolia.  
Spica Nardus Germanica, Trag.  
Nardus Italica, Matth. Lob. Germanica, Lon.  
Lavandula, Ang. (cui & Cneorum Theophr. Gef. hort. Dod. Ad. fœmina, Dod. gal.  
Lavandula major, Cord. in Diosc. & hist.  
Pseudonardus, Matth. Cast. mas. Fuch. at in ico. fœmina.  
Lavandula mas, Lugd. latioribus folijs, Cam.  
Lavandula altera longiore folio & spica, Clus. hist.  
Cassia alba Theophrasti, Dalech. in Plin.  
Flore est cæruleo: habetur & albo, & purpureo: hinc figuræ duæ apud Tab. Ger. & Eyst. sub  
Lavandula 1. & spica hortulana flore albo, Tab.  
Lavandula flore cæruleo: & Stœchas sive Spica hortulana, Ger.  
Lavandula flore cæruleo: & Lavandula flore albo, Eyst.  
Quæ flore est albo, folia vulgari paulo latiora habet.

II. Lavandula angustifolia.  
Lavandula, Trago. (cui & Cassia Germanica)

Matth. Lac. Lon. vulgaris, Cord. in Diosc.  
Lavandula minor, Cord. h. fœmina, Lugd.  
Pseudonardus fœmina, Matth. Fuch. (at in ico. mas) Cast.  
Stachys, Ang.  
Nardus vulgo dicta, Gef. hor.  
Lavandula mas, Dod. gal. altera, Eid.  
Spica, Ad. Lavandula, Lob.  
Spica Italica & domestica, Cæs.  
Spica Nardi, Cam.  
Lavandula brevior folio & spica, Clus. hist.  
Flore est cæruleo: habetur & albo: huic duæ figuræ apud Lob. Tab. Ger.  
Spica lavandula, & Lavandula alba, Lob. ico.  
Lavandula alba, & Spica alba, Tab.  
Lavandula flore albo, & Lavandula hort. minima, Ger.  
Spica vulgaris flore cæruleo & flore albo, Eyst.  
III. Lavandula folio dissecto.  
Lavandula multifido folio, Clus. hisp. & hist.  
Lob. Lugd.  
Lavandula secunda, Tab.  
Stœchas multifida, Ger.

## R O S M A R I N U S.

**Λ**ιβανωτίς Dioscoridi l. 3. c. 89. ab odore Thuris nomen habet, Galeno 7. simpl. λιβανωτίς τριφασματικὴ, id est, Libanotis coronaria, quod ea οὐ τριφασματικὴ coronarij, ad corollas utantur.

Genera tria fecit Dioscorides & Galenus: umbelliferi genera duo, unum fecundum, alterum sterile: tertium non umbelliferum à coronarijs expetitur. Theoph. 9. hist. 12. duo genera proposuit, fructiferum folio helioselini, semine & radice candidis: & sterilem folio Lactuca. Plinio lib. 24. c. 11. genera duo: alterum sterile: alterum cui & caulis & semen resinaceum, quod Cachrys vocatur: folijs odor thuris. At lib. 19. cap. 12. Rosmarinum coronarium, cum alijs speciebus confundit.

Hic de coronario agimus (de alijs inter umbelliferas dictum fuit) quem aliqui Cneoron nigrum Theoph. & Casiam Hygini volunt.

I. Rosmarinus hortensis angustiore folio.  
Rosmarinus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Lon.  
Rosmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui & Cneorum Theophr. & Casia Latinorum) Dod. gal. Lac. Ad. Lob. Cæs. Lugd. Cam. Eyf.  
Libanotis coronaria, Cord in Diosc. Ges. hort.  
Rosmarinus minor sive tenuifolius, Ges. hort.  
Casia nigra Theophrasti, Dalech. in Plin.  
Hysopus Hebræorum quibusdam.

Florib. est communiter subceruleis, rarius albis.

II. Rosmarinus spontaneus latiore folio.

Rosmarinus sylv. seu major, Cord. hist.

Rosmarinus alter ignobilior, Ges. hor.

Rosmarinum sylv. Cæs.

Hic sponte Monspeisuli cum Epirosmarino reperitur.

Est & alius Rosmarinus sylv. de quo inter Ledi genera.



## S E C T I O Q U A R T A.

HYSSOPUS; SATUREIA SIVE THYMBRA; THYMUS; EPI-  
THYMUS; CUSCUTA; SERPILLUM; POLIUM; AGERATUM; PU-  
legium; Dictamnus; Origanum; Tragoriganum; Sampsuchus sive Amaracus;  
Marum sive Majorana; Clinopodium & Acinos; Erinus;  
Ocimum sive Basilicum.

## H Y S S O P U S.

**Υ**σσωπός Dioscoridi l. 3. c. 30. sic dici volunt quasi ὑψίστος (προχονέμενος ἐπὶ τὸν ὤπα quia super vultus effunditur: quam Dioscorides inter umbelliferas stirpes retulit: communis verò spicata est.

Genera duo Dioscoridi, ὄσωνι montana: & ὑψιστῶν hortensis: Verum Gracorum Hysopus, ab Arabum & Officinarum Hysopo differt, qui à nonnullis Symphytum petraeum Diosc. l. 4. c. 9. esse videtur: alijs Polium Hysopus Dioscoridu est. Plinius Hysopi lib. 26. cap. 8. vires proposuit: & l. 14. c. 16. Hysopi ex Cilicia, ad vini confectionem, meminit, multis planta notis additis.

I. Hysopus officinarum cærulea, sive spicata.  
Hysopus, Brunf. Trag. Tur. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Tab. Cam. flore cæruleo, Eyf.  
Hysopum, Matth. Cæs. Cast.  
Hysopus hort. Fuch. communis, Ang. Dod. gal.  
Hysopus vulgaris, Ges. hor. Dod. Clus. hist.  
Hysopus fariva, Cord. hist. Lugd.  
Hysopus Arabum, Ad. Lob. Ger.

Floret aliquando ex una, aliquando ex utraque parte, quæ

Hysopus utrinque florifera, Dod.

Alia odore moschum redolente à priore differt, quæ faciliè in vulgatam degenerat.

Hysopus moschata vel de Cilissa, Ges. hort.

Meminit Gesn. & Crispæ: habetur & folijs dissectis: item communiter est folijs atro-virentibus: est & pallide luteis: spica quoq; brevi & rotunda à priore variat: circa vulgatum & Epi-hysopus reperitur.

II. Hysopus rubro flore.

Hysopus Arabum flore rubro, Lob. Lugd. Cam. Ger. Eyf.

Hysopus Arabum, Tab.

Flores sæpius uno tantum, aliquando utroq; ordine digesti: satione quoq; in colorem cæruleum degenerare solet.

Ee

III. Hys-

## III. Hyssopus vulgaris alba.

Hyssopus albis florib. utrinq; digestis, Lob. ico.

Hyssopus flore albo, Lugd. Cam. Eyft.

## IV. Hyssopus Anglica.

Hyssopus ab una parte alba, altera viridis, Ad. Lugd. Tab.

## V. Hyssopus minor angustifolia.

Hyssopus alter, Dod. ut:

Hyssopus parva angustis folijs, Lob. ico.

an Hyssopus Hispanicus minor, Clus. hist.

## VI. Hyssopus hirsuta: in Prodr.

## VII. Hyssopus umbellata.

Hyssopus vulgaris comosus, Clus. hist.

## VIII. Hyssopus latifolia, in Prodr. descripta.

## IX. Hyssopus rotundif. spicata, fortè Dioscor.

Hyssopus folio Origani Dalechampij, Lugd.

X. Hyssopus latifolia coma rotunda confert.

Hyssopus ex codice Cæsar. Dod. Lugd. Col.

## XI. Hyssopus angustifolia spicata.

Hyssopus angustifolius spicato flore, Clus. hist.

## XII. Hyssopus angustifolia montana aspera.

an Hyssopus sylv. &amp; montana, Trag.

Hyssopus montana, Matth. Lugd. Cast.

an Hyssopus montana odora, Cam.

## XIII. Hyssopifolia.

Grafe poley, Cord. ob.

Gratiola minor, Ges. col.

Hyssopoides, Cam.

Est major latioribus folijs, minor angustioribus: floribus est cæruleis minoribus, rarissimè albis: at ex Hispania habemus, floribus oblongis, saturatoris cærulei coloris.

## S A T U R E I A.

**Θ** *Υαῖφα* Dioscoridi l. 3. c. 25. *Θυαῖφον* Theoph. 7. hist. 1. (fortè ἀπὸ τῆς ὀσμῆς ob fragrantiam) dicitur ipsa Satureia. At Satureia, alijs à saturando dicta, quod cibus loco condimenti addatur: alijs à Satyris nomen traxisse putant, eo quod coitus marcescentes stimulet.

Genera duo Dioscoridi: sylvestris & sativa. Theoph. 7. hist. 6. sylvestris urbana aspectu vicina: at 6. hist. 1. plura ejus Genera esse monet. Plin. l. 19. c. 8. Thymbra, quæ Cunila, quæ & Satureia dicta in condimentario genere: & l. 20. c. 16. Cunila præter sativam, plura sunt in medicina genera: est quæ bubula appellatur, aliæ gallinæ, quæ Origani Heracleoticum, &c.

## I. Satureia hort. sive Cunila sativa, Plinij.

Hyssopus agrestis, Brunf.

Satureia, Trag. Lac. Lon. Dod. Lob. Cæf. (cui &amp; Cunila &amp; Thymbra agrestis) Tab. Cam.

Satureia altera, Matth. vulgaris, Dod. gal.

Thymbra secunda species, Ang.

Satureia sativa, Fuch. Tur. hortensis, Ges. hort. Ad. Lob. ico.

Thymbra vera, Ges. hort.

Satureia sive Thymbra sativa, Cord. in Diosc. &amp; hist.

Satureia vulgaris hortensis, Lugd.

Satureia sylv. altera, Cast.

Satureia hortensis æstiva, Ger.

Satureia domestica, Eyft.

Flosculis est candidis, aut dilutè purpureis: aliquando caule & folijs subcæruleis. Addit Tabern.

Satureiam Romanam 2. quam sub

Hyssopo albo flore, Ger. pinxit, quid est?

## II. Satureia montana.

Thymbra, Dod. Cord. in Diosc. &amp; hist. Lugd. Tab. Eyft.

Thymbra sylv. Ang. agrestis, Ges. hor.

Satureia altera, Lac.

Satureia hortensis, Lob. ob. Cæf.

Satureia sive Thymbra altera, Ad. Lob. ico.

Saxifraga secunda, Cam. ep. Matth.

an Satureia perennis, Cam.

Flosculis est purpureis, aut candidis: in hortis folijs est latioribus, ut Lob. in sylvestribus angustioribus, ut Dod. & Lug. pingunt; utramque Camer. in Matth. expressit. Huic Cuscuta etiam innascitur, quam

Epithymbrum sive Cuscutam thymbrae adnatam, Cord. in Diosc.

Epithymbrum Æginetæ, Cord. hist.

Epithymbron, Cast. vocat.

## III. Satureia spicata.

Saxifraga prima, Matth.

Thymbra S. Juliani, sive Satureia vera, Ad. Lob. ico.

Saxifraga vera, Diosc. Lugd.

Clinopodium, Cæsal.

Thymbra vera, Lugd. Tab.

Satureia S. Juliani, Ger.

Duplex est: quæ in mente S. Juliani, folijs est angustissimis: quæ verò Romæ & Neapoli in tectis & parietibus provenit, folijs est latioribus.

## IV. Satureia Cretica.

Thym-

Thymbra Cretenfis, Alpi.

Thymbra legitima, Cluf.hift.

Thymbram Bellonij, antiquorum legitimam cenfer Belli ep. ad Clufium.

Satureia legitima Dioscoridis, Ponæ.

Hanc Thymbræ legitimæ nomine, & quæ vulgo *τρίφι* & *θύμβρι* dicatur, ab Honorio Belli

ex Creta accepimus.

V. Satureia thymi folio.

Satureia Dioscoridis, Matth. Cast. Lugd.

Polium fœminam recentiorum efle volunt, Ad.

Thymū vulgatiorem folio tenuiore, dicit Eyft.

Hanc ex horto Clariffimi Contareni Thymbræ nomine habemus.

## T H Y M U S.

**Θ** *Υμ* & Dioscoridi l. 3. c. 44. & Theoph. 4. hift. 7. & 6. ejusd. 2. & 1. cauf. 5. ἀπὸ τῆς θυμῆς, quod ijs qui animi deliquium patiuntur adhibeatur; alij ἀπὸ τῆς θυμῶστος, ἢ τῆς θυῆς deducunt, quod hoc veteres in facris, quæ igne accenfo fiebant, primum ufi fint, ut apud Rhodiginum l. 3. c. 23. legere eft.

Genera: Dioscorides l. cit. capitatum descripsit: at l. 4. c. 179. Thymi durioris meminit. Ex Theoph. 6. hift. 2. duo genera, Plinius l. 21. c. 10. & 21. candidum & nigricans, propofuit.

I. Thymus vulgaris folio tenuiore: & Eyft.

Thymus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Cord. hift.

Lon. durior, Cam.

Thymus noſtrās, Cord. in Dioscor. vulgaris, Gefn. hort.

Thymum durius, Dod. gal.

Serpillina hortenfē, Dod. ico.

Pepolina, Cæf.

Foliorum colore variat: alteri virentia & fuaveodora: alteri candida & graveolentia, qui rarior eft.

II. Thymus vulgaris folio latiore.

Thymum durius, Dod. Lob. ico. Cluf. hifp. Ger.

Thymum vulgare, Lugd.

Thymus niger, Tab.

Thymus alter durior, Cam.

Flore eft purpureo, nunc albicante.

III. Thymus capitatus, qui Dioscoridis.

Thymum, Matth. Ad. Lob. Creticum, Cord. in

Diofc. Dod. gal. Lugd. Cæf. legitimum, Cluf. hifp. & hift.

Thymum cephaloton, Dod.

Thymus, Ang. Lac. Cast. 2. Alp.

Thymus capitatus, Cord. hift.

Thymus verus capitatus five Creticus, Cam.

IV. Thymum inodorum, in Prod. defc.

## E P I T H Y M U M E T C U S C U T A.

**E** *πίθυμον* Dioscoridi l. 4. c. 179. & Plinio l. 26. c. 8. flos eft à Thymo duriore, Satureia fimili. Verum non ſolum Thymo, ſed & Thymbræ, Polio, Diſtanno, Chamædri, Hyſſopo, Serpillo, Majorana, Origano, Stræbe, Ebulo alijsq; Cuscuta modo circumnaſci obſervavimus.

Cuscuta, recentioribus Græcis καλὴν, quam aliqui Androſacen Dioscoridis l. 3. c. 150. alioqui Cadytam Theoph. 2. cauf. 3. & Plinij l. 16. c. 44. efſe volunt. Sed ad Orobanthen Theoph. 5. cauf. 22. referri poteſt. Nonnullis podagra lini, quod linum amplectatur: λινόδεσμων, Gefnero.

I. Epithymum five Cuscuta minor.

Epithymum, Matth. Lac. Ad. Cast. Lugd. (qui

& Matth. & Lob. figuram habet) Cæfalp. (qui

Thymo Italico innaſci ſcribit) Alp. Tab.

Epithymum Græcorum & Arabum, Lob.

Caſſutha minor, Dod.

Epithymum vulgare, ſi ex Thymo fimili ablatum, verum Dioscoridis Epithymum eft, Col.

II. Epithymum capitulis Platani crinitis.

Epithymus, peculiaris planta à Thymo & Cuscuta, quæ in Sclavonia provenit folijs Thymbræ hirsutis, in cauliculorum ſummis capitula

hirsuta rotunda, Platani pilulis ſimilia, ex

cujus floſculis capillamenta ruſeſcentia prodeunt: radicem habet craſſam, nigram, intus

albam, quæ exiccata non ſecus quam capilla-

menta purgat: & apud Sclavonios Verduun

Xeglie, id eft, Herba coleram purgans: hæc

Anguil. Sed qui eft?

III. Cuscuta major.

Adroſaces, vulgo Cuscuta, Trag.

Adroſace Dioscoridis, ſi legatur ἀφύλλον, id eft, ſine folijs, Ang.

Cuscuta, Matth. Ang. (cui & Caſuta) Lac. Lon

Cast. Cæf. Cluf. pan. & hift. Ger.

Caſſytha, Dodon. gal. Gefn. hort. Adv. Lobel. Tabern.

Caſſutha, Fuch. Tur. Dod. Lugd. Thel.

Hæc paſſim herbis & fruticibus adnaſcitur,

potiſſimum Urticæ majori, lino, trifolio corniculato, lupulo, rubo & vepribus: colore vel albo vel rufo.

## S E R P Y L L U M.

**E** *Ἐρπυλλος* Dioscoridi, lib. 3. cap. 46. ἀπὸ τῆ ἑρπειν à serpendo dictum: quia aliqua ejus particula terram tangente, ab ea radices demittantur: Sic & Plinio, lib. 20. cap. 22.

Genera duo Dioscoridi sunt: primum hortense, odore Sampsuchi: alterum sylvestre Zygis dictum, quod non serpat, sed in altitudinem excrescat. Theophrastus 6. hist. 7. duo genera agnovisse videtur, cum dicat Serpyllum sylvestre quoque genus esse. Plinius & sativi & sylvestris meminit, & hoc serpere tradit: quod non intelligendum de eo Serpyllo, quod lib. 16. cap. 44. arboribus se circumdare scribit.

I. Serpyllum majus latifolium.

Thymum latifolium, Lob. ico.

II. Serpyllum latifolium hirsutum: quod  
1. in Prod.

III. Serpyllum sativum.

Serpyllum, Matth. Lac. Lugd. Tab.

Serpyllum domesticum, Cast.

Serpyllum folijs amaraci, Ger.

IV. Serpyllum vulgare majus.

Serpyllum majus flore purpureo, & aliud candido, Cam. Ger.

Serpyllum album 1. & 2. Tab.

Flore est albo, est & purpureo.

V. Serpyllum folijs citri odore.

Serpyllum alterum citratum, Matthiol. citrum olens, Gesn. hort. Thal. citratum, Tab. Eyf.

Serpyllum sylv. 1. citratum, Cast.

Serpyllum referens planta, odore citri, Cæs.

Serpyllum pannonicum 1. Clus. pan. & hist.

Thymum latifolium, Ger. ico.

VI. Serpyllum vulgare minus.

Serpyllum, Brunf. Trag. Fuch. Ang. Gesn. hort. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Lugd.

Serpyllum vulg. Dod. Ger. & vulgare flore albo.

Serpyllum sylv. Matth. Cord. in Diosc. sylv. alterum, Cast.

Serpyllum minus flore albo, & flore purpureo, Tab.

Serpyllum vulgare repens, Clus. hist.

Aliud folijs est rotundis, aliud acuminatis & angustioribus: flos subpurpureus, roseus, candidus: pro cæli & loci diversitate odorem mutat, & inodorum reperitur: aliquando Thymum durius in Serpyllum degenerat: sic Theoph. 5. caus. 8. Ocimum in Serpyllum transire scribit.

Hoc quandoque cum capitulis lanuginosis occurrit.

VII. Serpyllum angustifolium glabrum.

Serpyllum pannonicum 2. Clus. pan. & hist.

Aliquando inodorum est: aliquando odorem foliorum Nucis refert.

VIII. Serpyllum angustifolium hirsutum: vel montanum repens hirsutum.

Serpyllum pannonicum 3. Clus. pan. & hist.

IX. Serpyllum folio Thymi.

Serpyllum alterum, Dod.

Serpyllum Narbonense folijs & facie perpusilli angustifolij Thymi, Lob. Lugd.

Serpyllum sylvest. Zygis Dioscoridis, Clus. histor.

Serpyllum Creticum, Tab. Ger.

## P O L I U M.

**Π** *Ὠλίον* Dioscoridi, lib. 3. cap. 124. sic dictum propter caniciem, quæ in capitulis, secundum Dioscoridem, at secundum Plinium, in folijs apparet: πολὺς namque canitiem & canum significat.

Genera duo Dioscorides agnovit, τὸ βουν montanum, alterum fruticosius: Galenus 8. simpl. majus & minus. Plinius, lib. 21. cap. 7. campestre majus, & sylvestre minus proposuit.

*Polium montanum.*

I. Polium Lavandulæ folio.

Polium alt. Matth. Gesn. hort. Lac. Lugd. Cam.

Polium majus, Cord. hist. campestre, Lon.

Polium recentiorum fœmina Lavandulæ folio, Adv. Lob.

Polium pannonicum 1. vel majus, Clus. pan.

Polium 7. flore albo, Clus. hist.

Polium folijs & facie Lavandulæ, Eyf.

Variat folijs latioribus & angustioribus; hinc Polium fœmina, & Polium campestre, Tab.

Hujus speciem per omnia majorem, cana lanugine candicantem, magis odoratam & aromaticam, Cordus in sua historia notavit, Polium minus nominans.

II. Polium montanum luteum.

Polium, Tur. Dod. ico. at 5. desc.

Polium luteum, Ad. Lob. Lugd. Clus. pan.

Polium 3. Clus. hisp. montanum 3. Eid. hist.

Polium montanum luteum, Tab. Ger.

Flos modo luteus, modo pallidus, interius pallescens & foris exalbidus: interdum ex luteo vire-



virescens: Ex hujus semine natum, flore ex albo purpurascens, quod  
Polium 4. Clus. hist.

### III. Polium montanum album.

Polium montanum, Ang. Lob. Tab. Ger.

Polium minus & mediterraneum, Adv.

Polium alterum seu parvum, Dod. gal.

Polium tenuius & 2. Dod.

Polium montanum, 1. Clus. hisp. & hist.

Polium montanum alterum, Cæs.

an Polium minus, Cord. in Diosc. & hist.

Est duplex: alterum cauliculis humi sparsis, folijs incanis & denticulis vix conspicuis: alterum cauliculis erectis, folijs angustioribus, capitulis longioribus, quod

Polium montanum 2. flore albo, Clus. hist.

### IV. Polium montanum repens.

Polium 4. & repens, Dod.

Polium 6. Clus. hisp. montanum 8. Eid. hist. & pannonicum minus, Eid. pan.

Polium mont. supinum minimum, Lob. Lugd.

Polium montanum 3. Cæs.

Polium montanum minimum, Tab. Ger.

#### *Polium maritimum.*

I. Polium latifolium incanum Creticum: in Prod. descr.

### II. Polium angustifolium Creticum.

Polium erectum Creticum & fortè frutescens Diosc. Ponæ.

III. Polium maritimum erectum Monspeliacum.

Polium 1. Matth. desc. at 2. ico. Clus. hisp.

Polium, Lac. Matthioli, Lugd.

Polium 1. five montanum Diosc. Gefn. hort.

Origan 3. species Dioscoridis, Quadramio.

Hoc & locis maritimis, & diversis collibus, & arenosis littoribus, ut ad Cerium montem, & Magalonam insulam Narbonensis Galliae fruticat, ita ut & maritimum & montanum dici possit: in quo Epipolium notavimus.

### IV. Polium maritimum supinum Venetum.

Polium 1. Dod. gal.

Polium repens 3. Dod. ico. at 4. desc.

Polium Venetum, Ad.

Polium 4. Clus. hisp. Lugd.

Polium montanum, Cast. Cæs.

Polium montanum purpureum, Lob. Tab. Ger.

5. purpureum, Clus. hist.

Origanum 3. genuinum Dioscoridis, Quad.

Hyllopus Apolus Diosc. & Serapionis, Col.

Illud erectum est, & omnibus partibus crassius: hoc vero repit, tenuius & candidius est: utrumque loco natali legimus.

### V. Polium montanum supinum alterum.

Polium 5. Clus. hisp. 6. albo flore, Eid. hist.

Sola teneritate & floris colore à priore differt.

### VI. Polio affinis Guacatane.

Guacatane plantula Polio montano haud ab-  
similis, sed inodorum, Monard. & ex eo, Lugd.  
Castor.

Guacatane pilosellæ comparare possumus,  
Frag.

## A G E R A T U M.

**A** γέρων Dioscoridi, lib. 4. cap. 59. cui nomen inditum, διὰ τὸ ἐπιπολὺν τὸ ἄνθος ὁμοιοῦντες φυλάττειν αὐα, quoniam flos in sua coloris specie diutissime conservetur: quasi dicas senectutis expers, quod ἀγέρων dicitur: vel ut Plinius, lib. 27. cap. 4. quoniam diutissime non marcescat.

### I. Ageratum folijs ferratis.

Eupatorium Mesuæ, Trag. Gefn. hort. Matth. Lon.

Ageratum, Matth. Gefn. hort. Lac. Cast. descrip. Lugd. Cam. Tab. Col. Eyf.

Ageratum Septentrionalium, Ad. Lob. Eyf.

Mentha corymbifera minor, Cord. hist.

Costus minor hortensis, Gefn.

Herba Julia, Ang. Gefn. col.

Balsamita minor, Dod.

Balsamita scemina, Ger.

Camphorata, Cæs.

Floribus est luteis: rarius candidis, & hoc

Ageratum florib. candidis, Ad. Lob. Tab. Cam.

Ageratum 2. Matth. Lugd.

Hoc etiam majus est & minus: nam quod in Hetruria provenit multò minus est, quod

Ageratum minus. Cam. in Matth.

Circa Monspelium etiam Corymbis longioribus & magis compactis reperitur.

### II. Ageratum folijs non ferratis.

Ageratum 3. Matth. Lugd.

Ageratum minus, Lob. Cam. Tab.

### III. Ageratum ferratum alpinum.

Ageratum purpureum & Moschatella cærulea Germanis quibusdam, Lugd.

## P U L E G I U M

**Γ**λύχων Dioscoridi lib. 3. cap. 36. cui & βλύχων, à βλήχῃ balatu, quoniam dum floret, gustatum à pecoribus βλήχῃς ποπιμπλάνται balatum concitet: quod & Plinius lib. 20. cap. 14. notavit. Pulegium latinis, quod ejus flos recens incensus, pulices interficiat.

Genera duo Plinius fecit, sativum & sylvestre: illud marem & fœminam: mas candidum, fœmina purpureum florem habet, quo solo inter se differunt: sylvestre, quibusdam Dictamnus dicitur.

## I. Pulegium latifolium.

Pulegium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. & hist. Dod. Lon. Cæs. Cast. Cam.

Pulegium vulgatum, Ang.

Pulegium fœmina, Fuch. in ico.

Pulegium aquaticum, Geln. hort.

Pulegium regium, Ad. Lob. Lugd. Eyf.

Floribus est cœruleis ex roseo albicantibus, rarissimè albis.

## II. Pulegium latifolium alterum.

Pulegium, Cast. mas Plinij, Lob. ico.

III. Pulegium folijs Nummulariæ: in Prod. describitur.

## IV. Pulegium angustifolium.

Pulegium cervinum, Gef. hor. Lugd. Cam. Eyf.

Pulegium alterum folijs oblongis, Dod.

Pulegium angustifol. sive cervinum, Ad. Lob.

In folijs aliqua notatur differentia; hinc Puleg. Cret. & Pulegium Mafsilioticum, Tab.

Pulegium mas & Pulegium regium, Ger.

## D I C T A M N U S.

**Δ**ικταμνον Dioscorides lib. 3. cap. 37. meminit, & aliquibus γλύχων ἀγρία Pulegium sylvestre dici. Videtur Δικταμνον vox, ἀπὸ τῆ τιντεν deduci, eò quod, ut Dioscorides & Theoph. εἴπτον ἐστὶ: cum non modo potum, sed appositum quoque parvis defunctos eijciat. Δικταμνον Theoph. 9. hist. 16.

Genera tria Dioscoridi & Theoph. Creticum, pulegio simile at majoribus & lanuginosioribus folijs: Pseudodictamnus, minus illo acre, & ut Theoph. minus, & viribus longè inferius: & Dictamnus Creticum alterum folio Sisymbrij, floribus origani sylvestris: quod Theoph. veluti equivocè sic appellatum scribit, nec enim speciem, nec vim eandem habere. Idem Plinius l. 25. c. 8. Officina Dictamnus album etiam habent.

## I. Dictamnus Creticus.

Dictamnus, Brunf. Dictamnus, Ang. Tur.

Dictamnus, Matth. Lac. Ad. Lob. Cast.

Dictamnus Creticum, Matt. Cæs. verum, Dod.

Dictamnus vera, Cord. in Diosc. Gef. hor. (Lugd.

Dictamnus Creticus, Trag. Dod. gal. Lon. Cam.

Qui ex Creta adfertur, crassioribus & villosioribus folijs: qui ex horris Italiæ majoribus, minusque incanis: monet Clus. hist. ap. in Sardinia minoribus, candidioribus & odoratissimis folijs reperiri.

## II. Pseudodictamnus verticillatus inodorus.

Pseudodictamnus, Mat. Dod. gal. Lac. Cast. Cam.

Lugd. qui & Matth. & Dod. figuram proponit.

Pseudodictamnus florib. verticillatis, Ad. Lob.

καλλιμαθεία, Ang. (Eyf.

Pseudodictamni nomine ex Creta, Cæs.

Gnaphalium Dioscoridis, Ponæ.

## III. Pseudodictamnus alter odoratus, quid?

Dictamni 3. genus, sive Dict. non Cret. Dod. gal.

Pseudodictamnus, Eid. in ico.

## IV. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ.

Pseudodictamnus Cydoniæ, sive Dictamnus 2.

Theoph. Ponæ.

Ex horto Clarissimi Contareni.

V. Dictamnus albus vulgo, sive Fraxinella: quia vulgo Dictamnus dicitur, huc retulimus, alias rectius in aliam classem referretur.

Dictamnus putatus, Brunf. (Lon.

Dictamnus vulgaris, Trag. Gef. hor. Cam. Offic.

Pæonia mascula, Eidem.

Dictamnus album, nonnulli pumila fraxinus,

Matth. Lac. Cæs. Cast.

Tragium, Dod. gal. Gef. hor. (qui tamen negat)

primum Dioscoridis, Ad.

Tragium Creticum, Guil. the.

Dictamnus nostra, Cord. in dis.

Fraxinella, Cord. hist. Dod. Lug. Cl. pan. & hist.

Natrix Plinij, Ang. (Ger. Eyf.

Diptamnus album, Belli ep. 3. ad. Clus.

Polemonium, Tab.

Plinio l. 27. c. 12. Natrix vocatur herba, cujus radix evulsa virus hirci redolet. Tragium Diof.

l. 4. c. 49. in Creta tantum nascitur habes folia Len-

tisco similia & ramos & fructus, minora tamen

omnia. Tragiū negat Belli, quia hirci odorē non

spiret, sed gravem, neq; in tota Creta inveniri.

Duplex est 1. elatius, oblongiore spica satu-

ratiore, folijs nigricantibus: 2. humilior la-

vior spica, floribus & folijs dilutioribus.

ORIGA-

## O R I G A N U M.

**O**ρίανθ. Dioscoridi l. 3. c. 32. διὰ τὸ χαίρειν ὄρεσιν dicitur, Eustachio volente, qui ab ὄρε & ἵανθ. derivat: ἄλλ' παρὰ τὸ ὄρεν ἢ γανθ. quia visus claritati conducit, deducunt.

Genera quatuor Dioscoridi: ἡρακλειωτῆς: ὄνιτις, quasi asinis pabulo gratum sit: ἀγριορίανθ. & τραγορίανθ.: Theophr. 6. hist. 2. duorum tantum meminit: nigri sterilis, & candidi fructuosi. Plin. l. 20. c. 16. Origanum Heracleoticum Græcorum, quod Cunilam gallinaceam Romani appellant, refert: at c. 17. Onitidis, quod prasion appellant Hyssopo non dissimile, & Tragorigani Heraclyi, cujus tria sint genera (Dioscoridis utrumq; Tragoriganum intelligens) Cretici, Smyrnai, tandem Heracleotici, quod Oniten vocent, historiam sed confusorem tradit.

I. Origanum sylv. Cunila bubula, Plinij.  
Origanum, Brunf. Ang. Tur.  
Origanum vulgare, Trag. Matt. Lon. Lug. Eyf.  
Origanum sylv. Dod. Cord. in Diosc. Fuch. Gef.  
hort. Lac. Tab. Cam.  
Origanum onitis majus, Ad.  
Agrioriganum sive Onitis major, Lob.  
Origanum Italicum, Cæf. Anglicum, Ger.  
Folijs longiorib. rotundiorib. variat: florib.  
ex candido rubentibus, phæniceis, sanguineis.  
Tragoriganum Dioscoridis quibusdam.

II. Origanum sylv. album.

Origanum sylv. Cam.

Origanum album, Tab. Ger. desc.

III. Origanum syl. humile: in Prod. descrip.

IV. Origanum Heracleoticum: Cunila gal-  
linacea Plinij.

Origanum peregrinum 1. vel 6. Trag.

Origanum Heracleoticum, Matt. Gef. hor. Lac.

Ad. Lob. Lugd. Cast. Cam. Ger. 1. & 2. Tab.

Origanum Græcum, Ang.

Origanum alterum, Cæf.

Est flosculis ex albo purpurascens: est &  
candidis.

V. Origanum Creticum.

Origanum Heracleoticum in Creta, Cord. in  
Dioscorid.

Origanum Creticum, Gef. hor. Cæf. Cam.

Origanum Anglicanum, Dod.

Hyllopus Dioscoridis, Ang.

Origanum Syriacum sylvestre, Ad.

VI. Origanum Onites: & Matth. Gef. hor.  
Lac. Lon. Cast. Lugd.

Origanum Heracleoticum, Ruel.

Marum quibusdam, Dod. gal. Lac. Lugd.

Hyllopus genuina Græcorum, Ad. Lob.

Hyllopus legitimus & Mesuæi, scarlaepepe He-  
truscis, Cæf.

Majorana major Anglica, Tab. Ger.

Origanum syl. potius quàm majorana, Col.

VII. Origanum Onites fl. albicantibus.

Origanum Onites, aliud à Matthioli, Cam. hor.

Origanum Onites dictum, Eyf.

VIII. Origanum folio subrotundo.

Origanum Onitis Galloprovinciæ minus, Ad.

Origanum Monspeliacum, Cam. ep. Matth. &  
hort. Tab.

IX. Origanum cognata Zatarendi: quid?

Zatarendi. Alpino, quod siccatum, instar Ori-  
gani pro obsonio comedunt.

## T R A G O R I G A N U M.

**T**ραγορίανθ. Dioscor. l. 3. c. 35. (origani 4. genus eadem, quod aliqui hircinum interpretantur, cum sic di-  
ctum videatur, quasi capris gratum sit) quod pro locorum ratione variat: quoddam speciosius latioribus  
folijs: alterum gracilius, folijs exilioribus, quod aliqui πείθειν vocant. Plinio l. 20. c. 17. Tragoriganum simi-  
lius est Serpyllo syl. Is Tragorigani differentias à Dioscoride propositas, sub Origano Heracleo recenset.

I. Tragoriganum Serpyllifolium.

Tragoriganum, Matt. Lac. Cast. Lug. Ger. 1. Tab.

II. Tragoriganum latifolium.

Marum, Matth. Cast. Lugd. Tab.

Tragoriganum, Dod. Lugd.

Tragoriganum alterum, Gef. hor. Ad. Lob.

Thymum Creticum, Ger. ico.

III. Tragoriganum angustifolium.

Tragoriganum 2. Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.  
Cam. ep. Tab.

Tragoriganum flore albo, Lob.

IV. Tragoriganum Creticum.

Tragorigan. Cretense apud Veneros, Ad. Lob.

Tragorigani 2. altera species, Clus. hisp.

Tragoriganum Hispanicum 3. Eid. hist.

Thymum magnum, Alp.

# SAMPSUCHUM, SIVE AMARACUS; MARUM SIVE MAJORANA.

**Σ**αμψυχον in Cyzico & Cypro laudatissimum, secundum locum sibi vendicat Aegyptium: vocatur à Cyzicenis & Siculis ἀμαράκων, Dioscorides l. 3. c. 47. Et Theoph. 1. hist. 15. 6. hist. 1. & 7. Amaracum (vel ut Gaza reddit Samsucum vel Sampsuchum) suffrutex est & coronaria herba minutis folijs condita ut Serpillum, &c. Amaracum, Diocles medicus & Sicula gens appellavere, quod Aegyptus & Syria Sampsuchum. Plinius l. 21. c. 11. & 12. Sampsuchum sive Amaracum in Cypro laudatissimum & odoratissimum, ex quo oleum, quod Sampsuchinum & Amaracinum, &c. Μαρόν ἢ ὀρέγον Dioscoridis l. 3. c. 49. Majoranam esse volunt.

Genera duo Plinio l. 12. c. 24. Maron in Aegypto nascitur pejus quam Lydium, majoribus folijs ac varijs: illa brevia ac minuta & odorata.

I. Sampsuchus sive Marum, Mastichen redolens.

Clinopodium, Dod. gal. Gef. hor. (cui & herba Sampsucho cognata) Cam.

Helenium, Theoph. fortè Tragoriganum Diosc.

Marum, Gef. hor. Cast. Tab. Ger. peregrin. Eyf.

Marum, Mastic Gallorum & Anglorum, Ad.

Marum, an Helenium odorum Theoph. Lob.

Marum verum, vulgo Mastic, Lugd.

Marum vulgare sive Clinopodium, Dod.

Tragoriganum 1. Clus. hisp. & Tragoriganum

Hispanicum 1. cujus semen Ambræ dulcis nomine missum, Eid. hist.

Ludit folijs nunc longioribus, nunc rotundioribus, modò angulolis & hederaceis.

II. Marum repens verticillatum.

Sampsuchus Diosc. sive Amaracus serpens, Ad.

Marum supinum, Lob.

Marum ex Sicilia allatum, Sampsuch. Diosc. Gef.

Marum repens, Tab.

Pulegium angustifolium, Ger. ico.

III. Majorana Syriaca vel Cretica.

Marum Syriacum, Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Marum Cretense, Alp.

IV. Majorana tenuifolia.

Majorana nobilis, Brun. Ang. sativa, Trag. Lon.

Majorana gentilis, Tur. tenuifolia, Tab. Ger.

Amaracus sive Major. tenuif. Matt. Cast. Lugd.

Amaracus, Sampsuchum, Gef. hor.

Majorana tenuior & minor, Dod.

Amarac. tenuior, Ad. Lob. tenuif. urbana, Cam.

Hæc apud nos in Majoranam vulgarem degenerat: & huic Cuscuta circumnascitur, quæ

Epimajorana, Tab. Ger.

V. Majorana vulgaris.

Majorana, Brunf. Dod.

Amaracus, Matth. Fuch. Lugd. qui Matth. &

Fuch. iconem proponit.

Sampsuchus sive Amaracus, Latinis Majorana,

Cord. in Diosc. & hist.

Amar. vulgatiore, Ad. Lob. ico. Eyf. major, Cast.

Amaracus, Majorana, Sampsuchum, Gef. col:

Sampsuchus, Lac. Lob.

Majorana vulgo, Maron, Diosc. Cæf.

Majorana sive Amarac. major, Gef. h. Tab. Ger.

Amaracus sylv. annua, Cam.

Hanc latis admodum folijs & capitulis rotundioribus sub Majorana latifolia Eyf. proponit.

VI. Majorana sylv. perennis: & Cam.

Majorana sylv. Trag. Gef. hor.

Origano cognata majorana major, Eid.

Hanc Londino folijs subluteis accepimus.

VII. Majorana sylv. latifolia.

Amaracus sylv. folijs latioribus, Cam.

Majorana sylv. Eid.

Hanc ex horto Sprengeri Heidelb. habemus:

## CLINOPODIUM ET ACINOS.

**K**λινόποδιον Dioscoridi l. 3. c. 109. quod flores habeat ὡς κλῖνος ποδὶν ὁμοία: Et Plinio l. 24. c. 15. quod orbiculato florum ambitu speciem pedum lecti prabeat, ex intervallis Marrubij modo dispositis: quod sanè Clinopodio primo pulchro convenit. Verum ab alijs Ocymoides nominari monet, & Serpyllo similem, surculosam palmae altitudine: quæ de secundo dici rectè possunt, propter foliorum formam cum Serpyllo & odorem cum Ocimo. Ἀκινὸς ἢ ἄκινος herba coronaria ocimo similis, sed hirsutior atq. odorata, Diosc. l. 3. c. 50.

I. Clinopodium Origano simile.

Origanum quartum & minus, Trag.

Clinopodiū, Cord. in Diosc. Gef. h. Lac. Cast. Tab

Clinopodium vulgare, Matth. majus, Cam.

Betoni-

Betonica Pauli, Guil.  
 Pulegium montanum, Lon.  
 Origanum sylv. Eid. verticillatum, Thal.  
 Calamintha prima, Tur.  
 Acynus sive sterilis, Ad.  
 Acinos, Lob. Ger.  
 Acinos, sive Clinopodium sylv. Lugd.  
 Clinopodium primum, Matth. Clus. pan. Lugd.  
 Herba Origano vulgari similis, Cæs.

Duplex est: elatius majore folio: humilior alterum, minore: flore communiter purpureascente, rarius albo.

## II. Clinopodium arvense Ocimi facie.

Basilicum tertium, Trag.  
 Calaminthum montanum, Eid.  
 Pseudoclinopodium, & Clinopodium alterum, Matth.  
 Acinos, Dod. gal. Fuch. ico. Lac.  
 Ocymastrum, Fuch. Lugd.  
 Pulegium petræum, Gesl. hort.  
 Ocimum parvum, Lon.  
 Ocimum sylv. sive Acinos, Dod. Ger.  
 Clinopodium, Ang. Tur. Cæs. majus, Thal.

Clinopodium alterum Matthioli, Lugd. Tab.

Clinopodium aut Lectipes, Ad.

Clinopodium vulgare, Lob. Clus. hist.

Folij est modò latioribus, modò angustioribus, ratione loci: modò erecta, modò repens: aliquando hirsutissima, aliquando penè lævis: floribus cæruleis, rarius albis.

Hanc Matth. ut ex ejus descriptione patet, Manardum secutus, & hist. Lugd.

Acinos nomine exhibuere.

## III. Clinopodium Ocimi facie alterum.

Acinos Anglicum, Clus. pan.

Acinos Dioscoridis fortè, Eid. hist.

## IV. Clinopodium montanum.

Clinopodium Austriacum, Clus. pan. & hist.

Flore est purpureo intenso seu violaceo: rarius albo.

## V. Clinopodium alpinum hirsutum.

Clinopodium alpinum, Ponæ.

## VI. Acinos latifolia.

Acinos, Urtichella olitoribus, Col.

Acinos Dioscor. nomine ab Imperato accepim⁹.

# ERINUS.

**E**rinus Dioscoridi l. 4. c. 29. folijs ex Ocimi minoribus, & lacteo succo turget, & c. Plinio l. 23. c. 7. Herba quam Græci Erineon vocant, & c.

Erini nomine à recentioribus plantæ proponuntur.

I. Erini seu Ocimi aquatici nomine à Matth. quem sequuntur, Lac. Lon. & Lugd. hist.

Basilicum aquaticum, Cast. cujus folia incisuris carent: pro hac

Hieracium Sabaudum latifolium, Guilandinus nobis ostendit.

2. Erinus Dalechampij, in hist. Lugd. sed quid?

3. Erinus Cæs. & Columnæ: est Rapunculi minimi species.

4. Erinos vel Caprificus, Nicandro & Plinio, fortè Esula dulcis, Tragi: vel altera Esula sylv. ejusdem, Adversar.

# OCIMUM.

**O**κνον Dioscoridi l. 2. c. 171. Theoph. 7. hist. 3. cui, ut & Varroni & Plinio l. 19. c. 7. à celeritate proveniendi dicitur. Recentioribus Græcis βασιλικόν, id est. regale: unde ab Αἴθιο ὀνιμον βασιλικόν appellatur.

Genera plura recentioribus, quæ potissimum differunt magnitudine foliorum. quæ latiora, angustiora, plana vel crispâ: colore eorundem quæ viridia, nigricantia, maculata: florum, qui candidi, vel purpurascens: & odore, cum in aliquibus caryophyllos, in alijs citrum redoleant.

## I. Ocimum latifol. maculatum vel crispum.

Ocimum latifolium, Cæs.

Basilicum Indicum, vel potius Hispanicum, Camer.

Ocimum aut Basilicum crispum exoticum aut Hispanicum, Cam. ep. Matth.

Ocimum crispum Hispanicum, Tab.

Ocimum Indicum, Clus. hist.

Basilicum Indicum maculatum, Eyst.

Est majus & minus.

## II. Ocimum viride folijs bullatis.

Ocimum Indicum viride majus, folijs protuberantibus. Eyst.

## III. Ocimum folijs fimbriatis viridibus.

Ocimum crispum viride, Eyst.

Odore est inter Camphoram & Citrum confuso.

## IV. Ocimum caryophyllatum maximum.

Ff

Ocy-

Ocimum in viridarijs Alexandriae, Alp.

Ocimum latifolium magnum, Eyst.

Folijsest oblongis colore rubro suffusis eximie odoratis.

V. Ocimum caryophyllatum majus.

Basilica major, Trag. Lon.

Ocim. maj. Matt. Fuch. Dod. gal. Lac. magn. Tur.

Ocimum maximum, Dod. Lugd.

Ocimum nigrum, Cord. in Diosc. & hist.

Ocimum maximum caryophyllatum, Ad. Lob.

Ocimum caryophyllatum, Ges. hort.

Hoc cum magis minusve hirsutum sit, ab alijs hirsutum, ab alijs laeve pingitur: color tam foliorum, quam florum, in alio alb. in alio niger est.

VI. Ocimum citri odore.

Ocimum citratum, Ges. hor. Cæs. Eyst.

Ocimum maximum citratum, Lob.

Ocimum medium sive citratum, Ad. Tab. Ger.

VII. Ocimum vulgatius.

Basilicum sive Ocimum, Brunf.

Ocimum medium vulgatius, Ad. Eyst.

Basilica minor, & Baccharis Germanica, Trag.

Ocimum medium, Matth. Cast. Cam. Lugd. qui Matth. & Fuch. figuram exhibet.

an Ocimum Nabathæum, Cord. in hist.

Ocimum mediocre, Fuch. 3. & medium, Cæs.

Ocim. sive Basilicum medium vulgatius, Lob.

Ocimum magnum, Tab. Ger.

VIII. Ocim. minus angustifol. folijs serratis.

Ocimum minus angustifolium flore albo, Eyst.

IX. Ocimum anisi odore.

Ocimum anisatum, Eyst.

Medio vulgatori, figurâ respōdet odore Anisi.

X. Ocimum minimum.

Ocimum crispum, Brunf. Lon.

Ocimum caryophyllatum, vel minus, Matth.

Ocimum exiguum. Fuch. minus, Dod. gal. Tur.

Basilicum minus, Cast.

Ocimum minus caryophyllatum, Cord. in Diosc. Tab. Ger.

Ocimum minimum Amaraci figura caryophyllatum, Lob. Eyst.

Ocimum parvum, & Ocimum caryophyllatum, Lugd. duæ figuræ.

Ocimum alterum tenuifolium, Cæs.

XI. Ocimo affinis.

Albahaca herba, quæ odoris gratia in nova Hispania excolitur, Joseph. Acosta l. 4. c. 27.



## SECTIO QUINTA

MENTHA; MENTHA SYLVESTRIS SIVE MENTASTRUM;  
MENTHA AQUATICA, SEU SISYMBRIUM; MENTHA CATARIA;

Calamintha; Melissa; Marrubium; Galeopsis sive Lamium & Urtica mortua; Ur-

tica; Alysson; Sideritis; Euphrasia; Melampyron & Cratæogonon;

Betonica, Serratula; Scrophularia & Ruta

canina; Stachys.

## M E N T H A.

**M**entha veteribus Græcis, Plin. l. 19. c. 8. auctore, *μινθᾶ* dicebatur: at odoris suavitas nomen apud Græcos mutavit, & ἡδύς *ἡδύς* ab ἡδὺς *ἡδύς*, i. e. suavis odor, vocatur. qua voce Dioscor. l. 3. c. 41. usus est. Hydri-  
osmi Theoph. 7. b. 7. ubi Gaza Mentastrum convertit: ut Mentæ (sorte Mentastrum intelligens) 6. b. 7. meminit.

Genera: Dioscoridi sativa est & sylvestris, quam Mentastrum dici, voluit interpretes, Plinium. Galeno 6. simpl. Mentha est odorata, quæ Dioscoridi sativa est, & altera inodora, quam Calamintham vocitent. Et Plin. l. c. & l. 20. c. 14. Mentæ genus ejus sylvestre Mentastrum est. Sic l. 20. c. 14. Neperæ mentionem facit, ex qua, ut & Mentastro, Origano, Cunila, Serpillo, Marrubio vinum confici, l. 14. c. 16. ostendit.

*Mentha sativa.*

I. Mentha hortensis corymbifera.

Balsamita, Brunf. major, Dod. gal.

Alisma, Trag.

Mentha Sarracenica, Nicolao in Marriat. Ang.

Cord. in Dioscor. (qui Chrysocome cognatam vulg.) Lac. Lon. Cam. Eyst.

Mentha Græca, Matth. Ges. hort. Cast.

Mentha Romana, Lac.

Mentha corymbifera major, Cord. hist.

Costus hororum, Ges. hor. Ad. Lob. Lugd.

Ovaria, Ges. hort.

Herba S. Mariæ vulgo, Cæs.

Hæc quibusdam Lepidium Dioscoridis: at  
Cæsal-



Cæſalpino Melilotus Dioſ. Plinij & Avicennæ.

II. *Mentha corymbifera anguſtifolia.*

*Mentha Sarrac. ſpecies altera, Myconi, Lugd.*  
an *Mentha Sarracenica ſpecies ſylv. in ſylva*  
*Martia, Cam.*

III. *Mentha hortenſis verticillata ocimi o-*

*Mentha hortenſis 4. Fuch. Tur. (dore.)*

*Mentha fativa 4. Dod. Lugd.*

*Mentha 3. Gefn. hort. 4. Lon.*

*Mentha Romana anguſtifolia, Ad. Lob.*

*Mentha cardiaca, Cam.*

*Calamintha ocymoides, Tab.*

*Ocymoides repens, Ger. ico.*

IV. *Mentha criſpa verticillata : & Eyſt.*

*Mentha fativa 1. Fuch. Dod. gal. Lac.*

*Mentha fativa, Tur. fativa criſpa, Lugd.*

*Mentha vulgata ſerpens rotundiore folio, pu-*  
*legij flore, Ad. Lob.*

*Mentha cruciata, Lob. ico. titulo tranſpoſito.*

*Mentha altera, Cam. ep. Matth.*

V. *Mentha rotundifolia criſpa ſpicata.*

*Mentha fativa ſeu criſpa, Trag. Cord. in Dioſc.*

*Mentha fativa altera, Matt. Fuch. Dod. Tur. Lac.*

*Mentha criſpa, Lon. Cam. ſive Baſamita.*

*Mentha rotundifolia altera flore ſpicato, ſive*  
*cruciata mentha, Lob. (tranſp.)*

*Mentha vulgata, ſive fuſca ſacra, Lob. ico. tit.*

*Mentha hort. rotundifolia, ſeu Romana, Cæſ.*

*Mentha fativa minor, Caſt. (exhibet.)*

*Mentha ſpicata quinque varietates Lobelius*

VI. *Mentha rotundifolia ſpicata altera.*

an *Mentha rubra, Trag. Lon.*

*Siſymb. 1. Ang. hortenſe, Matth. Lac. Caſt. Lugd.*

*Mentha hortenſis altera, Gefn. hort.*

*Siſymbria mentha agreſtis, Lob.*

VII. *Mentha anguſtifolia ſpicata.*

*Mentha, Brunf. Ang.*

an *Nepeta aquatica, vel Mentha agreſt. 3. Trag.*

*Mentha 1. Matth. Caſt. hortenſis 1. Gefn. hort.*

*Mentha fativa, vel hortenſis 3. Dod. Fuch. Tur.*

*Siſymbrij 1. altera ſpecies, Cord. in Dioſc.*

*Mentha acuminata, Lon. acuta, Tab. Cæ. in Mat.*

*Mentha Romana ſive præſtantior anguſtifolia.*

*Adv. Lob.*

*Mentha fativa, Lugd. cruciata, Ger.*

*Mentha hortenſis oblongo folio, Cæſ.*

*Mentha odorata anguſtifolia, Cam.*

*Latoribus aliam, aliam anguſtiſſimis & lon-*  
*giſſimis folijs in hortis obſervavimus.*

VIII. *Mentha ſpicata folio variegato.*

*Menthaſtrum alterum, Dod.*

*Menthaſtrum Anglicum cinereum & niveum, Ad.*

*Menthaſtrum niveum Anglicum, Lob. Lugd. Eyſt.*

*cujus ſolum nomen apud Tabernemontanum.*

*Interdum in eodem ramo folia quædam ni-*  
*vei coloris, quædam partim nivei partimque*  
*viridis, in quibuſdam nihil nivei.*

*Mentha ſylveſtris ſive Menthaſtrum.*

I. *Mentha ſyl. rotundiore folio : & Gefn. hort.*

*Menthaſtrum, Cord. in Dioſc. Tab.*

*Menthaſtrum folijs orbiculatis, Gefn. ap.*

*Mentha aquatica, Ger.*

II. *Mentha ſylv. longiore folio : & Gefn. hort.*

*Mentha equina, Brunf.*

*Menthaſtrum, Trag. (vel mentha agreſtis alte-*

*ra) Matth. Fuch. Dod. Cord. hiſt. Lac. Ad. Lob.*

*Caſt. Cluſ. hiſt. ico.*

*Menthaſtrum ſyl. Eyſt. vulgare, Lugd.*

*Siſymbrium campeſtre, Ang.*

*Mentha ſylv. Tur. Lon. ſylv. altera, Cæſ.*

III. *Mentha ſylv. longioribus nigrioribus*  
*& minus incanis folijs.*

*Menthaſtrum aliud, Lob.*

*Menthaſtrum Campenſe, Lugd.*

IV. *Mentha ſylv. anguſtifolia.*

*Pulegium aquaticum, ſeu paluſtre ſpicat. Eyſt.*

V. *Mentha montana verticillata.*

*Menthaſtrum montanum, & 1. Cluſ. pan.*

*Menthaſtrum montanum panno. ic. Eid. hiſt.*

*Menthaſtrum pannonicum, Cam.*

VI. *Menthaſtrum cæruleum, Cam. quid ?*

VII. *Mentha tuberoſa radice. (Cam.)*

*Menthaſtrum tuberoſa radice, Cluſ. pan. & hiſt.*

VIII. *Mentha radice geniculata : quæ 2. in Prod.*

## MENTHA AQUATICA, SIVE SISYMBRIUM.

Σίσυμβριον, ἑρπύλλον ἄγρον : *Siſymbrium, alij Scerpillum ſylv. vocant, Mentha hortenſis ſimilitudine, ſed*  
*lterioribus folijs atque odoratis, Dioſcoridi, l. 2. c. 155.*

*Genera duo fecit : alterum Mentha ſimile : alterum quod Cardamine dicitur : & Plinius, lib. 20. cap. 22.*  
*Siſymbrium ſylv. à quibuſdam thymbraum appellatum, pedali non amplius altitudine : quod in riguis naſci-*  
*tur ſimile Naſturtio eſt, & l. 19. c. 8. Siſymbrium latiſſimè naſcitur in piſcinis & ſtagnis.*

I. *Mentha rotundif. paluſtris, ſeu aquat. major. | Mentha rubra, Brunf.*

Ff 2

Balſa-



Balsamina agrestis & Nepeta 3. Trag.  
 Sifymbrium sylv. Matth. Lugd.  
 Sifymbrium, Fuch. Dod. primum, Thal.  
 Sifymbrij 1. species prima, Cord. in Diosc.  
 Calamentum 3. Ang.  
 Calamintha aquatica, Gesn. col. Tab.  
 Sifymbrium agreste aquaticum, Gesn. hort.  
 Menta sylv. altera, & Menta aquatica, Lon.  
 Menta sylv. 1. Cæs.  
 Aquatica, sive Sifymbria mentha, Ad. Lob.  
 Sifymbria mentha, Ger.  
 Balsamita officinarum, Eyft.

Hæc aliquando tota rubet: magis minusve hirsuta existit.

II. Menta rotundifolia palustris minor, sive flore globofo: pro 5. in Prodromo descripta.

III. Menta palustris folio oblongo.  
 Menta trifolia aquatica hirsuta, Ad. Lob. Lug.  
 Calamintha 3. Dioscoridis, Lob. ico.  
 Mentastrum minus spicatum, Lugd.  
 Mentastrum aliud hirsuto folio, Cam.

*Menta cataria.*

I. Menta cataria vulgaris & major.  
 Menta non odorifera, Brunf.  
 Nepeta vulgaris, Trag.  
 Nepeta fruticosa, Cord. in Diosc.  
 Herba gattaria, Matth. Cast.  
 Calaminthæ 1. genus, Fuch. 3. genus, Dod. gal.  
 Tur. Thal.  
 Calaminthæ species quibusdam, Gesn. hort.  
 Calamintha montana, Lon.

Balsamita major, Lac.  
 Cattaria herba, Dod.  
 Cattaria, sive Mentha catti, Ad.  
 Mentha cataria, Lob.  
 Gattaria vulgò, Calamintha 3. Diosc. Cæs.  
 Herba felis, Lugd.  
 Mentha felina, Tab. Ger. Eyft.  
 Nepeta Germanica, Cam.

Alij Calaminthæ, alij Melissæ, alij Nepetæ, alij Urticæ, quæ Herculanæ Plinio, speciem faciunt: alij inter Calamintham & Melissam mediam volunt.

II. Menta cataria minor.  
 Cattaria minor, Clus. pan.  
 Cattaria tenuifolia Hispanica, Eid. hist.  
 Nepeta minor, Cam.

III. Menta cataria minor alpina: pro 4. in Prodromo descripta.  
 Nepetella, Eyft.

IV. Menta cataria latifolia.  
 Mentha cataria peregrina latifolia, Lob. Lugd.  
 Menta felina sativa latifolia, Tab.  
 Menta cattaria altera, Ger.  
 Nepeta peregrina, Eyft.

V. Menta cataria angustifolia major.  
 Mentha cataria peregrina angustifolia, Lob. Lug.  
 Cattaria folio longiore, Dod.  
 Mentha felina sativa angustifolia, Tab.  
 Salvia Romana, Ger. ico.

VI. Menta cataria angustifolia minor: sub 3. in Prodromo descripta.

## CALAMINTA.

**K**αλαμίνθον, quasi bona & utilis mentha, nidore enim suo, ut habet Aristophanes, serpentes, vel accensa, vel substrata, ait Dioscorides, l. 3. c. 43. sugare solet.

Genera tria Dioscoridi: 1. folijs Ocimi, montibus familiaris: 2. pulegio similis, sed major, quam ἀγρία pulégium sylv. Romani νεπέταν vocant (& Plinius, l. 20. c. 14. Nepeta obiter meminit) 3. Mentha sylvestri cognata est, folijs oblongis, caule & ramis, quam superiora majoribus, sed viribus inefficacior.

I. Calamintha incana ocimi folijs.  
 Calamintha 2. incana, Lob. Lugd.  
 Calamintha Cretica, Cam.  
 Calamintha montana incana minor, Tab.  
 Calamintha montana vulgaris, Ger.

II. Calamintha pulegij odore, sive Nepeta.  
 Calamintha altera, Matth. Lugd. (fortè pulegium Diosc.) Lac. ico. Lug. (duplici figura) Cam.  
 Nepeta agrestis, Cord. in Diosc.  
 Calamintha Italica pulegij odore, Gesn. hort.  
 Calamintha altera odore gravi Pulegij, folijs maculatis, Ad. Lob.

Pulegium sylv. sive Calamintha altera, Dod.  
 Calaminthum, quod vulgo Nepeta, Cæs.  
 Calamintha arvensis 2. Tab.  
 Calamintha montana præstantior, Ger. ico.  
 Calamintha angustis folijs, Eyft.

III. Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ.  
 Calamintha, Matth. 2. Thal. vulgaris, Cam.  
 Calamintha montana, Gesn. hort. Lac. Dod. Cast. Lugd.  
 Calamintha montana vulgaris, Lobel. Tab. Eyftett.

Nepeta

*Nepeta montana*, Cord. in Diosc.

*Calamintha* 3. Dioscoridis Dalechampia, Lug.

*Mentha fativa rubra*, Ger. ico.

IV. *Calamintha magno flore*.

*Calamintha montana præstantior*, Adv. Lob.

Lugd. Cam. Tab. Eyft.

*Calaminthum* 1. Ang.

*Calamentum montanum*, Cæf.

*Scordonia* five *Salvia agrestis*, Ger. ico.

V. *Calamintha vulgaris exiguo flore*: quæ in Prodrômo describitur.

VI. *Calamintha arvensis verticillata*.

*Mentastrum*, Brunf.

*Nepeta agrestis*, vel 4. Trag. Lugd.

*Mentha aquatica exigua*, & *Pulegium sylv.* Eidem, & floris colore solum differt.

*Calamintha aquatica*, Matth. Lugd.

*Calamintha aquatica Belgarum*, an *Polycnemon*, quasi *multitibia*, Ad. Lob.

*Calamintha altera*, Dod. gal. Fuch. Tur.

*Calamintha arvensis*, Gefn. hort. Tab.

*Nepeta*, Lon.

*Polycnemon Lobelij*, Lugd.

VII. *Polycnemon Dalechampij*, Lug. quid?

## MELISSA.

**M**ελισσόφυλλον & Μελίτταν, id est, *Apiastrum*, quod hac αμέλιττα apes delectentur, Dioscoridi, lib. 3. cap. 118. Plinio, lib. 21. cap. 20. *Melysophyllum* five *Melitis*: & prius, lib. 21. cap. 9. *Melissophyllum* quod *Apiastrum*. Latinis *Melissa* ab apibus, quæ etiam μέλισσα dicuntur.

I. *Melissa hortensis*: & Lon.

*Melissa*, Brunf. Ang. Dod. Cæf. Ger. officin. Eyft.

*Melissa domestica*, vel 1. Trag. descript. nostrâs, Cam.

*Melissoph.* Matth. Gefn. hort. Cast. Lugd. Tab.

*Melysoph.* vulgare vel adulterinum, Fuch.

*Apiastrum*, Matth. Cord. in Dioscor. Lac. Tur.

Ad. Lob.

*Citrâgo*, Gefn. hort.

Hanc in montibus sponte nasci Matth. asserit, quam

*Melissophylli* sylv. genus Matthioli, Gef. hort. nominat.

II. *Melissa peregrina folio oblongo*.

*Melissa Moldavica*, Matth. Cast. Lugd.

*Melissa* vel *Cedronella*, id est, *Citrâgo Turcica*, Gefn. hort.

*Melissophyllum Turcicum*, Ad. Lob.

*Melissæ* genus ex Oriente, Cæf.

*Melissa Turcica Dalechampij*, Lugd. Camer. Tab. Ger.

Variat magnitudine: hinc duæ figuræ in Lugd. hist: colore quoque flores, qui cæruleus, purpureocæruleus, & albus.

*Melissa Moldavica* flore cæruleo, & flore albo, Eyfett.

III. *Melissa Moluccana odorata*.

*Melissa Constantinopolitana*, Matth.]

*Cardiaca Melica*, five

*Molucca Syriaca*, Ad.

*Molucca lævis*, Dod. Ger.

*Cardiaca melica*, five *Molucca minus aspera*, Lobel.

*Molucca* five *Melissa Constantinopolitana*, Cam. 1. Cast.

*Molucca* 1. Cæf.

(Lugd.

*Molucca* five *Melissa Turcica Dalechampij*,

*Melissophyllum Constantinopolitanum*, Eid.

*Cardiaca Syriaca*, Tab.

*Molucca odorata spinosa*, Cast. Eyft.

Alteram lævem, alteram aculeatam Matth. dicit: aculeis carentem nullam vidimus.

IV. *Melissa Moluccana fœtida*.

*Melica*, vel *Molucca asperior*, Ad. Cam.

*Molucca asperior Syriaca*, & *Mafeluc Turcorum*, Lob.

*Molucca spinosa*, Dod. Lugd. Ger.

*Molucca altera*, Cæf.

*Molucca*, vel *Melissa Constantinopolitana* 2.

*Cardiaca Syriaca aspera*, Tab. (Cast.

*Molucca lævis inodora*, Eyft.

Utramque *Moluccam Alyssu Galeni* congenerem, ut & *Dioscoridis* & *Plinij Cæsalpinus* voluit.

## MARRUBIUM.

**Μάρριον** Dioscorides, lib. 3. c. 119. id quod *Marrubium album* dicitur, nominat: at quod nigrum, Βαρύριον & μέλαν πικρόριον, lib. 3. cap. 117. vocat. Plinius, lib. 20. cap. 22. *Marrubium*, quod Græci *Prasium* vocant: & lib. 27. cap. 8. *Balloten*, alio nomine *Melampyrion* Græci vocant.

Genera duo Theoph. 6. hist. 1. & 2. proposuit: aliud folio herbido, incisuris profundioribus, quo unguentarii

utuntur : alterum rotundius squallens, incisuras habens obscuriores (Prasium innuere videtur.) Et Plin. l. 20. c. 22. duo genera, ex Castoris sententia, nigrum, & quod magis probat candidum.

*Marrubium nigrum.*

I. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theophrasti.

Marrubium mas, Brunf.

Melissa sylv. Trag.

Cardiaca, Matth. Dod. gal. (& Sideritis i.) Gef. hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Thal. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Lycopsis, branca lupina, Ang.

Cardiaca, vel Lycopus, Fuch.

Alysson Galeni & Aëtijesse, Cæsalp. censet.

II. Marrubium palustre glabrum.

Marrubium aquat. Trag. Ad. Lob. Dod. Thal.

Marrubium palustre, Dod. gal. Lon. (Lugd.

Sideritis i. Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. Lugd.

Cast. Cam. 2. Lon.

Lancea Christi, Gefn. hort.

Verbenæ alterum genus, Cæs.

III. Marrubium palustre hirsutum : quod i. in Prodromo.

IV. Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis. (Lon.

Marrubium majus, vel i. Trag. nigrum, Gef. h.

Ballote, Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Lac.

Dod. Lob. Cæs. Cast. Lugd.

Marrubium nigrum foetidum, Ad.

Marrubiastrum, Tab.

Marrubium aquaticum, Ger.

Variat folijs majoribus & minoribus.

V. Marrubium nigrum rotundifolium.

Ocimastrum Valentinum, Clus. hisp. & histor. Lugd.

Marrubium Hispanicū odore Stæchados, Lob.

Marrubium Hispanicum, Tab. Ger.

VI. Marrubium nigrum longifolium.

Herba venti Monspel. Gefn. hort. Lob. Lugd.

Sideritis Monspeliensium, Lugd.

Parietariam Monspeliensium à Cordo vocatī, Lob. & Lugd. asserunt.

*Marrubium album.*

I. Marrubium album vulgare.

Marrubium foemina, Brunf. candidum, Trag.

Marrubium, Matth. Cord. in Diosc. Fuch. Dod.

Tur. Lac. Cæs. Cast. vulgare, Clus. hist. Eyft.

Marrubium album odorum, Ad.

Marrubium, Gefn. hort. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Prasium, Ang.

II. Marrubium album villosum, an Prasium

Dioscoridis : quod 2. in Prodromo.

III. Marrubium album crispum : quod 3. in Prodr. (num.

IV. Marrubium album latifolium peregrinum Marrubium candidum, Dod. Ger. Hispanicum, Tab.

Marrubium candidum alterum Hispanicum, Lob. (hist.

Marrubium alterum pannonicum, Clus. pan. &

Marrubium Creticum, Cam. (grinum.

V. Marrubium album angustifolium pere-

Marrubium Creticum angustiore folio, Adv.

Lob. Eyftett.

Marrubium Creticum, Dod. Ger. Tab. Lugd.

qui à priore non distinguit.

Marrubium Creticum aliud, Cam.

VI. Marrubium album peregrinum brevi-

bus, & obrulis folijs.

Marrubium Creticum angustis folijs inodorum, Eyftett.

GALEOPSIS SIVE LAMIUM VEL URTICA MORTUA.

Γαλεόψις ἢ γαλεόβολον tota frutice, cum caule & folijs Urticam refert : at folia leviora & trita graviter olent : florestenuēs sunt ac purpurascētes, Dioscoridi, l. 4. c. 95. Et Plinio, l. 27. c. 9. Galeopsis aut Galeobdolon, &c. Urtica mortua & iners, quod folijs innoxia sit, quam Plinius, l. 21. c. 15. inter Urticas recensens, Lamium vocavit eam quæ innoxia sit & morsu careat : & l. 22. c. 14. addit album habere in medio folio, &c.

I. Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis.

Urtica labeo mas, Brunf.

Lamium, Trag. (vel Urtica 8. 9. 10.) Fuch. Dod. gal. Lugd.

Galeopsis Ericio Cord. Cord. in Diosc. Lon.

Cæs. 2. Tab.

Galeopsis vulgaris foetens purpurea, Adv. sive

Urtica non mordax, Lob.

Galeopsis purpurea, Lugd. Cast.

Urtica mortua, Gefn. hort.

Urtica iners altera, Dod.

Urtica non mordax vulgaris foetens purpurea, Lob. ico.

Lamium, sive Urtica non mordax vulg. & foetida, Clus. pan.

Habe-

Habetur major & minor: flore quoq; purpurascens, vel rubro cōmuniter: rariꝝ albo, luteo, & vario: est & reptilis magis humiq; procumbens.

II. Lamium purpureum vel album non fœtens folio oblongo.

Urtica labeo fœmina, Brunf.

Galeopsis, Trag. (vel 5. 6. 7. Urtica) Matth. Lac. Lugdun.

Lamium sive Archangelica fl. alb. Ad. Lob. Lug.

Urtica iners sive Lamium 1. Dod.

Galeopsis flore verticillato, Thal.

Leucas tertia, Cæs.

Lamium purpureum & album, Tab. rubr. Ger.

Galeopsis vera Dioscoridis, Clus. hist.

Tres species flore tantum differentes: est purpureo, vel ex rubro albōve purpurascens, labelis albis venis notatis: albo, luteo & croceo.

III. Lamium folio oblongo luteum.

Galeopsis flore croceo, vel Urtica 6. Trag.

Urtica iners 3. sive Lamium flore luteo, Dod.

Lamium luteum, Ad. Lob. ico. Tab. Ger.

Leucas montana, Cæs.

Galeopsis flore luteo, vel Urtica labeo, Cam.

Flores majore ex parte & non nihil rubicundi & cærulei coloris, quare

Urtica fatua aquatica, sive Lamium πολύμορφον, aut πολύχρουν, Thal.

IV. Lamium maculatum.

Urtica fatua λουίζουλη, Thal.

Galeopsis prima, Tab.

Lamium album, Ger.

Urtica mortua maculis albis respersa, Col.

V. Lamium alba linea notatum.

Urtica lactea, Matth.

Lamium Plinij, Ang. Cam.

Milzadella vulgo, Leucas Dioscor. fortè, Cæs.

Lamium Plinij montan. Campoclarensis, Col.

Huic linea semper per medium folij decurrit: cujus altera species folijs brevioribus, profundius incisus & linea angustiore, & Lamium æquicolorum, Col. dicitur.

VI. Lamium folijs caulem ambientib. majus.

an Lamium 3. vel peregrinum, Clus. pan.

an Lamium pannonicum 3. Clus. hist.

Ballote crispa major, Lugd.

Narrubium χαμαιπετής, Thal.

Alfines species, Tab.

Alfine hederula altera, Ger.

VII. Lamium folio caulem ambiente minus.

Morsus gallinæ folio hederulæ alterum, Lob. ico.

Leucas quarta, Cæs.

Ballote crispa minor, Lugd.

VIII. Lamium maximum sylvaticum fœtidum.

Heraclea vel Urtica 11. Trag.

Urtica sylvana, Lon.

Urtica fœtida maxima πορφυράθεμον, Thal.

Urtica Heraclea, Lugd. herculea, Tab.

an Sideritis alia, Lugd.

Galeopsis legitima, vel vera Dioscoridis, Clus. histor.

Huic simile aliud, folijs non ita amplis, sed inferius incanis & lanuginosis. (Lamium incanum dici poterit) Thal.

IV. Lamium maximum sylvaticum alterum.

Galeopsis maxima pannonica, Clus. pan. & hist.

X. Lamium montanum Melissæ folio.

Melissa prima, Trag. ico. sylv. Lon.

Melissophylli species, Dod. gal.

Melissophyllum verum, Fuch. sylv. Cord. obs.

Melissophyllum Fuchsi, Ges. hor. Lob. (& Herba sacra Agrippæ) Lugd.

Melissa Fuchsi, Lob. ico. Cam. Eyf.

Herba sacra quorundam Dalechampij, Lugd.

Melissa altera, Cæs.

Variat floribus communiter pallidè purpurascens: reperitur & albis & versicoloribus, hinc

Lamium pannonicum 1. versicolore flore, &

Lamium pannonicum 1. albo flore, Clus. hist.

Est & altera caulibus infirmioribus & frequentiorib. & folijs paulò angustioribus, & Lamij pannonici 1. species altera, Eid. dicitur.

X. Lamium peregrinum, sive Scutellaria: in Prodomo descripto.

Betonica sylv. Pauli, Quadramio.

Scutellaria, Cortuso.

Cassida, Colum.

Scordotis secunda Plinij, Ponæ.

Floribus est purpureis, rarius albis.

## U R T I C A.

**A** καλύρη Dioscoridi l. 4. c. 94. & Theoph. 7. hist. 7. παρὰ τὸ μὴ ἔχειν πολλὰ σπῆν, quod injucundo sit tactu, & pruritus creat, Athenæo: dicitur & ὀνιδι, quasi pruriginosa, & πῦρ, quod pungat & suo morsu sensum laessat. Latinus Urtica ab urendo dicta, quod pruritus & pustulas igni similes excitet, Plinio.

Genera.

Genera duo Dioscoridi: una agrestior, altera non aque aspera, &c. at Plinius l. 21. c. 15. plures sunt differentie: sylvestris, quam feminam vocant, mitior: & in sylvestri qua dicitur Cania, acrior: quæ verò odorem fundit, Herulanea: quæ innoxia morsu carens, Lamium vocatur. Vide etiam l. 22. c. 13. & 14. Distinguiamus in purgentes & non pungentes: pungentes in maiorem & minorem: non pungentes, in satidas & non satidas, & has in maculatas, & non maculatas: quæ floribus colore purpureo albo, luteo variant.

*Urtica urens.*

I. *Urtica urens maxima.*

*Urtica major*, Brunf. Fuch. Dod. gal. Lon. Thal. Taber.

*Urtica vulgaris urens* r. Trag.

*Urtica secunda*, Matth. Lac. Cæs. Lugd. Cast.

*Urtica*, Cord. in Diosc. *urens*, Ger. *urens altera*, Dodon.

*Urtica sylv. major*, Ges. hor. *sylv. asperior*, Lob.

*Urtica communis*, sive *major & femina*, Ad.

Hujus & caulis & radix aliquando parum rubent, & dicitur

*Urtica rubra*, Tab. Ger.

II. *Urtica urens altera.*

*Urtica vulgaris urens altera*, Trag.

*Urtica oligophyllos* (à folior. paucitate) Lug.

III. *Urtica urens minor.*

*Urtica minor*, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord. hist.

Lon. Thal. Tab. Ger. *sylv. minor*, Ges. hor.

*Urtica tertia*, Trag. Matth. Lac. Lugd. Cast.

*Urtica exigua*, Cæs. *urens minima*, Dod.

*Urtica minor sive Cania* Plinij acrior, Ad.

*Urtica minor acrior*, Lob.

IV. *Urtica urens pillulas ferens*: 1. Dioscoridis *femine lini*.

*Urtica*, Ang. legitima, Clus. hist.

*Urtica Romana*, Trag. Fuch. (& vera) Tur. Ges. hort. Eyst.

*Urtica sylv. sive Romana offic. semine lini*, Ad.

*Urtica Rom. vel mascula*, Lob. Cam. Tab. Ger.

*Urtica prima*, Matth. Lac. Cæs. Cast. Lugd.

*Urtica*, quæ in Alexandria Angiar dicitur, Alp.

*Urtica sylvestris*, Dod. gal.

*Urtica urens prior*, Dod.

*Urtica fatua aculeata.*

I. *Urtica aculeata folijs serratis.*

*Cannabis sylv. Trag. Lugd. spuria*, Ger.

*Cannabis sylv. spuria altera*, Lob. ico.

*Cannabina alba*, Tab.

Floribus communiter purpureis: rarius candidis.

II. *Urtica aculeata folijs serratis altera.*

*Cannabis sylv. spuria tertia*, Lob. ico.

an *Sideritis Cordi*, Thal.

*Alyssum arvense album*, Tab.

*Urtica mortua quarta*, Dod. post.

III. *Urtica aculeata folijs non serratis.*

*Sideritis altera Matthioli*, ipsi Lugd.

*Cannabis spuria facie Urticæ*, Lob. ico.

*Urtica fatua sylv. aculeata*, Thal.

A L Y S S O N.

**A** "Αυσον Galen. 2. de Antidosis, herba est Marrubio similis, orbes habens in surculorum summitatibus, asperiores & magis spinosos: flores ad caeruleum vergentes: sic dicta eidem, 6. simpl. quod demorsos à cane rabido mirifice juvet. Sed hæc à Diosc. l. 3. c. 105. quæ folijs est rotundis, & fructu duplicium scutulorum effigie, planè diversa: ut & Pl. l. 24. c. 11. licet eandem nominis ratione assignet, cui & alia est, & ad Rubiam lavem referenda.

I. *Alysson verticillatum folijs profundè incis:* gere suspicatur, Lugdun.

*Alysson Galeni*, Clus. hisp. & hist. Dod. Lobel. Planta Hispanica Marrubio similis, Col.

Cast. Ger.

*Alysson Galeni aliud*, Cam.

*Alyssum Galeni Hispanicum*, Tab.

*Moluccam spinosam Clusium pro Alyssopin-*

Ex horto clarissimi Contareni.

II. *Alysson verticillatum folijs crenatis.*

*Sideritis Alysson*, & *Sideritis Heraclea Dios-*

coridis, *Alysson Antonij Coi ex Galeno*, Col.

S I D E R I T I S.

**S** *Idupitis* (ἀνὸ σιδῆρος ferro, ob vim vulnera glutinans) Dioscoridi l. 4. c. 33.

Genera: Dioscoridi triplex est: 1. aliquibus *Heraclea folijs Marrubij*: 2. *folia longu pediculi harentia*, ceu *filicis*, utring, numerosa: quæ *Heraclea Crateva folijs Coriandro similibus*. Plin. l. 25. c. 5. sub *Achillæa* sex differentias recensuit: prima *Achillæa*, quæ & Dioscor. altera est *Myriophyllon Diosc.* tertia est *Sideritis Heraclea* 1. Diosc. quarta & quinta *Sideritis Heraclea Crateva* & tertia Diosc. sexta est *Sideritis secunda Dioscor.*

*Sideri-*

*Sideritis hirsuta.*

I. *Sideritis folijs hirsutis profundè crenatis.*  
*Sideritis herbariorum* 5. Tab.  
*Sideritis Monspeliaca Scordioides*, Ad. floribus  
 luteis, Lob. Lugd.

*Tragoriganum Prassaioides*, Peninij.

II. *Sideritis hirsuta procumbens.*  
*Sideritis Heraclea*, Clus. hist. at 3. in hist.  
*Tetrahit herbariorum*, Lob. Lugd.

*Herba Judaica*, Dod.

*Sideritis Herculea Dioscoridis*, Cæs.

*Sideritis prima Herculea*, Cam.

*Sideritis herbariorum* 4. Tab.

III. *Sideritis hirsuta procumbens altera minimum crenata.*

*Sideritis quarta* & quinta, Clus. hist.

IV. *Sideritis vulgaris hirsuta erecta.*

*Sideritis prima*, Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Gesn.  
 hort. Thal.

*Sideritis vulgaris*, Cam. in Matt. vel 2. Clus. hist.

*Sideritis quarta*, Lon.

*Sideritis Heraclea*, Cord. hist. Tab.

*Sideritis sive ferruginatrix*, Ad. Lob. ico.

*Sideritis Herculea altera in vineis*, Cæs.

*Herba Judaica*, Ges. col.

*Tetrahit*, Lugdun.

V. *Sideritis hirsuta vulgaris humilior.*

*Sideritis secunda*, Clus. pan. & hist.

Illius flos candidus, rictu sanguineis notis asperfo: hujus flos amplior, albus luteo pallescens paucis rubris punctis aspersis.

VI. *Sideritis hirsuta pallido flore.*

*Sideritis pannonica* 3. Clus. pan. at 6. in hist.

VII. *Sideritis montana parvo varioq; flore.*

*Siderit. mont. parvo flore nigro purpureo*, Col.

Caput purpureo nigrescit, umbilico luteo &

collo candicante, à D. Columna accepimus.

VIII. *Sideritis alpina Hyssopifolia.*

*Sideritis montana*, Ad. Lob. ico. Lugd.

*Sideritis herbariorum* 6. Tab.

*Sideritis septima*, Clus. hist.

Variat folijs quandoq; angustioribus, quandoq; latioribus & in summitate crenatis, qualem ex Pyrenæis habemus.

IX. *Sideritis querno folio*, Dalech. Lugd.

Huic similem Britannicæ nomine, ann. 1578. in horto Patavio legimus.

X. *Sideritis alfine Trixaginis folio*: quæ 2. in Prodromo.

*Sideritis glabra.*

I. *Sideritis arvensis latifolia glabra.*

*Sideritis* 2. Matth. quamvis hist. Lugd. velit esse Cannabinam spuriam Lobelij: alij Marrubium pannonicum Clusij.

*Sideritis Heraclea altera*, Cæs.

*Sideritis arvensis flore pallido*, Cam.

*Sideritis prima arvensis species altera*, Thal.

*Alyssum majus*, Tab.

*Alyssum Germanicum*, Ger.

II. *Sideritis glabra oblongo splendente folio*: quæ 1. in Prod.

III. *Sideritis arvensis angustifolia rubra.*

*Sideritis alia in vineis flore purpureo*, Cæs.

*Sideritis arvensis flore rubro*, Cam.

*Siderititi* 1. congener secunda, Thal.

*Ladanum segetum* Plinij, & *Tetrahit angustifolium alijs*, Lugd.

*Alyssum Galeni flore purpureo*, Tab.

Plinius lib 26. cap. 8. inquit, Ladano sistitur alvus utroque quod in segetibus nascitur confuso & cribrato: hæc ille. Flore est purpureo, rarius albo.

## E U P H R A S I A.

**E**uphrasiam olim *Εὐφροσύνη* dictam aliqui volunt, eò quod oculos, eorum caliginem discutiendo, delet: hinc nonnullis *Ophthalmica* & *Ocularia*: quæ cum paulò supra ducentos annos inventa fuerint, veteribus indicta videtur. Fortè hæc vox à *Euglossa* mutuata, quæ etiam *ὀφθαλμική* dicitur: quod eo modo quo *Euglossa* in vinum conjecta animi lætitiâ faciat: sic & *Euphrasia*, quam primo loco proponimus, oculos juvet: hinc Germanis, oculorum solatium.

I. *Euphrasia officinarum.*

*Eufragia alba*, Brunf. vulgaris, Col.

*Eufragia*, Matth. Ang. Cæs. Cast. desc. altera major, Thal.

*Euphrasia* & *Eufrasia*, Fuch. Dod. Lac. Ges. Ad.

Lob. Lugd. Tab. Ger. vulgaris, Lon.

*Euphrasia Argentinensium*, vel 2. & 6. Trag.

*Ophthalmica* sive *Ocularia*, Eric. Cord.

Altera major est & ramosior, folijs minoribus: altera minor folijs latioribus, & in montibus ferè semper unicaulis, quandoq; in alpi-  
 bus Helveticorum parva, luteis floribus: floribus

colore variat, communiter ex luteo albicat, aliquando eleganter ex cæruleo purpurascit: hinc Euphrasia ramosa pratensis flore albo, & Euphrasia minus ramosa, flore ex cæruleo purpurascente, Eyft.

II. Euphrasia folijs lini angustioribus.

Eufragia linifolia, Col. par. 2.

Hæc flore, fructu, semine ac sapore congener & dodrantem non excedit.

III. Euphrasia pratensis rubra.

Eufragia altera, Dod. Lob. Lugd. Col.

Sideritis pratensis rubra, Lugd.

Ericoides rubrum, Thal.

Cristæ alterius generis prima, Cæf.

Odontites, Tab.

Cratæogonon Euphrosyne, Ger.

Habetur brevis & palmaris.

IV. Euphrasia pratensis Italica latifolia.

Eufragia 3. non scripta, sive media, Col.

Brunellæ Italicæ nomine in Phytopinace: ac in Prod. sub Euphrasia purpurea minore descripta: quæ floris colore purpureo, vel candido variat.

V. Euphrasia Italica latifolia altera.

Eufragia major sylv. purpurea latifolia, Col.

VI. Euphrasia pratensis lutea.

Sideritis pratensis lutea, Lugd.

Ericoides luteum, Thal.

Cristæ alterius generis altera, Cæf.

Odontites secunda flore luteo, Tab.

Eufragia sylv. major lutea angustifolia, Col.

VII. Euphrasia lutea albinefolia, radice squammata: pro 1. in Prod. descripta.

Anonyma radice dentariæ, Col. par. 2.

## M E L A M P Y R U M.

**M**ελάμπυρον, id est, Triticum nigrum, Galeni i. aliment. ult. quod ex tritici mutatione generari censeatur: & Theophrasto 8. hist. 5. de nostro 1. & 2. intelligere oportet: quod quibusdam Plinij l. 21. cap. 17. Stelephuros, alijs ejusdem Alopecuros, cui nomen à spica molli & lanugine densa, vulpium caudis non dissimili, cui proxima Stelephuros, nisi quod illa particulatim floreat: hæc Plinius. An forte Aera Plinij l. 18. c. 17. Triticum simili modo enecat æra: quamvis hoc nomen & jam Lolio tribuatur.

I. Melampyrum purpurascente coma.

Trifolium majus, Brunf. ico.

Triticum vaccinum, Trag. Dod. Lon. Lugd.

Melampyr. Dod. gal. Ad Lob. Cam. Tab. 5. Thal.

Parietaria sylv. tertia, Clus. pan. & hist.

Variat floris colore: flore est infernè supernèq; puniceo, medio candido, folijs laciniatis: sic infernè puniceo, supernè luteo, folijs minoribus flore luteo in summo albicante: infernè candido supernè luteo: sic ex albo viridiq; mixto.

II. Melampyrum cærulea coma.

Parietaria Lipsensium, Trag.

Parietaria sylv. Cam. sylv. 1. Clus. pan. & hist.

Coma, coloris est, modo violacei, modo purpurei, nunc dilutioris, nunc saturatoris: modo candidi.

III. Melampyrum lanuginosum Boeticum.

Parietaria montana Boetica, Clus. cur post.

IV. Melampyrum luteum latifolium.

Parietaria sylv. 2. Clus. pan. & hist. sylv. Eyft.

Cratæogonon, Ad. Lob. Lugd. rubrum & album, Ger.

Satureia lutea Dalechampij, Lugd.

Hyslopous nemorensis & lutea, Lugd.

Melampyrum primum, Thal.

Crista prima, Cæf.

Milium sylvaticum primum & secundum (solo colore floris differunt) Tab.

Κραταύγον Dioscorides l. 3. c. 139. folijs Melampyro similibus describit, & quæ notæ huic conveniunt. At Plinio l. 7. cap. 8 Cratæogonon duplex, alterum Dioscoridis respondens, alterum fortè Persicaria erit.

V. Melampyrum luteum angustifolium: quod sub Melampyro 4. in Phytopinace, & pro Melampyro luteo linariæ folio, in Prod. descr. an Melampyrum sextum, Thal.

VI. Melampyrum luteum minimum.

Melampyr. perpusillū luteum, Ad. Lob. ic. Lug.

Melampyrum luteum, Tab.

## B E T O N I C A.

**K**εττον à remedium copia & varietate: συχρόγον, quod frigidis locis invenitur: Romanis Βίτονιον Dioscoridi l. 4. cap. 1. Veronica qua dicitur in Gallia, in Italia Serratula, à Græcis Cestron, aut Psycotrophon, Plinio lib. 25. cap. 8.

I. Beto-



I. *Betonica purpurea.*

*Betonica*, Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch. (purpurea, Eid. ico.) Dod. Gesn. hort. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Thal. Lugd. Cast. Tab. Ger.

*Betonica vulgaris*, Clus. hist.

*Vetonica*, Cord. in Diosc. & hist.

Duplex est: altera spica brevior, altera longior, molliore, serius florente, & altius excrefcēte.

II. *Betonica alba.*

*Betonica alba*, Brunf. Tab.

*Betonica albo flore*, Dod. Clus. pan. & hist. Cam.

*Betonica candida*, Trag. Lob.

*Vetonica alba*, Cord. hist.

III. *Betonicaefolia capitulo Alopecuri.*

*Alopecuri* genus, sive *Alopecures montana*, Lugd.

## S E R R A T U L A.

*Serratula à folijs minutim serratis nomen accepit.*

*Serratula*, Matth. Dod. Adv. Lobel. Clus. histor. Lugd. Cast. Cam. Ger.

*Serratula tinctoria*, Tab. tinctoris, Eyst.

*Cerretta* sive *Serretta*, Cæs.

*Centauroides*, vel *Centaureum majus* syl. German. Th. qui vult *Schartam* seu *Tinctoriū* florem à Trago nominari: quod ego, sed male, a *Solidago Serracenicā* 4. Lon. ico. (liās credidi.)

Differentia in folijs ratione incisuræ quadruplex est, ut rectè *Thalius*:

1. Folijs omnibus serratis, sed incisura carentibus, etiam flore candido, quæ

*Serratula tinctoria* 1. Tab.

*Serratula purpurea*, Ger.

2. Folijs ad radicem integris, reliquis profundè incisis, quæ

*Serratula* 2. Tab.

*Serratula flore albo*, Ger.

3. Primum folium ad radicem integrum habet, reliqua omnia dissecta, quemadmodum *Loelius* 1. figurâ pinxit.

4. Folia utroque latere omnia similibus divisionibus divulsa sunt, quæ

*Serratula* 3. Tab. Ger. & 2. apud Lob.

*Serratula tinctoris*, Eyst.

Majorem & minorem *Cæsalpinus* agnoscit.

## B E H E N A L B U M E T R U B R U M.

*Serratulæ* affinis capitulo squamoso luteo, ut & flore.

*Behmen* ab *Arabum*: id est *Behen album*, nam rubrum *Behmen Ackmar* incolæ appellant, *Rauvolf*. & Lugd. ap.

*Behen Arabibus*, ut *Serapioni* sunt radices pastinacæ radicibus similes: quare *Haliabbas* scribit *Behen* & *Pastinacæ* sylv. radices, nulum inter se discrimen habere. Equidem in officinis radices duæ nomine albi & rubri ostenduntur, sed quid sint controvertitur: *Al-*

bum aliqui *Polemonia* sive *Lychnidis*, quæ *Papaver spumeum* & *Behen album* *Montspeliensis* dicitur speciem esse existimant: *Ben* verò rubrum, alij *Limonij* maritimi, alij *Valerianæ* rubræ, alij *Bistortæ* esse autumant: aliqui verò, *Garzia* & monente & reprehendente, *Zerumbeth* esse statuunt. Quare aliqui in descriptionibus *Arabum*, substituunt *Eryngium*, alij *Tormentillam*, alij *Angelicam*, alij denique *Caryophyllatam*. Licet *Actuarius* & *Myrepsus* *Behen Hermodactylos* esse velint.

## S C R O P H U L A R I A.

*Scrophularia* & à radice nodosa & ab effectu, quod ad *Scrophulas* prodesse credatur, nomen accepit. *Alia tamen radice est nodosa, alia fibrosa nodis carens.*

I. *Scrophularia nodosa foetida.*

*Scrophularia major*, Brunf. Gesn. hort. Tur. Lon. Adv. Lobel. Cæs. Thal. Lugd. Camer. Tab. Ger.

*Scrophularia*, Matth. Lac. Dod. Cast.

*Ocimastrum alterum*, Trag.

*Galeopsis*, Dod. gal. Fuch. cui minor, in ico.

*Clymenum mas*, Gesn. hort.

Sunt qui *Galeopsin*: alij *Clymenum* *Plinij* l. 25. c. 7. cui *hederæ* folia tribuit: alij *Chrysip-*

*peame* ejusdem l. 26. c. 9. (cujus tamen notas nullas addidit) velint. Alijs *Millemorbia*, *Ficaria*, *Ferraria*, sive *Castrangula*.

II. *Scrophularia palustris* non foetida, seu aquatica minor.

*Scrophularia fœmina*, Cam. ep. Matth.

*Betonica aquaticæ septentrionalium* species minor, Lob. obs.

III. *Scrophularia aquatica major.*

*Ocimastrum majus*, Trag.

Galeopsis 2. Dod. gal.

Scrophulariæ majoris altera species, Gef. hor.

Clymenon fœmina, Eid.

Clymenon, sive Betonica aquatica, Tur.

Betonica aquatica, Dod. Ad. Lob. Lugd. Taber. Ger.

Scrophularia major aquatica, Thal.

IV. Scrophularia folio Urticæ,

Galeopsis, Ang.

Scrophularia peregrina, Cam.

an Scrophularia Cretica 2. Clus. hist.

V. Scrophularia flore luteo.

Lamium pannonicum, 2. Clus. pan. alterum sive exoticum, Eid. hist.

Scrophularia montana maxima, Col.

In Phytopinace, Matthiolo & Prodomo descripta.

VI. Scrophularia folijs lacinitatis: quæ 2. in Prod.

VII. Scrophularia folijs filicis modo lacinitatis, vel Ruta Canina latifolia.

Scrophularia Cretica 1. Clus. hist.

VIII. Scrophularia, Ruta canina dicta vulgaris, Sideritis 3. Matth. Cam. qui addit forte à pistore non rectè expressam.

Sideritis altera Diosc. Lac. Cast. Tab. prima, Lon.

Galeopsis 3. Dod. gal.

Ruta canina, Ad. Lob. Lugd. Tab. Clus. hist.

Scrophulariæ similis planta major: Sideritis 2. Dioscoridis, Cæs.

In Matthioli figura folia inferiora cum Tanacetum referant, aliqui Tanacetum inodorum esse suspicantur: at Rutam caninam ipsum exprimere voluisse non dubitamus, cum à Nobilibs. Cortuso Sideritidis 3. nomine, Rutam hanc acceperimus, qui eam Matthiolo communicaverat.

## S T A C H Y S.

Στάχυς frutex est Marrubio similis, sed longior. folijs subhirsutis, duris, odoratis, candidis, Dioscoridi lib. 3. cap. 120. At Plinio lib. 24. cap. 15. Stachys porri similitudinem habet, longioribus & pluribus folijs, odoris jucundi, coloris in luteum inclinati. Stachys id est spica.

I. Stachys major Germanica.

Marrubium agreste, vel 3. Trag.

Stachys, Matth. ed. prim. Fuch. Dod. gal. Cord.

in Diosc. & hist. Tur. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd.

Tab. Ger. Dioscoridis, Lob.

Sphacelus alijs Stachys, Guil.

Stachys Germanica, Gesn. ap. minor, Cam.

Pseudostachys, Matth. Lugd.

Salvia sylvestris, Cæs.

Marrubium montanum alterum, Thal.

Sideritis, Heraclea, Col.

Floribus est purpurascens, rarius albis.

II. Stachys Cretica: pro Pseudostachyde in Prodomo describitur.

III. Pseudostachys alpina.

Marrubium montanum 1. Thal.

Alpenkraut/ fortè Sphacelus Theophrasti, Lon.

Salvia sylv. nigrior, Cæs.

Salvia alpina, Tab. Ger.

Hujus altera species gravi odore carens: utraque sub Pseudostachyde 2. in Prodomo descripta.

IV. Stachys minor Italica.

Stachys, Matth. Dod. Lugd. Taber. Ger. minor, Cam.

Stachys floribus gratioris odoris, Gesn. ap.

Stachys spuria Flandrorum, Ad. Lob. ob.

Stachys lychnitis, Eid. ico.

Salvia sylvestris 3. Cæs.

V. Stachys Lusitanica, Lob. Lugd.

VI. Stachys spinosa Cretica.

Stachys spinosa & Gaiderthymo, id est, Asinum Thymum, Clus. ap. 1.

Gaiderothymum Creticum, Hon. Belli ep. 5. ad Clus. Ponæ Ital.

VII. Stachys palustris fœtida.

Stachys palustris Gesneri, Cam.

Betonica fœtida, Gesn. col.

an Herbæ Judaicæ cognata, Eid.

Sideritis 1. gravis odoris, Thal.

Clymenon minus, Lugd.

Tertiola, quod tertianas sanet, Cæs.

Marrubium aquaticum acutum, Ger.

Lyfimachia galericulata adulterina, Eyft.



## S E C T I O S E X T A.

SALVIA; HORMINUM; VERBASCUM; BLATTARIA;  
ÆTHIOPIS; VERBASCULUM SIVE PRIMULA VERIS;

Sanicula Alpina vel Auricula Urſi; Pinguicula; Digitalis;  
Ephemeron.

## S A L V I A.

**S**alvia, quod ad multa, præſertim ad ſecunditatem, ſalutaris ſit: cum ſteriles, hujus uſu frequenti gravidæ reddantur: quare Agrippa ſacram herbam vocavit, Aërio auctore. Ελεγιſφακον Dioſcoridi l. 3. c. 40. (quæſi in tabem redacta, cum herba ipſa ſemper retorrida & exucca videatur: id enim ſφακός & ſφακός ſignificat: folia enim attritis veſtibibus comparantur) & ελεγιſφακον & ſφακον dicitur. Plinius l. 22. c. 25. Lenti ſylveſtri annumerat, putans Elegiſphacon à Lente dictum, ab alijs Phacon. Eſt, inquit, & ſylveſtris Elegiſphacon à Græcis dicta, ab alijs Phacos: Eſt ea ſativa lente levior & folio minore atque ſiccior & odoratior (quibus Sphacelum Theophraſti innuit.) Eſt & alterum genus ejus ſylveſtris, odore gravi: hæc mitior: folia habet Cotonei mali effigie, ſed minora & candida) hæc eſt apud Dioſcoridem hiſtoria Salvia, quam cum Phaco & Aphaca confundit) ſubjungit: noſtri, qui nunc ſunt herbarij, Elegiſphacon Græcè, Latine Salviam vocant, mentæ ſimilem, canam, odoratam (majorem hæud dubiè intelligit.) At l. 26. c. 6. Salvia meminit: an verò de hac, vel Stachy, vel Sphacelo Theophraſti, vel Hormino vulgari, vel Aethiopide loquatur, ambigitur.

Genera: Dioſcorides unus meminit: quæ major vulgaris eſt: at Theoph. 6. hiſt. 1. Salviae plura ſunt genera: ſubjungens Sphacelum & Salviam inter ſe diſtare, quæſi alterum urbanum alterum ſylveſtre genus dixerit.

I. Salvia major, an Sphacelus Theophraſti?

Salvia latifolia, Brunf. deſc. Trag. Geſ. hor. Lon. Cluſ. hiſt. Cam.

Salvia major, Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lugd. Caſt. Tab. Ger.

Salvia hortulana, Eric. Cord.

Salvia, Ang. Cord. in Dioſc. domeſtica, Cæſ.

Salvia major ſcabrior Dioſcoridis, Ad. Lob.

Salvia major latifolia flore cæruleo, Eyſt.

Varietas in folijs & floribus: folijs eſt viridibus, ijsque criſpis & non criſpis, purpureſcentibus, veſticoloribus: ſic vel totis, vel partim albidis: floribus communiter cæruleis, rarius candidis.

II. Salvia nigra.

Salvia major alba, Dod.

Foliorum pediculi, ac nervi, & recens enata folia atrorubent.

III. Salvia minor aurita & non aurita.

Salvia nobilis, Brunf. Geſn. hort.

Salvia anguſtifolia & minor, Trag.

Salvia minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in

Dioſc. Lac. Tur. Lob. Cæſ. Tab. Ger. pinnata, Ad.

Salvia acuta, Lon.

Salvia anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

Salvia tenuifolia auriculata, Cam.

Sphacelus verus Theophraſti, Lugd.

Variat folijs auritis, vel pinnatis, & non auritis: folijs aliquando Lavandulæ concoloribus, ſed latioribus, & gravioris odoris: rarius lureolis: flore cæruleo, rarius albo.

IV. Salvia minor altera: hæc odore & ſapore eſt Abſinthij, floreque rubente: quam primum Baſileæ in horto Pharmacopæi Johannis Heitzmanni: dein in horto Montebelgardia-co, legitimus.

V. Salvia folio tenuiore.

Salvia Hispanica odoratiſſima, Cam.

Salvia Indica, Tab. Ger.

Salvia Hispanica flore albo, Eyſt.

VI. Salvia latifolia ſerrata: quæ 1. eſt in Prodromo.

VII. Salvia anguſtifolia ſerrata.

Salvia Cretica anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

VIII. Salvia anguſtifolia lanuginofa: quæ 3. in Prodromo.

IX. Salvia baccifera.

Salvia fructum inſtar gallæ ferens, Matth.

Salvia Græca, quæ hodie φλαςκομυλῶ, Ang.

Salvia Cretica, Dod. Tab.

Salvia coccifera ſive baccata Cretenſis, Ad.

Salvia Cretica baccifera, Lob. ico. Lugd. Cam. ep. Matth.

Hujus folia aliquando aurita, nonnunquam

appendicibus carentia: subinde quædam cauliculorum pars inter genicula in crassitudinem extruberant ut gallarum ( sunt excreſcentiæ quædam ) magnitudinem & ſimilitudinem, ſeu baccarum & pomorum orbiculatorum, in

Crera aſſequantur. At in regionibus frigidis nulla proſert: hinc duæ figuræ apud Cluſ. hiſt. Salvia Cretica pomifera, & non pomifera.

X. Salvia folio ſubrotundo: quæ 2. in Pro-dromo.

## H O R M I N U M.

**O** *ῥανον* herba eſt folijs Marrubio ſimilis, caule quadrangulo, &c. Dioſcoridi l. 3. c. 145. dictum videtur ἀνὸ τῶ ῥεματί, quod τῶς τλὴν αὐτῶς αἰτῶν παρὰ ῥεματί, ad Venerem ſtimulet, ut Dioſcorides loquitur. Theophrastus Hormini (Gaza Geminalem vertit) inter fruges meminit 8. hiſt. 1. & 7. Galeno 8. ſimpl. φέγειν: Aeginetæ ῥεματί & φέγειν dicitur. Plinius l. 18. c. 7. Horminum à Græcis dictum, Cumino ſimile ſcribit.

Genera duo Dioſcoridi: ſativum & ſylveſtre: in ſylveſtri ſemen rotundum ac fuscum, in altero nigrum & oblongum reperitur. Et Plinio l. 22. c. 25. Horminum Cumino ſimile, &c. duorum generum, alteri ſemen nigrum & oblongum, alteri candidum & rotundum: qui vires à Dioſcoride prius propoſitas ſubjungit.

### I. Horminum ſativum.

Horminum, Matth. Ang. Lac. Dod. Adv. Lob. Cæſalp. Lugd. Taber. Caſt. ſativum, Dod. gal. Cæſalp. Cam.

Orminum verum, Geſn. hort. minus, Lon.

Horminum ſylv. folijs purpureis, Ger.

II. Horminum Syriacum: & Eyſt. in Phytopinace, Matthiolo & Prodromo deſcriptum. Biſermas, Cam. Aman quibuſdam.

### III. Horminum Sclarea dictum.

Gallitricum ſativum, Trag.

Gallitricum, Dod. gal. Lugd. Cam. Ger.

Sclarea, Matth. Caſt. Cam. Tab. vulgo & Centrum galli, Guil. pap.

Sclarea hortensis, Geſn. ap.

Sclarea Æthiopis, Ang.

Orminum ſativum, Fuch. Tur. Cord. in Dioſc.

Horminum & Orminum minus, Geſn. hort.

Scarſea, Ad. Lob.

Sideritis Heraclea, Frac. cui & Alyſſon Galeni.

Scordium alterum Plinij, Dalech. in Plin.

Orvala, Dod. Caſt.

Horminum ſylv. 1. Cluſ. hiſt.

Horminum hortense, Eyſt.

Matrifalvia major, Col.

Quibuſdam ſcopa regia Plinij, inter Sideritides lib. 25. cap. 5. & Tuſſilago altera, quæ quibuſdam Salvia, Plinij lib. 26. cap. 6. cum qua in multis convenit: alijs Phorbion Galeni: alijs Baccharis Dioſcoridis l. 3. cap. 51. alijs Scordium alterum Plinij l. 25. cap. 6. quibuſdam Ale-trolophos Plinij lib. 27. cap. 5. in cujus deſcriptione ſeminis forma & uſus, cum Sclarea ſemine convenit: alijs Horminum ſativum Dioſcoridis.

### IV. Horminum luteum glutinoſum,

Orvala 3. Dod.

Colus Jovis, Ad. Lob. Cluſ. pan. Lug. Cam. Eyſt.

Melinum, Cæſ.

Galeopsis lutea Dalechampij, Lugd.

Horminum ſylv. 2. Cluſ. hiſt.

Camphorata quibuſdam, quia ſummitas Camphoram redoleat: Sphacelus alijs, quod ejus ſuccus in ulceribus malignis valeat. Stachys Plin. quibuſdam.

V. Horminum ſyl. latifolium verticillatum.

Horminum ſylv. 1. vel ſylv. latifolium alterum, Cluſ. pan.

Horminum ſylv. 3. Eid. hiſt.

VI. Horminum pratense folijs ferratis.

Salvia agrestis, Brunf. flore purpureo, Eyſt.

Salvia ſylv. vera, Trag. ſylv. Geſn. hort.

Horminum ſylv. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in Dioſc. Geſn. hort. Lon. Ad. Lob. Lugd. Camer. majus, Thal.

Horminum ſylv. 2. vel ſylv. 4. flore violaceo, Cluſ. pan.

Hormini quarti ſpecies 1. Eid. hiſt.

Orvalæ ſylv. ſpecies 4. Dod.

Sideritidis Heracleæ ſpecies, Fracaſt.

Gallitricum vulgo, Cæſ.

Sclarea ſylv. Tab.

Colus Jovis, Ger. ico. Eyſt.

Quibuſdam Verbenacæ rectæ genus: alijs Ale-trolophos Plinij.

Hujus differentiæ plures, ſorum colore non nihil differentes: ut flore cæruleo, violaceo, rubicundo: Sic Camerarius abſque ullo flore per æſtatem, ſed hyeme cæruleo, lupuli odore, obſervavit.

VII. Horminum pratense niveum folijs incanis,

Hor-

Horminum sylv. quartum niveo flore, Clus. pan.  
 Hormini sylv. quarti altera species, Clus. hist.  
 Horminum sylv. Ger.  
 Selarea sylv. flore albo, Tab.  
 Salvia agrestis flore albo, Eyf.

VIII. Horminum sylv. majus folijs profundius incisus.

Hormini syl. 4. altera species, vel dilutiore flore, Clus. pan. syl. 4. species 3, Eid. hist.

Pars externa non purpurascit, sed virescit: folia inferiora quasi laciniosa: flos dilutioris coloris, aliquando quasi cinereus. Hoc eriam flore est minore & rubro, quod

Hormini sylv. quarti species 4. Clus. hist.

IX. Horminum sylv. Lavandulæ flore.

Hormini sylv. secundi species 5. Clus. pan. 4. species 5, Eid. hist.

Selarea Hispanica, Tab.

Gallitricum alterum, Ger.

X. Horminum sylv. salvifolium majus, vel maculatum.

Horminum sylv. Matth. Cæs. Cast. Lugd.

Verbascum salvifolium, Lob. ico.

Verbascum nigrum salvifolium, Ad. Lob. ob. Lugd. Orvala altera, Dod.

Hormini sylv. tertij altera species, Clus. pan.

Hormini sylv. quinti altera species, Eid. hist.

XI. Horminum sylv. salvifolium minus.

Horminum sylv. 3. vel Horminum sylv. 5. salvifolio, Clus. pan.

Hormini sylv. quinti species prior, Eid. hist.

Flos ex cæruleo purpurascens & quasi violaceus, interdum colore dilutiore, nonnunquam quasi cineraceo.

XII. Horminum minus supinum.

Horminum sylv. sextum sive minus supinum Creticum, Clus. hist.

XIII. Horminum angustifolium laciniatum: quod 2. est in Prodromo.

Folia inferiora aliquando in profundas lacinias dividuntur: aliquando Scolopendriæ folia referunt.

XIV. Horminum minus album Beticæ facie: quod 3. in Prodromo.

XV. Horminum tenuifolium angustis folijs Erythrodani sylvestris longioribus, Thal. quid?

## V E R B A S C U M.

**V**erbascum  $\phi\lambda\epsilon\mu\theta$  Dioscoridi lib. 4. cap. 104.  $\alpha\phi\lambda\epsilon\omega$  uro, quasi  $\phi\lambda\epsilon\gamma$  flamma, quia hujus pro elychnijs usus est.

Genera summa duo Dioscoridi: album & nigrum: in albi genere mas & scemina: mas folijs albis, oblongis, angustis: scemina folia brassica latiora, candida, flores candidi: aut ex luteo pallescentes. Nigrum folijs est albo latioribus & nigrioribus. Est sylvestre folijs Salvia flore verticillato luteo. Sunt & Phlomisides dua hirsuta, humiles, rotundi folijs. Tertia præter has est quæ Lychnitis & Thryallis: folijs crassius ad lucernarum elychniæ aptis. Et Plinio lib. 25. cap. 10. Verbascum Græci Phlomon, genera habet prima duo: album in quo mas: alterum nigrum in quo scemina, tertium, non nisi in sylvis reperitur, sunt folia brassica latiora pilosa & c. Sylvestri folia Elelyphaci alba, ramis lignosis. Sunt & Phlomisides dua hirsuta, rotundi folijs humiles. Tertia Lychnites vocatur, ab alijs Thryallis folijs ad lucernarum lumina aptis.

I. Verbascum mas latifolium luteum.

Verbascum i. Matth. Cord. in Diosc. Lugd. Cæs.

Verbascum mas, Ang. Ad. Cast. Tab. (Thal.

Verbascum candid. mas, Lac. Lon. album mas,

Verbascum latius, Dod. latifolium mas, Eyf.

Verbascum mas & Candela regia, Lob.

Verbascum aut Phlomos vulgaris mas, Lob.

Thapsus barbatus, Ger.

II. Verbascum mas angustioribus folijs floribus pallidis.

Verbascum secundum, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Verbascum sylv. majus, Lon.

III. Verbascum scemina flore luteo magno.

Verbascum sive candela regia, Trag.

Verbascum nigrum, Fuch. Lon.

Verbascum album scemina luteo flore, Dod. gal.

Lugdun.

Verbascum album mas, Ang.

Verbascum maximum album scemina flore subpallido, Lob. ico.

Verbascum alterum flore aureo, Cæs.

Verbascum luteum, Tab.

Verbascum lychnite minus, Ger.

IV. Verbascum scemina flore albo.

Verbascum sylvestre, Trag.

Verbascum candidum mas, Fuch. Dod. gal. Tur.

Ges. hort.

Verbascum tertium flore candido, Cæs.

Verba-

Verbasum album fœmina, Ang. Lon.

Verbasum angustius, Dod.

Verbasum flore albo, Tab.

Thapsus barbatus maximus odoratus Septentrionalium, Ad. fœmina flore albo, Lob. ico.

Thapsus barbatus flore albo, Ger.

Varietas in folijs observatur, quam notant nomine

Verbasci albi secundi, Tab.

Verbasci albi, Ger.

V. Verbasum Lychnitis flore albo parvo.

Verbasum primum, Brunf.

Verbasum lychnite, Matth. Lac. Tab. Ger.

Verbasum candidum fœmina, Fuch. Gef. hor.

Verbas. album fœmina, albo flor. Dod. gal. Lug.

Verbasum fœmina, Ad. Lob. obs. Lugd.

Verbasum quartum, Cæs. Eyft.

Phlomos mas alter, Lob. ico.

Phlomos lychnitis, Lugd.

Verbasci tertia altera species, Cast.

VI. Verbasum nigrum folio papaveris corniculati: & Cam.

Verbasum aliud, Matth.

Verbasum laciniatum, Lugd.

Verbasum sylv. tertium, Dod.

Verbasum sylv. Salvifolium, fruticosum, lignosum, Ad. ubi legendum Verbasum purpureum Erucæfolium.

Verbasum sylv. Salviflorum laciniatum, Lob. ob.

Verbasum Intubaceum, Tab.

VII. Verbasum nigrum flore ex luteo purpurescente.

Verbas. nigrum, Trag. Dod. Lob. ico. Tab. Ger.

Verbasum tertium, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Verbas. sylv. Fuch. Tur. Gef. hor. sylv. minus, Lon.

Verbasum nigrum Salvifolium purpureo flore, Ad. Lob.

Verbasum nigrum latifolium, Thal.

Blattaria Plinij, seu Verbasum nigrum, Eyft.

Flore variat: alterius ex citrino purpurescit: alterius ex flavo candidus: alibi flore prorsus cado.

VIII. Verbasum folijs subrotundis flore Blattariæ: in Phytopinace & Prodromo describitur.

IX. Verbasum humile Creticum laciniatum.

Arcturus Creticus, Belli ep. r. ad Clus. Ponæ.

Verbasum Brassicæ folio, Col.

Verbasum fruticosum auriculatum, Ponæ Ital.

Variat: nam illud folijs est latorib. capitulis rotundis: est & alterum, longiorib. & angustioribus folijs, capitulis oblongiusculis, & hoc est Arcturi secunda species, Ponæ Ital.

*Verbasum Salvifolium.*

I. Verbasum latis Salviæ folijs.

Verbasum sylv. Matth. Ang. Lac. Gef. hor. Lugd. Clus. hisp. & hist. Cast.

Verbasum sylv. alterum, Dod.

Verbasum sylv. Salvifolium fruticosum lignosum, Ad.

Verbasum salvifol. fruticosum, luteo flor. Lob.

Verbasum sylv. folijs Salviæ, Cam.

Verbasum quartum, Lob. ico. 7. Cæs.

II. Verbasum angustis Salviæ folijs.

Verbasum sylv. Dod. Gef. hor. Lugd. Cæs.

Verbasum sylv. Salvitenuifolium Narbonensium, Ad.

Verbasum sylv. folijs Salviæ tenuifoliæ, Lob.

Phlomis lychnitis, Clus. hisp. & hist. Lugd. duplici figurâ.

Salvia sylv. Monspeliensium, Gef. hor.

Hæc Angarathi aliquibus dicitur.

III. Verbasum acuto salviæ folio.

Phlomis lychnitis altera Syriaca, Lob.

Verbasum sylv. folio Salviæ tenuifoliæ, Lugd.

IV. Verbasum subrotundo Salviæ folio.

Verbasum sylv. Salvifoliū exoticum, Lob. Lug.

Hoc Verbasci cistioidis nomine ex horto clarissimi Contareni habemus.

## B L A T T A R I A.

**B**lattariam Plinius l. 25. c. 9. sic expressit: Est similis Verbasco herba, quæ sæpe fallit pro ea capta, folijs minus candidis, cauliculus pluribus, flore luteo. Hæc abjecta blattas in se contrahit, ideoq; Romæ Blattariam vocant, hæc ille. Hoc Dioscorides l. 4. c. 104. Verbasco sylvestri cui flos est aureus tribuit.

I. Blattaria lutea folio longo laciniato.

Blattaria, Trag. Matt. Ang. Fuch. Dod. Gef. h. (& Verbasci nigri species) Lon. Lug. Cast. Tab. Ger.

Chrysogonom, an potius Blattaria Plinij, Ad.

Blattaria, Lob. Plinij, Eid. ico.

Blattaria flore luteo, Eyft.

Verbasum leptophyllum, Cord. hist.

Verbasum nonum, Cæs.

Duplex est: altera quatuor cubitorum, tria, quatuor, quinque; & plura vascula conjuncta habens: altera humilior, singula vascula profertens, folijs multò vixidioribus.

II. Blat-

II. *Blattaria alba.*

*Blattaria flore albo, Lob. ico. Cam. Eyf.*

*an Verbasum quintum, Cæf.*

*Ad Verbasum lychnitis referri potest. Variat flore parvo, eoq; albo vel viridi, vel viridi purpurascens & magno flore, quare hæc*

*Blattaria altera: illa verò*

*Blattaria flore viridi.*

*Blattaria flore ex viridi purpurascens dicitur, Lobel. icon.*

III. *Blattaria magno flore: & Lob. ico.*IV. *Blattaria purpurea.*

*Blattaria flore purpureo, Gef. hor. Lob. ico. Lug. Cam. Ger.*

*Blattaria phœnicea, Tab.*

*an Verbasum octavum, Cæf.*

*Folijs est nigrioribus non lacinatis, parumque ferratis: flos modo dilute rubet, obsoleto colore purpurascit: quandoq; nigræ violæ colore eleganti nitet,*

## Æ T H I O P I S.

**A** *Æthiopsis Dioscoridi lib. 4. cap. 105. folia Verbasco similia, per quam hirsuta habet, &c. Et Plinio lib. 27. cap. 4. Aethiopsis folia habet Phlomo similia, magna, multa & hirsuta, &c. à loco natali forte nomen habet, quia Plinio l. c. ex Aethiopia eximia venit: hac, inquit lib. 26. cap. 4. clausa omnia tactu aperiri. At lib. 24. cap. 17. Aethiopida in Meroë nascitur, ob id Meroidum appellarunt folio Lactuca, &c. hic sanè aliam quàm Dioscorides intelligit.*

I. *Æthiopsis folijs sinuosis.*

*Æthiopsis, Matth. Ang. Lac. Dod. Gef. hor. Lon.*

*Cæf. Lugd. Cast. Tab. Ger. Eyf.*

*Æthiopsis sive Phlomitris, Ad. Lob.*

*An potius Verbasum lychnites Dioscoridis: cum hujus Æthiopidis vascula, non solum bina*

*semina nec ervi magnitudine contineant, nec radicem viscidam habeat, neque in exsiccata cornu durities sentiat, quæ à Dioscoride suæ tribuuntur.*

*II. Æthiopsis folijs in profundas lacinias divisis: quæ in Prodromo describitur.*

## VERBASCULUM SEU PRIMULA VERIS.

**P** *Primula veris, quod primo Vere floreat, Dioscoridis lib. 4. cap. 104. φλωίδες & Plinij lib. 25. cap. 10. Phlomidæ censentur. Alijs verò Plinij lib. 25. cap. 4. & lib. 26. cap. 11. Dodecatheon, cui sunt folia septem, Lactucis similima, à lutea radice exeuntia. Verum apud Plinium lib. 25. cap. 10. alterum genus Alismatis in sylvis, nigrius, majoribus folijs, videtur.*

*Verbasculum flore simplici.*

I. *Verbasculum pratense odoratum.*

*Herba Paralyfis, Brunf. Cast. desc.*

*Herba Paralyfis vulgaris, Trag. altera, Cæf.*

*Dodecantheon, Ang.*

*Primula veris, Matth. Lugd. Taber. hortensis, Thallio.*

*Primula veris major fl. luteis odoratis, Dod.*

*Primula pratensis, odora lutea, Ad. Ger.*

*Primula veris flore luteo, Eyf.*

*Primula pratensis, Lob.*

*Primula veris flavo flore elatior, Clus. hist.*

*Verbasculum odoratum, Fuch. Dod. gal.*

*Arthritica, Gef. hor. simplex luteo flore, Cam.*

*Alisma pratorum, Col.*

II. *Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum.*

*Herba Paralyfis alba, Brunf. sylv. Trag.*

*Primula veris altera, Matth. Lugd.*

*Verbasculum non odoratum, Fuch.*

*Verbasculum album, Dod. gal.*

*Primula veris maj. (fl. albidis inodor.) Dod. Ger.*

*Primula pratensis pallida, Ad.*

*Primula pratensis inodora luteopallida, Lob.*

*Primula veris, Paralyfis sylv. Thal.*

*Primula sylv. tertia, Tab.*

*Primula veris pallido flore elatior, Clus. hist.*

III. *Verbasculum sylv. majus singulari flore.*

*Verbasculum minus, Dod. gal.*

*Primula veris minor, Eid. Lugd. Ger.*

*Primula sylvarum, Ad. Lob. Lugd.*

*Arthriticæ species flore singulari, Gef. hor.*

*Herba Paralyfis, Cæf.*

*Primula veris pallido flore humilis, Clus. hist.*

*Alisma sylvarum, Col.*

*Primula sylv. secunda, Tab.*

*Primula veris sylv. flore pallido, Eyf.*

*Arthritica caule exiguo vel nullo, Cam.*

*Flore est pallido, reperitur etiam niveo, quæ Sylvarum primula alba, Ad.*

IV. *Primula veris montana incana lutea.*

*Paralytica rotundifolia montana, Col.*



*Verbasculum flore multiplici.*I. *Verbasculum hortenſe multiplex.*

Arthriticæ genus daſypodium, ſive denſifolium, Gefn. hort.

Arthritica pleno flore, Cam.

Primula hortenſis Anglica flore pleno, Ad. Lob. Lugd. Ger.

Primulæ veris flos multiplex, Dod. multiflora, Tab.

Primula veris Anglicana flore pleno, Eyſt.

II. *Verbasculum ſylv. magno plenoq; flore.*

Primula veris ſylvarum flore pleno ſpecioſo, Ad. Lob. ico. Eyſt.

Primula veris ſylvarum flore multiplici, Lugd.

Primula veris multiflora ſylv. Tab. veris flore pleno, Ger.

III. *Verbasculum ſyl. minus ſingulari flore.*

Primula ſylvarum flore obſcurè virentibus ſimbratis, Ad. Lob. Lugd.

Primulæ veris minoris altera ſpecies, Dod.

Primula ſylv. flore viridi, Tab. Ger.

IV. *Verbasculum proliferum.*

Primula veris flore gemino altero alteri innato, Lob. Lugd.

Primula veris prolifera, Tab.

Primula veris flore geminato, Ger. Eyſt.

*Verbasculum alpinum.*

I. *Verbasculum umbellatum alpinum minus.*

Majele, Cord. obſ.

Gerchenblümlein/ Gefnero, monente, Cam.

Verbasculus alpinus ſive cæruleus, Lugd.

Sanicula alpina minor ſive media, Lob. Lugd.

Primula veris flore rubro, Cluſ. pan. & hiſt. Ger.

Arthritica flore purpureo, Cam.

Primula alpina media, Tab.

Primula veris anguſtifolia rubra & alba, Eyſt.

Flore eſt ſubcæruleo, aut carnei coloris, aut dilutiore purpurâ nitente, interdum ſaturatius rubente: raro candido & exalbido, omnes tamen circa umbelicum luteoli ſunt.

II. *Verbasculum alpinum umbellatum majus.*

Sanderlin/ Simlero de alpibus.

Paralitica alpina, Sanicula anguſtifolia major, Lub. Lugd.

Primula veris albo flore, Cluſ. pan. & hiſt. Ger.

Primula alpina anguſtifolia, Tab.

Variat floris colore: eſt albo: rubro: rubore & candore conuſo.

## SANICULA ALPINA VEL AURICULA URSI.

**S**anicula à ſanandis vulneribus: Auricula Urfi à forma foliorum dicitur: an ἄλισμα ſive Δαμασόνιον folijs Plantaginis ſed anguſtioribus. & in terram convexis, &c. Dioſcoridis l. 3. c. 169. Et Plinij l. 25. c. 10. Alisma ſive Damafonion folijs Plantaginis, ſed anguſtioribus, maguſq; lacrimioſis, convexiq; in terram, &c.

*Sanicula alpina folijs ſerratis.*I. *Sanicula alpina lutea.*

Sanicula ſive Auricula Urfi, Matth.

Arthriticæ genus alpinum, & Sanicula alpina, Gefn. hort.

Lunaria arthritica, Eid. de lun. & fraſto.

Auricula urſi, Dod. Caſt.

Auricula urſi prima vel luteo flore, Cluſ. pan. & hiſt. Ger.

Paralytica alpina, Sanicula ſive auricula urſi, Lob. flore luteo, Ad.

Auricula urſi ſeu lupi, Cæſ.

Primula veris pachyphyllos, Lugd.

Auricula urſi floribus luteis, Cam. Tab. Eyſt.

Alisma ſive Damafonium Dioſcoridis, Col.

Variat folijs & floribus: folijs lævibus & viridibus, interdum incanis vel caneſcentib. denſioribus, tenuioribus: majorib. & minoribus: floribus pallidis, luteis, aureis, rariſimè candidis vel cæruleis, iſſq; modò majorib. modò minoribus, modò denis, vicanis, tricanis, hinc

Auricula urſi floribus pallidis & candidis.

Auricula urſi floribus luteis.

Auricula urſi floribus aureis & cæruleis, Tab.

II. *Sanicula alpina purpurea.*

Britannica, Ang.

Arthriticæ ſpecies flore purpureo, Gef. hor.

Paralytica alpina, Sanicula flore purpureo, Ad.

Auricula urſi, Caſtor. icon. flore purpureo, Lobel. icon.

Auricula urſi ſuaverubens, Ger.

Auricula urſi 2. Cluſ. pan. & hiſt.

Primula alpina latifolia, Tab.

Sanicula alpina rubra, Eid.

Flore eſt purpureſcente, rubeſcente ſanguinis modo, & atro colore.

III. *Sanicula alpina folijs rotundis.*

Auricula urſi quinta, Cluſ. hiſt.

Hæc etiam minoribus folijs reperitur, quæ

Auriculæ urſi quintæ ſimilis, Cluſ. ap. alt. auct.

IV. *Sanicula alpina flore variegato.*

Auricula urſi tertia, Cluſ. pan. & hiſt.

Auricula urfi floribus guttatis, Tab.

Floribus est rubris, albis maculis aspersis.

V. Sanicula alpina angustifolia.

Auricula urfi 5. Clus. pan. 7. in histor. at 8. in cur. post.

Auricula urfi 8. Tab. flore purpureo, Ger. Eyft.

Flores dilute rubent: huic similis brevioribus tamen folijs, cujus Clus. in cur. post. meminit.

VI. Sanicula alpina folijs quasi farinâ asper-

Auricula urfi 7. Clus. cur. post. (fis.

Flores exalbidî carneo colore perfusi.

VII. Sanicula alpina minima carnea.

Arthritica cæruleis flosculis, Gefn. hort.

Sanicula alpina minima, Lob. Lugd. Tab.

Auricula urfi 6. Clus. pan. 8. Eid. hist. 10. cur. post.

Auricula minima, Ger.

VIII. Sanicula alpina minima nivea.

Auricula urfi minima flore niveo, Clus. pan. & hist. Tab. Ger.

an Auricula urfi flore albo, Eyft.

Folia pallescunt & flos omnino niveus, cum illius viridia folia & flos dilute rubens sive carneus.

IX. Sanicula alpina folijs borraginis villosa.

Auricula urfi Myconi, Lugd.

Auricula urfi ex Pyrenæis, Clus. hist. ap. alt. auct.

Auricula urfi 9. Eid. cur. post.

*Sanicula folijs non serratis.*

I. Sanicula alpina rubescens, folio non serrata.

Auricula urfi 4. Clus. pan. & hist. 7. Tab. (to.

Auricula urfi rubescens, Ger.

II. Sanicula alpina alba folijs non crenatis.

Auricula urfi 6. Clus. hist.

Similis flore pallido, quæ

Auricula urfi pallido flore, Clus. cur. post.

III. Sanicula alpina minima pilosa: quæ pro 2. in Prodomo descripta.

*Sanicula rotundifolia.*

I. Sanicula montana latifolia laciniata.

Cortusa, Matth. Cast. Lugd. Cam.

Caryophyllata Veronensium fl. Saniculæ urfinæ, Ad. Lob.

Sanicula montana, Clus. hist. altera, Eid. pan.

Sanicula alpina, Tab. Ger.

Duplex figura apud Clusium, Tab. & Ger.

1. Sanicula montana, Clus. hist.

Sanicula alpina Clusij, Tab. Ger.

2. Cortusa Matthioli, Clus. hist. & cur. post.

Saniculæ alpinæ icon verior, Tab.

Cortusæ rarior icon, Ger.

In figura Saniculæ Clusij malè averfa parte puncta aspersa sunt.

Flore est eleganter rubro, & ad purpureum tendente: habetur & violaceis, rarius albis floribus.

II. Sanicula montana rotundifolia major.

Sanicula alpina alia, Gefn. hort.

Caryophyllata, sive Geum alpinum recentiorum folio hederaceo, Ad. Lob. ico. Lugd.

Sanicula montana 1. Clus. pan. altera, Eid. hist. Eyftett.

Sanicula alpina, Cam. ep. guttata, Eid. hort.

Coryledon; Dalechampii, Lugd.

III. Sanicula montana rotundifolia minor.

Sanicula montana minor, Clus. pan.

Saniculæ montanæ alterius species 2. Eid. hist.

IV. Sanicula montana longifolia serrata.

V. Sanicula montana flore calcari donato.

Pinguicula (vel Liparis) Gefn. Cl. pan. & bat.

Cucullata, quibusdam Criâs Apuleij, Lugd.

Pinguicula vel *ἰόνργον*, Viola humida aut palustris: Dodecatheon Plinij, Gefnero, Cam.

Variat floris colore, qui albus, purpureus & cæruleus.

## D I G I T A L I S.

**D**igitalis, quod flores digitale referant, nomen habet. Sunt qui ad Verbascum, alij ad Alismatis genus alterum Plinij referant. At Doctiss. Fabius Columna, Ephemeram Dioscoridis lib. 4. cap. 85. censet.

*Digitalis folio Verbasci.*

I. Digitalis purpurea folio aspero.

Campanula sylv. Trag.

Digitalis rubra, Dod. gal. purpurea, Fuch. Ang.

Gefn. hort. & ap. Lon. Dod. Ad. Lob. Lugd. Cam.

Tab. Ger.

Aralda Bononiensibus, Gefn. hort.

Verbascum digitale, Costæo.

Virga regia major flore purpureo, Cæs.

Ephemeris alia species major, Col.

Flos purpureus, nigris punctulis insignitus, ruber, incarnatus, sive ex purpureo candidus, intus punctatus: aliquando flores in rotundam spicam in gyrum coli effigie in summo dispositi rufescunt ex luteo, intus guttis purpureis asperis, hinc

Digitalis flore rubro, & flore incarnato, Eyst.

II. Digitalis alba folio aspero.

Digitalis 2. Dod. alba, Lob. Lugd. Eyst.

Virga regia major flore pallido, Cæf.

Ephemer altera species major candida, Col.

Flos nivei candoris, intus nigris punctis intercurfantibus.

*Digitalis folio virecente.*

I. Digitalis lutea magno flore.

Campanula sylv. flore luteo, Trag.

Digitalis lutea, Fuch. Anguil. Lon. Thal. Lugd.

Cam Tab. Ger. flore luteo, Eyst.

Digitalis minor, Gef. hor. flore minore, Eid. col.

Digitalis lutea flore amplo, Ponæ.

Digitalis 3. Dod.

Calathiana viola Plinij, Dalech. in Plin.

Ephemeron Dioscoridis, Col.

Flore est luteo pallido, rarissimè albo : & intus vario.

II. Digitalis major lutea vel pallida, parvo

Digitalis major, Gef. hor. 4. Dod. (flore.

Digitalis flore minore albidior, Gefn. col.

Digitalis lutea, Ad. parva, Lob. ico. sub ramo minore exprimitur.

Virga regia : Alisma & Damasonium Dioscoridis, & Fistula pastoris Avicennæ, Cæf.

III. Digitalis minor luteo parvo flore : in Prodromo descripta.

IV. Digitalis angustifolia lutea.

Digitalis lutea parva, Lob. ico.

V. Digitalis angustifolia flore ferrugineo.

Digitalis gilvo flore, alias ferrugineo, Lob.

## E P H E M E R O N.

**C**um doctissimus Fabius Columna, Digitalem censeat esse Ephemeron Dioscoridis. pauca aspergamus. *Εφύμερον* sive *ἱερὸν ἀγρίον* caulem & folia lilij habet sed hac tenuiora : flores candidos, amaros, semen molle, radicem unam digitali crassitudine, longam astringentem, odoratam, &c. Diosc. l. 4. c. 85. Ephemeron folia habet lilij, sed minora, caulem parem, florem caeruleum, semen siccum, radicem unam digitali crassitudine, Plinio l. 25. c. 13. Subjiciamus & Matthioli & Lobelij Ephemeron utrumque nolis incognitum.

I. Ephemerum quod aliqui sylvestrem Irin appellant, Matth. Lacunæ, Cast. desc.

Ephemerum non lethale Matthioli, Lug. Tab.

Ephemerum Matthioli, ex spurijis appositis plantis esse videtur, Colum.

II. Ephemerum Matthioli, vel potius

Ephemerum spurium, Lob. Dod.

Has duas easdem esse vix credimus : cum illi folia lilij & radix unica digitalis crassitudine tribuatur : huic verò folia & radix Isatidis adscribatur : imò figurarum nulla est similitudo : & Lobelij potius *Lyfimachiam* aliquam referat.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER SEPTIMVS.

## SECTIO PRIMA.

LYSIMACHIA; VERONICA; TEUCRIUM; SCORDIUM;  
CHAMÆDRYS; CHAMÆPYTIS; ALSINE; SPERGULA;  
ANAGALLIS; ELATINE.

## LYSIMACHIA.

**Λ**υσιμάχιον ἢ λυθρον Dioscoridi l. 4. c. 3. caules emittit cubitales fruticosos, folia salignis similia, flos flavus aureusve, &c. Sic dicta à Rege *Lyfimacho* Agathocli filio, ejus inventore : folia habet Salicis viridia, florem purpureum (aureum habet vetus) fruticosa, &c. Plinius l. 25. c. 7. addit tantam ei vim esse, ut jumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Unde videtur innuere, τὰ ἀπὸ τῆς μάχης λυθὲν dictam esse. *Salicaria* etiam, à foliorum cum salicis folijs similitudine vocatur. Hujus species est filiquosa, quæ à filiquato sæpe præcoci, qui auctu & incremento florum eruptioni antevertit, quasi proles parente prior, Filius ante patrem vocatur.

*Lyfima-*

*Lyfimachia lutea.*

I. *Lyfimachia lutea* major: quæ Dioscoridis. *Cenraurium majus* quibusdam, *Hermol. Mar- nard. Ruel.*

*Lyfimachia lutea*, *Trag. Fuch. Tur. Ang. Adv. Lob. Cæf. Tab. Cam. Ger. Eyft. lutea communis*, *Cluf. hift.*

*Lyfimachia*, *Matth. Lac. Lugd. r. Lon.*

*Lyfimachia vera*, *Cord. in Diosc. falsa, Cæf.*

*Lyfimachium verum*, *Dod. gal. legitimum, Eid.*

*Lyfimachium luteum*, *Gefn. hort. Thal.*

*Salicaria*, *Gefn. hort.*

Folijs nunc ternis, nunc quaternis, nunc binis reperitur.

II. *Lyfimachia lutea minor*, folijs nigris punctis notatis.

*Lyfimachia lutea* in alis foliorum florens, *Cæf.*

*Lyfimachia lutea altera*, *Cluf. pan. & hift.*

*Lyfimachia flore luteo* majore, *Cam.*

*Lyfimachia lutea Pannonica* major, *Eyft.*

Folijs est quaternis, etiam ternis.

III. *Lyfimachia trifolia lutea* spicata.

*Lyfimachia lutea altera* ~~spicata~~, *Col.*

IV. *Lyfimachia bifolia* flore globofo luteo.

*Lyfimachia lutea altera*, *Lob. Cluf. hift.*

*Lyfimachium aquatile*, *Dod. belg.*

Addit *Clufius* *Lyfimachiam luteam* 3. sive minorem, quæ à priore solum radice & caule, quæ melius exprimuntur, differt.

V. *Lyfimachia lutea corniculata.*

*Lyfimachia Virginæ* nomine ipsum semen *Paravio* missum quod anno 1619. in horto eleganter crevit & ex semine deciduo se facile habetenus propagavit.

*Lyfimachia filiquosa.*

I. *Lyfimachia filiquosa* hirsuta magno flore.

*Lyfimachia* seu *Salicaria altera*, *Trag.*

*Lyfimachia purpurea*, *Fuch.* (Tur.

*Lyfimachia purpurea* primum genus, *Eid. ico.*

*Lyfimachium purpureum* 1. *Dod. gal. Lugd.*

*Antoniana* major hirsuta, *Gefn. hort.*

*Epilobij* 4. species, *Gefn. ad Cord.*

*Lyfimachia filiquosa*, *Ger. 1. Tab.*

*Lyfimachia* 2. & 3. fl. purpureo vel rubro, *Lon.*

*Lyfimachij* majoris purpurei 1. species, *Thal.*

*Onagra campestris* hirsuta, *Cæf.*

Flore est majore violaceo, purpureo.

II. *Lyfimachia filiquosa* hirsuta parvo flore.

*Lyfimachia filiquosa* 2. *Tab.*

Major est & minor, utraq; in *Prod. descripta.*

III. *Lyfimachia filiquosa glabra* major.

*S. Antonij herba* 3. *Gef. ad Cord. cui & filius ante patrem.* (hif.

*Lyfimachia filiquosa*, *Ad. Lob. Cæf. major, Cl.*

*Pseudolyfimachium purpureum* 1. *Dod.*

*Onagra* genus alterum, *Cæf.*

*Lyfimachia filiquosa* flore albo, *Tab.*

*Lyfimachia campestris*, *Ger.*

*Lyfimachij* majoris purpurei 2. species, *Thal.*

Flore est parvo pallide rubente, rarius albo: quibusdam *Delphinium Dioscoridis* censetur.

IV. *Lyfimachia filiquosa glabra* minor.

*Filius ante patrem* minor, *Gefn. col.*

*Lyfimachia filiquosa* varietas, *Ad.*

*Lyfimachia* medium genus, *Thal.*

*Lyfimachia minor*, & 3. *Tab.*

Flosculi rubicundiores: alij ex rubicundo pallidiores: alij prorsus candidi.

V. *Lyfimachia filiquosa glabra angustifolia.*

*Lyfimachia media* altera species, *Thal.*

*Lyfimachia filiquosa* minor, & 7. *Tab.*

*Chamænerion*, *Ger. ico.*

VI. *Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia.*

*Antoniana*, sive *S. Antonij herba* maxima, *Gef. hort. ap.*

*Chamænerion & Epilobion*, *Gefn. ad Cord.*

*Eyft. Thal. cui &*

*Lyfimachia omnium* maxima.

*Filius ante patrem* maximus, *Gefn. col.*

*Onagra*, *Lugd. Cæf.*

*Lyfimachia vulgo* altera, *Cam.*

Sub *Chamædaphne* malè in *Matth. meo* *Typographi* errore posita, cum ad *Onagra* caput p. 816. reponi debuisset, ut ex synonymijs, quilibet tantillū in plantis versatus colligere potest.

*Onagra Dioscoridis* 1. 4. c. 118. & *Oenothera Plinij* 1. 26. c. 11. & 14. censetur: flore est cæruleo, rarius albo, ut & subsequens. (Rifolia.

VII. *Lyfimachia Chamænerion dicta angu-*

*Epilobium* (id est *λυσιμαχίς* *viola* super filiquā) sextum, *Gefn. ad Cord.*

*Pseudolyfimachium purpureum* minus, *Dod.*

*Lyfimachia filiquosa* varietas altera, *Ad.*

*Chamænerion Gesneri*, seu *Delphinium buccinum*, *Diosc. Lob.*

*Lyfimachia filiquosa* alia, *Lugd. 3. Cluf. hift.*

*Lyfimachia* species in uliginosis, *Thal.*

*Linaria rubra*, *Lugd.*

VIII. *Lyfimachia Chamænerion dicta alpina*: quæ in *Prodromo* describitur.

*Lyfimachia spicata.*

I. *Lyfimachia spicata purpurea*, fortè Plinij.  
*Solidaginis Sarracenica* alia species, Trag.  
*Lyfimachia altera*, Matth. Læc. Lugd. Cast. Eyft.  
*Lyfimachium purpureum*, Gefn. hort. Thal.  
*Lyfimachium purpureum alterum*, Dod. gal.  
*Lyfimachia* 3, Tur.  
*Lyfimachia* fortè Pliniana, Ad.  
*Lyfimachia purpurea*, Lob. Cæf. Cam. Tab.  
*Lyfimachia flore purpurafcente*, Ang.  
*Pseudolyfimachium purpureum alterum*, Dod.  
*Lyfimachia purpurea communis major*, Cluf. hiftor.

*Lyfimachia purpurea spicata*, Ger.

Folia bina communiter, aliquando ternaria rarius quaterna, simul caulem ambiunt.

II. *Lyfimachia spicata cærulea*.  
*Lyfimachium cæruleum*, Dod. gal.  
*Lyfimachij* 3, genus, Dod. Gefn. hort.  
*Pseudolyfimachium cæruleum*, Dod.  
*Lyfimachia cærulea hortensis*, Ad. Lob. Lugd.  
*Lyfimachia cæruleo flore*, Cluf. hift.  
*Veronica recta cærulea*, Eyft.

*Lyfimachia non spicata.*

I. *Lyfimachia rubra non filiquofa*.  
*Lyfimachia* 2. vel minor rubro flore, Cluf. pan.  
*Lyfimachia purpurea* 2. five minor, Eid. hift.  
 II. *Lyfimachia linifolia purpurocærulea*.  
*Lyfimachia rubra minima*, Cluf. hift.  
 III. *Lyfimachia cærulea galericulata*, vel  
*Gratiola cærulea*.  
*Lyfimachia galericulata*, Lob. Lugd. Cluf. hift.  
*Lyfimachia flore cæruleo galericulato*, Cam.  
*Sideritis cærulea*, Thal.  
*Gratia Dei*, Cæf.  
*Tertianaria*, Tab.

*Herba Judaica altera*, Dod. belg.

Hæc in Anglia flore albo quoque reperitur.

## E X O T I C A.

I. *Poutiou ex Malacca ad febres abigendas*:  
 par. 4. Ind. Orient. 8.  
 II. *Sary flos seu pollen*, quo corpus inungentes contra ventorum vim se tutos afferunt, l.c.  
 III. *Sodouvaya in Java oblinendo corpori idonea*, l.c.  
 IV. *Surahan*, vili pretio venditur, l.c.

## V E R O N I C A.

**V**eronica, apud recentiores herba est celebratissima, Græcis & Latinis scriptoribus fortè incognita, quàmvis Dodonæus velit esse *Betonica* Pauli lib. 7. *Casalpinus* verò ad *Myosotidem Dioscoridis* lib. 2. cap. 214. at *Columna* ad *Alysson Dioscoridis* lib. 3. cap. 105. referendam censet. Germanis *Ehrenpreis* & *Grundheil*/ ob mirificam facultatem ulcera ac vulnera sanandi.

I. *Veronica mas erecta.*

*Veronica mas*, Matth. Ang. Lugd. Cast.  
*Veronica assurgens*, Dod.  
*Veronica recta mas*, Lob. vulgaris recta, Cluf. hift.

Duplex est: major & minor: illa latiore folio & longiore spica: hæc angustiore folio & brevior spica.

II. *Veronica mas supina & vulgarissima.*

*Teucrium*, Trag.  
*Veronica mas*, Fuch. Lon. Lugd. Thal.  
*Veronica mas serpens*, Dod.  
*Betonica Pauli*, Dod. gal.  
*Veronica vulgo dicta*, Gefn. hort.  
*Veronica vera & major*, Ad.  
*Veronica major septentrionalium*, Lob.  
*Veronica*, Tab. vera & major, Lob. ico. Cam. Ger.  
*Veronica vulgaris supina*, Cluf. hift.

*Veronica humicaulis & supina*, Col.

*Auricula muris* 3, Cæf.

Floribus est subcæruleis, rarius candidis, reperitur nonnunquam folijs vulgaræ forma quidem similibus, sed triplo minoribus.

III. *Veronica spicata latifolia.*

*Veronica prima*, vel major latifolia, Cluf. pan.  
*Veronica erectior latifolia*, Eid. hift.

Alia est folijs atrovirentibus & splendentibus: in altera nec splendent, nec adeò atra sunt: spica etiam in alia oblongior.

IV. *Veronica spicata angustifolia.*

*Veronica recta herbariorum*, Lob. Lugd.  
*Veronica recta vulgaris major*, Cluf. hift.  
*Auricula muris* 4, Cæf.

*Veronica recta* 1. & 2. Tab. assurgens, Ger.

*Veronica spicata cærulea*, Cam.

Variat folijs latioribus & paulò angustioribus: spica flosculorum cæruleorum, & spica dilutior. Addit

Addit Clusius in hist. alterius figuram, quam à priore non distinguo, nomine  
Veronicæ secundæ erectioris angustifoliæ.

V. Veronica spicata minor.  
Veronica recta minima, Lobel. Lugdun. Ger. Clus. hist.

Veronica recta minor, Clus. pan. Tab.  
Flore est cæruleo, rarius albo.

VI. Veronica pratensis sepillifolia.  
Eufragia, & Eufragia nobilis, Brunf.  
Teucium alterum, Trag.  
Veronica fœmina, Dod. gal. Lugd. Thal.  
Betonica Pauli, Turn. Gesn. hort. quorundam, Camer.  
Veronica pratensis, Dod.

Veronica minor serpillifolia, Ad. Lob.

Auricula muris prima in pratis, Cæs.

Folijs est communiter integris, rarissimè cre-  
natis: floribus cæruleis, frequentius pallidis  
& dilutis: hinc

Veronica minor, Tab. Ger.

Veronica minor fœmina flore candido, Taber-  
næmont. sub

Veronica mare, apud Ger.

VII. Veronica alpina frutescens.  
Veronica tertia fruticans, Clus. pan. & hist.

Veronica alpina serpillifolia, Ponæ.

VIII. Veronica alpina bellidis folio hirsu-  
ta, in Prodr. descripta: quæ duplex est major  
& minor.

## T E U C R I U M.

**T** *Εύκλειος* Dioscoridi l. 3. c. 111. (cò quod *Teucer* ejus inventor existimetur, Plinio l. 25. c. 5. auctore) & *Χα-  
μαίριος* ex aliorum sententia, Plinio l. c. & l. 26. c. 8. *Teucrium*.

## I. Teucrium.

Teucrium secundum, Marth. Lugd. 1. Tab.  
Teucrium, Fuch. Ang. Dod. gal. Cord. in Diosc.  
Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Cast. verum, Gesner.  
hort. Eyf.

Chamædris altera seu assurgens, Dod.  
Teucrium vulgare fruticans, sive 1. Clus. hist.  
Teucrium latifolium, Ger.

## II. Teucrium folijs Scorodonix.

Teucrium verum, Cam.

## III. Teucrium Creticum incanum.

Teucrium Creticum, Clus. hist.

## IV. Teucrium peregrinum folio sinuoso.

an Pæderota, Pausania?

Teucrium Boeticum, Clus. hisp. Lugd. Tab. Ger.

Teucrium fruticans Boeticum, Clus. hist.

Camerarius, Teucrij Boetici, quod à Clusij  
diversum sit & Teucrij Belgici, solo nomine me-  
minit: sed quid utrumq;?

V. Teucrium alpinum inodorum magno  
flore: in Prodr. descriptum.

VI. Teucrium alpinum coma purpureocæ-  
rulea.

Clinopodium alpinum, Ponæ.

VII. Teucrio affinis, Chamærops.

Chamærops, Plinio l. 26. c. 7. Lugd.

## S C O R D I U M.

**Σ** *Κέρδιον* Dioscoridi l. 3. c. 125. quod *Alium* aliquantum redolcat: at Galenus 8. simpl. propter acrimoniam  
Scorodo, id est. *Allo* ad similem, nomen sortitum putat: quibusdam, *Crater* à auctore, *μυελόειον*, ab in-  
ventore dicitur: Plinio l. 25. c. 6. *Scorodotis* sive *Scordion*.

Genera: Græci minus meminere: at Plinius l. c. duplex habet: alterum folijs lanuginosis, quæna similitu-  
dine. Est & alterius generis latioribus folijs mentastro similibus, & c.

## I. Scordium.

Scordium, Trag. Matth. Dodon. Lac. Tur. Lon.  
Ad. (cui & *Trixago palustris*) Lob. Cast. Lugd.  
Cam. Eyf.

Scordium verum, Ges. hort.

Scordium commune, Ang.

Scordium, Tab. minus, Ger.

Magnitudine variat: hinc figuræ tres apud  
Tabernæmontanum,

Scordij majoris & medij nomine.

Scordium majus & minus, Ger.

## II. Scordium lanuginosum.

Scordium Creticum lanuginosum, Cam.

III. Scordium alterum, sive *Salvia sylve-  
stris*.

*Salvia* sylv. Trag. (& *Nepeta altera*) Lon. Tab.

*Sphacelus* sylv. Dod. gal.

*Scorodonia*, Cord. in hist. Thal. Ger.

*Salvia*

Salvia montana & Ambrosia quibusdam, Gesner. hort.

Scordium majus Plinij, Eid.

Scordium alterum Plinij, Ad Lob. Cam.

Salvia agrestis sive Sphacelus, Dod. Lugd.

Melinum alterum brevius, Cæs.

Scordium 2. folijs amplis instar Melissæ, vel

Calaminthæ primæ, in Samnitibus ad ripas Pi-

scaræ nasci, Anguillara scribit: idemq; in Græ-

cia reperiri, quod odore & qualitate à primo dissimile non sit.

IV. Scordium alterum lanuginosius verticillatum.

Scordotis Plinij, Hon. Belli, epistola quinta ad Cluf.

Scordotis legitimum Plinij, Ponæ.

V. Scordio affinis, Elephas ob florem.

Elephas Campoclarensum, Col.

## C H A M Æ D R Y S.

**X** *Ἀμείδις* Dioscoridi l. 3. c. 112. quasi humilis quercus, quod folia Quercus habeat, & hujus respectu quasi humi repat: cui & χαμείδις: & quibusdam τόνειον, propter similitudinem cum Teucrio. Trissaginem Gaza vertit apud Theoph. 9. hist. 10. Sic Plinio l. 24. cap. 15. Chamædrys quæ latine Trissago, quam aliqui Chamædropem alij Teucrion appellavere. Sic alijs Serrata, à folijs serratis, à qua serram inventam dicere, & Quercula minor.

Unius solum apud Dioscoridem & veteres mentio fit.

I. Chamædrys arborea Ægyptiaca.

Chamædrys arborea in Insula Cocyræ, Alp.

Ad cubitos duos exurgit, folijs duplo aut triplo, quàm in Italica majoribus.

II. Chamædrys major repens.

Trissago, seu Chamædrys, Matth. Lugd.

Trissago, Lac. Trixago, Cast.

Chamædrys, Ang. Ad. Lob. Cæs. major primus, Cluf. pan.

Chamædrys major repens, Dod.

Chamædrys mas, Cam.

Chamædrys major 1. & 2. Tab.

Chamædrys major, & Chamædr. latifolia, Ger.

Folio majore & minore variat: floribus item albis ac rubellis in eadem planta.

III. Chamædrys minor repens.

Chamæpitys, Brunf.

Chamædrys, Dod. gal. Cord. hist. Gesn. hor. Tabern. Eyf.

Chamædrys vera, Trag. Tur. Cord. in Diosc.

Chamædrys vera mas, Fuch.

Chamædrys vulgaris mas, Lon.

Chamædrys major, Lob. ico. Lugd. minor, Ger.

Chamædrys repens minor, Dod.

Chamædrys major, vel 2. Cluf. pan.

Chamædrys vulgaris, vel 2. Eid. hist.

Flore est purpurascens, rarius niveo.

IV. Chamædrys spinosa: in Phytop. Matthiolo & Prodomo descripta.

V. Chamædrys alpina Cisti flore.

Cervaria, Gesn. hort.

Herba cervi quibusdam, Eid. fracto.

Chamædrys montana frutescens durior, Ad. Lobel.

Chamædrys 3. sive montana, Cluf. pan. & hist.

Chamædrys montana, Lugd. Tab.

Chamædrys alpina Simleri, Cam.

Argentina Mompelliaca, Tab.

Teucrium alpinum Cisti flore, Ger.

VI. Chamædrys alpina saxatilis.

Teucrium 3. Cluf. pan. 6. pumilum, Eid. hist.

Veronica petræa sempervirens, Ponæ.

VII. Chamædrys alpina minima hirsuta, quarto loco in Prodomo descripta.

an Teucrium minimum, Cluf. hist.

VIII. Chamædrys unicaulis spicata.

Trixago Apula unicaulis, Col. cui fortè

Verbena recta Dioscoridis.

IX. Chamædrys Austriaca folijs tenuissimè laciniatis: quæ 2. in Prodomo.

X. Chamædrys Hispanica folijs tenuissimè divis: 3. in Prodomo.

XI. Chamædrys spuria major latifolia.

Veronica maxima, Lugd.

an Chamædrys mas altera, Cam.

XII. Chamædrys spuria major altera, sive frutescens.

Teucrium 1. vel Teucrium majus pannonicum latifolium, Cluf. pan. at in hist.

Teucrium quartum.

Hujus duæ species: altera virgis erectis caulibus quadrangulis, nonnunquam rotundis, magis minusq; hirsutis lignescens, & ex una ala communiter cauliculis 4. prodeuntibus folijs latiori-



coloribus: altera virgis humi diffusis, frequentibus, ut interdum magnos cespites late tegant, folijs minoribus & flore dilutiore: & hæc est Teucrij quarti species secunda, Clus. hist.

XIII. Chamædrys spuria hederacea repens, sive Scutellata repens.

Chamædrys hederacea, in Cat. Altorff.

XIV. Chamædrys spuria major angustifolia.

Chamædrys altera, Trag.

Teucrium primum, Matth. Lugd. 2. Tab.

Chamædrys vulgaris mas, Fuch. Tur. Lugd.

Hierobotane fœmina, Dod. gal. Lugd.

Pseudochamædrys, Ges. hort.

Chamædrys sylv. Dod.

Veronica supina facie Teucrij pratensis, Lob. ic.

Auricula muris quinta, Cæs.

Teucrij quarti species tertia, Clus. hist.

XV. Chamædrys spuria minor rotundifolia.

Chamædrys, Brunf. falsa, aliquibus Teucrium, Ges. hort.

Chamædrys vulgaris fœmina, Fuch. Tur. Lon. Lugdun.

Hierobotane mas, vel Verbenaca supina mas, Dodon. gal. Lugd.

Teucrij species quam Chamædryn vocant, Cord. in Diosc.

Teucrium pratense, Ad. Lob. & Teucrium spurium Chamædryoides, Lob. ico.

Pseudochamædrys, Thal.

Auricula muris sexta, Cæs.

Teucrium tertium minus, Tab.

Chamædrys sylv. Ger. Clus. hist.

Alia caulibus altioribus, folijs rotundioribus, amplioribus, flore cæruleo: alia folio rotundiore, sed minore, hispidiore, dentato.

XVI. Chamædrys spuria minor latifolia.

Teucrium secundum, vel Teucrium pannonicum minus, Clus. pan. at. 5. Eid. hist.

Teucrium pannonicum, Tab. Ger.

Flos aut cærulei saturati coloris aut dilutioris & quasi cinerei: sic ex carneo candicantis.

XVII. Chamædrys spuria latifolia minima.

Veronica tetragona mont. recta minima, Col.

XVIII. Chamædrys spuria minor angustifolia: pro quinta in Prodom. descripta: quam Teucrij quarti speciem 3. Clus. hist. secundum descriptionem diceremus, nisi figura ejus aliam ostenderet.

XIX. Chamædry spuria affinis rotundifolia scutellata.

Alyssum Dioscoridis montanum, Col.

## CHAMÆPITYS.

**X** *Αμυγνίτις* Dioscoridi lib. 3. c. 175. & 176. quasi humilis picea, quod folia Piccam oleant. Plinio l. 24. c. 6. Chamapitys, Latinis Ajuga appellatur, diciturq; propter abortus, ab alijs Thusterra.

Genera tria Dioscor. 1. herba est qua humi serpit incurva similis, folijs sempervivi minoris: at multo tenuioribus pinguioribusq; & hirsutis: floribus luteis, vel candidis: 2. cubitalibus ramis in anchora speciem incurvatis flore candido: 3. mas est, herbula levis, foliolis tenuibus, albis, pilosis: caule scabro, candido: pusillis floribus luteis, &c. Plin. l. c. cubitalibus ramis flore pinus & odore: altera brevior & incurva similis: tertia eodem odore, & ideo nomine quoq; parvulo cauliculo, crassitudine digitali, folijs scabris, exilib. albus, in petris nascent.

I. Chamæpitys incana exiguu folio.

Chamæpitys prima, Fuch. Ang. Lon. (qui flores purpureos tribuit.)

Chamæpitys tertia, Dod. Matth. Ital. Lac.

Ajuga 1. Tur. sive Chamæpitys altera, Matth.

Chamæpitys 1. Dioscoridis odorator, Ad. Lob.

Chamæpitys tertia, sive altera, Matth. Lugd.

Folij est incanis, hirsutis flosculis luteis distincta ab Echio scorpioide, Chamæpityde vermiculata, & Anthylloide, Thalij.

II. Chamæpitys moschata, folijs ferratis: an prima Dioscoridis?

Chamæpitys species Monspelij, Ges. hor.

Iva moschata Monspeliensium, Ad. Tab. Ger.

Anthyllis altera, Clus. hisp. & hist. Cast. Lugd.

Anthyllis Chamæpitydes minor, Lob.

Chamæpitys spuria prior, sive Anthyllis altera, Dodon.

Chamæpitys altera & major, Cæs.

III. Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido.

Chamæpitys tertia, Trag. Fuch. Ang.

Chamæpitys secunda, Tur. Lon.

Chamæpitys 1. Matt. Dod. Lac. Cord. hist. Lugd.

Chamæpitys, Ges. hor. Cæs. vera, Cord. in Diosc.

Chamæpitys major, Tab. mas, Ger. Eyst.

Ajuga sive Chamæpitys mas Dioscoridis, Ad. Lobel.

Ajuga, Cast. tertia, Tur.

Ajuga luteo flore, Clus. pan. & hist.

Peristerona Cratevæ, Ang.

Flore est luteo: at Clusius in hist. meminit

Ajugæ multifidis folijs flore rubefcente, quod Fuchsio & Dod. tertium sit.

IV. Chamæpitys cærulea Austriaca.

Chamæpitys Austriaca, Clusius pan. & histor.

Eyffert.

Chamæpitys cærulea, Cam.

Flore est communiter cæruleo: rarius purpureo.

V. Chamæpitys spuria multifido folio, I. a mij flore.

Ajuga adulterina, Clus. hisp. Lugd.

Chamæpitys spuria altera, Dod. qui duplicem figuram habet, quem Lugd. historia imitatur.

Chamæpitys adulterina, Lob.

Chamæpitys alia, Cam. ep.

Pseudochamæpitys, Clus. hist.

## A L S I N E.

**A** λειν Dioscoridi l. 4. c. 87. quod lucos, quos αλον nominant & umbrosa loca amet: & Μυὸς ἑρ, id est, muris auricula, quod musculorum auribus folia similia habet. Sic Plinio l. 27. c. 4. Alfine quam quidam Myofoten appellant, nascitur in lucis, unde & Alfine dicta. Unius uterq; meminit.

I. Alfine hederulæ folio.

Alfine quartum genus, Fuch. ico.

Elatine, Dod. gal. Lac. Thal. prior, Lugd.

Lappago Plinij, Ang.

Alfine mas, Gef. hor. species in vinetis, Eid. col.

Alfine spuria prior, Dod.

Morsus gallinæ folio hederulæ, Ad. Lob.

Centunculus hirsutior, Cæs.

Alfine hirsuta, Cam.

Alfine hederacea, Tab. Ger.

Variat foliorum magnitudine: flore purpureascente, aut dilute purpureascente: rarius lacteo.

II. Alfine Veronicæ folijs flosculis cauliculis adhærentibus.

Elatine polyschides, Lugd.

Alfine folio Veronicæ, Tab. Ger.

Alysson, Col. in phytobas.

III. Alfine Chamædrifolia flosculis pediculis oblongis insidentibus.

Morsus gallinæ tertiæ, Trag.

Alfine media, Fuch. Lugd. Cam.

Alfine, Tur. alterum genus, Fuch. ico.

Elatine altera, Dod. gal. Lugd.

Alfine altera folijs ferratis, Gef. col.

Alfine folijs Triflaginis, Lob. ico. Tab. Ger.

Alfine spuria altera, Dod.

Antirrhinon Dioscoridis, Cæs.

IV. Alfine triphyllos cærulea.

Spindelstraut/ cæruleis flosculis, Trag.

Alfine parva recta, Lob. ico. Cam.

Elatine triphyllos, Lugd.

Daëtiliobotanon cæruleo flore, Thal.

Alfine recta, Tab. Ger.

Altera majoribus & crassioribus folijs: altera minoribus.

V. Alfine Symphyti petræi capitulis.

Alfine alia, Clus. hisp. Boëtica, Eid. hist.

VI. Alfine scandens baccifera.

Cyclaminus altera Dioscoridis, Ghini.

Recentiorum planta, Alfinis majoris facie baccis Solani, an Cacubalum Plinij, Ad.

Alfine repens, Clus. hisp. & hist. ap. alt. Lob. Dodon. Cast. Cam.

Alfine major, Clus. hist. maxima, Thal.

Cucubalus Plinij, Lugd.

VII. Alfine baccifera similis suis acinis.

Herbæ adversus hæmorrhoides admirabilis acini, Clus. hist. app. alt. ad lib. 6.

VIII. Alfine altissima nemorum.

Morsus gallinæ majus, Brunf.

Morsus gallinæ 2. genus, Trag.

Alfine major, Dod. Cam. Tab. Ger.

Alfine major, & Alfine genuina Diosc. Lugd.

Alfine maxima, Lob. ico. media, Thal.

Centunculus viticulis cubitalibus, Cæs.

IX. Alfine angustifolia.

Alfine maxima, Lugd.

X. Alfine major.

Alfine marina, Dod. Tab. Ger.

Alfine sive Hippia major, Lob. ico.

Centunculus, Cæs.

XI. Alfine media.

Morsus gallinæ primum genus, Trag.

Alfine, Math. Ang. Lac. Lon. Lob. Lugd. Cast.

Alfine major, Fuch. 1. genus, Eid. ico.

Alfine media, Dod. gal. Tab. cui & Alfine, Ger.

Hippia minor, Cord. hist.

Alfine minor, Dod. Ad. Lob. ico. Thal.

Alfine morsus gallinæ scæmina, Gef. hor.

XII. Alfine minor multicaulis.

Morsus

Morſus gallinæ minor, Brunf.

Morſus gallinæ ſpecies 4. Trag.

Alſine, Turn. minor, Fuch. Dod. gal. Lon. Thal. Lugd. Tab.

Alſines 3. genus, Fuch. ico.

Alſine minima, Dod. Ad. Lob. Cam. Ger.

Centunculus minutifſimis cauliculis, Cæſ.

XIII. Alſine minor lini capitulis.

Alſine minima ſuffruticis inſtar, Thal.

Alſine petræa minima, Tab. petræa, Ger.

Variat : alia ſuffrutici ſimilis, rigidis cauliculis : alia cauliculis tenerioribus : tertia medio modo ſe habet cauliculis non aded implexis : & hujus, ut & prioris, plures differentiæ notantur, foliorum longitudine, tenuitate, hirsutie differentes.

XIV. Alſine minor folijs rotundis.

Alſines minoris alia ſpecies, Thal.

Variat : alteri enim folia ſunt latiora, rotundiora : alteri ſubrotundiſcula & mucronata : alterius, medio modo ſe habent.

XV. Alſine verna Androſaces capitulis : ſub 6. in Prodomo deſcripta.

XVI. Alſine affinis Androſace dicta major. Androſace altera, Matth. Lugdun. Cluſ. pan. & hiſt. Cam. Tab.

Androſace annua ſpuria, Ger.

Morſus gallinæ, vel Alſines ſpecies non ex Syria, ſed ex quadam antiqua macerie, Ad.

XVII. Alſine affinis Androſace dicta minor : ſub 5. in Prodomo deſcripta.

XVIII. Alſine nodosa gallica.

Alſine nodosa, Lugd.

*Alſine Spergula dicta.*

I. Alſine Spergula dicta major.

Spergula, Dod. Lugd.

Sagina Spergula, Ad. Lob.

Alſine renuifolia altera, vel terreſtris altera *rexiopum*, Col.

II. Alſine Spergulae facie media.

Spergula marina, Lugd.

Anthylloides, Thal.

III. Alſine Spergulae facie minor : ſive Spergula minor ſoſculo ſubcæruleo : quæ ſub Alſine 9. in Prodomo deſcribitur.

an Aſterias ſive Stellaria, Lugd.

*Alſine paluſtris.*

I. Alſine aquatica major.

Alſine paluſtris, Tab. Ger.

II. Alſine aquatica media.

Alſine fontana, Tab. Ger.

III. Alſine aquatica minor & fluitans.

Alſine fluviatilis, Tab. Ger.

IV. Alſine paluſtris minor, folio oblongo : quæ 2. in Prodomo, &

Portulacæ aquaticæ nomine miſſa.

V. Alſine paluſtris minor ſerpillifolia : quæ 1. in Prodomo.

VI. Alſine littoralis folijs Portulacæ.

Alſines genus pelagicum, Cluſ. hiſt.

VII. Alſine maritima flore rubente.

Alſine maritima Neapolitana, Col.

VIII. Alſine minor Androſaces alterius Matthioli facie : quæ 5. in Prodomo.

IV. Alſine nodosa Germanica : quæ 8. in Prodomo.

X. Alſine tenuifolia muſcoſa.

Alſine muſcoſa, Lugd.

*Alſine alpina.*

I. Alſine alpina glabra : in Phytopinace ſub 21. at in Prodomo ſub 3. deſcripta.

II. Alſine alpina junceo folio : ſub 22. in Phytop. at ſub 4. in Prodomo propoſita.

III. Alſine montana capillaceo folio.

Alſine ſaxifraga anguſtifolia minima montana, Col.

IV. Alſine alpina cauliculis nudis prolifera. an Saxifragia 3. Col.

V. Alſine alpina minima glabra : quæ 7. in Prodomo.

VI. Alſine montana latifolia flore laciniato.

Alſine montana hederacea maxima, Col.

*Alſine hirsuta arvenſis.*

I. Alſine hirsuta magno flore.

Auricula muris quibuſdam, Dod. gal.

Alſine ſpuria 3. Eid. lat.

Alſine myoſotis, Ad.

Alſine hiſpida 1. Thal.

Hæc duplex eſt : alterius folia minore hirsutie donantur : alterius pilioſiora ſunt.

II. Alſine hirsuta altera viſcoſa.

Auricula muris 3. Dod. gal.

Alſine ſpecies glutinoſa, Gef. col.

Alſine ſpuria 4. Dod.

Alſine viſcaria, Cam.

III. Alſine hirsuta minor.

Alſine hiſpida minuta, Thal.

**A** *Naxos* Dioſcoridi lib. 2. cap. 209. *Anagallida*, aliqui *Corchorum* vocant, Plinio lib. 25. cap. 13. Genera duo Dioſcoridi & Plinio ſtrepunt diſtantiæ: quæ cæruleo eſt flore, ſæmina: quæ phæniceo mas iſſdem dicitur.

*Anagallis terreſtris.*I. *Anagallis phæniceo flore.*

*Anagallis*, Cord. in Dioſc. Gef. hor. mas, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lon. Lugd. Caſt. Ger.

*Anagallis rubro flore vel purpureo*, Gefn. col.

*Anagallis phænicea mas*, Ad. Lob.

*Anagallis phænicea*, Tab. punicea, Cæſ.

*Anagallis phæniceo flore*, Cam. mas, Cluſ. hiſt.

*Anagallis terreſtris mas*, Thal.

*Corchorus Cratevæ*, Theoph. & Nicandri, Ang.

Hæc Dioſcoridis mas eſt: aliquibus *Corallina* *Æginetæ*: alijs *Corchorus* Plinij: alijs *Molochia Serapionis*. Variat floris colore: phæniceo eſt communiter: eſt & purpureo ſcente ſive obſolere purpureo, cui phæniceum quidpiam permixtum conſpicitur, monente Cluſ. hiſp. & hiſt.

II. *Anagallis cæruleo flore.*

*Anagallis ſæmina*, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lon. Caſt. Lugd. Ger.

*Anagallis cærulea ſæmina*, Ad. Lob. Cluſ. hiſt.

*Anagallis cærulea*, Cæſ. Tab. cæruleo flore, Cam.

*Anagallis terreſtris ſæmina*, Thal.

Flore eſt cæruleo, rarius albo.

III. *Anagallis cærulea*, folijs binis terniſve ex adverſo naſcentibus.

*Anagallis tenuifolia Monnelli*, Cluſ. hiſt. ap. alt.

IV. *Anagallis lutea nemorum.*

*Numularia ſylvatica vel mas*, Gefn. hort.

*Anagallis lutea*, Ad. Lob. Lugd. Thal. Tab. Ger.

*Anagallis luteo flavo flore*, Cam. Cluſ. pan. & hiſt.

*Alline lutea*, Lugd.

Folio aliquando ampliore reperiri, auctor eſt Cluſ. hiſt. ap. alt.

*Anagallis aquatica.*I. *Anagallis aquatica major folio ſubrotundo.*

*Anagallis aquatica*, folio maximo, Thal.

*Berula ſive Anagallis aquatica*, Tab.

*Anagallis ſive Beccabunga*, Ger.

II. *Anagallis aquatica minor folio ſubrotundo.*

*Sium*, Brunf. non odoratum 1. Trag.

*Sium*, Ang. Eric. Cord. Fuch. Lon. non odoratum quibusdam, Gefn. horr.

*Sij alterum genus*, Fuch. ico.

*Cepæa*, Tur. Dod. gal.

*Anagallis aquatica*, (ſive *Becabunga Germanorum*) Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cæſ.

*Anagallis aquatica minor* 1. Tab.

*Anagallis aquatica minor flore pallido*, Ger.

Quibusdam *Sium Dioſcoridis* lib. 2. cap. 154. ſed folia oluſarri deſunt & inodora ſunt: alijs *Cepæa Dioſcoridis* lib. 3. cap. 168. ſed folia *Portulacæ* hæc non habet.

III. *Anagallis aquatica major folio oblongo.*

*Berula major*, Tab.

*Anagallis aquatica*, Ger. major, Gefn. col.

IV. *Anagallis aquatica minor folio oblongo.*

*Anagallis aquatica minor* 2. Tab.

*Anagallis aquatica minor*, Ger.

V. *Anagallis aquatica folijs pulegij ſerpillive*.

*Sium alterum & Anagallis aquatica*, Trag.

VI. *Anagallis aquatica folio rotundo non crenato.*

*Anagallis aquatica altera*, Lob. Lugd.

*Anagallis aquatica* 3. Lob. ico.

*Guilandinus* modò *Alisma*, modò *Cochleariam* nobis nominavit: & alij *Samolum* Plinij lib. 25 cap. 11. faciunt.

VII. *Anagallis aquatica anguſtifolia.*

*Anagallis aquatica* 4. Lob. ico.

VIII. *Anagallis aquatica anguſtifolia ſcutellata*: hæc in *Prodomo*, & pro 9. in *Phytopynce* deſcripta.

## E L A T I N E.

**E** *Æthiops folia* habet *Helxine*, at minora & rotundiora piloſa, &c. in ſegetibus, Dioſcoridi lib. 4. cap. 40. Idem Plinius lib. 27. cap. 9. *Elatine* nomine.

I. *Elatine folio ſubrotundo.*

*Veronica ſæmina*, Matth. Fuch. Gefn. hort. Tur. | Dod. Lon. Cæſ. Caſt. Lugd. (qui Matthioli & Fuchſij figuram exhibet) Cam. Ger.

*Elatine*

Elatine Dioscoridis, Ad. Lob.

Verbasculum quorundam, Lugd.

Elatine 1. Tab. altera folio rotundo, Thal.

Reperitur folijs latioribus oblongis : dein folijs decuplo minoribus, rotundis Numulariæ forma, quam

Elatines alteram speciem Thalius facit.

II. Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo.

Elatine, Matth. Cast. Lugd. resta, Lob.

Elatine altera, Dod. Lob. ico. Tab. Ger.

Elatine folio acuminato, Thal.

Linaria hederulæ folio, Col.

In agris hirsutior & minor : in hortis glabrior & lætius virens.

III. Elatine folio acuminato flore cæruleo.

Differt à priore folijs rotundioribus, ad basin minus auriculatis : ac floribus, qui subcærulei, vel cærulei sunt : & Monspeffuli in loco Gramuntio, & hinc inde circa vias reperitur.



## SECTIO SECUNDA.

HELIOTROPIUM; AURICULA MURIS; ECHIUM; ONOSMA; ANCHUSA; LYCOPSIS; BUGLOSSA ET BORRAGO;

Cynoglossum; Cerinthe; Lithospermum; Symphytum; Pulmonaria; Consolida media; Brunella; Bellis.

### HELIOTROPIUM.

**H** *ἡλιοτρόπιον* Dioscoridi lib. 4. cap. 193. quod τὰ φύλλα τῇ τῆς ἡλίου συνωρετίζονται, quod folia cum Sole circumagat : & *ονοπέρις*, quod ramuli cum floribus, Scorpionum caudæ modo inflectantur. Theophrasto 7. h. st. 3. & 9. Solaris herba Gaza vertente. Plinio lib. 22. cap. 21. Heliotropium quod cum Sole se circumagat, etiam núbilo die, tantus sideris amor est, noctu velut desiderio contrahitur cæruleus flos.

Genera duo Dioscoridi : majus flore candido, aut subsulvo : minus, semine verrucarum (hinc Verrucaria) pensili. Plinio, tricoccum & Heliotropium : parvum & magnum intelligens.

I. Heliotropium majus Dioscoridi.

Heliotropium majus, Matth. Ang. Dod. Gesn. hort. (& Scorpioides album) Lac. Adv. Lobel. Cæs. Lugd. (& Verrucaria) Cast. Taber. Camer. Ger. Clus. hist.

Herba cancri majus, Lon.

II. Heliotropium minus supinum.

Heliotropium supinum, Dod. Clus. hisp. & hist. Ger. desc.

Heliotropium humi sparsum, Lugd.

Heliotropium minus 1. Tab.

III. Heliotropium supinum alterum.

Heliotropium minus folio ocimi, Gesn. col.

Heliotropium minus. Lob. ico. Ger. repens, Ad.

Heliotropium minus 2. Tab.

Verrucaria altera minor, Lugd.

IV. Heliotropium tricoccum.

Heliotropium minus, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Dod. Cam. ep. & hort. cui & herba Clytiæ.

Heliotropium minus tricoccum, Gesn. hort. Clus. hisp. & hist.

Heliotropium vulgare Tornesol Gallorum, si-ve Plinij tricoccon, Ad.

Heliotropium parvum Dioscoridis, Lob.

Heliotropium tricoccum, Cæs. Lugd. Tab. Ger.

V. Heliotropium alterum, Matth. Lug. quid?

### AURICULA MURIS SIVE ECHIUM SCORPIOIDES.

**M** *ὄρε ὄρα* sive *ὄρε ὄριδα*, id est, muris auricula, quam *Myosotida* vocant, Dioscoridi lib. 2. cap. 214. *Myosota* sive *Myosotis*, Plinio lib. 27. cap. 12.

*Echium scorpioides* : *Echium*, propter foliorum formam : *Scorpioides*, eò quod ramulos floribus onustos candarum Scorpionum instar contorqueant, vocamus : & cum alij *Myosotida*, alij *Heliotropium* faciant, *Heliotropium* sequi, & *Echium* precedere volumus.

I. *Echium Scorpioides arvense*.  
*Auricula muris minor* 3. Trag.  
*Euphrasia* 4. & *Pilosella sylvestris*, Eid.  
*Scorpioides mas*, Dod. in ico.  
*Scorpioides aquaticum*, Gefn. hort.  
*Scorpioides* 3. Dod.  
*Myosotis hirsuta reptans*, Adv. Lob.  
*Alsine myosotis*, sive *Auricula muris*, Lobel.  
 icon.  
*Heliotropium minus alterum*, Cæs. tertium,  
 Taber.  
*Echij palustris altera species*, Thal.  
*Auricula muris cærulea*, Tab.  
*Pilosella flore cæruleo*, Ger.  
*Heliotropium erectum*, Eid.  
*Echium minimum vel Buglossum*, Col.  
*Scorpioides tertium minus Dodonæi*, Eyf.  
 Variat magnitudine, aliquando vulgata  
 quadruplo major est & hirsutior.

II. *Echium Scorpioides minus flosculis luteis*: in Prodomo descriptum.  
 III. *Echium Scorpioides palustre*.  
*Cynoglossa minor*, Brunf.  
*Euphrasia cærulea*, Trag. Tab. Ger.  
*Scorpioides fœmina*, Dod. in ico.  
*Scorpioides aquaticum, vel palustre, vel cæruleum*, Gefn. hort.  
*Heliotropij species altera*, Eid.  
*Leontopodium*, Lon. Lugd.  
*Myosotis Scorpioides partim repens, partim erecta*, Lob. ico.  
*Heliotropium minus in palustribus*, Cæs.  
*Echium palustre*, Cordo, Thal.  
*Scorpioides tertium majus Dodonæi*, Eyf.  
*an Auricula muris*, Matth. Dod. gal. Lac. Cast.  
 Lugd.  
 Est glabrum, aliquando leviter hirsutum:  
 flore est cæruleo, rarius niveo.

## E C H I U M.

*Ἐχίον, ἢ ἀλυσσίδιον* Dioscoridi lib. 4. cap. 27. *Echium dictum volunt quoddam contra viperarum illud valeat: alij quoddam florescat capitulis vipere similibus: sed Dioscoridi, quoddam semina νεπαλῆ ἐχ. & ὀμοια, capituli viperino similia habeat.*

Genera: Plinio lib. 25. cap. 9. *Echyos* utriusque generis, pulegio similis folijs coronata: Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula vipere similia sunt. Verum Dioscoridis *Echium*, à Plinio lib. 22. cap. 20. *Pseudoanchusam* dici putant, quam à quibusdam *Enchusam*, aut *Dorion*, & multis alijs nominibus appellatum scribit.

I. *Echium majus & asperius flore albo*.  
*Echium flore albo*, Cam. ep. Matth. & hort.  
 II. *Echium vulgare*.  
*Echium*, Matth. Ang. Lac. Gefn. hort. Dod. Lob.  
 ico. Cast. Lugd. vulgare, Clus. pan. & hist.  
*Echium, sive Alcibiaceum*, Dod. gal.  
*Lycopsis*, Cord. in Diosc.  
*Buglossum sylv.* Lon.  
*Echium, Buglossum agreste*, Ad.  
*Echium floribus purpurantibus rubellis*, Lob.  
*Anchusa major*, Cæs.  
*Anchusa sylv.* Thal.

Flos communiter cæruleus est: aliquando ex purpura rubet, vel subcinereus est. Caulis aliquando duorum triumve digitorum latus, quemadmodum in Beta, Digitali purpurea, Cucurbita, Tithymalo cyparissia & alijs observavimus.

III. *Echium Creticum latifolium rubrum*.  
*Echium* 3. vel *Echium Creticum* 1. Clus. hist.

IV. *Echium Creticum angustifol. rubrum*.  
*Echium* 4. vel *Echium Creticum* 2. Clus. hist.  
 V. *Echium sylv. lanuginosum*.  
*Echium* 1. & *Echium pullo flore*, Clus. pan. & hist.  
 VI. *Echium sylv. hirsutum maculatum*.  
*Echium* 2. vel *rubro flore*, Clus. pan. & hist.  
 Flos nunc saturatè rubente, modo dilutiore colore præditus est.  
 VII. *Echium alpinum luteum*.  
*Echium montanum Dalechampij*, Lugd.  
*Trachelium* *supposedes*, Clus. pan.  
 VIII. *Echium pumilum flore luteo*.  
*Echium flavo flore*, Clus. cur. post.  
 IX. *Echium luteum minimum*.  
*Echioides lutea minima Apula campestris*, Col.  
 X. *Echium pumilum album*.  
*Echioides parva alba Amphibia*, Col.  
 XI. *Echium Hispanicum flore calcari donato*: quod 1. est in Prodomo.

## O N O S M A.

**O**<sup>nosm</sup> Dioscoridi l. 3. c. 147. folijs Anchusæ sine caule, semine & flore: & Plinio l. 27. c. 12. cui Onosma. Onosma, Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. Tab. Ger. Hædennus plantam non vidimus: esse autem Lycopsi- di cognatam & in Anchusis habendam, figura ostendit: & Adversariorum authores, id velle videntur.

## A N C H U S A.

**A**<sup>γχουσα</sup> Dioscoridi l. 4. c. 23. παρὰ τὸ ἄγχαν quodd vim suffocatoriam habeat, dicta videtur: alijs verò à florido radicis colore, siquidem ἄγχεσθαι erat suco illinire: hinc Galenus in Oratione suasor. ad artes 6. Anchusa pictas dicit. Anchusa etenim ab Echio, Lycopsides & Buglossa, radicis sanguineo succo, quo manus in- fiuntur, Dioscoride monente, differt.

Genera tria Dioscoridi: 1. quæ ἐνόηλια, folijs Lactuca hirsutis: 2. quæ Ἀλκιβιάδιον ἢ Ὀνοχάλης, quæ priore minor: 3. secunda non dissimilis, semine puniceo. Plinius lib. 22. c. 20. primam Dioscoridis nomine An- chusæ, & l. 27. c. 5. secundam sub Alcibio proposuit: & l. 22. c. 21. Onochiles habetur.

I. Anchusa Echij folijs & floribus.

Anchusa, Ad.

II. Anchusa lutea major.

Anchusa tertia, Matth. Ang. Lac. Cam.

Anchusæ prima species forte, Cord. in Diosc.

Buglossa rubra, vel Anchusa tertia, Lon.

Anchusa lutea, Ad. Lob. ico.

Anchusa quarta seu Pseudoanchusa, Dod.

Anchusa flore exalbido, Clus. pan. & hist.

Flos luteus, rarius albus: aliquando ex albo pallescens.

III. Anchusa lutea minor.

Anchusa Echiioides lutea, Col.

IV. Anchusa puniceis floribus.

Anchusa, Gesl. hor. secunda, Matt. Ang. Lac. Lugd.

Buglossa rubra, vel Anchusa 2 Lon.

Anchusa minor seu Alcibiadion, vel Onochi- les, Ad.

Anchusa parva, Lob. ico.

Anchusæ alterum genus Onochiles dictum, Clus. histor.

V. Anchusa minor Patavina.

Anchusa tertia, Cam. ep.

VI. Anchusa angustifolia.

Anchusa lignosior angustifolia, Ad. Lob. icon. Lugd. Clus. hist.

Tragoriganum nothum Dalechampij, Lugd.

Lithospermum minus repens in Phytopynace; at in Matthiolo

Lithospermum fruticosum angustifolium.

## L Y C O P S I S.

**L**<sup>υκοψις</sup>, quibusdam Ἀγχουσα, quia radice etiam rubra est Dioscoridi l. 4. c. 6. Lycopsis, Plinio l. 27. c. 11. Sic dicta forte à caulis, soliorum & florum impexa hirsutie pedem lupinum imit ante.

I. Lycopsis.

Cynoglossum, Matth. Lac. Lugd.

Cynoglossa vera, Cast.

Buglossum vulgare, Lon. ico.

Echij altera species, Dod.

Lycopsis, vel Lycapsis degener Anchusa, Ægi- netæ, Ad.

Lycopsis altera Anglica, Lob. Lugd.

Echion, Cæs.

Aliquando caule caret: Monspeliaca flore est dilutè purpureo: Anglica saturationis est purpuræ.

II. Lycopsis Ægyptiaca.

Lycopsis Dioscoridis, Cynoglossi genus, Rau- vvolf. Lugd. ap.

## B U G L O S S A E T B O R R A G O.

**B**<sup>ορραγον</sup>, Dioscoridi libr. 4. cap. 28. quod linguas bubulas imitetur. Dicitur & Εὐφροσύων, quod in vinum coniecta animi voluptates augeat, Dioscoridi & Plinio libr. 25. cap. 8. cui Buglossos, boum lingua similis.

Borrage



*Borrage* verò officinū, ad imitationem Marcelli dicta, *Buglossa* vera veterum censetur, & ab officinarum *Buglossa* diversa est, quam aliqui *Buglossum* veterum, alij eorundem *Lycopsis*, alij *Cirsium*, nescio quā velle, dicunt. Utrumq; pro *Buglossa* agnoscimus, ipsam *Borraginem* officinarum, *Buglossam* latifoliam: & *Buglossam* officinarum, *Buglossam* angustifoliam nominantes. At *Guilandinus*, *Buglossum* officinarum, *Buglossum* antiquorum esse asserit: *Borraginem* verò à *Dioscoride* *Echion* vocari suspicatur.

*Buglossum sativum.*

**I. Buglossum latifolium, Borrage.**

*Borrage*, Brunf. Trag. Fuch. ico. Ang. Gef. hort. Dod. Lon. Lugd. Cæs. Cam.

*Buglossum*, Matth. Fuch. Tur. Lac. Ad. Cast.

*Buglossum* verum, Dod. gal. Cord. in Diosc.

*Borrage* flore cæruleo: & albo, Eyst.

*Buglossum latifolium*, Lob. vulgare, Clus. hisp.

*Buglossa urbana*, Clus. hist.

*Borrage* floribus albis, Tab. hortensis, Ger.

Flore est communiter cæruleo: aliquando candido, vel ex pallescente roseo: interdum Autumnino suaverubente. Et Taber. proponit

*Borraginem* sylv. floribus albis, quæ

*Borrage* flore albo, Ger. &

*Borraginem* tenuifoliam, quæ

*Lycopsis* Anglica, Ger.

**II. Buglossum latifolium semper virens.**

*Buglossum semper virens*, Ad. Lob. ico. Lugd.

Camer.

*Buglossum* Hispanicum, Cæs. Tab.

*Borrage* semper virens, Ger. Hispan. latifolium, Eystett.

**III. Buglossum angustifolium majus.**

*Buglossa*, Brunf. Cæs. Italica, Trag. Lon.

*Buglossa longifolia*, Cord. hist.

*Buglossum* vulgare, Matth. Lac. Cast. Lugd. Taber. Ger.

*Cirsium* Italicum, Fuch.

*Lycopsis*, Ang. *Lycopsis*, Dod. gal.

*Cirsium*, Cord. in Diosc.

*Echium* Italicum spinosum, Fuch. ico.

*Anchusa*, Tur. *Anchusa* Alcibiadion, Dod.

*Buglossus* Italica, vel Gallica major, vel vera, Gef. hort.

*Buglossum* angustifolium, Ad. Lob.

*Buglossum* Italicum, vel Hispanicum grande, Camer.

*Buglossum* Italicum flore cæruleo: flore albo, Eystett.

Floris color cæruleus, albus, rubeus, interdum variegatus: folia modo latiora, modo angustiora sunt: hinc figuræ tres apud Tab. & Ger. apud illum *Buglossa* vulgaris Italica mas, & Italica

fœmina: apud hunc, *Buglossa* vulgaris, *Anchusa* Alcibiadion & *Anchusa* lutea, ico.

Aliquando folijs est latioribus, sinuosis, flore albo, qui cum ramo instar *Scorpioidis* incurvatur, eoq; à priore differt, quod

*Buglossum* folijs sinuosis nominavimus.

**IV. Buglossum vulgare, asperitate & proceritate discrepans.**

*Buglossum* vulgare violaceo & albo colore, Eystett.

**V. Buglossum angustifolium minus.**

*Buglossa* minor, Trag.

*Cirsium* Germanicum, Fuch. *Loniceri*, Lugd.

*Echium* lanuginosum primum, Fuch. ico.

*Anchusa* genus, Dod. gal. 3. Eid. lat.

*Buglossus* minor, Gef. hor.

*Cirsium* minus, Lon.

*Echij* facie *Buglossum* minimum, Lob.

*Buglossum* minus sativum, Lugd.

*Buglossum sylvestre.*

**I. Buglossum sylvestre majus nigrum.**

*Buglossum* alterum flore nigro, Matth.

*Buglossum* sylv. Matthioli, Lugd.

*Buglossum* sylv. majus, Cast.

*Buglossa* sylv. nigra, Thal.

Flore nigro, rarissime albo.

**II. Buglossum sylv. minus.**

*Buglossum* sylv. Brunf. Dod.

*Borrage* sylv. Trago.

*Echium*, Fuch. Germanicum spinosum, Eid. ico.

*Echium* alterum, Cord. in Diosc.

*Lycopsis* sylv. Dod. gal.

*Buglossa* sylv. Dod. sylv. altera: Lon.

*Buglossum* erraticum asperum echiioides, Ad.

*Echium* Fuchij, Lugd. Cam.

**III. Buglossum sylvestre minus alterum & asperius.**

*Buglossa* sylv. Trag.

*Anchusa* minor, Cord. hist.

*Lycopsis*, Lon. Lugd.

*Buglossum* sylv. minus, Cast. Lugd.

Flos ex cæruleo purpurascit, rarius candidus est.

**IV. Buglossum sylv. tertium.**

|   |   |
|---|---|
| Cynoglossum, Trag. Tur. officin. Fuch. falsum, Lon. | Alyssum Germanicum Echiodides, Lobel. Lugdunen. |
| Lycopsis, Fuch. icon.                               | Buglossæ sylv. species, Thal.                   |
| Cynoglossos altera Plinij, Dod. gal.                | Aparine major Plinij, Tab. Ger.                 |
| Anchusa aspera, Cord. in Diosc.                     | Crucialis quædam, Cæs.                          |
| Hoc prædicto simile, sed non idem.                  | Asperugo spuria, Dod. belg.                     |
| V. Buglossum sylv. caulibus procumbentibus.         | Borrago minor sylv. Col.                        |

## CYN OGLOSSUM.

**K** *Ὠρόλωσσον* Dioscoridi lib. 4. cap. 129. id est, *Lingua canina*, à foliorum forma qua Plantagini latifolia similia, at angustiora, minora & lanuginosa Dioscoridi. Plinio lib. 25. cap. 8 Cynoglossos caninas imitans linguas, topiarijs operibus gratissima: est & alia similis ei, & qua ferat lappas minutas. Neutrum Dioscoridis esse censemus.

I. Cynoglossum maximum Belgicum.

Cynoglossum maximum, Lob. obs.

Hoc folijs, floribus & seminibus vulgato duplo majus est.

II. Cynoglossum majus vulgare.

Cynoglossa major, Brunf.

Cynoglossum vulgare, Matth. Lob. Thal. Cast.

Lugd. Clus. hist. Eyf.

Cynoglossum, Dod. Ad. Tab. Ger. officinarum, Lon.

Cynoglossus vulgaris, Gef. hor.

Cynoglossa, Cæs. major, Cord. in Diosc.

Cynoglossa vulgaris major, Col.

Lycopsis, Lac.

Hoc sæpe sine caule reperitur, quod tamen à caulifero diversum non est: hinc duæ figuræ apud Matthiolum, Lob. Dod. Rarius flore albo occurrit.

III. Cynoglossum sylvaticum rubente caule.

Cynoglossum sylvaticum Hæcynicum, Thal.

an Cynoglossum montanum, Cæs.

an Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum, Col.

IV. Cynoglossum sempervirens: in Phytopynace & Prodromo descriptum.

an Cynoglossa media altera virente folio, Col.

V. Cynoglossum globofo flore.

Cynoglossa media montana incana angustifolia altera, Col.

VI. Cynoglossum fructu umbilicato.

Cynoglossa altera media fructu *πολύκλυσ* sive *λινυώδης*, Col.

VII. Cynoglossum medium.

Cynoglossum similis planta Plinij.

Cynoglossa minor, Cord. in Diosc.

Cynoglossum pusillum Narbonense, Ad. Lob. ico. Lugd.

Cynoglossum parvum, Cæs. Italicum. Cam.

Cynoglossum pumilum, Clus. pan. sive Austriacum alterum, Eid.

Cynoglossum Narbonense, Eyf.

Cynoglossa minor montana serotina altera Plinij, Col.

VIII. Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio.

Cynoglossum parvum cinereum Creticum, Camerac.

Cynoglossum Creticum primum, Clus. hist.

an Cynoglossa media argentea Apula campestris, Colum.

IX. Cynoglossum Creticum latifolium foetidum.

Cynoglossum Creticum secundum, Clus. hist.

X. Cynoglossum minus.

Elatine, Trag. Lon.

Lappula rusticorum, Lugd.

Cynoglossa minor montana serotina altera Plinij, Col.

Hæc magnitudine variat, cum vix semipalmaris in Anglia reperiatur.

CERINTHE SIVE CYN OGLOSSUM  
MONTANUM.

**C** *Erinthe* Plinio lib. 21. cap. 12. est folio candido incano, cubitali, capite concavo, mellis succum habente: floris avidissima sunt apes.

I. *Cerinthe seu Cynoglossum montanum* majus.  
*Cerinthe*, Gesn. hort. Cast. quorundam, Clus. hisp.  
*Cynoglossa montana*, Gesn. hort.  
*Cerinthe major*, Lob. Lugd. Cam. Clus. hist. Tabern. Ger.  
*Telephium Dioscoridis* quibusdam, Eid.  
*Telephium maculosum*, Cam.  
*Maru herba*, Dod.  
*Pulmonaria Romana*, Cæs.  
 Variat flore luteo, purpureo luteo, purpureo & versicolore.

II. *Cerinthe flore ex rubro purpurascente*.  
*Cerinthe tertia*, Clus. hist.  
 III. *Cerinthe flore flavo asperior*.  
*Cerinthe quorundam major flavo flore*, Clus. hist.  
 IV. *Cerinth minor*.  
*Cerinthe Plinii*, Ad. Lob. ico. Lugd.  
*Cerinthe minor*, Lob. Cam. Tab. Ger.  
*Cerinthe secunda*, Clus. hisp. minor seu quarta, Eid. hist.  
*Maru herba minor*, Dod.  
 V. *Cerinthe folio non maculato viridi*.  
*Cerinth quinque genus*, Clus. hist. ap. al.

## L I T H O S P E R M U M.

*Λιθόσπερον* recensuit Dioscorides lib. 3. cap. 158. quod à seminis duritie nomen accepit: folijs olivæ longioribus, latioribus & mollioribus, &c. Semen lapideum duritie, rotundum candicans, ervi parvi magnitudine. Plinius lib. 27. cap. 11. *Lithospermum* inter omnes herbas nihil est mirabilius, &c. lapillos gerit candore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia vero lapidea: & qua pediculis adhaerent caver-nulas habent & intus semen, &c.

I. *Lithospermum arundinaceum*, fortè Dioscor. & Plinij.  
 an Coix Theophrasti, 1. hist. 16.  
*Lachryma Christi*, Trag. Gesner. hort. cui & Jodoci.  
*Lithospermum majus*, Trag. Gesner. hort. cui & fruticosum.  
*Arundo lithospermos*, Gesner. hort.  
*Lithospermum primum*, Lacun. arundinaceum, Lugd.  
*Lachryma Jobi*, Ad. Clus. hisp. & hist. Dod. Lob. Cam. Cast. Eyst.  
*Lachryma vulgo*, Cæs.

II. *Lithospermum majus*, Matth. Lac. Cast. Lugd. quid?

III. *Lithospermum majus erectum*.  
*Saxifraga tertia*, Brunf.  
*Lithospermum*, Brunf. Fuch. Cord. in Dioscor. & hist. Tur. Lon. Ad. primum, Anguil. commune, Gesner. hort.  
*Milium Solis sativum*, Trag.  
*Lithospermum minus*, Matthiol. Dod. Gesner. hort. Lac. Lob. Cast. Lug. Ger. vulgare minus, Cam.  
*Lithospermum sativum*, Fuch. ico.  
*Lithospermum legitimum*, Clus. hist.  
*Lithospermum alterum fruticosum*, Thal.  
*Lithospermum arvense*, Tab.  
*Anchusæ tertiæ similis altera*, Cæs.  
*Milium Soler Mauritanis*, quod in montibus

*Soler* frequenter nascatur: hinc vulgo *milium Solis* ineptè dicitur.

Hujus species minima *palmum alta*, Lini foliis angustis, granulis pusillis, rotundis, cuius *Adversaria* meminere.

IV. *Lithospermum minus erectum*.  
*Lithospermum Anchusæ facie*, Lob. Lugd.

V. *Lithospermum minus repens latifolium*.  
*Lithospermum alterum*, Ang.

*Lithospermum majus*, Dod. Ad. Lob. Lugd.  
*Lithospermum vulgare majus*, Cam.

*Lithospermum repens majus*, Clus. pan. & hist.  
*Lithospermum*, Cæs. virgatum, Thal.

*Pulmonaria minor Dalechampi*, Lugd.  
 Hoc ad *Echium*, vel *Anchusæ* referri potest, quod aliqui *Lithospermum* Dioscor. & Plinij censent.

VI. *Lithospermum angustifolium umbellatum*: in *Prodromo* descriptum.

VII. *Lithospermum arvense radice rubra*.  
*Lithospermum sylv.* Trag. Fuch. Dod. gal. Camer. epist.

*Echium minus herba Lithospermo congener*, Gesner. ap.

*Anchusa degener facie Milij Solis*, Lob. ico.  
*Anchusa tertia Lithospermo similis*, Cæs.

*Anchusa arvensis alba*, Thal.  
*Anchusa arvensis minor facie Milij Solis*, Tab.

*Lithospermum tertium* Dod. nigrum, Lugd.

Ad Anchusam, vel Echium, aliqui referunt.

VIII. Lithospermum Linariæ folio Germanicum.

Passerina, Trag. Cam.

Lithospermum sylv. minus, Dod. gal.

Lithospermum quartum exiguum, Dod. lat.

Lithospermum minus, Lon.

Passerina herbariorum unicaulis, Ad.

Lingua passerina, Tab.

Passerina linaria, Ger.

Linaria altera botryodes montana, Col.

IX. Lithospermum linariæ folio Monspeliacum.

Passerina linariæ folio, Lob. Lugd.

## S Y M P H Y T U M.

**Σ**υμphyton Dioscorides lib. 4. cap. 9. & 10. proposuit : sic dictum à facultate conglutinandi, quâ pollet : nam & carnes dum coquantur conglutinat additum, eodem auctore. Et Plinio lib. 27. cap. 6. unde & Græci (ait) nomen imposuere : hinc Latinus Consolida dicitur.

Genera : Dioscoridi duplex est, πετρεῖον petræum, quod in petris nascatur, ramulis origano similibus, folijs tenuibus, & capitulis thymi : Alterum, quod aliqui πυχτὸν pecton vocant : caule cubitali, folijs hirsutis ad Buglossi foliorum similitudinem : floribus luteis, &c. Plinius lib. 27. cap. 6. Alum nos vocamus, Græci Symphytum petræum, similis cunila bubula, folijs parvis cactu multibus thymi, &c.

I. Symphytum Consolida major.

Symphytum quidam Inulam rusticam, quidam Alum Gallicum vocant, Scribon. c. 21.

Consolida major, Brunf. Trag. Cam. Thal. Ger.

Symphytum, Tur. Lon. majus, Matth. Cord. hist. Cam. Cast. Tab.

Symphytum magnum, Fuch. Dod. ut : Lugd.

Symphytum alterum, Ang. Cord. in Dioscorid. Lac.

Symphytum Alum, seu Alus, Ad Lob.

Consolida vulgo, Cæf.

Marem faciunt & fœminam, floris colore potissimum differentes : mas, flore est purpureo, vel purpurocæruleo : fœmina, flore albo, vel pallide luteo : rarius luteo : hinc duæ figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum : tres apud Eystert.

Symphytum majus flore albo, & flore purpureo, Tab.

Consolida major flore albo & flore purpureo, Ger.

Symphytum majus flore purpureo : flore rubro : flore pallido, Eyst.

II. Symphytum majus tuberosa radice.

Symphytum tuberosum, Lob. Dod. Lugd.

Symphytum tuberosum majus, Clus. hist.

Symphytum majus flore subluteo, tuberosa radice, Cam.

Symphytum radice tuberosa, Cam. ep.

Symphytum alterum folio Borriginis, Ang.

Consolida altera minor, Cæf.

Consolida tuberosa vel nodosa, Cam.

III. Symphytum minus tuberosa radice.

Symphytum tuberosum, Clus. pan. tuberosum minus, Eid. hist.

Floribus est pallidis, vel subluteis.

IV. Consolida major, amplexicaulis flore purpureo, Thal. quid ?

V. Symphytum minus Borriginis facie.

Symphytum pumilum repens Borriginis facie, Lob.

Borrago minima herbariorum, Lugd.

an Asarum muri, Eid.

VI. Symphyto viribus affinis.

Bisa radix quæ ex Bengala & Patane montibus adfertur, Acosta cap. de Datura : sed quid ?

## S Y M P H Y T U M M A C U L O S U M, S I V E P U L M O N A R I A.

**P**ulmonaria dicta, quod hujus folijs ut plurimum maculæ albæ latæ aspersæ sint. & quod Pulmonum affectibus medeatur : quibusdam Calla alterum genus apud Plinium lib. 27. cap. 8. cui Calla duorum generum est : una, similis Aro, &c. Alterum genus ejus, quidam Anchusam vocant, folia Lactucæ longiora, plumosa, radice rubra, &c. Illam Arisarum, hanc Pulmonariam volunt. At Eracastornus Pulmonariam ex genere Buglossæ esse censet.

I. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia.

Pulmonaria altera, Matth. Cast.

Pulmonaria & Pulmonalis, Dod. gal.

Pulmonaria Plinij, Gefn. hort.

Pulmonaria, Cæf. maculofa, Ad. Lob. Cluf. pan.

Cam. Tab. Ger. Eyst.

Symphytum maculoſum, Dod.

Pulmonaria major, Lugd.

Pulmonaria vulgaris maculoſo folio, Cluf. hiſt.

Folijs variat, quæ aliquando albis punctis notantur, aliquando ijs carent: & hæc

Pulmonaria folio non maculoſo, ſive 2. Cluf. hiſtor.

Floribus eſt communiter cæruleo rubentibus: rarius albis. Marem & ſæminam, nomine Pulmonariæ Plinij Taber. exhibuit, quem Gerardus imitatur.

II. Pulmonaria anguſtifolia rubente cæruleo flore.

Conſolida major ſylv. Trag.

Symphytum ſylv. Cord. hiſtor. & Pulmonaria Plinij, Schol.

Pulmonaria folijs Echij, Lob. ico Ger.

Pulmonariæ tertiæ ſpecies altera, Cluf. pan. 5. Pannonica, Eid. hiſt.

Pulmonaria quarta Plinij anguſtifolia, Tab.

Variat floribus, alteri flores initio rubent, dein cæruleum colorem ſaturationem contrahunt: alteri flores pulcherrimè rubentes: illa Pulmonaria 5. hæc verò 4. Cluf. in hiſt.

III. Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria anguſtifolia cærulea.

Pulmonaria 2. vel anguſtifolia cæruleo flore, Cluf. pan. tertia Auſtriaca, Eid. hiſt.

Pulmonaria prima anguſtifolia, Taber. 2. anguſtifolia, Ger.

Pulmonaria Auſtriaca ſecunda, Cam.

## CONSOLIDAMEDIA.

**C**onſolida media, quibuſdam Chamæciſſos ſpicata Plinij lib. 24. cap. 15. Alijs Anonymos Plinij lib. 27. cap. 4. (Anonymos inquit, non inveniundo nomen invenit) fortè quia vulneribus ſanandis efficaciſſima ſit.

I. Conſolida media pratensis cærulea.

Conſolida media, Brunf. Matth. Fuch. Taber. Eystert.

Conſolida media, & Herba Laurentiana, Caſt. Prunella cærulea, Trag.

Bugula, Dod. ut: Cluf. pan. & hiſt. Lugd. Ger.

Bugula, & Prunella quibuſdam, Ad. Lob.

Arthetica Pandectarij, Ang.

Symphytum medium, Lon.

Conſolida media major, Thal.

Conſolida media prima, Tab.

Chamæciſſus quorundam, Lugd.

Chamæciſſi alrerum genus Cæf.

Flore eſt cæruleo: rarius cinereo vel albo: folijs latioribus & anguſtioribus, leviter incifis vel ſinuatis.

II. Conſolida media pratensis purpurea.

Prunella purpurea vel quarta, Trag.

Conſolida media purpurea, Fuch. ſecunda, Taber.

Conſolida media minor, Thal.

Bugula carnei coloris flore, Cluf. pan. & hiſt.

Bugula flore albo, Ger.

Hæc repit & folijs priore eſt rotundioribus, non laciniatis, aliquando etiam non crenatis: flores, rubicundioris diluti coloris ſunt.

III. Conſolida media flore luteo: hæc cæteris multò minor eſt, folijs rotundis, crenatis, flore luteo: quam ex Anglia habemus.

IV. Conſolida media cærulea alpina, in Prodr. deſcripta.

## BRUNELLA.

**B**runella, quæ ex Conſolidæ ſpeciebus eſt, ab effectu nomen accepit, ed quod faucium & linguæ affectibus, ſeu potius malo Caſtrenſi, Germanis die Brüne dicto, medeatur: quod malum ab Aegineta lib. 3. Eryſipelas Cerebri dictum videtur. Quibuſdam Symphytum petraum: alijs Polycnemon Dioſcoridis lib. 3. cap. 108.

I. Brunella major folio non diſſecto.

Brunella, Brunf. Dod. ut: Lob.

Prunella vulgaris, & 6. Trag.

Conſolida minor, Matth. minima, Cam.

Prunella, Fuch. Ang. Adv. Cæf. Lugd. Camer. Taber. Ger.

Symphytum petraum, Lobel. ico. an & Cord. in Dioſc.

Prun-

*Prunella*, aut potius *Brunella officinarum*, Eyft.  
Flore est purpureo, vel cæruleo punicante: aliquando ex diluto cæruleo albicante, rarius albo: folijs integris nonnunquam leviter crenatis.

II. *Brunella folio laciniato.*

*Symphytum petræum*, Lob.

*Brunella altera*, Dod.

*Prunella secunda*, Clus. pan. & hist. tertia, Tab.

*Prunella altera hirsutior*, Cæf.

*Prunella Lobelij*, Ger.

Flore est purpurei vel carnei coloris, vel cinerei, vel nivei: folijs aliquando solum superioribus, aliquando simul etiâ inferiorib<sup>9</sup> laciniatis.

III. *Brunella Hyssopifolia*: in Phytop. sub 2. descripta.

an *Prunella secunda*, Tab.

an *Prunella flore albo*, Ger.

IV. *Brunella cæruleo magno flore.*

*Prunella cærulea altera*, vel 3. Trag.

*Prunella prima & major*, Clus. pan. & hist.

*Prunella grandiflora*, Cam.

*Brunella cærulea magno flore*, Eyft.

Folij est integris: reperitur & laciniatis: flore saturatius purpurascens, nonnunquam & dilutioris & exalbidi, rarius albi coloris.

V. *Brunella minor alba laciniata.*

*Prunella candida altera*, vel septima, vel fœmina, Trag.

Hæc semipalmaris est, aliquando trium quatuorve unciarum.

## B E L L I S.

**B**ellidem etiam ad *Consolidam mediam*, vel *minorem*, referunt, quam licet aliqui apud *Theophrastum* 7. hist. 9. *Anthemidis foliaceæ speciem* (*Nigellam foliosam Gaza* vocat) velint; *Gracis* tamen indicta videtur. *Plin. lib. 26. cap. 5.* *Bellis* in pratis nascitur flore albo aliquatenus rubente. *Et lib. 21. c. 8. luteus & Bellio pastillicantibus quinquagenis quinque barbulis coronatur.*

I. *Bellis sylv. caule folioso major.*

*Oculus bovis*, Brunf.

*Bupthalmum*, Eid. majus, Lon.

*Bellis major*, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Cæf. Cast. Cam. Ger. Lugd. (cum figura Matth. & Fuchij) Adv. Lob. (cui & *Consolida media vulnerariorum*) Eyft.

*Bellis sylv. Tur. major sylv. Fuch. ico. Gesn. hor.*

*Bellium majus*, Tab.

Folio acutiore est, vel rotundiore: caule & hirsuto & glabro: flore nonnunquam gemino, etiam pleno, sed rarissimè reperitur.

II. *Bellis alpina major rigido folio*: quæ 1. in Prodomo.

an *Bellis alpina*, Cam.

III. *Bellis alpina alba minor*: quæ 2. in Prodomo.

IV. *Bellis montana major folio acuto*: quæ 3. in Prodomo.

V. *Bellis montana folio obtuso crenato*: quæ 4. in Prodomo.

VI. *Bellis sylv. media caule carens.*

*Bellis media*, Matth. Ad. Lugd. Tab. Clus. hist.

*Bellis minor*, Cast.

*Bellis sylv. media*, Gesn. hort. Ger.

*Bellis sylv. Dod. major sylv. Lob.*

VII. *Bellis sylv. minor.*

*Solidago Consolidæ species*, Brunf.

*Primula veris*, Eid. Cæf.

*Bellis minor*, Matth.

*Bellis minor sylv. Fuch. Dod. gal. Tur. Gesn. hor. Lugd. Tab. Ger.*

*Bellis pratensis minor*, Ad.

Flos colore variat: discum enim luteum ambiunt foliola, vel alba, vel ex candido rubra: alia ex albo & rubro mixta: alia intus rubra, in ambitu alba: aliquando in viridem colorem degenerant: reperitur vix uncias duas alta.

*Bellis sylv. minor flore mixto*, &

*Bellis sylv. minor flore pleno rubro*, Eyft.

VIII. *Bellis maritima folijs Agerati*: quæ 5. in Prodomo.

*Bellis hortensis.*

I. *Bellis hortensis flore pleno*, eoque magno, vel parvo.

*Primula veris*, Trag. Gesn. hort.

*Bellis*, Lon. minor, Matth. Lugd. minima, Cast.

*Bellis minor hortensis*, Fuch. Dod. gal. Gesn. hor. Lac. Tab.

*Consolida minor officinarum*, an *Bellis Pliniana*, Ad.

*Bellis hortensis multiplici flore*, Lob. Tab. Ger.

*Bellis minor fl. multiplici albo & rubro*, Eyft.

*Primula veris multiplici foliorum ordine*, Cæf.

Floris colore variat, albo, incarnato, rubro, vario, scilicet candido & rubro: est & fusco: hinc duæ figuræ, apud Lob. & Ger. tres apud *Tabernæmontanum*.

II. *Bellishortensis* prolifera.

*Primula veris*, cujus flores si non citius carpantur, ex se alios generant, ac sæpe ex uno quatuor aut quinque erumpunt, Trag.

*Bellishortensis* suaverubens, viridisque prolifera, Lob. ico.

*Bellis* prolifera, Cam. variegata, Eyft.

III. *Bellis hortensis* pediculo folioso: quæ 7. in Prodomo.

*Bellis cærulea*.

I. *Bellis cærulea* caule nudo.

*Aphyllantes* 3 Lugd.

II. *Bellis cærulea* caule folioso.

*Aphyllantes*, id est frondiflora, Ang. Cam.

*Bellis cærulea*, *Globularia Monspeliensis*, Ad. Lob. Tab. Ger.

*Bellis montana*, Cæf.

*Scabiosa pumilum* genus Clus. hist.

*Bellis minor* flore cæruleo, Eyft.

*Globularia cærulea*, Col.

Variat magnitudine, foliorum latitudine, & caulium altitudine: hinc tres apud Tab. Ger. icones: *Bellidis cæuleæ*, *Apulæ*, & *Monspeliacæ* nomine.

III. *Bellis cærulea spinosa*: quæ pro 6. in Prodomo describitur.

IV. *Bellis cærulea montana* frutescens.

*Bellis montana* fruticosa in Ilva, Cæf.

*Scabiosa quinta*, vel *Scabiosa montana repens*, Clus. pan.

*Scabiosa repens montana*, Cam.

*Scabiosa odorata*, Tab.

*Scabiosa montana minor repens*, sive 10. Clus. hist.

*Bellis lutea*.

I. *Bellis lutea* folijs profundè incisis major.

*Bellis major lutea*, Trag.

*Chrysanthemum*, Dod. Cam. ep. Cast.

*Chrysanthemum* folio virentiore, Cam.

*Chrysanth. segetum* folio multiscisso, Adv.

*Chrysanthemum segetum*, Lob.

*Chrysanthemum arvense*, Tab.

*Chrysanthemum* species 4. Cæf.

II. *Bellis lutea* folijs profundè incisis minor.

*Chrysanthemum minus*, Cam. ep.

III. *Bellis lutea* folijs subrotundis.

*Chrysanthemum* 3. Cæf.

*Chrysanthemum Myconi*, Lugd.

an *Chrysanthemum* folio minus dissecto, Cam. merar.

IV. *Bellis spinosa* folijs Agerati.

*Bellis spinosa* elatior, Lob. ad par. alt.

V. *Bellis montana* globoso luteo flore.

*Globularia lutea montana*, Col.



## S E C T I O T E R T I A.

PILOSELLA; GNAPHALIUM; LEONTOPODIUM; HELI-  
CHRYSUM; STOECHAS CITRINA; CONYZA; ASTER;  
TRIPOLIUM; ALISMA; ET VIRGA AUREA.

## P I L O S E L L A.

**P**ilosella à copiosis pilis quibus vestitur, nomen sortita est, quam aliqui ad *Myosoridem*, alij ad *Holostium* referunt: sunt qui *Intybi* minimam speciem faciant.

I. *Pilosella major* repens hirsuta.

*Auricula muris*, Brunf. *Ericio Cord. alia*, Cord. in Diosc.

*Auricula muris minor*, Trag. Lon.

*Pilosella*, Matth. Ang. Ad. Lob. Cast. Tab.

*Pilosella major*, Fuch. Dod. ut: Lug. media, Th.

*Pilosella* quibusdam *Holostium*, Lac.

*Pilosella repens*, Ger.

II. *Pilosella major* repens minus hirsuta.

*Auricula muris minor* secunda, Trag.

*Pilosella vulgo*, Cæf.

*Pilosella major*, Cam. ep.

*Lactucella sylv. repens*, Cam. hort.

III. *Pilosella major* erecta.

*Pilosella major*, Ger. altera, Tab.

IV. *Pilosella major* erecta altera.

*Pilosella major* prima, Tab.

*Pilosella major* latifolia, Ger. ico.

V. *Pilosella montana* hispida parvo flore.

*Pilosella major umbellifera* *μακρόν ανθ. & montana* & *pratensis*, Col.

VI. *Pilosella* Syriaca.

Pilo-



Pilosella maxima Syriaca, Lob. Lugd. Tab.

VII. Pilosella incana saxatilis lutea.

Auricula muris altera incana saxatilis frigida-  
rum regionum, Col.

## G N A P H A L I U M.

**G**ναφάλιον Dioscoridi lib. 3. c. 132. quod folijs αὐτὶ γναφάλης protomento, ut aitur: Et Plinio lib. 27. c. 10. cui Gnaphalium, quod alij Chamædilon vocant. Verum apud Plinium l. 24. c. 19. habetur herba, Impia, incana, vocata rosmarini aspectu. thyrsum modo vestita atq; capitata, unde alij ramuli assurgunt sua capitella gerentes, ob id Impiam appellatam, quoniam liberi supra parentem excellent, alij potius ita appellatam, quod nullum animaleam attingat, existimavere: hæc Plinius. Sunt qui Gnaphalium vulgare esse velint, & esse quoq; Centunculum ejusdem: Sic autem Plinius l. 24. c. 15. Itali Centunculum vocant, rostratus folijs ad similitudinem capit is penularum, jacentem in arvis, Græci autem Clematidem.

I. Gnaphalium maritimum.

Gnaphalium, Matth. Lobel. Lugd. legitimum, Clus. hist.

Gnaphal. marinum, Ges. hor. Ad Lob. ico. (Cottonaria vulgi sive Bombax humilis) Tab. Ger.

Gnaphalium marinum tomentosum, Lugd.

II. Gnaphalium latifolium Americanum.

Gnaphalium Americanum αἰγυγόνιον, Clus. pan. & hist.

Gnaphalium latifolium peregrinum, Eyst.

Centunculi Americani nomine ex America accepimus, apud quos uti & in Brasilia, apud Toupinambaultios frequens est.

III. Gnaphalium vulgare majus.

Heliochrytos sylv. Trag.

Gnaphalium, Fuch. Ges. hor. Tur. Lac. Cast.

Gnaphalium vulgare, Matr. Ad. Lob. Lug. Tab.

Filago, Dod. ut: Ger.

Centunculus, Tur.

Tomentum, Cord. hist. Lon.

Impia Plinij. Ang. (& Cartafilago) Ges. hor.

Herba Impia, Cæs.

Gnaphalium vulgare minus, Thal.

IV. Gnaphalium medium.

Filago 4. Dod. gal. minor, Dod. lat. Lob. ico.

Gnaphalium medium, Tab. vulgare, Ger.

V. Gnaphalium minus latioribus folijs.

Gnaphalium Plateau tertium, Clus. hist.

VI. Gnaphalium minus repens.

Gnaphalium minimum, Lob. ico. minus, Tab.

Filago minor Ger.

Hoc etiam duarum solùm unciarum reperitur.

VII. Gnaphalium roseum sylvestre.

VIII. Gnaphalium roseum hortense: utrumque in Podromo descriptum.

IX. Gnaphalium minus lato oblongo folio.

Gnaphalium secundum Plateau, Clus. hist.

X. Gnaphal. majus angusto oblongo folio.

Heliochrytos sylvestris, Trag. ico. alt.

Filaginis altera species, Dod. ut:

Filago Germanica altera secundum folia florida, Ad. Lob. ico.

Gnaphalium vulgare majus, Thal.

XI. Gnaphalium majus angusto oblongo folio alterum.

Pseudoleontopodium Matthioli, Lugd.

Gnaphalium Anglicum, vel Belgicum folio longiore. Ad Lob. ico.

Chrysocome Germanica, Lob. obs.

Chrysocome lanuginosa, an Impie species, Lug.

Gnaphalium majus, Tab. Anglicum, Ger.

Gnaphalij genus, Clus. hist.

Leontopodium alterum vulgare, Matth. Cam.

an Herba Impia in montibus, Cæs.

an Chrysocome & Chrysitis, Cast.

Hoc cum à priori parum differat, qui voluerit, idem dicat.

Gnaphalium montanum.

I. Gnaphalium montanum flore rotundiore.

Lagopus secundus, Trag.

Auricula muris, Lon. quarta, Trag.

Pilosella minor, Fuch. Dod. gal. Lugd. Thal.

Lagopiron Hippocratis, Ges. animal.

Gnaphalij genus, Ges. col.

Gnaphalium montanum purpureum & album, Ad Lob. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum suaverubens, &

Gnaphalium montanum variegatum, Eyst.

Variat floribus candidis, subpurpureis, roseis, ex candido & rubro mixtis.

II. Gnaphalium montanum longiore & folio & flore.

Gnaphalium montanum purpureum, & suaverubens, Lob. ico. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum Dalechampij, Lugd.

Pilosella minor, Dod. Clus. hist.

Variat ut prior floris colore; hinc duæ icones apud Lob. Tab. Gerard.

III. Gna-

III. Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca.  
Baccharis Rauvvolfij, Lugd. ap. Clus. hist.

IV. Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo.

an Leontopodium Dioscoridis?

Leontopodium verum, Matth.

Leontopodium Matthioli, Lugd. Tab.

Leontopodium, Dod. Cast.

Leontopodium sive pes leoninus, Ad.

Gnaphalium alpinū, Ger. def. Clus. pan. & hist.

V. Gnaphalium alpinum magno flore folio brevi.

Leontopodium sive pes leonin<sup>9</sup>, Lob. Tab. Ger.

Idem cum priore cenfet Lug. at cū illud radicem habeat magnam, quasi squammosam, folia oblonga: hoc verò radicem tenuem, foliaque brevia, differre statuimus.

VI. Gnaphalium alpinum minus.

Leontopodium parvū, Lob. Lugd. Tab. Ger. def.

Pilosella minor altera.

## LEONTOPODIUM.

**Λ**εοντόποιον Dioscorides l. 4. c. 131. duorum dicit generum & ad amatoria valere, &c. Plinius lib. 26. c. 8. Leontopodij quidem meminit, sed à Dioscoridis diversum censemus: Dioscorides fortè de Gnaphalio alpino intelligendus: quod Gnaphalium à Plinio l. 27. c. 8. Cemos appellari nonnulli existimant.

## HELICHRYSUM.

**Ε**λίσχυρον aut χρυσάνθμον ή αμάραντον Dioscor. l. 4. c. 57. ubi folia Abrotano similia & umbellam auream tribuit. At Theophr. l. 9. c. 21. Ελίσχυρον, id est, aureum colorem habens, (Aureliam Gaza vertit) alijs Coma aurea. Plin. l. 21. c. 25. Heliochrysum, quod alijs Chrysanthemum, & quæ Dioscorides habet.

I. Elichryson folijs Abrotani.

Helichrysum, Matth. def. Cast.

Helichrysum Creticum, Matth. ep. ico.

an Helichryson quod vulgo in Creta, Lagochimithia, quod leporibus cubilia grata præbeat, appellare solent, Bellon.

Elichryson, Ang. Lac. Dod. Lob. Clus. hisp. & hist. Lugd. Cam.

Heliochryson, Ad.

Helichrysum 1. & Helich. 1. altera icon. Tab.

Coma aurea & Helichryson, Ger.

Varietas in folijs advertitur: hinc duæ figuræ apud Taber. & Gerardum.

II. Elichrysum folijs oblongis Stœchadi citrinæ similis, Dod.

Helichrysum, Cam. ep. ico.

Chrysocome peregrina, Eyst.

III. Elichrysum folijs oblongis paucis Stœchadi citrinæ angustioribus.

Helychrysum Cretic. Matth. def. Lug. Cam. ep.

IV. Elichrysum seu Stœchas citrina angustif.

Amaranth. luteus, Fuch. Lac. Lon. citrinus, Tur.

Stœchas citrina, Matth. Lac. Ges. hor. Dod. Cast.

Lugd. officinarum, Tab. desc.

Ageratum Aurelia, Dod. gal.

Heliochrysum, Cord. in Diosc.

Helichrysum, & Amaranthus Galeni, Cæs.

Chrysocome aurea ve coma, Ad. Lob.

Chrysocome prima vulgaris, Clus. hist.

Coma aurea, Lob. ico.

V. Elichrysum Orientale.

an Chrysocome Dioscoridis l. 4. c. 55. & Plinij, cui & Chrysitis l. 21. c. 5. in Phytopynace, Matthiolo & Prodromo descriptum.

Stœchas citrina comis grandioribus, Cam. ep.

Elioichrysum, Belli ep. 1. ad Clusium.

Helichrysum Creticum, Eyst.

VI. Elychrysum Creticum.

Chrysocome 5. vel Cretica, Clus. hist.

VII. Elichryson sive Stœchas citrina latifolia.

Amaranthus & Heliochrysos primus, Trag.

Amaranthus luteus primus, Tab.

Chrysocome sive Amaranthus luteus, Ger.

Variat latioribus & oblongioribus folijs: hinc tres icones.

Amarant. lutei 1. 2. & 3. apud Tab. & apud Ger. sub

Chrysocome. Amarantho Galeni & Heliochryso sylvestri.

VIII. Elychrysum sylv. latifolium capitulis conglobatis.

Chrysocome & Helichrysos sylv. Lob. ico.

Chrysocome montana, Cæs.

Chrysocome altera, Clus. hisp. tertia, peregrina secunda, Eid. hist.

Chrysocome, Tabern. Ger.

IX. Elychryson sylv. angustifolium capitulis conglobatis.

Stœchas citrina altera, Ad. Lob. ico. Lugd.

Ageratum aliud quorundam, Lugd.

Chrysocome, Cæs. altera, peregrina 1. Clus. hist.

Blichry-

Elichrysum Creticum, Cam.

Stæchas citrina, sive Chrysocome Monspeliaca, Taber.

X. Elichrysum sylv. flore oblongo.

Stæchas citrina altera inodora, Ad. Lob. ic. Lugd.

Gnaphalium marinum Dalechampiij, Lugd.

Chrysocome latioribus folijs, Cæf.

Chrysocome quarta, peregrina 3. Clus. hist.

XI. Elichryso sylv. flore oblongo similis: in Phytopynace & Prodromo describitur.

XII. Stæchas viridis capitulo oblongo.

Stæchas viridis Dalechampiij, Lugd.

## C O N Y Z A.

**K**ονύσα Dioscoridi l. 3. c. 136. sic forte dicta, quod κούωνας, seu culices, suo lentore capiat: apud Theophrastum 6. hist. 1. & 2. Pulicariam Gaza vertit, Plinio l. 21. c. 10. Conyza.

Genera tria Dioscoridi: parva, quæ odore præstantior: major, gravi odore: tertium genus medium inter illas, in jucundioris odoris, &c. Theophrasto plura genera, mas & sæmina: hac minor, illa major, Plinio genera duo mas & sæmina, in folio differentia, &c.

I. Conyza mas Theophrasti major Dioscoridis.

Conisa magna, Tur.

Conyza major, Clus. hisp. Dod. Cæsalp. Cast. Camer.

Conyza magna, Lugd.

Conyza major vera, Ad. Lob. ico.

II. Conyza major altera.

Conyza major Dioscoridis Rauvvolffij, Clus. hist.

Conyza Syriæ, Lugd. append.

III. Conyza sæmina Theoph. minor Dioscoridis.

Conyza minor vera, Ges. ap. Ad. Lob. ico. Lugd.

Conyza minor, Clus. hisp. & hist. Cæf. Cast.

Conyza minor, & Eupatorium Mesues, Col.

Conyza minor altera, Dod.

IV. Conyza minor exotica.

Conyza minor Boëtica, Clus. cur. post.

V. Conyza Salviæ odorem spirans.

Planta Bantanica, Clus. exot. l. 4. c. 23.

VI. Conyza major vulgaris.

Conyza major, Trag. Matth. Dod. gal. Ges. hor. Lac. Lon. Cast. Lugd.

Conyza major altera, Dod.

Conyza Helenitis, Cord. hist. Thal.

Baccharis, Matth. Lac. Ion. Tab.

Baccharis Monspeliensium, Ges. hort. Ad. Lob. Lugd. Cam. Ger.

VII. Conyza pannonica lanuginosa.

Conyza tertia Pannonica, Clus. pan.

Conyza tertia Austriaca, legitima fortè Diosc. Eid. hist.

VIII. Conyza cærulea acris.

Tinctorius flos alter, Trag.

Erigeron tertium, Dod. gal. quantum, Eid. lat.

Dentelaria, Ges. hort.

Conyza muralis, Eid. col.

Conyzoides cærulea, Ges. corol. Cord.

Conyza odorata, Lugd.

Conyzæ genus tenuifolium, Thal.

Conyza cærulea, Tab.

Amellus montanus, Col.

Variat folijs, in altera brevioribus & latioribus: in altera longioribus & angustioribus: est & altera erecta, altera repens: flore cæruleo, qui in pappum vel album, vel rufescentem abit.

*Conyza montana.*

I. Conyza cærulea alpina major: quæ 1. in Prodromo.

II. Conyza cærulea alpina minor: quæ 2. in Prodromo.

III. Conyza alpina pilosissima.

Conyza Helenitis pilosa, Lob. ico.

IV. Conyza incana.

Conyza Helenitis mellita incana, Lob. ico.

V. Conyza montana folijs glutinosis pilosis.

Conyza montana Myconi, Lugd.

VI. Conyza montana lutea, folijs oblongis.

Hæc duplex à Thalyo proponitur, nomine

Conyzæ majoris montanæ, &

Conyzæ majoris alterius: hujus posterioris figura à Camerario in suo horto exhibetur.

VII. Conyzis affinis.

Britannica Gesneri & Lugd. Ad. Lob. ico.

Britannica vera Dalechampiij, Lugd.

Bellis lutea Dalech. Lugd.

*Conyza palustris.*

I. Conyza media Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis.

Calaminthæ tertium genus, Fuch.

Conyza, Cord. in Diosc. Tab. altera, Tur.

Conyza media, Matth. Dod. ut: Lac. Ad. Lon. Lob. Lugd. Eyft.

Conyza 3. Matt. ep. Ang. Cast. 3. aquatica, Gef. h.

Conyza 3. vulgaris, Clus. pan. media vulgaris, Eid. hist.

Conyza aquatica, Thal.

Conyza major, Ger.

Mentha lutea, Lon.

Asteri Astico similis altera quæ Cunilago, Cæs.

Cunilæ 3. genus, quæ Cunilago Plin. l. 20. c. 16.

II. Conyza major flore globofo.

Conyza minor, Trag. Matth. Dod. gal. Lac. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Conyza prima, Ang. minor seu fœmina, Lon.

Conyza minima, Ad. (five Pulicaria) Lob. Dod. Lugd. Thal.

Pfyllium, Cord. hist. ico. Conyza, Eid.

Major est & minor.

III. Conyza aquatica laciniata.

Conyza Helenitis folijs laciniatis, Lob. ico.

Conyza Helenitis, Dod. belg.

IV. Conyza palustris ferratifolia.

Conyza aquatica, & aquatica folijs ferratis, Gef. hort. & col.

Conyza maxima ferratifolia, Thal.

Lingua major Dalechampii, Lugd.

Conyza quarta, Cam. ep.

Consolida palustris, Tab.

Solidago Sarracenica, Ger.

V. Conyza aquatica, Asteris flore aureo: quæ 3. in Prodomo.

VI. Conyza affinis Germanica.

Solidago Sarracenica tertia, Trag. Lon.

Herba vulneraria ad fluvium Pfrim, Trag.

Consolida Sarracenica tertia, Tragi, Lugd.

Conyza nomine posita in Cordi historia.

## A S T E R A T T I C U S.

**A** *ἄστυς ἀττικός* Dioscoridi l. 4. c. 120. *florem habet in cacumine purpureum, aut luteum, per ambitum anthemidis capituli modo divisum, foliis stellæ modo radiatis.* Plin. l. 27. c. 5. *Aster, ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam Inguinum (sc. inflammationi) præsentaneum remedium est: in cacumine capitula stellæ modo (hinc Asteris nomen) radiata, &c.*

*Aster Atticus luteus.*

I. Aster luteus foliolis ad florem rigidis.

Aster Atticus alter, Matth. Lugd.

Aster Atticus verus, Ang. Gef. hor.

Aster, five Stella Attica Monspeliensium aureo flore, Ad.

Aster Atticus, Lob. (cui & Inguinaria) Ger. luteus, Cam.

Aster Atticus primus flore luteo, Clus. hisp. vel

Aster atticus legimus, Clus. hist.

Aster æsticus, Cæs.

Aster luteus alter, oculus Christi minor, Lugd.

Oculus Christi, Eid.

Aster atricus Mafilioticus, Tab.

Est latifolius: est & angustifolius.

II. Aster atticus folijs circa florem mollibus. Aster cernuus, Col.

Baccharis vel Carpesium Alpini, quo nomine accepimus.

III. Aster luteus radice odora.

Incensaria, Cæs.

Asteris altera species Apula, an Baccharis, Col.

Baccharis vera Dioscoridis, Malocho, hoc nomine accepimus.

an Aster luteo flore, Cam. ep.

IV. Aster luteus major folijs succisæ.

Aster primus, vel pannonicus major, Clusius pannon.

Aster tertius five Austriacus 1. Eid. hist.

V. Aster luteus hirsuto Salicis folio.

Aster pannonicus tertius, Clus. pan. at quintus, in histor.

Aster flore luteo, Tab.

Aster hirsutus, Ger. ico.

VI. Aster montanus luteus Salicis glabro folio.

Aster atticus secundus, Clus. pan. at quartus five Austriacus secundus, Eid. hist.

Bellis lutea, Lugd.

Bubonium luteum, Tab.

Aster Italorum, Ger.

VII. Aster luteus foliis glabro & crenato.

Aster Italorum, Ad. Lob.

Aster atticus, Dod. atticus Italorum, Clus. pan.

Aster octavus Italorum, Eid. hist. ico.

VIII. Aster luteus angustifolius.

Aster conyzoides Gesneri, Lob. Lugd.

Aster æsticus tertius, Cæs.

IX. Aster

IX. *Aster luteus linariæ rigidoglabro folio.*

*Aster atticus quartus, Clus. pan. desc.*

*Aster sextus, Austriacus 4. Eid. desc.*

X. *Aster montanus luteo magno flore.*

*Aster montanus, Ad. Lob. ico. Ger.*

*Aster montanus luteus mas, Tab.*

*Aster atticus alpinus foliolis luteis, Cæs.*

XI. *Aster atticus luteus montanus villosus magno flore.*

*Aster montanus hirsutus, Ad. Lob. ico. Lugd.*

*Aster luteus sive oculus Christi minor, Eid.*

*Aster montanus luteus femina, Tab.*

XII. *Aster luteus supinus.*

*Aster atticus supinus, Clus. hisp. (at in hist. secundus) Dod. Lob. Lugd.*

*Aster atticus repens, Cam.*

*Aster Atticus cæruleus.*

I. *Aster atticus cæruleus vulgaris.*

*Tinctorius flos primus, Trag.*

*Aster atticus, Matth. (cui & Amellus,) Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. desc. Gesn. hort. Lac. Lon. Clus. pan. Cast. Lugd.*

*Aster Atticus, Amellus non est, Guil.*

*Aster atticus purpureus, Fuch. ico.*

*Aster atticus 1. Dod. cæruleus, Thal. Cam.*

*Aster Italorum purpurascens, Lob.*

*Aster cæruleus Italicus, sive 8. Clus. hist.*

*Aster atticus minor flore cæruleo, Eyst.*

Hujus differentiae duæ: est latifolius & angustifolius, & hujus pumilum genus: Sic qui

maturius florere, minùs altè asurgit, quàm qui seriùs: communiter cæruleis, aliquando purpureis foliolis orbis luteus cingitur: rarissimè totus albus reperitur. Aliquando caulibus est altioribus & folijs latioribus, qui dicitur *Aster atticus major flore cæruleo, Eyst.*

II. *Aster hirsutus Austriacus cæruleus magno flore, folijs subrotundis: in Prodromo descriptus.*

III. *Aster montanus cæruleus magno flore, folijs oblongis.*

*Aster atticus quintus, sive Amellus alpinus, qui Virgiliano respondere videtur, Clus. pan.*

*Aster septimus sive Austriacus 5. vel Aster alpinus cæruleo flore, vel 7. Eid. hist.*

*Aster purpureus montanus, Lugd.*

*an Anthyllidi secundæ similis, Cæs.*

Magnitudine variat: nam in monte Jura, duarum triumve unciarum reperitur, cum alias palmam superet.

IV. *Aster atticus alpinus alter.*

*Aster atticus cæruleus alpinus, Cam. ep.*

Est omnino minor vulgari, & interdum globulitumens villosi foliolis ad radicem adnascuntur.

V. *Aster Tripolij flore.*

*Aster minor Narbonensium Tripolij flore, Linariæ folio medio purpureus, Ad. Lob. ico.*

*Aster Linariæ folijs Narbonensis, Lob.*

*an Anthyllis altera, Cæs.*

## TRIPOLIUM.

**T**ριπόλιον (quasi dicas ter canum seu canescens) Dioscoridis l. 4. c. 135. cujus flores (ut tradunt, inquit) colorem ter die mutant, manè candidi, meridie purpurei, serò puniceis conspiciuntur.

I. *Tripolium majus cæruleum.*

*Tripolium, Dod. ut: Lugd. Cam.*

*Tripolium littorum, Ad.*

*Tripolium vulgare, Lob. Lugd. Eyst.*

*Amelli species palustris, Col.*

Flos purpureus, medio luteus aut croceus: aliquando in eodem medio & luteus & puniceus, ambitu purpureo, qui colores in omni flore se-

nescente conspiciuntur. Luteis etiam floribus Lobel. observavit: Folijs quoque in summitate profunde in aliquot ferras divisus notavimus.

II. *Tripolium minus: & Lob. & Lugd.*

Magnitudine solum à priore differre videtur.

III. *Tripolium minus alterum.*

*Anthyllis minor, Cord. obs.*

*Tripolium minus, Cam.*

## ALISMA SIVE DAMASSONIUM.

**A**λίσμα sive Δαμασκόλιον Dioscorides l. 3. c. 169. folijs dicit plantaginis sed angustioribus. &c. quem Plinius imitatus l. 25. c. 10. cum duplex, alterum laciniosis angustis, alterum majoribus folijs in sylvis. &c. Quid verò sit, magna inter authores controversia, alijs Plantaginem, alijs Calceolum Mariae, alijs Digitalem, alijs Mentham grecam, alijs aliam statuentibus. Verum cogitandum, an non Dioscoridis & Plinii primum Alisma, sit Santicula alpina, qua Auricula Ursi dicitur: quemadmodum Plinius secundum ipsum Verbasculum. In Phytopyrace duplex Alisma proposuimus: primum sub Alismate folio glabro, quod nunc ad Gentianas retulimus: alterum folio hirsuto, de quo inter Doronici species egimus.

## VIRGA AUREA.

**V**irga aurea, quæ à forma & floris colore luteo nomen habet, ab alijs propter vires & Solidago & Consolida vocatur. Quibusdam Panax Chironium Theophrasti 9. hist. 10. & Plinij l. 25. c. 4. Panax Pharnacium & Phanax Chironium folio Lapathij, censetur: alijs Cunilago Plinij, Panaces dictum: & quia folia aliquando maculata observantur, sunt qui Leucographum Plinij, l. 27. c. 11. autumant.

## I. Virga aurea major, vel Doria.

Doria, fortè Panaces Chironium, Gesn. hort.

Dorea Narbonensis, quasi Aurea, Ad. Eyf.

Herba Doria, Lob. Cæs.

Dorea sive herba aurea, Lugd.

Limonium aliud, Lugd.

Panax Chironium Theophrasti, Tab.

Herba aurea Penæ & Lobelij, Lugd.

Variat folijs, ijsque integris non ferratis, qualia sunt cum primum erumpunt, & cum in hortis celitur: vel ferratis, aculeo folij summitati insidente, quemadmodum Monspeffuli observavimus: hinc duæ figuræ in Lobelij iconibus & in Lugdunensi historia.

## II. Virga aurea larifolia serrata.

Virga aurea, Cam. ep. Thal. Villanovani, Ger.

Virga aurea vulgo dicta, Cæs. ferratis fol. Tab.

Virga aurea altera ferrato folio, Lob.

Virga aurea margine crenato, Dod.

Virga aurea altera, Lugd.

Virga aurea minor laciniatis folijs, Cam.

an Consolida Sarracenica major, Lugd.

Variat folijs longioribus, latioribus, brevioribus, ferratis tamen: & quandoque folia lineis albis notantur.

## III. Virga aurea angustifolia serrata.

Solidago, Ang.

Solidago Sarracenica, Trag. Fuch. Dodon. ut: Lon. Ad. Lob. Lugd.

Virga aurea, Gesn. hort.

Consolida Sarracenica, Thal. Eyf.

Consolida aurea, Tab.

Herba Doria, Ger. ico.

Est latioribus & angustioribus folijs: ex Anglia habemus folio niveo & bicolore.

IV. Virga aurea angustifolia minus serrata. Virga aurea, Matth. Dod. ut: Lon. Lugd. (qui & Matth. & Dodonæi figuram exhibet) Cast. Ger. Eyf.

Virga aurea Villanovani, Ad. Lob.

Virga aurea folijs non ferratis, Cam. ep.

Virga aurea Broccenbergensis, Thal.

Virga aurea major angustifolia, Cam.

Virgæ aureæ alterum genus, Cæs.

Leucographis Plinij, Ang.

Symphytum petræum 3. Tab.

Variat folijs, quæ sæpè sine crenis, aliquando saltem minus conspicitis serrata sunt: sic folijs oblongis, aliquando subrotundis & flore luteo, rarius albo: hinc tres figuræ apud Tabernam. Symphyti petræi 1. 2. & 3. nomine.

## V. Virga aurea magno flore.

Consolida aurea nemorum, Limonij folio, Ad. Lob. ico.

VI. Virga aurea montana serrata magno flore, quam Plantaginis alpinæ nomine in summitate montis Calcaris circa tuguriola collectam, habemus.



## SECTIO QUARTA.

VERBENA; SUCCISA; SCABIOSA; JACEA; STOEBE;  
CYANUS; TRAGOPOGON; SCORZONERA; CALTHA;  
HELENIMUM; FLOS SOLIS.

## VERBENA.

**V**erbena ῥῶδαρνα sive περιστερῶνα (apud Pausaniam ἀειρερῶνα) folia habet quernis similia, sed angustiora minoraq; colore aliquatenus glauco, &c. Sacra herba dicta, quod in expiationibus ad amuletum sit perutilis, Dioscoridi lib. 4. cap. 61. Sic verò Plinius lib. 25. cap. 9. Nulla Romana nobilitatis plus habet, quam Hierobotane: aliqui peristereon, nostri Verbenacam vocant: hac est, quam legatos ferre ad hostes indicavimus: hac Jovis mensa verritur, domus purgantur, lustranturq;.

*Genera ejus duo sunt Plinio l.c. foliosa, quam fœminam putant: mas rarioribus folijs, &c. folia minora quàm quercus colos glaucus, &c. quidam unum omnino genus faciunt, quoniam utraq. eodẽ effectus habeat, &c.*

### I. Verbenã communis cœruleo flore.

Verbenã mascula, Brunf.  
Hierobotanẽ mas, Eid.  
Columbaris, Herm. Barbaro.  
Verbenã, Gefn. hort. Lon. recta, Trag.  
Verbenacã, Matth. Lac. Cast. vulgaris, Lugd.  
Verbenacã supina (& fœmina) Fuch. Cord. in  
Verbenã sive Verbenacã, Guil. pap. (Diosc.  
Verbenacã recta, Dod. ut: Lugd. Tab.  
Verbenã communis & sacra recta, Ad. Lob.  
Verbenacã fœminã, Cæs. Cam. vulgaris, Cl. hist.

Herba sacra, Ang. Tur.

Floribus est cœruleis, quandoque albidis.

### II. Verbenã tenuifolia.

Verbenacã supina, Clus. hisp. Dod. Lugd. Tab.  
Sacra Verbenã Hispanicã minor, Lob.  
Verbenã supina, Clus. hist.

III. Verbenã Peruana, quæ Hispanicæ similis, ex Monardi, Lugdunensis refert.

IV. Verbenã nodiflora, in Phytopinace, Matthiolo & Prodromo descripta.

Verbenacã nodiflora, Imperato.

## SUCCISA SEU MORSUS DIABOLI.

**S**uccisa dicitur, quod ejus radices circumrosa sint: vulgus enim credit, Dæmonem cum tantæ efficacie radicem hominibus invidet: eam statim ubi succreverit, undique circumrodere: quare Morsus diaboli dicitur. Sunt qui Geum veterum censent: at Columna videtur Pycnocomon Dioscoridis lib. 4. cap. 176. alijs Nigina Plinij lib. 27. cap. 12. Herba, inquit, quæ vocatur nigina, tribus est folijs longis intubaceis: Alij ad Scabiosas: alijs ad Jaceas referunt.

### I. Succisa glabra.

Jacea nigra, Brunf.  
Morsus diaboli, Eid. Trag. Dod. gal. Gefn. hort.  
Lac. Ad. Lob. Lon. Lugd. Cam. Tab. Ger.  
Succisa, Matth. Fuch. Dod. Cast.  
Scabiosa folio integro, Cæs.  
Pycnocomon, Col.

Folij est glabris & integris, rarius laciniatis: floribus cœruleis, rarius purpureis, vel incarnatis, rarissimè albis: est etiam major & minor.

II. Succisa hirsuta, quæ à priore sola hirsutie differt.

Morsus diaboli hirsuta rarior, Gefn. hort.

## S C A B I O S A.

**S**cabiosa, alijs à scabro herbæ habitu (quod vulgata convenit) alijs quòd scabiei medeatur, quod vox Pfora præterendere videtur: quare Végar Aetij aliqui censent: Sunt qui ad Staben Dioscoridis l. 4. c. 12. referant.

Scabiosa pratensis & arvensis.

### I. Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum.

Scabiosæ primum genus, Trag.  
Scabiosa, Lac. desc. Lon. vulgaris, Fuch. communis, Dod. gal.  
Scabiosa altera campestris seu segetum, Lob. ico. Ger.  
Scabiosa major, Cast. arvensis, Tab. vulgaris,  
Scabiosa folio scisso, Cæs. (Eyst.  
Scabiosa major flore ex cœruleo purpureo, Tab.  
Huc referenda est

Scabiosa major satorum vulgarior, Ad. Lob.

Scabiosa vulgaris major, Dod. Lugd.

Scabiosa dissectifolia major, Thal.

Variat folijs modo crassius, modo tenuius utrinque divisus: flore ex cœruleo, purpureo, vel bresilico colore tincto: hinc duæ apud Tab. & Gerardum figuræ.

Scabiosa major, flore ex cœruleo purpureo, Tab.

### II. Scabiosa major squammatis capitulis.

Scabiosa, Brunf. quinta, Trag.  
Scabiosa major, Matth. Lugd. Cam. Clus. hist.  
Jacea nigra major laciniola, Ad.

Scabiosa major flore purpureo, Tab. Ger.

Cyanus sylv. major arvensis, Thal.

Floribus est ex purpura subrubentibus: repetitur floribus paucioribus, minoribus, fl. candido: folijs altera latioribus, altera angustioribus.

III. Scabiosa major altera, squammatis capitulis, sive Jacea rubra latifolia laciniata.

Jacea tertia, Tab.

Jacea major, Ger.

### IV. Scabiosa fruticans latifolia alba.

Scabiosa nona sive æstivalis, Clus. hist.

Flos vel candidus, vel cœruleis staminibus ornatur, vel liver, vel ad cœruleum inclinatur.



V. *Scabiosa fruticans angustifolia alba*.  
*Scabiosa montana calidarum regionum*, Adv.  
 Lob. Lugd.  
*Scabiosa quarta & major Pannonica*, Clus. pan.  
*Scabiosa major Pannonica albo flore*, vel 8. Eidem hist.

*Scabiosa maxima leucanthemos*, Cam.  
*Scabiosa montana*, Tab.

VI. *Scabiosa angustifolia alba altera*.  
*Scabiosa major alba*, Tab.  
*Scabiosa montana*, Ger. ico.

VII. *Scabiosa multifido folio flore flavescente*.

*Scabiosa tertia*, Clus. pan.  
*Scabiosa seprima* vel *ὀχρόλουνος* flore, Eid. hist.  
*Scabiosa tenuifolia*, sive major, sive 7. Thal.  
*Scabiosa lutea* è Thuringia, Cam.  
*Scabiosa Pannonica flore albo*, Eyft.

VIII. *Scabiosa flore globofo niveo*.  
*Scabiosa alba in hortis Belgij*, Clus. hist.  
*Scabiosa Belgica flore albo*, Eyft.

IX. *Scabiosa alba gemino capite*.  
*Scabiosa alba gemino tergeminove capite*, Clus. hist.

Flore purpurascens, vel incarnato, huic non absimilem, in Bavaria Camerarius observavit.

X. *Scabiosa prolifera folio latiore*.  
*Scabiosa prolifera*, Lob. ico. Tab. prolifero flore, Clus. hist.

XI. *Scabiosa prolifera folijs Gingidij*: quæ 3. in Prodomo.

XII. *Scabiosa tenuifolia prolifera minor*.  
*Scabiosa tenuifolia minima prior*, Eyft.

XIII. *Scabiosa folio Sinapi sylv.* quæ 2. in Prodomo.

*Scabiosa montana.*

I. *Scabiosa alpina folijs Centaurij majoris*.  
*Scabiosa alpina maxima*, Ad. Lob. ico. Tab.  
*Centaurium nothum Dalechampi*, Lugd.  
*Scabiosa alpina Centauroides*, Cam. Eyft.

II. *Scabiosa montana glabra, folijs Scabiosæ vulgaris*.

*Scabiosa secunda vel alpina*, Clus. pan.  
*Scabiosa quinta sive montana*, Eid. hist. desc.

III. *Scabiosa montana Dentis leonis folio*: quæ 4. in Prodomo.

IV. *Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima*.  
*Scabiosa latifolia purpurascens flore*, Clus. pan. sive 4. Eid. hist.

V. *Scabiosa latifolia rubra non laciniata secunda*.

*Scabiosa prima, vel latifolia rubro flore*, Clus. pan.

*Scabiosa rubra Austriaca*, Lob. ico.

*Scabiosa integrifolia prima*, Thal.

*Scabiosa tertia vel latifolia Pannonica rubro flore*, Clus. hist.

*Scabiosa Succisæ similis*, Cæs.

*Scabiosa latifolia septima*, Tab.

VI. *Scabiosa Virgæ pastoris folio*.

*Scabiosa latifolia peregrina*, Tab.

VII. *Scabiosa argentea angustifolia*: quæ 6. in Prodomo.

an *Scabiosa gramminea folio argenteo flore purpureo*, Cam.

VIII. *Scabiosa montana minor capitulo squammoso*.

*Scabiosa montana omnium minima*, Adv. Lob. ico. Lugd.

*Scabiosa æstiva minor*, Lob.

*Scabiosa montana minor septima*, Tab.

*Scabiosa capitulo globofo.*

I. *Scabiosa peregrina rubra capitulo oblongo*: quæ 1. in Prodomo.

*Scabiosa Indica sive sexta*, Clus. hist.

*Scabiosa Indica flore saturatè rubro*, &

*Scabiosa Indica flore dilutè rubro*, Eyft.

Hanc folijs in tenuiores lacinias divisiss, florequè minore & rubro, nomine *Scabiosæ nigre* odore Zibethi, ex horro Patavino habemus.

II. *Scabiosa capitulo globofo major*.

*Scabiosa quinta & sexta*, Trag.

*Scabiosa minor*, Marth. Lob. (cui & *Columbaria*) Lugd. Cast.

*Scabiosa minor lævis*, Gesn. hort.

*Scabiosa media*, Dod.

*Scabiosa media serrato angustifolio, flore globulariæ*, Ad.

*Scabiosa 20 fœmina herbariorum*, Tab.

*Scabiosa folijs bellidis sylvestris majoris, major*, Thal.

*Scabiosa quinta sive montana*, Clus. hist. ico.  
*Phyteuma Dioscoridis*, Col.

III. *Scabiosa capitulo globofo minor*.

*Scabiosæ folijs bellidis species minor*, Thal.

*Scabiosa minor*, 1. 2. 3. 5. Tab.

*Scabiosa media, minima, minor & major*, Ger. ico.

*Scabiosa angustifolia flore subcæruleo*, Eyft.  
 Folio-

Foliorum dissectionibus variant, cum alteri ad medium nervum tenuissimè dissecta sint, alteri non item: tertia folia inferiora penitus dissecta non habet.

IV. Scabiosa capitulo globoso folijs in tenuissimas lacinias divisiss.

Scabiosæ tenuifoliæ species altera, Thal.  
an Scabiosa tenuifolia flore cæruleo, Eyf.

V. Scabiosa minor capitulo globoso odore, Phyteuma minus, Col.

*Scabiosa stellata.*

I. Scabiosa stellata folio laciniato major.  
Scabiosa Hispanica major, Clus. hisp. & hist.  
Lob. Lugd Tab Ger.

Scabiosa peregrina, Dod. Cæs.

Scabiosa Hispanica, Cam. Eyf.

II. Scabiosa stellata folio laciniato minor, sive maritima.

Scabiosa Hispanica minor, Clus. hisp. & hist.

Scabiosa Hispanica minor, vel altera, Lugd.

Scabiosæ peregrinæ alteræ species, Dod.

Hæc si in hortis colatur pedalem altitudinem excedit.

III. Scabiosa stellata minima: quæ 5. in Prod.

IV. Scabiosa stellata folio non dissecto.

Scabiosa peregrina, Lob. Lugd. Ger.

Scabiosa arborescens, Cæs.

Scabiosa peregrina folijs non dissectis, Tab.

Scabiosa arborea Cretica, Ponæ.

Habet Camerarius Scabiosam Gallicam folio oblongo, tenui, nigricante, nitido: sed nostræ folia incana sunt.

## J A C E A.

*Jacea adæo Scabiosæ similis est, ut eam Scabiosam nominare soleant: sunt tamen qui velint Hyosiridem esse Plinij l. 27. c. 11. quam Intubo similem sed minorem, & tactu asperiores, scribit.*

*Jacea non laciniata.*

I. Jacea nigra pratensis latifolia.

Scabiosa vulgaris pratensis, vel 4. Trag.

Centaurij pratensis species, Gesl. hort.

Gethia nigra Scaligeri, Eid.

Jacea nigra, Eid. Tab. Ger. flore purpureo, Eyf.

Cyanus sylv. angustifolius, Thal.

Jacea alia nigra, Lugd.

an Solidago Sarracenica altera, Lon.

Hujus folia inferiora quâdoq; laciniata sunt: quæ & floribus albis pingitur in hort. Eyf.

II. Jacea nigra angustifolia, vel Lithospermia: venis folijs: quæ 1. in Prodomo.

Variat: alia caule lævi, eoq; cum folijs virente: alia caule aspero rufescente, vel molli tomento vestito, folijsq; incanis.

III. Jacea fruticans pini folio.

Stæbe capitata tofmarini folio, Ponæ.

Chamæpitys fruticosa Cretica Belli, Eid.

Chamæpitys Berthiolo.

IV. Jacea integrifolia humilis: quæ 2. in Prodomo.

V. Jacea nigra squammoso capite major.

Jacea Austriaca prima, Clus. pan.

Jacea squammato capite montana prima, Eid. hist.

VI. Jacea nigra squammoso capite minor.

Jacæ Austriacæ primæ aliud genus, vel Jacea montana squammoso capite minor, Clus. pan.

Jacea squammato capite montana 2. Eid. hist.

VII. Jacea latifolia capite hirsuto.

Jacea Austriaca secunda, vel Jacea montana villoso capite elatior, Clus. pan.

Jacea Austriaca villoso capite, sive 4. elatior, Eid. hist.

Jacea pannonica capitulo crispo, Camerar. in Thal.

Cyanus sylv. montanus integrifolius, &

Cyanus sylv. *πυρροχλωρόφυλλος*, Thal.

VIII. Jacea angustifolia capite hirsuto.

Jacea montana villoso capite humilior, Clus. pan. vel quinta, Eid. hist.

IX. Jacea alba hirsuto capite.

Jacæ Austriacæ majoris villoso capite flore albo, nomine, D. Fürerus Northusa misit.

*Jacea laciniata.*

I. Jacea nigra laciniata.

Jacea nigra, Dod. ut: Lugdunens. vulgaris, Ad. Lobel.

Hyosiris Plinij, Ang.

Jacea Austriaca tertia, Clus. pan. at sexta in hist.

Jacea pannonica Clusij hirsuto capite, Cam.

II. Jacea humilis alba Hieracij folio.

Jacea pumila, Ad. Lob. ico.

Jacea humilis Hieracij folio, Lugd.

Flore est albo: aliquando ex cæruleo obsoleto purpurascit: Est major & minor.

III. Jacea laciniata squammata.

Jacea

Jacea squammato capite tertia Cretica, Clusij hiftor.

IV. Jacea laciniata lutea.

Jacea montana minima tenuifolia, Col.

V. Jacea latissimo laciniato folio: sub Jacea Babylonica in Prodomo descripta.

*Jacea laciniata capite spinoso.*

I. Jacea capite longis aculeis spinoso: quæ 3. in Prodomo.

II. Jacea lutea spinosa Centaurioides.

Jacea lævis maxima centaurioides Apula, Col.

III. Jacea lutea capite spinoso.

Jacea major lutea, Ad. Lob. ico. Lugdun. Tab. Ger. Eyft.

Jacea lutea, Clus. hisp. & hift. Lugd. desc.

Spina solstitialis altera, Dod.

Carduus stellatus capitulis spinosis, Lob.

Carduus eriocephalus Dodonæi, Lugd. ico.

IV. Jacea Cyanoides echinato capite.

Jacea major folio multum laciniato, Ad.

Jacea major, Lob. Lugd.

Cyanoides flos, Dod.

Cyanoides major, Tab.

Jacea montana echinato capite, Clus. pan. & hift. five 7.

Stæbe Salmantica secunda, Clus. hift. ico.

Flos purpurascens, rarius albus: rarissime luteus.

V. Jacea folijs Seridis candicantibus, purpurea.

Jacea altera, Clus. hisp.

Jacea purpurea Valentina muricato capite, Clus. hift.

VI. Jacea laciniato Sonchi folio, sive Jacea latifolia purpurea capitulo spinoso: quæ 4. in Prodomo.

VII. Jacea minor folijs aculeatis: Cyani majoris nomine missa.

*Jacea laciniata incana.*

I. Jacea tomentosa capitulo spinoso: quæ 2. in Prodomo.

II. Jacea montana incana mollis capitulis hispidis: quæ 6. in Prodomo.

III. Jacea montana incana aspera capitulis hispidis: quæ 5. in Prodomo, qui volet has duas conjungat.

IV. Jacea montana candidissima Stæbes folijs, quæ in Phytopinace & Matthiolo sub Jacea incana laciniata: at in Prodomo sub 7. describitur.

V. Jacea montana incana capite pini. Chamæleon non aculeatus, Advers. Lobel. icon.

Jacea montana, acanophora, Lugd.

Jacea alia pumila sive varia, Cam.

VI. Jacea montana incana odora.

Jacea montana Narbonensis, Lob.

Jacea muscata & quinta, Tab.

Jacea montana, Ger.

*Jacea oleæ folio.*

I. Jacea incana Cyani capitulis.

Jacea incana altera Cyani aut Jaceæ capitulis, Advers.

Stæbe incana altera, Lob. ico.

Jacea incana, Lugd.

Cyano similis quædam, Cæf.

II. Jacea oleæ folio capitulis simplicibus.

Parmica altera, Marth. Lugd.

Parmica, Lac. Cyano similis, Cæf.

Parmica Austriaca, Lob. Clus. pan. & hift. Dod. Cam. Ger.

III. Jacea oleæ folio minore flore.

Parmicæ Austriacæ species, Clus. cur. post.

IV. Jacea oleæ folio capitulis compactis.

Jacea pusilla incana altera folio oleæ, Lob.

Jacea incana folio oleæ, Lugd.

V. Jaceæ oleæ folio affinis.

Doricnyum Dioscoridis fortè, Ponnæ Ital.

Lagochimicæ nomine, semine ab Honorio Belli ex Creta misso, in horto Anno 1600. crevit.

## S T O E B E.

Σ *Tois* vulgaris est notitie, Dioscoridi libr. 4. cap. 12. Plinio libr. 22. cap. 11. Stæbe quam aliqui Phleon. At libr. 21. cap. 15. quadam spinam in folio habet & in caule, ut Phleos quod aliqui Stæben appellavere: ob quam utriusque brevitatem quid statuendum sit, dubium sanè: nihilominus tamen recentiorum aliqui, subsequentibus plantis id nominis tribuunt, quod extrema folia utcumque aculeata sint, quas tamen alij ad Cyanos, alij ad Centauria propter amorem referunt, ad confusionem vitandam, Stæbes nomen servabimus.

*Stœbe folijs laciniatis.*

I. Stœbe major folijs Cichoraceis, mollibus, lanuginosis.  
 Stœbe Salmantica prima, Clus. hisp. & hist.  
 Stœbe Salmantica major, Lob.  
 Aphyllanthes prima, Dod.  
 Scabiosa, seu Stœbe Salmantica prior, Lugd.  
 Stœbe major, Tab.  
 Stœbe argentea minor, Ger.  
 Stœbe Hispanica, Cam.

II. Stœbe major folijs Erucae mollibus lanuginosis.

Stœbe Salmantica primæ altera species, Clus. hisp. Lugd.  
 Stœbe Salmantica secunda, Clus. hist.  
 an Stœbe argentea incana Aldroandi, Lob.  
 Aphyllanthes tertia, Dod.

III. Stœbe major calyculis non splendentibus.

Centaureum majus in muris, Gesl. hor.  
 Stœbe Salmantica alterius altera species, Clus. hisp. Lugd.

Jacea, sive Stœbe gallica, Clus. pan.  
 Stœbe Gallica & Austriaca elatior, Eid. hist.  
 Cyanus sylv. tenuifolius, Thal.  
 Jacea alba, Lugd.

IV. Stœbe viridis calyculis argenteis: in Prodromo.

V. Stœbe calyculis argenteis.

Stœbe Salmantica altera, Clus. hisp. Lugd.

Stœbe Salmantica tertia, Clus. hist.

Stœbe argentea Salmantica minor, Lob.

Aphyllanthes quarta, Dod.

Stœbe minor, Tab.

Stœbe argentea major, Tab.

an Stœbe, Ang.

an Papaver spumeum, Cæs.

VI. Stœbe calyculis argenteis minor.

Jacea alba, Tab.

Jacea flore albo, Ger.

VII. Stœbe incana Cyano similis tenuifolia.

Centaurei majoris species minor, Gesl. col.

Cyano minori similis, Clus. pan.

Stœbe Austriaca humilis, Eid. hist.

an Papaver spumeum aliud in saxosis, Cæs.

VIII. Stœbe rubra Monspeliaca parvis Cyani capitulis: vel Jacea rubra angustifolia laciniata.

Jacea rubra major laciniosa, Lugd.

IX. Stœbe squammis asperis.

Aphyllanthes secunda, Dod.

*Stœbe non laciniata.*

I. Stœbe spinosa maritima.

Stœbe ex Cod. Cæsareo, Dod.

Stœbe peregrina, Clus. hist. ap. alt. aust.

Cyanus spinosus Creticus, Ponæ Ital.

II. Sphæritis ex Codice Cæsareo, Dodon. quid?

## C Y A N U S.

**C**yanus, à floribus cyaneo seu caeruleo colore, nomen accepit. Plinius libr. 21. cap. 8. de vestium amulatione cum floribus agens, ait, in nomine est & Cyani color: & cap. 11. Rosam Cyanus excipit Cyanum Amaranthus. At Hermolaus, Lencium Dioscoridis censuit: & Casalpino, Struthium apud Theophrastum ex hoc genere videtur: verum Columna, Papaver Heracleum Theophrasti & Dioscoridis statuit: Lobelius num Chondrilla species sit dubitat.

I. Cyanus montanus latifolius: vel Verbaſculum Cyanoides.

Verbaſculum, Trag.

Cyanus major, Matth. Dod. ut: Lob. Lugd. Cast. Cam. Ger. Eyft.

Cyanus major hortensis, Ad.

Cyanus montanus, Gesl. hor. Tab.

Cyanus sylv. Lon. flore grandi, Cæs.

Flore est magno cæruleo, aliquando umbilico purpureo: rarius flore albo est.

II. Cyanus segetum.

Lychnis agria, & Flos frumenti, Brunf.

Baptifecula, Trag.

Cyanus, Dod. gal. Turn. Gesl. hort. Lon. Cæs. flos, Dod.

Cyanus major, Matth. Lugd. Cast. Cam.

Cyanus sylv. Fuch.

Cyanus vulgaris, Ad. Lob. Ger.

Cyanus cæruleus, Tab. arvensis cæruleus, Thal. Eyfterr.

Papaver Heracleum. Col.

Flos communiter cæruleus, rarius albus.

III. Cyanus hortensis flore simplici.

Floris colore variat, cæruleo, purpureo, hicq; aliàs dilutè rubro & incarnato, aliàs ad puniceum inclinante, aliàs vario, violaceo, albo, & ex

Mm

his

his coloribus mixto: hinc figuræ quatuor apud Tabernæmontanum & Gerardum.

1. Cyanus cæruleus sativus, Tab. sub Cyano variegato apud Ger.

2. Cyanus purpureus, Tab. Ger.

3. Cyanus albus, Tab. Ger.

4. Cyanus ex albo violaceus, Taber. Cyanus violaceus, Ger.

Sic apud Eyst. flore purpureo, incarnato, rubro, albo, albo fundo purpureo, variegato.

IV. Cyanus hortensis flore pleno.

Cyanus flore multiplici, Lob. ico.

Cyanus multiflorus, Tab. Ger.

Variat floris colore purpureo, albo, medio purpureo: hinc duæ figuræ apud Lob. & Ger. tres apud Taber.

1. Cyanus fl. purpureo multiplici, Lob. ico.

Cyanus purpureus multiflorus, Tab. Ger.

2. Cyanus flore albo multiplici medio purpureus, Lob. ico.

Cyanus albus multiflorus medio purpureus, Tabern.

3. Cyanus cæruleus multiflorus, Tab.

V. Cyanus repens latifolius.

Cyanus peramarus supinus capitulis squarosis Sesamoidis parvi, Ad. Lob.

Cyanus repens, Lob. ico. supinus, Lugd.

Cyanoides minor altera, Tab.

VI. Cyanus repens angustifolius.

Cyanus repens alter, Lob. repens, Lugd.

Cyanus minimus, Ad. repens, Lob. ico.

Cyanoides minor, Tab.

## T R A G O P O G O N.

**T**ραγοπωγων ἢ τριεπωγων, ἡδὲ νόμῳ, à proluxa lanugine, quæ è summo erumpit, sibi nomen ascivit, Dioscorides libr. 2. cap. 173. Tragopogon Theophrasto 7. hist. 7. At Plinio lib. 21. cap. 15. Come, ab alijs Tragopogon, folijs Croco similis. Et lib. 28. cap. 13. Est & Tragopogon quem alij Comen vocant, &c. La' nis Barbula hirci.

*Tragopogon luteo flore.*

I. Tragopogon pratense luteum majus.

Barbula hirci, Trag. Matth. Lac. Cast.

Tragopogon, Matth. Fuch. Ang. Gesn. hor. Tur.

Dod. Lon. Cæs. flore luteo, Eyst.

Tragopogon luteum, Lob. Tab. Ger.

Tragopogon luteus communis, Thal.

Barba hirci, Cord. in Dios. & hist. Dod. gal. Ges.

hort. Lugd. flore luteo, Cam.

Gerontopogon flore luteo, Gesn. col. & Barba fenis.

II. Tragopogon folio oblongo sinuato: primo loco in Prodromo descriptum.

III. Tragopogon spicarum luteum.

Tragopogon spicatus, Lugd.

IV. Tragopogon laciniatum luteum.

Acorus Theophrasti, Ang.

Tragopogon laciniatis folijs, Col.

Folia prima graminea sunt, integra nec laciniata.

V. Tragopogon tenuissimè laciniatum: quod 2. in Prodromo.

an Chondrillæ τραγοπωγωνανθεύς alia species, Thelio.

VI. Tragopogon Coronopi folio.

Chondrilla τραγοπωγωνανθεύς major, Thal.

Duplex est: major, minor quæ sola magnitudine à priori differt.

VII. Tragopogon hirsutum.

Tragopogon Apulum hirsutum humile, Col.

VIII. Tragopogon hirsutum venenatum.

Tragopogon ex Sicilia venenatum, Cæs. quid?

IX. Tragopogon gramineo folio radice villosa.

Barbula hirci minor, Tab.

Tragopogon minus, Ger.

X. Tragopogon parvum ex luteo purpurascens.

Tragopogon parvum flore Chondrillæ purpureocæruleæ, Lob. ob.

an Barbula hirci minor ex Ilva, Cam.

*Tragopogon purpureo flore.*

I. Tragopogon purpureocæruleum porrifolio, quod Artifi vulgo.

Tragopogon alterum, Matth. Lugd.

Tragopogon, Dod. Lob. puniceum, Gesn. hort. purpureum, Ger. Eyst.

Tragopogon sylv. flore purpureo, Cæs.

Barbula hirci altera, Matth. Cast. purpureocærulea, Taber.

Barba hirci flore purpureo, Cam.

Gerontopogon flore puniceo, Gesn. col.

Gerontopogon sive Salsifica Italarum, Lugd.

Flore est purpureocæruleo, nigro purpureo, cæruleo: albo in Apennino Camerarius notavit.

II. Tra-

II. *Tragopogon purpureocæruleum crocifolium.*

*Tragopogon crocifolium montanum, flore nigro purpureo, Col.*

III. *Tragopogon gramineis folijs hirsutis.*

*Tragopogon alter gramineo folio suaverubente flore, Col.*

## S C O R Z O N E R A.

*Scorzonera nomen est Hispanicum, à scorzo vipera, vel à serpente scorzone: quare idem est ac Viperina aut Serpentaria, quod contra viperarum & serpentum venena efficax sit. Sunt qui ad Chondrillam Dioscoridis referant, sed magis ad Tragopogonis genus reducenda.*

*Scorzonera latifolia.*

I. *Scorzonera latifolia sinuata.*

*Scorzonera Hispanica, Matth. Lugd. Cast. Tab. Scorzonera, Dod. Lob. Lon. Cæs. Cam. latifolia, Thal.*

*Scorzonera major Hispanica prima, Clus. hist. Scorzonera Germanica, Tab.*

*Tragopogon peregrinus vel Hispanicus, Gesn. hort.*

*Viperaria Hispanica humilis, Ger. ico.*

Ratione saporis radice duplex: communiter est subdulcis, ita ut à Tragopogone nihil ferè distet: altera radice est amara Gentianæ instar, & hoc *ῥιζομαίωμα* veterum, Thalius censet. Floribus simplicibus & plenis Camerarius notavit.

II. *Scorzonera latifolia altera.*

*Scorzonera Boëmica, Matth. Lob. Lugd.*

*Scorzonera major, vel pannonica prima, Clus. pan. & hist.*

*Scorzonera Germanica, Tab. latifolia German. Eystert.*

III. *Scorzonera folijs nervosis.*

*Scorfonera altera, Lob. ico.*

*Scorzonera Germanica angustifolia, Tab.*

*Viperaria humilis, Ger. ico.*

IV. *Scorzonera latifolia humilis nervosa.*

*Scorfonera humilis latifolia sive secunda, Clus. pan. Pannonica 2. Eid. hist.*

*Scorzonera Pannonica, Tab.*

*Viperaria Hispanica, Ger. ico.*

*Scorzonera angustifolia.*

I. *Scorzonera angustifolia prima.*

*Scorfonera humilis angustifolia & Pannonica tertia, Clus. pan. & hist.*

*Scorzonera Pannonica angustifolia, Tab.*

*Viperaria Pannonica angustifolia, Ger.*

II. *Scorzonera angustifolia altera.*

*Scorfonera Pannonica 4. vel Scorfonera humilis fibrosa radice, Clus. pan.*

*Scorzonera tenuifolia prima, Thal.*

*Hieracium septimum Clus. hist.*

Hæc radice est dulciuscula, aut amara.

III. *Scorzonera angustifolia subcærulea.*

*Scorfonera Pannonica 5. vel major angustifolia, Clus. pan.*

*Scorzonera tenuifolia altera, Thal.*

*Scorzonera angustifolia elatior Pannonica 4. Clus. hist.*

Variat folijs angustioribus, calyculis brevioribus, semine crassiore & brevior.

## C A L T H A.

*Caltham Poëtarum hanc esse volunt, quam aliqui ab aureo colore floris, Chrysanthemum nominant, & quidem Dioscoridis lib. 4. cap. 58. At Columna in Phytobas. Clymenum Dioscoridis lib. 4. cap. 13. censet. Alij ad Caltham Plinij lib. 21. cap. 6. ali j ad Gromphœnam ejusdem, lib. 26. cap. 7. referunt. Dalechampsius à cereo ipsius flore Cerinthen putat.*

I. *Caltha vulgaris.*

*Calendula, Brunf. Trag. Dod. ut: Ang. Gesn. hort. Cæs. Cam. fativa, Tab.*

*Caltha, Matth. Fuch. Tur. Lon. Lugd. Cast.*

*Caltha Poëtarum & Chrysanthemon oculatum verius Dioscoridis, Ad.*

*Chrysanthemum, Lob.*

*Calendula simplici flore, Ger. Eyst.*

*Clymenon Dioscoridis, Col.*

Flore est pallido, citrino, ruffo: quæ Calendula lutea medioruffa, Eyst. aliquando reflorescit & fruticosa evadit.

II. *Caltha polyanthos maxima.*

*Calendula multiflora maxima, Tab. Ger.*

III. *Caltha polyanthos major.*

*Calendula lutea, flore pleno, Eyst.*

Variat flore majore, minore, ejusque colore aureo, vel melino: hinc tres figuræ apud Tab. & Ger.

Calendula major polyanthos flore aureo.

Calendula polyanthos flore aureo.

Calendula sariva polyanthos melina.

IV. Caltha floribus reflexis.

Chrysanthemum sive Caltha reflexis floribus, Lob. ico.

Calendula multiflora orbiculata, Tab. Ger.

V. Caltha prolifera majoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum, Lob. ico.

Calendula prolifera, Cam. Tab. Ger. Eyst.

VI. Caltha prolifera minoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum alterum, Lob. ico.

Calendula prolifera 2. Taber. major prolifera, Ger.

VII. Caltha arvensis.

Calendula circa Monspelium sponte, Ges. hor.

Calendula sylv. minor, Cæf.

Calendula arvensis, Tab. Ger.

Folij crenatis circa Monspelium reperimus.

VIII. Caltha humilis & minima: in Phytopinace descripta.

IX. Caltha palustris flore simplici.

Caltha Virgilij, Trag.

Tussilago altera, Matth.

Dotterblumen/ Dod. gal.

Chamæleuce, Ang. Tur.

Chelidonia palustris, Cord. hist.

Caltha palustris, Gesn. hort. (Ferraria quibusdam, forte à forma folij ferream soleam referentis,) Dod. Adv. Lob. Lugd. (& Malacocissus major) Cam. Ger.

Caltha palustris vulgaris, Clus. hist.

Chrysanthemum Lon.

Epimedium Dodonæi, Thal.

Amellus Virgilij putatus, Eid.

Farfugium, Cast.

Populago, Tab.

Est flore majore & minore: hinc apud Tab. & Ger. nomine

Populaginis majoris & minoris, Tab.

Calthæ palustris majoris & minoris, Ger.

Marem & fœminam facit Ges. l. de col. Stirp. illam ramulis rubentioribus, flore magis tincto: hanc minorem, albiorebus ramulis, & florem minus tincto scribit.

X. Caltha palustris flore pleno: & Cam. & Clus. hist.

Caltha palustris floribus densis, Gesn. hort.

Populago multiflora, Tab.

Caltha palust. multiplex, Ger. fl. multip. Eyst.

In Anglia sponte & plenis & odoratis floribus reperitur, Camerario autore: nobis hortensis est.

## HELENIMUM ET FLOS SOLIS.

**E**λένιον Dioscoridi lib. 1. cap. 27. Helenium Plinio lib. 21. cap. 10. quod è lacrymis Helena natum dicatur, & ideo in Insula Helena laudatissimum esse: quo loci Plinius Aegyptiacum Dioscoridus proponit. Panax Chironium Theophrasti 9. hist. 10. quibusdam censetur.

Genera duo Dioscoridi: alterum solij Verbasci, quod nostrum vulgatum est, ac à Plinio lib. 19. cap. 5. & lib. 20. c. 5. Inula dicitur: Alterum Aegyptiacum, quod Helianthe est flore albo, de quo inter Cisti genera.

I. Helenium vulgare.

Enula campana, Brunf. Cam.

Elenion, Trag.

Enula, Tur. Lon. Cæf.

Helenium, Brunf. Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc. Lac. Gesn. hort. Ad. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Eyst.

Helenium 1. Dioscoridis, Ang.

Inula, vulgo Enula campana, quod, quæ in campis provenit, hortensi præferatur, Gesn. hort.

Panax Chironium Theophrasti, Ang. Cord.

II. Helenio similis peregrina.

Faalim, Theveti: hujus iconem ex Theveti

Cosmag. Lugd. habet: quid est?

III. Helenium Indicum maximum.

Planta maxima, Cortuso in epist. ad Matt. edit. Ital. præfixa, Cast. cui & Bellis Pliniana.

Solis flos Peruvianus, Lob.

Chrysanthemum Peruvianum, Dod. Lugd.

Helianthemum Peruvianum, Cam. ep.

Herba Solis, Monardi.

Sol Indianus, Lon.

Helenium Indicum, Cæf.

Corona Solis, Tab.

Flos Solis gigantea, corona regia, crater Jovis, amoris tuba, rosa Hiericantis, Frag.



Flos Solis major, Ger. Eyft.

Flos à Sole dictus: Joseph. Acoftæ l. 4. c. 27.  
an Planta prægrandis flore Calendulæ forma,  
ex cujus femine panem & pulres in Virginia  
conficiunt: in desc. Virginie.

Variat magnitudine foliorum & florum,  
caulis altitudine: adolefcit enim in Hispa-  
nia ad 24. pedes. Flos (cujus folia in aliquibus  
longiora) aliquando tantæ magnitudinis, ut  
2362. femina inventa fuerint: quem aliqui al-  
bum viderunt.

IV. Helenium Indicum ramosum.  
Chrysanthemum Peruvianum alterum, Dod.  
Helianthemum Peruvianum proliſerum, Cam.  
Flos Solis ramosus, Cam. (ep.  
Corona Solis 2. Tab.  
Flos Solis minor, Ger.  
Flos Solis proliſer, Eyft.

In Italia viginti quatuor flores in una planta,  
plures in Hispania, sæpius conſpiciuntur: in Ger-  
mania etiam decem & plures obſervavimus.

V. Helenium Indicum medium laciniato  
folio.

Solis flos minor, Lob. Lugd. Cam.

VI. Helenium Indicum minus.

Corona Solis minor fœmina, Tab.

Flos Solis minor fœmina, Ger.

Ambo enim marem & fœminam exhibent.

VII. Helianthemum Indicum tuberoſum.

Flos Solis Farnesianus, ſive After Peruvianus  
tuberoſus, Col.

Chrysanthemum latifolium Braſilianum, in  
Prodromo.

Chrysanthemum è Canada quibuſdam.

Canada & Artifchoki ſub terra, alijs:

Gigantea, Burgundis.



## SECTIO QUINTA.

PERFOLIATA; BUPLEURUM; CENTAURIUM MINUS;  
GRATIOLA; HYPERICUM; CORIS; SYMPHYTUM PETRÆUM;  
POLYGONUM; ANTHYLLIS; SEDUM; COTYLEDON; ALOE.

### P E R F O L I A L A.

**P**erfoliata dicta, quod ſingula folia caulis penetret: quam alij Cacaliam Dioſcoridis lib. 4. cap. 123.  
ſuſpicantur: alij Cotyledonem ejuſdem lib. 4. cap. 92. pronunciarent, ni radix obſtaret. Alij  
Sefeli Aethiopicum ejuſdem lib. 4. cap. 61. cenſent.

I. Perfoliata vulgatiffima, ſive arvenſis.  
Perfoliata, Brunf. Matth. Fuch. Eric. Cord. Dod.  
ut: Ang. Geſn. hort. Lon. Cord. hiſt. Lugdun.  
Tab. Eyft.

Perfoliata vera, Thal. vulgaris, Ger.

Perfoliata major, Trag.

Cacalia, Lac.

Perfoliatum vulgatius flore luteo folio umbi-  
licato, Ad. Lob.

Sefeli Aethiopicum Dioſcoridis, Cæſ.

II. Perfoliata flore multiplici.

Perfoliata criſpa ceu muſcoſa, Cam.

III. Perfoliata montana latifolia.

Perfoliata montana, Geſn. Lugd. Cam.

IV. Perfoliata montana floſculis parvis.

V. Perfoliata alpina latifolia minor: hæc  
1. in Prodromo.

VI. Perfoliata alpina anguſtifolia major,  
ſive folio anguloſo: hæc 2. in Prodromo.

VII. Perfoliata alpina anguſtifolia media:  
quæ 3. in Prodromo.

an Perfoliata largifolia Dalechampij, Lugd.

VIII. Perfoliata alpina anguſtifolia mi-  
nor: quæ 4. in Prodromo.

IX. Perfoliata alpina gramineo folio, ſive  
Bupleuron anguſtifolium alpinum.

Sedum petræum Bupleuri folio, vel Bupleuron  
petræum gramineo folio, Ponæ.

X. Perfoliata minor anguſtif. bupleuri folio.  
Odontitis lutea, Lugd.

Perfoliatum anguſtifolium montanum, Col.

XI. Perfoliata alpina anguſtifolia minima:  
vel Bupleuron anguſtifolium Pyrenaicum: ſ.  
loco in Prodr. deſcribitur.

an Sefeli Aethiopicum parvum folijs grami-  
neis, Cæſ.

XII. Perfoliata minor ramis inflexis: quæ  
6. in Prodromo.

## B U P L E U R O N.

**B**ούπ *supra* Hippocrati & Nicandro in Theriacis. Plinius lib. 8. cap. 22. Bupleurismeminit, ubi aliqui Ammi vulgaris intelligendum censent : licet Bupleuron Plinij, rectius Valeriana campestri, quæ etiam Lactuca agnina dicitur, tribui videatur. Quare alijs hoc nostrum Bupleuron, βούπυρις dicitur, cujus Theophrastus 7. hist. 8. inter olera mentionem facit : Et Buprestis Plinio lib. 8. cap. 22. Sunt qui ad Panaces Chironium Dioscoridis, alijs ad Elaphoboscum referunt.

## I. Bupleuron folio rigido.

Beupleurum, Ang. majus, Gesn. hort.

Elaphoboscum & Gratia Dei Gallis, Eid.

Bupleurum alterum latifolium, Ad. Lob. Dod. Lugd.

Bupleurum latifolium, Tab. Monspeliensium, Ger.

Panaces Chironium quorundam, Lugd.

## II. Bupleuron folio subrotundo, sive vulgarissimum.

Herba vulneraria, Trag.

Isophyllon, Cord. hist.

Beupleurum, Dod. gal. Gesn. hort. Ad. Lugd.

Auricula leporis Monspeliensium, Gesn. histor. anim.

Panax Chironium Dioscoridis, Lon.

Bupleurum angustifolium, Dod. Tab.

Bupleurum angustifol. Monspeliensium, Ger.

Bupleurum angustifolium herbariorum, Lob.

Sanamunda quibusdam.

Folia inferiora subrotunda, quæ in caule longa & angusta sunt.

## II. Bupleuron angustissimo folio.

Bupleuron minimum, Col.

## C E N T A U R I U M M I N U S.

**C**entaurium duplex est : majus de quo supra capite de Lapatho : minus aliud, quod κενταύριον τὸ μικρόν ἢ λιμναιόν, quoniam loca rigua amet Dioscoridi lib. 3. cap. 9. At Theophrasto 9. hist. 4. πάντες λεπτόφυλλον Panax tenuifolium dicitur. Plinio lib. 25. cap. 6. Centaurium alterum cognomine lepton, quod aliqui Libadion vocant, quoniam secundum fontes nascatur : Fel terra propter amaritudinem summam dictum. Gallis Exacon (ἀπὸ τῆς ἀνοϊδαὶ ἀ medendo) quoniam omnia mala medicamenta potum è corpore exigit per alvum : Tertia est Centauris cognomine triorchis, &c. hac Plinius.

## I. Centaurium minus.

Centaurea, Brunf. Cæs. minor, Brunf.

Centaurum minus, Trag. Matth. Fuch. Ang.

Dod. ut : Tur. Cord. in Diosc. Gesn. Lac. Lon.

Cam. Thal. Lugd. Cast. Tab.

Centaureum minus flore rubro, Eyf. quod & flore albo pingit.

Centaureum parvum, Ad. Lob. Ger.

Flos communiter è puniceo colore in purpurea rubet : aliquando albus est : rarius ferruginei coloris. Variat etiam ratione soli, Theophrasto 4. hist. 5. monente ; in humidis enim, altius excrescit : in aridis, vix duas aut tres uncias æquat.

II. Centaurium minus spicatum album : in Phytop. Matth. & Prodromo descriptum.

## III. Centaurium luteum perfoliatum.

Perfoliata Achillæa, Gesn. hort.

Centaureum luteum, Adv. Clus. hispan. prius, Lugd. Eyf.

Centaurium floribus luteis sive citreis pallidis Mesuæi, Lob.

Centaurium luteum perfoliatum, Cam. ep.

Achilleos, Cæs.

Centaurium parvum flavo flore, Clus. histor. luteum, Ger.

Centaurium minus luteo fl. perfoliatum, Tab.

Hoc videtur Achilleon vera Plinij l. 25. c. 5. quam scribit esse scapo cæruleo pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis eleganter vestitam : vulneribusque mederi. Et Mesuæo, lib. 2. purg. 10. Centaurium floribus citreis pallidis.

Duplex est : alterum folijs angustioribus & non perfoliatis : alterum latioribus & caulem ambientibus : caule ramoso & non ramoso, & hoc est

Centaurium luteum alterum, Lugd.

## IV. Centaurium luteum pusillum.

Centaurium luteum novum, Col.

## G R A T I O L A.

**G**ratiola sive Gratia Dei nomen, recentior ætas tribuit, propter singulares vires, tam per superiora, quam per inferiora humores expurgandi, & recentia vulnera consolidandi : Hac veteribus indicta videtur, quamvis

quâmvīs aliqui Papaver spumeum Dioscoridis l. 4. c. 67. alij Eupatorium Mesue esse vetint. Centaurida alij faciunt, nec malè cum Centaurij minoris species esse videatur: & inter spurias Centaurij minoris appellationes, Helleborines & Multiradicis appellationes exstant, quæ Gratiola competere videntur, cum Hellebori modo purget, & radicibus complurimis firmetur. Sunt qui Persicariam minorem apud Sylvaticum credant.

Gratiola centauroides.

Gratiola, Matth. Dod. ut: Gefn. hort. Ad. Lob.

Lugd. Cast. Cam. Tab. Ger.

Gratia Dei, Lac. altera, Cæf.

Gratia Dei, cujus semen Gelbenech, papaver spumeum fortè, Ang.

Limnesium sive Centauroides, Cord. hist.

Eupatorium Mesue, Cord. schol.

Gratiola sive Centaurium aquaticum, fortè Pomonium palustre amarum Hippocrati veterinario, Gef. col.

Gratiola vulgo dicta, quæ quibusdam verius Hysopum vulgare censetur, Col.

Gratiola flore albo & Gratia Dei, Eyf.

Flos communiter purpurascens, aliquando albus, rarius luteus: folia minus magisve crenata.

## HYPERICUM.

**Y**περίκονοι δὲ Ἀνδροσαύμων, οἱ δὲ νότοι, οἱ δὲ χαμαίνωντες, quoniam semen odore pineam resinam imitetur, Dioscoridis l. 3. c. 171. Et Plinio l. 26. c. 8. Hypericon quod alij Chamapityn, alij Corion appellant. Perforata vulgo, quod folia soli objecta innumeris foraminibus scatere videatur: hinc & porosa quibusdam.

Genera: Dioscorides, præter vulgatum Hypericum & alterum sequenti capite exhibet, quod Ἀντρον, ei δὲ ὑπερίκον, οἱ δὲ Ἀνδροσαύμων dicatur. hyperici genus esse magnitudine distans, cum majus & fruticosius sit: & Androsamon dici, quod fructus, qui resinosi odoris est, attritu digiti veluti cruententur. Et sequenti capite Ἀνδροσαύμων, ei δὲ ὑπερίκον, οἱ δὲ Ἀντρον, ab Hyperico & Ascyro differt, &c. Plinio l. c. & l. 26. c. 15. duplex est Hypericum: aliud oleraceo frutice tenui, cubitali, rubente, &c. Aliud quod Corin appellant folio Tamaricis &c. Eid. l. 27. c. 5. Ascyrum sive Ascyroides Hyperici genus est, cujus comæ trita velut cruentant: qua de causa quidam hanc Androsamon vocavere, Idem c. 4.

I. Hypericum vulgare.

Hypericum, Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.

Lon. Dod. Ad. Lob. Cæf. Lugd. Cast. Cam. Tab.

Ger. Eyf.

Herba perforata, & Hypericum vulgare, Trag.

Ascyron, Dod. gal. Cord. in Diosc.

Androsamon minus, Gef. col.

Apud Dioscoridem inter Rutas sylvestres (cum ipsius species credatur) hujus descriptio etiam legitur.

Folijs modo latioribus, modo angustis variat, quod Tragus duabus figuris expressit: caules quoque ejus, quod in humentibus provenit, quadrati sunt, alibi verò rotundi. Hujus etiam minor species caule quadrangulo, folijs non perforatis.

II. Hypericum numulariæ folio: quod in Prodro mo describitur.

III. Hypericum folio brevior.

Hypericum Syriacum & Alexandrinum, Lob.

Hypericum Syriacum, Lugd. Ger.

Hypericum Alexandrinum, Tab.

IV. Hypericum minus erectum.

Hypericum pulchrum vel quartum, Trag.

Androsamon, Lon.

an Hyperici minor species, Thal.

Hoc cum utriculis circa caulem reperitur.

V. Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum.

Hypericum exiguum & primum, Trag.

Hypericum minus, Gef. col. Dod.

Hypericum minimum supinum Septentrionale, Lob.

Hypericum supinum 3. minimum, Clus. hist.

Ascyro adpinxit, Cam. ep.

Hoc interdum exiguum est, aliquando magno cespite serpit: hoc Lobelius in obser. illud in iconibus expressit.

VI. Hypericum supinum tomentosum majus, vel Hispanicum.

Hypericum supinum, Clus. hisp. tomentosum Hispanicum, Eid. hist.

Hypericum minimum supinum Septentrionale, Lob. obs. fco.

Hypericum humi stratum, Lugd.

Ruta sylvestris Dioscoridis, Johanni Placæ, quæ à Ruellio inter notha rejecta.

VII. Hypericum supinum tomentosum minus, vel Monspeliacum.

Hypericum supinum, Dod.

Hyperici-

Hypericum alterum tomentosum, Ad.

Hypericum tomentosum, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Hypericum tomentosum secundum, Clus. hist.

Androsæmon album Dalechampi, Lugd.

Lobelius cum priore idem dicit: at Clusius negat idem esse.

*Hypericum Ascyron dictum.*

I. Ascyrum supinum villosum palustre.

Ascyrum supinum *ἐλωδύς*, Clus. histor. ap. alt. austario.

II. Ascyrum, sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum.

Hypericum in dumetis nascens primum, Trag.

Ascyrum, Matth. ep.

Androsæmon, Matth. fol. Fuch. Tur. Lac. Cord.

in Diosc. Cast. Gef. col. (& Ascyroides) Cast.

Hypericum aliud, Dod. gal.

Androsæmon Campoclarense, Col.

III. Ascyrum magno flore: in Prod. describitur.

IV. Androsæmon hirsutum.

Hypericum in dumetis nascens 2. Trag.

Androsæmon, Matth. ep.

Ascyrum, Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Gef. col.

Dod. Ad. Lob. Lugd. Cast. Thal. Cam. Cæs.

Hypericum, Dod. gal.

Androsæmon alterum hirsutum, Col.

V. Androsæmon alterum folijs Hyperici, quod aliquibus Hypericoides.

Androsæmon magnum, Ad.

Androsæmon, Lob.

Ruta sylv. Hypericoides, Dod.

VI. Androsæmon perfoliatum & perforatum.

Androsæmon alterum Apulum, Col.

VII. Androsæmon maximum frutescens.

Androsæmon, Dod. ut: Gesn. hort. Lugd. Cæs. majus, Cam.

Androsæmon aliud, Lugd.

Clymenum, Ang. Gesn. hort. Cast. ico.

Clymenum Italicum, Ad. Lob. Ger.

Siciliana. Gesn. hort. Col. Eyf.

Herba Siciliana, Tab.

Androsæmon Diosc. Galeni & Plin. & Centuria Theophrasti, Cæsalpino.

Clymenon Plinij 25. c. 7. Anguillaræ, quod potius Periclymenum Dioscoridis est.

VIII. Androsæmon foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis.

Tragium Creticum, Bellon.

Tragium, Belli ep. 3. ad Clus. legitimum, Ponæ.

Androsæmon minus, Cam.

Ascyrum legitimum, vulgo *αγρόλεπτο*, Belli ep. 1. ad Clusium.

Androsæmon foetidum seu tragodes, Eyf.

## C O R I S.

**K** *οἷς* quod aliqui Hypericum vocant, Dioscoridi l. 3. c. 174. frutex est folio Erica: Et Plinio l. 26. c. 8. est aliud Hypericum, quod alij Corin appellant, folio tamaricis.

I. Coris lutea.

Coris, Matth. Gesn. hort. Lac. Lob. Lon. Cæs.

Lugd. Cast. Cam. Tab.

Coris Matthioli, Ad.

Coris legitima Erica similis, Belli ep. 1. ad Clus.

Coris legitima Dioscoridis, Ponæ.

II. Coris cærulea maritima.

Coris Monspelica, Ad. Lob. Cam. Tab.

Coris quorundam, Clus. hisp. & hist.

Flore est cæruleo, rarissime rubro.

## S Y M P H Y T U M P E T R Æ U M.

**Σ** *ὑμψυτον πετραίων* in petris nascitur, ramulis Origano similibus, folijs Thymi, &c. Dioscoridi lib. 4. c. 9. Alum nos vocamus, Græci Symphytum petræum: nascitur in petris, ideo petræum cognominatum, &c. Plinius lib. 27. cap. 6.

Symphytum petræum folijs Thymi.

Symphytum petræum, Mat. Lac. Lon. Lug. Tab.

Symphytum petræum Matthiolo creditur, Ad.

Symphytum petræum Matthioli, ad Coridem

Gallicam plurimum accedere videtur, Cl. hist.

Hoc ex agro Goritensi, ubi & Matthiolus notavit, à Doct. Agerio accepimus: quod à Coride

Monspelica diversum est.

## P O L Y G O N U M.

**Π** *ολύγονον* Dioscoridi l. 4. c. 4. à copiosis geniculis, quibus caules cinguntur, dictum. Plinio l. 27. c. 12. Polygonon Græci vocant, quam nos Sanguinariam.

*Genera duo Dioscoridi, mas & fœmina, de qua inter Equiseti species: mas, à feminibus sub singulis folijs turgescentibus, flos ei candidus, aut puniceus. Plinius l.c. qui plura genera Polygoni faciunt, hanc marem intelligi volunt, appellariq; à multitudine seminis, aut densitate fruticis Calligonon. Alij Polygonaton, à frequentia geniculorum, &c. ubi quatuor genera recensentur: primum est Polygonum vulgare: alterum Herniaria: tertium Polygonum fœmina Dioscoridis: quartum quibusdam Casia lignea Monspeliensum videtur: sed rectius tribuitur ei planta, quam Polygoni nomine Clusius proposuit.*

*Polygonum majus.*

**I. Polygonum latifolium.**

Herba proserpinaca (à serpendo) Apulejo.

Centumnodia, Brunf.

Polygonon, sive Polygonaton & Corrighiola, Eric. Cord.

Polygonum masculum Trag. Lac.

Polygonum mas, Matt. Fuch. Dod. ut: Ang Cor. in Diosc. & Sanguinalis mascula à cohibendo sanguine) Ges. hor. Cæs. Thal. Lugd. Cast.

Polygonum primum, Tur. vulgare, Cam.

Polygonum mas vulgare (Sanguinaria, Centumnodia) Ad. Lob. Ger.

Polygonum majus, Lon. Tab.

Aliud flore est candido, aliud ex purpura candicante, vel rubente.

**II. Polygonum oblongo angusto folio.**

Polygonum tertium, Tab.

**III. Polygonum brevi angustoque folio.**

Polygonum secundum, Tab.

Polygonum mas minus, Ger.

an Polygonum masculum fruticosum, Thal.

**IV. Polygonum saxatile: quod primum in Prodomo.**

**V. Polygonum maritimum latifolium.**

Polygonum marinum maximum, Ad. Lob. ico.

Polygonum marinum, Lob. ob. Cam. ep. & hor.

Polygonum marinum prius Dalechampi, Lug.

Polygonum tertium in maritimis, Cæs.

Flosculis est purpurascens, est & albis.

**VI. Polygonum maritimum angustifolium.**

Polygonum marinum alterum Dalech. Lugd.

*Polygonum minus.*

**I. Polygonum cocciferum: & Cam. ep.**

Radibus coccum adnascitur elegantissimo colore commendatum.

**II. Polygonum angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens.**

Polygonum, Germanis Knavel/ Trag.

Polygonon 3. Dod. gal. exiguum, Eid. fol.

Saxifraga Anglica, Ad. Lob. ico. Lugd.

Polygonum minus seu fœmina, Lon.

Polycarpon à seminis copia, Lugd.

Polygonum minus polycarpon, Tab.

Polygonum selinoides sive Knavel, Ger.

Varietas magna in hac planta observatur.

**III. Polygonum gramineo folio majus erectum.**

Polygonum minus alterum, Tab.

Anthyllis Valentina Clusij, Ger. ico.

**IV. Polygonum angustissimo folio affinis.**

Hæmorrhoidalis, quæ ad Caryophylleorum syl. classem referri debet, Clus. hist. ap. alt. ad l. 6.

Hæmorrhoidalis Aldroandi nomine, quæ à sanguine sistendo nomen habeat, ex Italia, circa Ravennam natam (etiam ex Valesia) accepimus.

**V. Polygonum minus candicans.**

Polygonum montanum minimum niveum & sericeum, Ad. Lugd.

Polygonum montan. niveum minimum, Lob.

Paronychia Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Polygoni Hispanici genus, Lugd.

Polygonum montanum, Tab. Ger.

an Herba Turca montana, Cæs.

Variat ratione ætatis, nam adulta paleaceas membranulas niveas habet, quemadmodum Adv. & Lugdun. pingunt: planta novella non item, sicut Clus. & Lob. proposuere: Sic in Belgio nata multum de candore suo remittit.

**VI. Polygonum montanum vermiculata folijs.**

Vermiculata montana nova, Col.

**VII. Polygonum Creticum Thymi folio: quod 2. in Prodomo.**

**VIII. Polygonum littoreum minus flosculis spadiceo albicantibus: quod 3. in Prodomo.**

**IX. Polygonum minus tenuifolium: quod 4. in Prodomo.**

**X. Polygonum maritimum minus foliolis Serpilli.**

Polygonum alterum pusillo vermiculato Serpilli folio, Ad. Lob. ico.

Polygonum alterum Serpilli folio, Lugd.

**XI. Polygon. minus, seu Millegrana major. Empetrum, Trag. Lon.**

Polygonum minus, Matth. Cast.

Epipactis. Ang.

Millegrana, Cord. hist.

Herba cancri minor, Cord. sch.

Herniaria, Gesf. hor. col. Dod. Lugd. (cui & Lithontribon ab effectu) Thal. Cam. Tab. Ger.

Herniaria multigrana serpillifolia, Ad.

Herba Turca, Lob. Cæs.

Polygoni genus Herniaria appellata, Clus. hist.

Hoc duplex est : aliud glabrum, aliud hirsutum. Est etiam Herniaria fruticosa viticulis

lignosis, foliolis oblongiusculis, brevis, densissima.

XII. Polygonum minus lentifolium : quod 4. in Prodro. mo.

XIII. Polygonum minimum, sive Millegrana minima.

Millegrana minima, Lob. ico.

Herniaria altera, Thal.

XIV. Herba ad rupturas utilis Monardis ; & ex eo Lugdunensis historiæ, quid est ?

## ANTHYLLIS.

**A**νθυλλίς Dioscoridi lib. 3. cap. 153. duplex est : altera folijs lenti similibus, mollibus : altera folijs Ajugæ, de qua inter Chamæpitydes actum. Plinius lib. 26. cap. 8. illam Anthyllion vocat.

I. Anthyllis maritima Chamæfycæ similis, Anthyllis marina Narbonensium altera, Chamæfycæ facie, Ad. Lob. ico. Lugd.

Huic similis aut eadem est.

Anthyllis Valentina, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Peplion sive Peplis, Dod.

Chamæfycæ Dalechampij, Lugd.

II. Anthyllis maritima lentifolia.

Anthyllis prior lentifolia maritima Peplios effigie, Ad. Lob. ico.

Anthyllis prima, Cast.

Anthyllis Portlandiæ lentifolia Penæ, Lugd.

III. Anthyllis maritima Alsinifolia.

Paronychia altera, Matth. Lugd.

Paronychia, Ang. Tab.

Gramen secundum Plinij, Ang.

Anthyllis marina incana alsinifolia Narbonensium, Ad. Lob. ico. Lugd.

Centumgrana, Cæs.

παρυνχίαν Dioscoridis l. 4. c. 54. & Gramen secundum Plinij l. 24. c. 19. Anguillara credidit.

Variat folijs modò subrotundis, modò oblongis.

IV. Anthyllis Chamæpitydes frutescens. Anthyllis altera Chamæpity similis, Cord. in Diosc.

an Chamæpitys vermiculata, Ad. Lob. ico.

an Chamæpitys prima Dioscoridis Penæ, Lug.

an Anthylloides minor, Thal.

## SEDUM.

**A**ἰσῶν Dioscoridi lib. 4. cap. 89. διὰ τὸ ἀειθαλὲς τῶν φύλλων, quia folia perpetuò vireant : quare Ἀἰσῶν nomen apud Theophrastum i. hist. 16. Sempervivum Gaza vertit : cui hoc à natura ut semper humidum, virideq; durare valeat, eidem Theophrasto 7. hist. 14.

Genera Dioscoridi tria sunt : magnum, parvum, & tertium, quod aliqui Ἀνδράχην ἄγλαν, ἢ ἀνδράχιν, Romani ἰλλέεβραν Illecebram vocant : quorum priora duo refrigerant, tertio vis est ex calfactoria. Plinio l. 25. c. 13. Aizoi duo genera : majus, quod aliqui Buphthalmum vocant, alij Zoophthalmum, alij Stergethon, quod amatorijs conveniat : alij Hypogeson, quoniam in subgrundijs serè nascitur. Italis, Sedum magnum, aut oculus, aut digitellus. Alterum minusculum, quod Erithales vocant, alij Trithales, quia ter floreat, alij Chrysorhales alij Isoetes : Sed alij Itali Sedum, alij Aizoon utrumque, quoniam semper vireat : aliqui Sempervivum, &c. Huic similis quam Græci Andrachnen agriam vocant : Itali Illecebram : hactenus Plinius secutus Diosc. Sedum, inquit Festus, alij Sadum appellant, herbam quam Opilius Aurelius Sefuvium vocari ait, eamq; in tegulis feri : hoc fortè factum, quod nonnullis locis plebs animos invaserit opinio, non feriri fulmine domum, in cuius tegulis Sedum vireat.

Sedum majus.

I. Sedum majus arborescens flosculis candidis. Aizoon magnum Dioscoridis, si caulis altitudo & foliorum longitudo spectetur.

Sempervivum arborescens, Matth. Cast.

Sedum majus verum, Gesf. hort.

Sempervivum majus, Ang.

Sempervivum sive Sedum arborescens majus, Dod. Sedum arborescens Græcum, Illyricum & Anglicum, sive maritimum, Ad.

Sedum arborescens majus Græcū, Lob. ico. Eyf.

Sempervivi majoris alterum genus, Cæs.

Sedum majus, Clus. hisp. legitimum, Eid. hist.

Aizoon arborescens, Lugd. Cam.

II. Sem-



I. *Sempervivum arborescens alterum*, Matth. Cast. Lugd. An diversum à priore?

III. *Sedum majus vulgare*.

*Aizoon magnum Dioscoridis*, quoad postrema Dioscoridis verba.

*Sempervivum majus*, Brunf. Matth. Ger.

*Umbilici Veneris species altera*, Ang.

*Sedum majus*, Fuch. Cord. in Diosc. (& *Vitalis major*) Lac. Tab. magnum, Tur.

*Sedum seu Sempervivum vulgare majus*, Gef. h.

*Sempervivum primum*, Lon. majus primum, Cæsalp.

*Sempervivum majus*, Dod. gal. Lob. Cast.

*Sempervivum majus alterum sive Jovis barba*, Dodon.

*Sempervivum*, sive *Sedum majus crenatum Myrthifolium*, Adv.

*Aizoon majus*, Lugd. Cam.

*Cotyledon altera prima*, sive *Sedum majus vulgare*, Clus. hist.

*Sedum vulgare*, Eyf.

IV. *Sedum majus montanum dentatis folijs*.

*Cotyledon altera montana*, Clus. pan.

*Cotyledon altera secunda*, Eid. hist.

*Aizoon sive Sempervivum majus*, Thal.

V. *Sedum majus montanum dentatis folijs alterum*.

*Cotyledon altera montana minor*, Clus. pan.

*Cotyledonis alterius altera species*, Eid. hist.

VI. *Sedum majus montanum folijs non dentatis*, floribus rubentibus.

*Cotyledon altera Taurica*, Clus. pan.

*Cotyledon altera tertia*, Eid. hist.

*Sedum minus flore rubente*, Eyf.

VII. *Sedum Nicotianæ flore*.

*Sedum Malagascaricum*, Clus. exot. quid?

*Sedum minus*.

I. *Sedum minus teretifolium album*.

*Sempervivum minus album*, Brunf.

*Sempervivum fœmina*, Eid.

*Sedum minus primum*, Trag. Clus. hist. alterum, Gef. hort.

*Sempervivum minus*, Matth. Ang. Cast. Cæf.

*Sedum minus*, Lac. offic. Ger. minus fœmina, Fuch.

*Sedum fœmina*, Tur.

*Crassula minor*, Dod. gal.

*Sempervivum quartum*, Lon.

*Tragus herba*, Cord. in Diosc.

*Vermicularis & Illecebra major*, Ad. Lob. Lug.

*Vermicularis flore albo*, Cam.

*Aizoon minus fœmina*, Lugd.

*Aizoi minoris species*, Thal.

*Sedum minus hæmatodes secundum*, Tab.

II. *Sedum minus teretifolium alterum*.

*Sempervivum tertium*, Lon.

*Aizoon minus Matthioli*, Lugd.

*Sedum medium teretifolium*, Ad. Lob. ico.

*Sempervivum parvum*, Lob.

*Sedum minus alterum*, Clus. hist.

III. *Sedum minus teretifolium luteum*.

*Sedi minoris 2. species*, Trag.

*Sempervivum minus æstivum*, Lob. Lugd.

*Aizoon medium*, Thal.

IV. *Sedum minus folio circinato*.

*Aizoon dasphyllum*, id est densifolium, Lugd.

*Sedum minimum frigidum*, Clus. hisp.

*Sedum minus septimum*, Clus. hist.

V. *Sedum minus luteum folio acuto*.

*Sedum minus*, Turn. mas, Fuch. hæmatodes, Tab. Ger.

*Sempervivum minus*, Dod. gal. primū, Eid. fol.

*Aizoon hæmatoides*, Lob. ico.

*Aizoon minus*, Lugd.

*Sedum minus quintum*, Clus. hist.

VI. *Sedum minus luteum ramulis reflexis*.

*Aizoon Scorpioides*, Lob. ico.

*Aizoon minus flore luteo inflexo*, Cam.

*Sedum minus quartum*, vel *Sedum minus Dioscoridis primum*, Clus. hist.

VII. *Sedum arvense flore rubente*: quod 9. in Prodromo.

VIII. *Sempervivum minus vermiculatum acre*.

*Aizoon tertium*, Dioscoridis.

*Portulaca tertia*, Brunf.

*Sedum minus tertium & Vermicularis*, Trag.

*Sempervivum minimum sive 3. Matth. Cast.*

*Gramen 3. Plinij & Sempervivum 3. Ang.*

*Illecebra sive Sempervivum 3. Dod. ut:*

*Sedi tertium genus*, Fuch. Lac. Tur.

*Aizoon minus*, quod malè pro *Vermiculari* accipitur, Cord. in Diosc.

*Aizoon acre*, Cord. hist.

*Sedum tertium Dioscoridis*, Gef. hort.

*Sempervivum tertium*, desc. at 2. ico. Lon.

*Sedum minimum*, *Illecebra*, *Sedi tertium genus non sempervirens*, Adv.

*Sempervivum minimum sive Illecebra*, Lob.

*Sempervivum tertium minimum alterum*, Cæf.



Aizoon minus fervidi gustus, Thal.

Aizoon minimum repens, tertium Diosc. Lug.

Sedum minimum, Tab.

Vermicularis sive Illecebra, Ger.

Sedum minus octavum causticum, Clus. hist.

Sedum minus seu minimum causticum, Eysf.

Aizoi facie planta quæ Dactylon 2. vel 3. Col.

IX. Sempervivum minus vermiculatum inspidum.

Aizoon minimum, Cord. hist.

Sempervivum tertium minimum, Cæs.

Aizoon minus & Vermicularis insipida, Thal.

Sedum minus, seu Vermicularis insipida, Eysf.

A priori non solum gustu differt, sed etiam foliolis magis reretibus & tenuibus: floribus est utraque luteis, rarius albis.

X. Sedum minus fruticosum.

Sedum minimum arborescens vermiculatum, Lob. Lugd.

an Polygonum masculum fruticosum, Thal.

XI. Sedum minus fruticosum alterum.

Vermiculatæ fruticis varietas major, Lob.

Vermicularis frutex major, Lugd.

Cassia lignæ similis frutex tertius, Cæs.

An sit Chamæpitrys altera Diosc. dubitant, Lob. & Lugd. hist. Selaginem Plinij Cæsalp. suspicatur, & quibusdam Sempervivum maritimum, aut Vermiculariam arborecentem dici.

XII. Sedum Portlandicum, Ad. Lob. ico. quid?

*Sedum saxatile & alpinum.*

I. Sedum alpinum Saxifragæ albæ flore, vel grandiflorum.

Sedum minimum tertium, Lob. Lugd.

Sedum ferratum, Dod. quoad ico.

an Sedum alpinum quartum, Col. part. 2.

II. Sedum alpinum album foliolis compactis.

Sedi aut Phylli genus flosculis albis, Gesn. fra.

Sedum alpinum tertium, Clus. pan.

Sedum minus nonum, sive alpinum tertium, Eid. hist.

III. Sedum alpinum hirsutum lacteo flore.

Sedum alpinum quartum, Clus. pan.

Sedum minus decimum, sive alpinum quartum, Eid. hist.

Jasme montana, Lugd.

IV. Sedum alpinum gramineo folio lacteo fl.

Sedum alpinum quintum, Clus. pan.

Sedum minus undecimum, alpinum 5. Eid. hist.

V. Sedum alpinum flore pallido.

Sedum alpinum primum, Clus. pan.

Sedum minus sextum, sive alpinum primum, Eid. hist.

VI. Sedum alpinum augustissimo folio, flore carneo.

Sedum alpinum secundum, Col. part. 2.

VII. Sedum alpinum exiguis folijs.

Sedum alpinum primum, Col. part. 2.

VIII. Sedum saxatile hirsutum purpureum: quod 5. in Prodomo.

IX. Sedum saxatile atrorubentibus floribus: quod 6. in Prodomo.

X. Sedum saxatile variegato flore: quod 7. in Prodomo.

XI. Sedum alpinum hirsutum luteum.

Sedum saxatile folijs margine piloso, Gesn. hor.

Phyllon thelygonon, Dalech. in Diosc.

Phyllon arrhenogonon Dalechampij, Lugd.

Sedum petræum montanum, Ad. Lob. ico.

Sedum alpinum sextum, Clus. pan.

Sedum minus duodecimum, alpinum 6. Cl. hist.

Leucoion luteum aizoides montanum, Col. p. 2.

XII. Sedum alpinum folijs crenatis asperis: quod 8. in Prodomo.

an Sedum cujus folia marginibus asperis brachias piscium referunt, Gesn. hort. (Iosis.

XIII. Sedum alpinum floribus luteis maculis minoris genus flosculis luteis vel croceis maculosis, Gesn. fra.

XIV. Sedum alpinum rubro magno flore.

Aizoon montanum, Lugd.

XV. Sedum montanum tomentosum.

Sempervivum rubrum montanum γυαπαλώδες, Colum.

XVI. Sedum alpinum ericoides purpureo: quod 3. in Prodomo.

XVII. Sedum alpinum ericoides cæruleum: quod 4. in Prodomo.

*Sedum folijs laciniatis.*

I. Sedum alpinum trifido folio.

Sedum septimum, vel alpinum Ajugæ folio, Clus. pan.

Sedum minus decimum tertium, Eid. hist.

II. Sedum tridactylites alpinum majus albū. Aline tridactylites alpina, in Phytop.

Saxifraga alba petræa, Ponæ. (teum.

III. Sedum tridactylites alpinum pallidè lu-

IV. Sedum tridactylites alpinum caule folioso: hæc tria in Prodomo sub Sedo 1. describuntur.

V. Sedum tridactylites alpinum minus: quod 2. in Prodomo.

Sedo

Sedo alpinoterrio similis altera, Colum. part. 2.

VI. Sedum tridactylites testorum.

*Handelskraut*/Trag.

Paronychia altera, Dod. rutaceo folio, Adv.

Lob. Lugd. Ger.

Umbilici species quibusdam, Cæs.

Daetylioboranon alterum, Thal.

Albine petraea rubra, & Paronychia tertia, Tabern.

Paronychia laciniata, Ger.

*Sedum palustre.*

I. Sedum palustre subhirsutum purpureum.

Sedi minoris quarta species, Trag.

Sedum palustre secundum, Clus. pan.

Sedum minus tertium, sive palustre, Eid. hist.

Aizoon palustre, Cam.

Sedum palustre flore incarnato, Eyf.

Hujus species est altera major & candidior : altera minor & rubicundior, seu mas & foemina : flos purpurascens aut carnei coloris.

## COTYLEDON SEU UMBILICUS VENERIS.

**K** *Κοτυλίων* Dioscorides lib. 4. cap. 92. Sedo subjungit, quod ipsi & *κοτυλίων* & *κομβάδιον* dicitur : quod à figura folij Acerabulo simili nomen accepit : hinc Latinis, *Acetabulum* & *Umbilicus Veneris*. Plin. lib. 25. cap. 13. *Cotyledon*.

Genera duo sunt Dioscoridi : alterum folio acerabuli instar orbiculato & concavo, ita tamen ut cavum id aciem prope fugiat : alterum latioribus folijs, usq; pinguibus, ac cu lingulas referentibus, densis & confertis circa radicem, & velut oculum in medio constituentibus, &c. Et Plinio, alterum folio est pingui & concavo, ut coxendices : aliud sordidis folijs, latioribus, densioribusq; circa radicem, velut oculum cingentibus, &c.

I. *Cotyledon major*.

*Umbilicus Veneris*, Matth. Lac. Tur-Lob. ico.

Cæs. Cast. Lugd. Tab. Ger. major, Lon.

*Umbilici Veneris* species prima, Ang.

*Cotyledon*, Dod. ut : Ad. Lob.

*Cotyledon* sive *Umbilicus Veneris*, Clus. hisp. & hist.

II. *Cotyledon media* folijs subrotundis.

*Umbilicus Veneris* alter, Matth. Lac.

*Cotyledon* altera, Dod. ut : Clus. pan. Lugd.

*Cotyledon* altera quarta, Clus. hist.

*Phylum thelegonum* Dalechampij, Lugd. sive

*Lichen primum* Plinij & sempervivum montanum.

III. *Cotyledon media* folijs oblongis serratis.

*Oboleum* Hippocratis, Ang.

*Aizoon* serratum, Cord. histor. Thal. cui &

*Crassula serrata*.

*Cotyledon minus* sedi folio, Ad. Lob.

*Umbilicus Veneris*, Lob. ico. minor, Lon. Tab. Ger.

*Phyllon primum*, Cæs.

*Palmaria*, Tabern. talis antequam caulem producat.

*Cotyledon minus*, Eyf.

IV. *Cotyledon media* subhirsuta floribus punctatis.

*Sedum* folijs minoribus albicantibus serratis, Gesn. hort.

*Cotyledon minus* montanum alterum, Lob. ico.

*Cotyledon* altera Etcheriana, Clus. pan.

*Cotyledon* altera quinta, Clus. hist.

V. *Cotyledon minor* folijs subrotundis serratis : in Prodomo describitur.

VI. *Cotyledon stellata*.

*Aizoon peregrinum*, Cam.

*Sempervivum* tertium, Col.

## A L O E.

**A** *Ἀλόη* Græci, Latini & officina pariter, *Aloën* tum herbam ipsam, tum & ejus succum densatum appellant, dicitur & *σῆρψ Ἀλγίβης* quod non modò in terra, sed & extra eam vivat. *Aloë* autem dicta videtur, quia maritimus gaudet. A recentioribus *Sempervivum* & *Sempervivum maximum*, quod *Sempervivi* modo diu duret, appellatur : *Sedum amarum* Columella : & quia ejus succus amarus est, idcirco & *Gentianam*, que amarissima est, *Aloën Gallicam* Apulejus nominavit. De *Aloë* Dioscorides lib. 3. cap. 25. quod folium habeat scillæ similitudine, crassum, pingue, in rotunditate modice latum, remorsum pandum : utrinque spinulis raris & brevibus, &c. & Plinius lib. 27. cap. 4.

Nn 3

I. Aloë

## I. Aloë vulgaris.

Aloë, Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod. ut : Cord.  
Lac. Tur. Gefn. hort. Lon. Ranvvolf. (quæ in  
Rama Judææ copiosa) Ad. Lob. Cæf. Caft. Garz.  
Cluf. hift. Eyft.

Aloë communis, Cam.

Aloë Dioscoridis, Col.

Aloë in infula Socotra, part. 2. Ind. Or. c. 6.

Aloë five Sempervivum, Arab. Sebar, Area, Ca-  
tecomor, Linc. part. 4. Ind. Or. c. 38. & fig. 19.

Azauar five Sempervivum, quo campi pleni,  
part. 4. Ind. Or.

II. Aloë folio in oblongum aculeum abe-  
unte.

Aloë Americana, Dod. Cluf. hisp. & hift. Caft  
Cam. Lugd. Tab. Eyft.

Aloë in Pisano vireto, Ad.

Aloë folio mucronato, Lob. Ger.

Aloë, Acoftæ.

Aloë alterum genus, Cæf.

Allagucy Indis, Fil y agulla, id est filum & acus  
Hispanis, cujus spinæ venenatæ, Frag.

Aloë spinosa five Americana, Cam.

America planta Aloës facie, Col.

Manguey Mexiocanum, alio nomine Metl,  
Linc. part. 4. Ind. Or. fig. 19.

Manguey arbor, ex qua parantur aquæ, vina,  
oleum, acetum, mel, fyrupi, fila, acus, & res  
aliæ infinitæ, in nova Hispania, quarum ple-  
rumque unam domibus suis, ad vitæ sustenta-  
tionem confitam, colunt, &c. part. 9. Ind. Oc.  
lib. 4. cap. 23.

Ex folijs succus dulcis elicitur : & ijsdem  
contufis & maceratis linum extrahitur, ex quo  
Indi lintea candidiffima texunt.

III. Aloë monstrosa Avinioninata : de qua  
in Prodomo, & ad Cluf. cur. post.

IV. Aloë palustris.

Stratiotes potamios, Dod. gal.

Planta folijs Aloës, quæ Stratiotes non est, An-  
guil.

Sedum aquaticum, Dod. fol.

Stratiotes five Militaris aizoides, Ad. Lob.

Stratiotes aquatica, Lugd.



## S E C T I O S E X T A.

RADIX RHODIA; TELEPHIUM; SCORPIOIDES;

PORTULACA; CEPÆA; CRITHMUM; KALI; TRA-

gum; Tithymalus; Pityusa five Efula; Apios five Tithyma-

lus tuberosus; Peplus five Efula rotunda; Pe-

plis; Chamæfyce; Lathyris;

Hipophaës.

## R A D I X R H O D I A.

**P**<sup>ῥοδία ῥίζα</sup> Dioscoridi lib. 4. caput. 45. sic dicta, quod contrita rosas redolet : hinc quibusdam  
Rosea radix.

Rhodia radix, Trag. Matth. Ang. Dod. ut : Rhodia five rosea radix, Fuch. Adv. Lob.

Cord. hift. Gefn. hort. Lac. Cluf. pan. & hiftor. Rosea radix, Lon. Tab.

Lugd. Caft. Cam. Ger.

(est.  
Flos nūc pallescētis, nunc rubefcentis coloris

## T E L E P H I U M.

**T**<sup>Τελέφιον</sup> Dioscoridi lib. 2. cap. 217. Portulacæ simile, alas binas in singulis foliorum geniculis habens,  
folijs caruleis crassis, lentis atque carnosissimis refertum, flore luteo aut candido, &c. Et Plinio lib. 27. cap. 13.  
Telephion & caule & folijs Portulacæ simile. Sic dictum volunt, quod ulceribus malignis ac deploratis, quibus  
Telephus Myfiæ rex ab Achille vulneratus consenuit, (quæ eam ob rem etiam Telephia vocantur) auxilietur.  
Vulgo Fabaria, à foliorum cum faba similitudine : officinis Crassula major. Verum Cotyledonis alterius  
descriptio Fabaria potius quàm Telephio convenire, Casalpino videtur : & sanè Telephium Dioscoridis non  
esse, cum ad folia ala non sint, censemus.

I. Tele-

I. *Telephium vulgare.**Scrophularia media, vel terria, Brunf.**Fabaria, Matth. Guil. Lugd.**Telephium, Matt. Gef. hor. Lob. Tab. Cast. Cam.**Telephium album, Fuch.**Acetabulum alterum, Cord. in Dioscor. album, Fuch. ico.**Crassula major, Dod. gal. Cæs. Thal.**Anacampseros, Gef. hor.**Faba inversa, Eid. Ad. Lob. ico.**Telephium alterum, sive Crassula, Dod.**Telephium vulgare, sive secundum, Clus. hist.**Crassula sive Faba inversa, Ger.**Coryledon alterum Dioscoridis, Col.*

*Alij folijs crenatis & subrotundis, ut apud nos provenit, pingunt: alij oblongis & integris, ut Lob. Dod. & Clusius. Flore est communiter albo, est & luteo: reperitur etiam flore purpurascens & folijs rarioribus, & est*

*Telephium tertium purpurascens flore, Clus. histor.*

*Huc referendum id quod solo folio glauco cæruleo vè à vulgato differt, quod*

*Telephium glaucum verius, Lob. ob.*II. *Telephium purpureum majus.**Scrophularia seu Portulaca major, Trag.**Telephium purpurascens, Fuch. Lugd.**Acetabulum purpureum alterum, Eid. ico.**Telephium floribus purpureis, Lob. ico. Lugd. Cam. ep. Tab. Ger.**Telephium quintum purpureo flore, Clus. hist.**Fabaria, Lon.**Crassula montana, Cæs.**Rapuntium umbellatum, Colum. part. 2.**Hoc folijs est longioribus & profundius cre-*

*natis: naps aliquando paucioribus, aliquando pluribus, quod posterius*

*Telephium quartum est, Clus. hist.*

III. *Telephium purpureum minus: in Pro-*  
*dromo descriptum.*

IV. *Telephium latifolium peregrinum.*

*Telephium Hispanicum, Clus. hisp. Lug. Tab.**Telephium primum, Dod. 1. sive Hispanicum, Clus. hist.**Telephium seu Crassula major Hispanica, Lob. Crassula major Hispanica, Ger.**Floribus est albis, etiam rubris.**Huic simile, modo idem non sit,**Telephium Austriacum, Clus. hisp. & hist.*

V. *Telephium repens folio deciduo.*

*Telephium minus repens sempervirens, Lob. Lugd. Cam.**Cepæa Pancij, Clus. hist. & hist. Cam.**Telephium tertium, Dod. sextum, Clus. histor. fortè Dioscoridis.**Telephium minus, Tab.**Telephium sempervirens, Ger.*

VI. *Telephium repens folio non deciduo.*

*Telephium Imperati in sua hist. Cam.**Telephium septimum sive legirimum Imperati Clus. hist.*

VII. *Telephium Dioscoridis, seu Scorpioi-*  
*des, ob silicarum similitudinem.*

*Scorpoides, Matt. Ang. Lac. Cast. Ad. Lob. Lon.**Scorpoides Matthioli, Dod. ut: Gef. hor. Lugd. Camer.**Lunaria burissa aliquibus, Ang. Gef. hor.**Telephyllon Cratevæ, Ang.**Telephium veterum verum, Guil.**Telephium, herba amoris, Cæs.*

## S C O R P I O I D E S.

**Σ** *Κεραυαδὲς Dioscoridi l. 4. c. 195. quod semen habeat ad similitudinem caudæ Scorpionis, & quod Scorpionum istibus præstantaneo sit auxilio: & Plinio l. 22. c. 15. cui Scorpium dicitur: quod Clymenum Dioscoridis esse, Casalpini & Columna volunt.*

I. *Scorpoides Bupleuri folio.**Scorpoides, Dodon. gal. Gef. hort. Lugd. prior, Dod. fol.**Scorpoides repens bupleuri folio; Ad. Lob.**Scorpoides bupleuri folio, Cam. Tab. Ger.**Leporis auricula vulgo, Cæs.**Catanancæ quorundam, Cam.**Clymenos Dioscoridis, Colum.*

II. *Scorpoides Portulacæ folio.*

III. *Scorpoides montanum, Lugd. quid?*

## P O R T U L A C A.

**A** *Ἀνδράχνη dicitur ipsa Portulaca Dioscoridi lib. 2. cap. 150. cui genera duo, Andrachne, & Andrachne sylvestris, qua folijs est priori crassioribus atque densis, in petrosis nascitur: aliquando in hortis folijs*

*folijs oleæ, sed minoribus multò, verum pluribus & teneris: cauliculis rubicundis, frequentibus, in terram inclinatis, &c. At Theophrastus Ἀδράχην herbam 1. caus. plant. 10. & 4. ejusdem 3. exhibet: dein Ἀδράχην arborem 1. hist. 8. & 15. 4. hist. 4. Portulacam Gazæ reddit. Verum Plinius lib. & cap. 20. scribit, Portulacam quam Peplion vocant, non multum sativa efficaciorē esse: ubi Portulacam cum Peplio herba diversissima confundit: causa erroris quod aliqui Peplion, portulacam agrestem vocarint: confundit quin etiam vires sylvestris cum sativæ Portulacæ viribus.*

I. Portulaca latifolia, seu sativa.  
Portulaca hortensis, Brunf. def. Trag. Fuch. Dodon. gal.  
Portulaca domestica, Matth. Ad. Lob. Cast. Taber. Ger.  
Portulaca, Tur. Cord. in Diosc. Lon. sativa, Ang. (Γαλιόλια in Græcia) Cord. hist. Dod. gal. Lugd. Eystett.  
Portulaca major, Cam. hortensis, Ges. hort.  
Portulaca latioribus folijs, Cæf.  
II. Portulaca angustifolia sive sylvestris.

Portulaca sylvestris, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. ut: Ad. Lob. Lugd. Cast. Ger.  
Portulaca, Lac. arvensis, Tab.  
Portulaca spontè nascens, Cord. hist.  
Portulaca minor, Ges. hort. Cam.  
Portulaca angustioribus folijs, Cæf.  
Cepæa, Cord. in Diosc. Lon. desc.  
III. Portulaca arvensis.  
Portulaca exigua, Cam.  
IV. Portulaca aquatica, Thalij, quid?  
V. Portulaca marina, Tab. Ger. quid?

## C E P Æ A.

*Κηπόα Dioscoridi lib. 3. cap. 168. Portulacæ similis est.*

Cepæa, Matth. Ang. Lac. Lon. ico. Ad. Lob. Matthiol. Cast. Cæf. Tab. Clus. hist.

Flosculis est albis, ex purpureo candicantibus, vel luteis.

## C R I T H M U M.

**K**ρίθμον sive κέτταμον Dioscoridi lib. 2. cap. 157. folijs pinguibus, albicantibus, portulacam referentibus, sed crassioribus, longioribus, falsoq; gustu, floribus candidis, &c. in muria servatur, cruda & cocta editur. Plinius lib. 21. cap. 15. Batin appellasse videtur, Batin marinam, & Batin hortensianam, quam aliqui Asparagus Gallicum vocant, sine ulla notis proponens: Batis etiam lib. 21. cap. 27. meminit, quæ alvum molliat, nec plura habet.

I. Crithmum, sive Fœniculum maritimum majus, odore Apij.  
Baticulæ alterum genus ex Sicilia, Cæf.  
II. Crithmum, sive Fœniculum maritimum minus.  
Crithmum primum, Matth.  
Crithmum, Ang. (& herba S. Petri) Dodon. gal. Cord. in Diosc. Lac. Tur. Lugd. Cast. Tab.  
Crithmus, vulgo Creta seu Salsa marina, Ges. ap.  
Crethamum marinum, Cord. hist.  
Crithmum marinum, Ges. hor. Dod. Ger.  
Fœniculum marinum, videtur verum Empeiron, Rond. cap. de mem. læsa.  
Fœniculum marinum, sive Empetrum, Ad. aut Calcifraga, Lob.  
Batis, Ges. hort.  
Baticula quasi parva Batis, Cæf.  
Creta marina, Lon.

III. Crithmum maritim. flore Asteris Attici.  
Crithmum tertium, Matth. Lugd. Cam.  
an Anthillis major, Cord. ob. sylv.  
Anthillis prima, Dioscoridis, Cæf.  
Crithmum Chrysanthemum, Dod. (Aster Atticus marinus quibusdam) Lugd. Tab. Ger.  
Chrysanthemum littoreum, Ad. Lob.  
IV. Crithmum maritimum spinosum.  
Crithmum secundum, Matth. Cast.  
Secacul, Ang.  
Crithmum spinosum, Dod. Tab. Ger.  
Crithmum sylv. Eryngium folijs Apij Plinij, Cæf.  
Pastinaca marina, Ad. Lob. Lugd.  
Tribulus marinus quorundam, Lugd.  
Cachry marinum, Cam.  
Corymbi alij colore candido, alij subrubente, aut violaceo: in hortis cultum, lætius ac minus spinosum redditur.

## K A L I.

**K** *Ali Mauritanorum, aliqui ad Anthillidem alterum Dioscoridis: alij ad ejusdem Tragon (cum tamen sapore non sit acerbo, nec acinis constet) referunt. Plinius lib. 8. cap. 22. ad Halymum retulisse videtur, dum inquit, alij olum maritimum falsum, & inde nomen, &c.*

## I. Kali majus cochleato semine.

Kali, Matth. (qui & hoc & Salicorniam unâ figurâ expressit) Dod. Cast.

Kali magnum, Sedi medij folijs semine cochleato, Ad.

Kali magnum, Lob. Lugd. & Kali Dalechamp. Soda, Lob. ico.

Kali cocheatum majus, Cam.

Anthillis altera falsa, Cam.

Salfolæ genus in hortis, Isgarum vulgo, Cæf.

## II. Kali minus album semine splendente.

Anthillis altera, Borda quibusdam, Dod. gal. Lugdun.

Alcali minus, Gesl. hort.

Kali album, Dod.

Kali minus, Ad. Lob. ico. Lugd. Eyft.

Kali alterum seu minus, Cam.

Salfolæ quædam in maritimis, Cæf.

## III. Kali minus alterum.

Kali parvum folijs oblongis, Cam.

Anthilloides, Thal.

Est majus & minus.

Huc referri debent,

Anthillis minor tertia, quinta & sexta, apud Cord. in obs. sylv.

IV. Kali minus villosum: quod primum in Prodromo.

V. Kali gramineo folio: quod 2. in Prod.

Salfolæ congener semine Polygoni, Cæf.

VI. Kali Arabum primum genus, Rauvvolf. Lugd. ap.

VII. Kali Crassulæ minoris folijs.

Kalli 2. species, Anthillis quibusdam, Alp.

Kali floridum røpens, Aizoides Neapolitærum, Col. part. 2.

VIII. Kali Ægyptiacum folijs valde longis hirsutis.

Kalli tertia species, Alp.

IX. Kali geniculatum majus.

Kali, Matthiol. Ang. geniculatum, Lugd. Cam. Tabern.

Salicornia, Dod. ut: Lugd.

Anthillis constans veluti tritici granis, Cord. ob. sylv.

Alcali, Gesl. hort. Lon.

Kali geniculatum vermiculatum, Ad.

Kali five Sedum marinum, Lemnio.

Kali tertium, Cam. ep.

Kalli primum, Kellu Ægyptijs, Alp.

Salfolæ genus aliud, Cæf.

Differentiæ duæ, unum simplicius & brevius, dodrantali altitudine, rectum & annuum: alterum multis ramulis fruticæ, lignosum & grandius, perpetuum. Habetur & rubrum & viride.

X. Kali geniculatum alterum, vel minus.

Kali Arabum 2. genus, Rauvvolf. Lugd. ap.

## T R A G U M.

**T** *ῥάγος, sive Ξυπρίον, aut Τράγανος à Dioscoride l. 4. c. 51. & à Plinio l. 28. c. 13. Tragi & Scorpij nomine proponitur: folijs carere scribunt: & l. 22. c. 15. Scorpius alter.*

## I. Kali spinosum cochleatum.

Drypis Theophr. Tab.

Kali five Alkali, Dod. belg.

an Hipophæston Dalechampij, Lugd.

Sunt qui Tragos esse velint.

## II. Kali spinoso affinis.

Tragum, Matth. Lac. Cast. def. Lon. Tab.

Tragus & Kali secundum genus, Dod. gal.

Tragon non est sed Drypis, Guil.

Tragon improbus, Matth. Ad.

Tragon Matthioli, Lob. Lugd. Ger.

an Tragos, Cæf.

Cum Dioscorides Trago folia non tribuat, idcirco videntur Matthiolus & Tabernæmontanus sine folijs pinxisse: at Lobeli<sup>9</sup> & ex eo Lugdunensis historia, folia adpinxere, & quidem rectè, ut in Lio Venetorum observavimus. Non defunt qui utramq; hic propositam plantam eandem faciant, & forsan non ita malè: quàmvis posterior longioribus & latioribus sit folijs.



## T I T H Y M A L U S.

**T**<sup>τιθύμαλλος</sup> & Dioscoridi l. 4. c. 165. <sup>τιθύμαλλος</sup> & Theophrasto 9. hist. 12. Lactariam Gaza vertit. Plinio lib. 26. cap. 8. Tithymalus, quem nostri herbam lactariam vocant, alij Lactucam caprinam. Sic etiam Columella: at Celsus marinam vocavit: officina Efulam dicunt. Lactaria nominata, ob lac omnibus commune, cum hac leviter secta, vel folio abrupto, lac effluit.

Genera Dioscorides septem recenset: 1. <sup>μαρυνάριος</sup> mas χαρνιας, quibusdam <sup>μαρυνάριος</sup> αμυγδαλοειδής dictus: alterum <sup>μυρσινίτης</sup> μυσίτης, quem <sup>μυρσινίτης</sup> αμυγδαλοειδής cognominat: 3. <sup>μαρυνάριος</sup> quem <sup>τιθύμαλλος</sup> τιθύμαλλος appellarunt: 4. <sup>μαρυνάριος</sup> 5. <sup>μαρυνάριος</sup> 6. <sup>μαρυνάριος</sup> 7. <sup>μαρυνάριος</sup> Theophrasto 9. hist. 1. Tithymallorum plura sunt genera, maritimus: masculus olea folio: myrtarius candidus, Myrti folio. Plinio l. c. genera ejus multa: 1. Characias, qui & masculus existimatur: 2. Myrsinitem vocant, alij Caryiten folijs myrti: 3. Paralius vocatur, sive Tithymalus folio rotundo: 4. Heliotropium appellant, folijs Portulacae, sic dictum, quoniam caput cum Sole circumagit: 5. Cyparissium vocant, propter foliorum similitudinem: 6. platyphyllon, alij corymbiten, alij amygdaliten à similitudine: 7. dendroides, alij cobion, alij leptophyllon.

*Tithymalus Characias, id est, vallis, sive amygdaloides, à foliorum aliqua forma.*

## I. Tithymalus Characias amygdaloides.

Tithymallus masculus, Theoph.

Ascebra magnum, Mesuæo.

Tithymalus characias, Ang. 1. sivemas, Dod. ut: Lugd. Cæs.

Tithymalus characias 2. Clus. hisp. Cam.

Tithymalus characias amygdaloides, Lob.

Tithymali characiæ species, Thal.

Tithymalus amygdaloides, & amygdaloides larifolius, Tab.

## II. Tithymalus characias rubens peregrinus.

Tithymalus characias, Matth. Lac. Lon. Lugd. Cast. Tab.

Tithymalus characias legitimus 1. Clus. hisp. & histor.

Tithymalus characias alter, Dod. Cæs.

Tithymalus platyphyllon, Ad.

Tithymalus characias Monspeliensium, Lob.

## III. Tithymalus characias folio lanuginoso.

Tithymalo characiæ primo similis, Clus. hisp.

Tithymalus characias alter, Eid. hist.

## IV. Tithymalus characias rubens Germanicus.

Tithymalus pentadonon, Cord. hist.

Tithymalus characias quartus, Dod.

Tithymalus characias Pannonicus, Clus. pan.

Tithymalus characias tertius Austriacus, Eid. histor.

Tithymalus fruticosus alius stipitibus rubris, Camer.

an Tithymalus latifolius alter, Cæs.

## V. Tithymalus characias angustifolius.

Tithymalus myrsinites altera, Lob. Lugd.

Tithymalus myrsinites angustioribus folijs, Cæsalp.

Tithymalus myrsinites tertius angustifolius, Taber.

## VI. Tithymalus characias folio serrato.

Tithymalus characias quintus, Dod.

Tithymalus serratus Monspeliensium, Ad. Lob.

ico. Dalech. Lugd. cui & myrsinites serratus.

Tithymalus myrtites Valentinus, Clus. hist.

## VII. Tithymalus sylvaticus lunato flore.

Tithymalus platyphyllon, Ang.

an Tithymalus dendroides, Cord. in Diosc.

Tithymalus in montibus, Cæs.

Tithymalus lunato flore, Colum.

*Tithymalus myrsinites, sive myrtifolius.*

## I. Tithymalus myrtifolius arboreus.

Tithymalus dendroides, Matth. Ges. hor. Lac. Ad. Lob. Lugd. Cast.

Tithymalus characias tertius, Dod.

Tithymalus arboreus myrtifolius, Lob. ico.

Tithymalus arboreus, Cæs.

an Tithymalus petræus, Ang. Cam.

## II. Tithymalus dendroides ex Cod. Cæsareo, Dod. Lugd.

## III. Tithymalus myrsinites latifolius.

Tithymalus myrsinites, Matth. Ang. Dod. ut: Ges. ap. Lac. Lon. Lob. Cæs. Lugd. Cast. Cam.

Tithymalus myrsinites, myrtifolius, foemina repens Diosc. Ad.

Tithymalus myrsinites legitimus, Clus. hist.

Tithymalus myrsinites primus, Tab.

## IV. Tithymalus myrsinites angustifolius.

Tithymalus myrsinites Dioscoridis, Ad. Lob. icon.

Tithymalus myrsinites alter, Tab.

Tithymalus myrsinites in montibus, Cæs.

V. Tithy-



V. *Tithymalus myrsinites* fructu verrucæ simili.

*Efula multicaulis* & quarta, Trag.

*Tithymalus helioscopius*, Dodonæi in ico. & Lugd.

*Tithymalus verrucosus* Dalechampij Lugd.

*Alypum* Guilandinus vocare solebat.

*Tithymalus maritimus*.

I. *Tithymalus maritimus*.

*Tithymalus paralius*, Matth. Ang. Dod. ut: Lac. Gefn. hort. Ad. Clus. hisp. Lob. Lon. Cast. Lugd. qui tres figuras habet, Cam. Tab.

*Tithymalus maritimus*, Cæf.

Variat, is qui in maritimis natus, ab hortenſi, hinc duæ figuræ apud Dodonæum, ejus qui in maritimis & ejus qui in hortis crescit.

II. *Tithymalo maritimo affinis linariae folio*.

*Efula altera* in humidis, Cæf.

*Tithymalus linifolius*, Cam.

*Tithymalus amygdaloides angustifolius*, Tab.

Hic antequam floreat, à *Linaria* solo lacteo succo distinguitur.

III. *Tithymalus maritimus spinosus*.

*Glaſtivida altera*, Belli ep. 4. ad Clus.

*Glaſtivida* 2. Cretica, Ponæ Bald. Ital.

IV. *Tithymalus maritimus purpureſcentibus floribus*.

*Efula rara* è Lio Venetorum inſula, Adv. Lob. Lugd.

an *Alypum*, Ang.

Cum *Efulis* nihil præter lac commune habet; *Pityuſæ* ſpecies Venetis, alijs *Turbith nigrum*.

*Tithymalus latifolius*.

I. *Tithymalus latifolius* *Hispanicus*.

*Tithymalus platyphyllos*, Clus. hisp. & hiſt. Dod. Lugd.

*Platyphyllum* *Hispanicum*, Lob.

*Tithymalus latifolius*, Cæſalp. *Hispanicus*, Tabern.

II. *Tithymalus arvenſis latifolius Germanicus*.

*Tithymalus platyphyllos*, Fuch. Tur. Lon.

*Pityuſa major*, Dod. Gal. ico. Thal.

*Pityuſa* ſive *Efula minor*, Dodonæi, Lugd.

Major eſt, & minor, & hæc folijs leviter hirsutis.

*Tithymalus helioscopius*.

*Tithymalus helioscopius*.

*Efula*, Brunf. vulgaris & tertia, Trag.

*Tithymalus helioscopius*, Matth. Ang. Fuch.

Dod. ut: Cord. in Dioſc. Tur. Gefn. hort. Lac.

Lon. Adv. Lob. Cæſ. Lugd. cum icone Matth. &

Dod. Thal. Cam. Tab.

*Tithymalus dendroides*, Dodonæi in ico. Thal.

Alia eſt folijs crenatis, ſed non uſque ad caulem: alia non crenatis & rotundioribus: caule leviter hirsuto.

*Tithymalus cypariſſias*.

I. *Tithymalus cypariſſias* folijs punctis croceis notatis.

*Efula ſcabioſa*, Gefn. col.

*Tithymalus* γαυρόφυλλος, Thal.

*Tithymalus arvenſis*, Cam.

Duplex eſt, major & minor.

II. *Tithymalus cypariſſias*.

*Tithymalus cypariſſias*, Matthiol. Fuch. Ang.

Dod. ut: (& *Pityuſa minor*) Tur. Lac. Gefn.

hort. Lon. Ad. Lob. ob. Caſt. Thal. Lugd. (qui

Matthioli & Dodonæi figuram habet) Taber.

Cam.

*Tithymalus cupreſſinus*, ſive humi pinus, Lobel. icon.

*Efula officinarum*, Cæſ.

Variat: 1. folijs lini virentibus, comâ flavâ, aliquando ſubrubente: 2. in montibus candidior, foliolis anguſtis, *Efula candidior*, Cæſalpino: 3. vix palmam altus, capitulo rubente.

III. *Tithymalus* ſive *Efula exigua*.

*Efula exigua*, Trag. Lob. minima, Lugd.

*Tithymalus leptophyllos*, Matthiol. Lugdun.

Cam. Thal.

*Tithymalus minimus*, Tab.

*Papaver ſpumeum*, Gefn. hort.

*Peplis minor* Dalechampij, Lugd.

IV. *Tithymalus* ſive *Efula exigua* folijs obtuſis: 2. loco in Prodromo deſcribitur.

V. *Tithymalus exiguus ſaxatilis*: 3. in Prod.

## PITYUSA SIVE ESULA.

**P**ITYUSA, à *Cypariſſia* *Tithymalo* ſpecie diſſerre exiſtimatur, ideôque etiam in *Tithymali* genere connumeratur: caule eſt cubito altiore, geniculato, foliolis acutis & tenuibus, pini folia imitantibus: floribus

*exiguus pene purpureis: semine instar lenticiula lato: radice candida, crassa, lacteo succo referta: quibusdam in locis frutex hic prae grandis invenitur, &c.* Dioscoridi lib. 4. cap. 166. At Plinius lib. 24. cap. 6. cum honore & Pityusa simili de causa dicitur, quum quidam in Tithymali genera numerant: frutex similis est picea flore parvo purpureo. At Pityusa videtur esse Esula sive Ezula, Arabum Alscebra aut Alsobra & Scebra. Ezula etiam nomen à πικρὺν luxatum esse potest: duabus enim prioribus syllabis sublatis, remanet στρ, cujus diminutivum Usula, & vocali prima mutata, Esula.

I. Tithymalus folijs pini, fortè Dioscoridis Pityusa.

Esula vulgaris major & quinta, Trag.

Pityusa Esula vulgo dicta, Gefn. hort.

Pityusa sive pinea, Esula minus offic. Ad. Lob.

Tithymalus pinea, Eid. ico.

(ob.

Esula minor, Dod. Lugd.

Esula major, Cæs.

Tithymalus cupressinus 2. Tab.

II. Tithymalus palustris fruticosus.

Esula major & secunda, Trag.

Pityusa major, Dod. gal. desc. Cord. in Diosc.

Pityusa grandis, Thal.

Esula major, Dod. Lugd.

Esula major Germanica, Ad. Lob. Lugd.

Tithymalus palustris, Cæs.

Tithymalus fruticosus Germanicus palustris, an Tithymalus maximus, Tab. (Cam.

III. Tithymalus montanus non acris.

Esula dulcis (vel 7.) Trag. Gefn. hort. Lon. Lob. ob. Lugd.

Erino cognata herba, Gefn. hort. Ad.

Pityusa sive Esula minor altera floribus rubris, Lob. Lugd.

Flos colore variat, est viridis, est rubri.

IV. Tithymalus incanus hirsutus: qui i. in Prodomo.

an Pityusa Anglicana, Cam.

V. Tithymalus folijs brevibus aculeatis. Pityusa, Matth. Ang. Lac. Lon. Cast. Lugd.

## APIOS SIVE TITHYMALUS TUBEROSUS.

**A**πῖος οἱ ἢ ἰσχυρά, radice est ad pyri formam accedente, rotundiore tamen, lactei succi plena, &c. Dioscoridi lib. 4. cap. 177. At Theophrasto 9. hist. 10. ἰσχυρὸν ἀπῖος (Gaza reddit carica seu pyrus) folio est rutaceo, brevi, canibus ternis aut quaternis humistratis: radice qua albucum, verum spumosa: ἰσχυρὸν dicitur, quod ἰσχυρά, id est, caricam seu sicum aridam radix referat, Dodonæo monente.

I. Tithymalus tuberosa pyriiformi radice.

Apios, Matt. Ang. Dod. gal. Lac. Lug. Cast. Tab.

Apios vera, Ad. Lob.

Tithymalus tuberosus Diosc. Lugd. tuberosa radice, Clus. hist.

folijs & ramulis minoribus: 2. radice minore, ramulis longioribus & folijs majoribus.

II. Tithymalus tuberosa oblonga radice.

Ischas alter, Clus. hist.

III. Tithymalus tuberosus Germanicus.

Tithymalus tuberosus alter, Cam.

Duplex est: 1. est radice crassiore & majore,

## PEPLUS, SIVE ESULA ROTUNDA.

**Π**επλός, οἱ ἢ συνή, οἱ ἢ μέγαντα ἀφρώδην, exiguus frutex lactei succi plenus folio parvo ceu ruta, at latiore: universa coma ferè dodrantali, rotunda, humi sparsa: semine sub folijs parvo, rotundo, minore quam candidi papaveris, radicem habet unicam, &c. Dioscoridi lib. 4. cap. 168. Peplos, quem aliqui Sycen, alij meconion aphrodes vocant, Plinio lib. 27. cap. 12

I. Peplus sive Esula rotunda.

Peplus, Matth. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord. in Diosc. & hist. Turn. Lac. Lon. Adv. Lob. Lugd.

Cast. desc. Thal. Tab. Ger.

Peplis, Cast. ico.

Esula rotunda, Gefn. collect.

II. Peplis altera species.

Tithymalus Epithymi fructu, Col.

## P E P L I S.

**Π**επλῖς, οἱ ἢ ἀνδράχων ἀρχία, Hippocrati πέπλιον, frutex est ramulos quoquo versum expandens & candidi succi plenus, folijs hortensis portulaca rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, ceu pepli: fervente gustu: radice tenui, singulari ac supervacua: in maritimis maxime nascitur, &c. Dioscoridi lib. 4. cap. 169. At Plinius lib. 6. cap. 22. Peplij meminit, ubi Portulacam sylvestrem ejusdem generis ac naturæ cum

cum *Portula sattivā*, cum *Peplio herba diversissima confundit*, ideo quod nonnulli *Peplion*, *agrestem Portulacā* vocarint,

I. *Peplis maritima folio obtuso.*

*Peplis*, *Marthiol.* *Turn.* *Advers.* *Clus.* *hispan.* & *hiflor.* *Lobel.* *Lugdun.* *Cast.* *descript.* *Camer.*

*Tab. ico. Ger.*

*Peplus*, *Cast. ico. minor*, *Tab.*

*Peplium*, *Cæs.*

*Peplion Dalechampi*, *Lugd.*

Variat caule rubro, albo.

II. *Peplis montana folio Numulariæ.*

*Peplis altera*, *Ang.*

## C H A M Æ S Y C E.

**X** *Αμυγδαλίνη* ἢ *συνὴ* ramos emittit quaternum digitorum, per terram stratos, teretes, lactei succi plenos: solia lentis figura peplo similia, parva, tenuia ac terræ inhaerentia, semen sub solijs rotundum ceu pepli, radicem tenuem ac supervacuam: sed neque florem neque caulem promit, *Dioscoridi lib. 4. cap. 170.* *Chamaesyce lentis solia habet, in aridis petrosiq; nascens, Plinio lib. 24. cap. 15.*

*Chamaesyce*, *Matth.* *Ang.* *Gesn. hort. Dod.* [duplicem figuram habet] *Camerar.* *Tabernæ-Adv.* *Lob.* *Clus. hisp.* & *hifl.* *Cæsalp.* *Lugd.* (qui) *mont.* *Ger.*

## L A T H Y R I S.

**L** *Αδρεϊς* quam aliqui *Τιθύμαλον* vocant, & *Tithymalorum* numero ascribunt, caule est cubitali digiti crassitudine, inani: in cacumine sunt alæ & solia, in caule oblonga amygdalinis proxima, &c. fructum gerit triplici loculamento distinctum, rotundum ceu capparum, in quo tria sunt minuta semina, incurvantibus tuniculis inter se discreta, ervis majora, quæ decorticata candida sunt, &c. totus fructus lacteo succo turget, *Dioscorides lib. 4. cap. 167.* *Lathyrus solia habet multa, lactuca similia, tenuiora, germina multa, in quibus semen tuniculis continetur ut cappar: quæ cum inaruerē, eximuntur grana piperis magnitudine, candida, dulcia, facilia purgatu, Plinius lib. 27. cap. 11.* *Grannum regium minus, Mesuæo.*

I. *Lathyrus major.*

*Catapauca*, *Brunf.* *Cæs. minor*, *Lob.* *Tab.*

*Lathyrus*, *Brunf.* *Matth.* *Fuch.* *Dod. ut:* *Cord. in*

*Diosc.* *Gesn. h. Tur.* *Lac. Ad. Lon.* *Lug. Cam.* *Cast.*

*Lathyrus* sive *Cataputia minor* 2. *Trag.*

*Cataputia vulgaris*, *Tartago Hispanorū*, *Eyst.*

Ratione ætatis, latiora vel angustiora solia habet: hinc apud *Tab.*

*Lathyridis* latif. & angustifolij; apud *Gerardū.*

*Lathyridis* sive *Cataputia majoris* & *minoris* nomine, figuræ exhibentur.

II. *Lathyrus minor conglomerato flore.*

*Lathyrus minor Dalechampi*, *Lugd.*

III. *Lathyrus minima.*

*Cataputia pusilla*, *Cæs.*

IV. *Lathyrus affinis.*

Semen *Visa dicta* ex *Bengala*, *Lathyridis* grano simile, *Acostæ Clusij cap. de Manna*, quid?

## H I P P O P H A E S.

**H** *Ιπποφαῖς* cum sit ex ijs, quæ lacteum succum fundunt, de eo, licet nobis incognitum in præsens. *Ἰπποφαῖς* fructus est densus, surculosus, solijs longis oleagineis proximis, angustioribus, mollioribus, inter quæ spina candicantes, sicca angulosa, floribus *hedera corymbos* referentibus, racematim coherentibus, sed minoribus mollibusq; & ex albedo partim rubentibus: radice crassa, molli, lactei succi plena, amara, ex qua recludit *Thapsia liquor* excipitur, ad biliosa, aquosa & pituitosa detrahenda &c. *Dioscorides lib. 4. cap. 162.* *Hippophyes* in sabulosis maritimisq; nascitur, spinis albis, *hedera* modo racemosa est, candidis & ex parte rubentibus acinis, radix succo madet, qui aut per se conditur aut pastillis farina, *Plinius lib. 22. cap. 12.*

I. *Hippophaës* quibusdam *ἀνάρθρα νανὰ θάριον*, id est, *Spina purgatrix*, *Ang.*

*Hippophaës* ex *Codice Cæsareo*, *Dodon.* *Lugdun.*

II. *Planta lactaria*, *Xabra* & *Camarronum Rhasis*, *Rauvvol.* & *Lugd.* quid?

III. *Dante* radix quædam candida lacticina, *Acostæ Clusij cap. de Manna*. quid?

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER OCTAVVS.

## SECTIO PRIMA.

### DE CONVULVULIS.

SCAMMONEA; CONVULVULUS SEU SMILAX LÆVIS; SOL-  
DANELLA; SMILAX ASPERA ET SALSAPARILLA; CHINA;  
BRYONIA; MECOACHA; LUPULUS; VITIS VINIFERA.

### SCAMMONEA.

**Σ**καμμωνία Dioscoridi lib. 4. cap. 171. & Theophrasto 4. hist. 6 & 9. hist. 1. & 10. Latinis Scammonia, ex cuius radice succus elicitur, ut lib. 12. sect. 6. ostendimus. Dioscoridis descriptio nostra plantae conveniret, nisi suae ramos quadantenus hirsutos, folia item hirsuta tribueret: quam hirsutiem (nescio an loci ratione) hactenus non observavimus: & Matthiolus in Dioscoridea descriptione omisit.

#### I. Scammonia Syriaca.

Scammonia, Matt. Gef. hor. Lon. Lug. Cast. Cæf.  
Scammonia, Dod. gal. Cord. in Diosc. Antio-  
chena, Cam.

Scammoniū, Cord. hist. Dod. Syriacū, Ad. Lob.

#### II. Scammonia Monspeliaca folijs rotundioribus.

Scammonia Monspel. Gefn. hort. Eyf.  
Scammonium Monspeliense, Ad. Lob. ico.

Scammonia Valentina, Cluf. hisp. Tab. Ger.

Scammonia maritima Monspeliaca, Lug. Cam.

Apocynum 4. latifolium, Cluf. hist.

#### III. Scammonie Monsp. affinis, folijs acutiori-

Periploca prior, Dod. (bus.

Scammonij Monspeliaci varietas, Lob.

Apocynum 3. Cluf. hisp. 3. latifolium, Eid. hist.

Scammonij quoddam genus, Cæf.

Volubilis marina, Tab.

### CONVOLVULUS SEU SMILAX.

**S**milacem duplicem Dioscorides habet: alteram lib. 2. cap. 176. ubi Phaseolum intelligere oportet. Alteram lib. 4. cap. 144. & 145. quam in asperam & laevem distinguit: illa, σμῖλαξ τραχέα, hac σμῖλαξ λεία dicitur: Utriusque & Plinius lib. 24. cap. 10. meminit. At Theophrastus 3. hist. 16. Smilacem arborem, quae illic sit similis describit, quam Plinius lib. 16. cap. 6. Illic genus facit: qui lib. 16. cap. 10. & Taxum à quibusdam Smilacem vocari scribit. Smilax laevis, Convolvulus à Plinio lib. 21. cap. 5. dictus videtur: quod arbores scandat & eis se convolvat: quibusdam Jafone ejusdem lib. & cap. 22. censetur.

Smilax laevis,

#### I. Convolvulus major albus.

Volubilis, Brunf. latifolia, Fallop. de decor.  
Volubilis major, Trag. Lon. Thal. Tab.  
Smilax laevis, Matt. Fuch. Gef. h. Lac. Cast. Lug.  
Smilax laevis major, Dod. ut: vel lenis major,  
Helxine cissampelos, Cord. in Diosc. (Lob. Ger.  
Malacocissus Damocratis, Ang.  
Convolvulus major, Gefn. hort. Ad. Cæf.  
Campanula alba sylv. Svvert.  
Convolvulus major flore albo, Eyf.

Semen nigrum est, aliquando rufescens.

II. Cōvolvulus ramosus incan<sup>o</sup> folijs piloselle.  
Helxine cissampelos ramosa Cretica, Ponç Ital.

#### III. Convolvulus minor arvensis.

Volubilis minor, Trag. Lon. Thal.

Helxine cissampelos, Matth. Fuch. Ang. Gefn.  
hort. Lugd. Cast.

Helxine hederacea, Lac.

Helxine in segetibus nascens, Cord. in Diosc.

Smilax laevis minor, Dod. ut: Ger.

Scammonia parva, Ang. Cam.

Orobanche Theophrasti, Ang.

Convolvulus, Tur. minor, Gef. hor. Cef. Cl. hist.

Convolvulus minor purpureus, Ad. Lob.

Volubilis arvensis, Tab.

Dioscoridi l. 4. c. 39. ἐξέλεν dicitur, quod folijs est hederæ, sed minoribus, & c. interpres Helxinen cissampelon reddidit: quibusdam Orobanchae Theophrasti (Ervanga Gaza) 8. hist. 8. alijs Scammonia tenuis Plinij l. 24. c. 15.

Variat flos colore, qui vel candidus, vel roseus,

seus, vel albus cum purpureo umbilico, vel pun-  
nicantibus lineis aspersis, vel purpureus radijs  
albis pictus.

IV. Convolvulus minor semine triangulo.  
Orbanche seu Cussus altera Serapionis, Trag.  
Orobanche Ruellij, Gef. hort.

Helxine cissampelos, Dod. gal. Lugd.

Helxine cissampelos altera atriplicis effigie,  
Ad. Lobel.

Centunculus Plinij, Anguil.

Elatine, Cord. in Diosc.

Convolvulo similis herba, Gef. hort.

Convolvulus niger, Dod.

Volubilis media sive nigra, Thal.

Volubilis nigra, Tab. Ger.

Fromentone alterum genus, Cæsalp.

Polygonum hederaceum, Colum.

Alijs Malacocissos Constantini Imperatoris:  
alijs Orobanche: alijs Helxine cissampelos: a-  
lijs Elatine: alijs Centunculus Plinij l. 24. c. 15.  
qui Græcis Clematis dicatur.

V. Convolvulus cæruleus hederaceo angu-  
loso folio.

Smilax cærulea, Dod. gal.

Scammonia similis flore cæruleo, Anguil.

Convolvulus peregrinus vel flos noctis, Gef. ho.  
Nil Arabum, Gef. hort. Eyit.

Convolvulus asureus sive cæruleus hederace-  
us, Ad. Lob.

Campana cærulea, Dod. Bry.

Volvulus cæruleus, sive campana azura, Lugd.

Convolvulus cæruleus, Cam. Cast. Tab. Ger.

Convolvuli alterum genus, quod pro Scammo-  
nio ostenditur, Cæf.

Campanula cærulea hederaceo folio, Svvert.

Quibusdam Granum nil Serapionis & Ara-  
bum: Ligustrum nigrum Columellæ alijs: alijs

Porthos cæruleus Theophrasti: quibusdam Vo-  
lubilis lanuginosa, Mesuæi.

VI. Convolvulus purpureus folio subrotun-  
do: qui 1. in Prod.

Convolvuli species altera, quæ ad Nil Avicen-  
næ referri potest, Dod.

Campanula azura, Svvert.

Campanula Indica purpureo violacea, Bry.

Convolvulus Indicus flore violaceo, Eyft.

VII. Convolvulus peregrinus cæruleus, fo-  
lio oblongo: qui 2. in Prod.

Convolvulus cæruleus minor Bauhini, Bry.

Campanula incognita cæruleo alba, Eid.

VIII. Convolvulus folijs laciniatis, vel  
quinquefolius: qui 3. in Prodr.

Convolvulus Ægyptiacus Bauhini, Bry.

IX. Convolvulus argenteus Altheæ folio.  
Convolvulus folio Altheæ, Clus. hisp. & hist.  
Lugdun.

Convolvulus peregrinus, Lob. Cast.

Scammonium minus Plinij 2. Tab.

sub Papavere cornuto luteo minore, apud Ger.

Alijs Helxine cissampelos Dioscoridis: qui-  
busdam Scammonium minus Plin. Flores pur-  
pura candicat: interdum omnino purpurascit.

X. Convolvulus Linariæ folio.

Cantabrica quorundam, Clus. hisp. & hist.

Cantabrica Plinij, Cast.

Convolvulus minimus spicæfolius, Ad. Lob.  
Lugd. Ger.

Volubilis terrestris Dalechampij, Lugd.

Scammonium minus Plinij, Taber.

Helxine stans Guilandino, Scammonia Pata-  
vina Cortuso dicebatur.

Variat magnitudine, reperitur enim vix duas  
trésve uncias altus: flore est communiter pur-  
pureo, rarius albo.

## S O L D A N E L L A.

**S**milacis levis generibus Soldanella ascribenda venit, quare & Belgis Convolvulus marinus dicitur: quæ du-  
plex est, maritima & alpina: alpina, huic ob foliorum similitudinem junximus. Soldanella maritima,  
quæ in officinis habetur, Dioscoridis l. 2. c. 148. est καὶ αὐτὴ βραχυστάκη, Brassica marina: si textus corrigatur.

I. Soldanella vel Brassica maritima major.

Brassicæ marinæ genus, Rauwolf. Lugd. ap.

Convolvulus marinus noster, Imperato.

Hujus folia quædam sunt laciniata, quædam  
non, omnia tamen parte superiore sinuata.

II. Soldanella maritima minor.

Brassica marin. Matt. Dod. gal. Ang. Cor. in Diosc.

& hist. Gef. hor. Lac. Tur. Lon. Lugd. Cast. Cam.

Soldanella, Gef. h. Dod. Lon. Ad. Lob. Cæf. Tab.

Soldanella marina, Ger. Eyft.

III. Soldanella alpina rotundifolia.

Soldanella montana, Ad. Lob. ico.

Soldanella alpina, Cam. ep. Clus. pan.

Soldanella alpina minor, Eid. hist.

Variat

Variat folijs & floribus: folijs, alijs supernè viridib. infernè dilutiorè virore splendentibus: alijs folijs infernè ut Cyclamini rubentibus, quæ tertia species est Clusio. Florè est purpureo, nunc

saturatione, nunc dilutiorè: reperitur & niveo.

IV. Soldanella alpina folio minus rotundo. Soldanellæ alpinae aliud genus, Clus. pan. Soldanella alpina major, Eid. hist.

## S M I L A X A S P E R A.

**Σ** *Μίλαξ τραχεία*, Smilax aspera Dioscoridi l. 4. c. 144. propter sarmenta rubi modo aculeata: *μίλαξ* simpliciter Theophrasto 3. hist. 18. ubi Gaza Hederam Ciliciam interpretatur, quia Plinius l. 16. c. 35. scribit Smilacem hederæ similem, primum è Cilicia profectam, sed in Gracia frequentiorè, &c. Et l. 24. c. 10. Smilax qui nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet.

I. Smilax aspera fructu rubente.

Smilax aspera vera, Trag.

Smilax aspera, Matth. Fuch. Dod. ut: Tur. Lac. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Ad. Lob. Lugd. Cast. Cæsalp. Cam.

Smilax aspera fructu rutilo, Clus. hisp. & hist.

Smilax aspera prima & tertia, Tab. Ger.

Volubilis aspera, Lonic.

Folia maculis candidis quandoq; notantur.

II. Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro.

Smilax aspera fructu nigro, Clus. hisp. & hist.

Smilax aspera altera facie Salsæparillæ, aut congener, Lob. ico.

Smilax aspera Lusitanica, Tab. Ger.

A priori differt & fructus colore, & folijs, in hac mollioribus minusq; spinosis, quandoque etiam spinis carentibus: folijs quoq; angustissimis in Galloprovincia observatur.

III. Smilax aspera Indiæ Occidentalis.

Buenas noches, fructus exoticus tertius, Clus. exot. l. 2. c. 18.

### Salsaparilla.

IV. Smilax aspera Peruvian. sive Salsaparilla. Zarzaparilla, Matth. Lac. Monar. Garz. Lugd.

Zarzaparilla Peruviana, Dod.

Zarza seu Salsaparilla, Castor.

Sarsaparilla, Lon. Frag Cæsalp.

Salsaparilla, Ad. Lob. & par. 6. Ind. Or. cap. 41.

Smilax aspera in Zazyntho, Alpino.

Smilax Peruviana, Tab. Gerard.

## C H I N A.

**C**um China suis sarmentis Smilaci aspera ab similibus non sit, Acoſta monente, & suis cauliculis tenuibus, raris, hederæ modo arborescendere, in historia Lugdunensi referatur, idcirco in hanc classẽ retulimus. Dicitur China & Chinaa radix, à China Indiæ regione, in qua copiosè nascitur. Est autem duplex: alba enim ex Indiæ occidentali, Hispania nimirum nova & Peru, quæ colore magis rufo est: alia ex Indiæ orientali ex regione Sinarum (ubi ab indigenis Lampatan vocatur) adfertur. Verum Grazias & Acoſta (qui integram plantam depingit, & ex eo Lugd. hist.) Chinam orientalem aliter describunt, quàm Monardes suam occidentalem. At radix hac Indiæ primum Anno Christi 1535. innotuit.

I. China radix: & Lugd. Fragoſo. Cina, alias China, Matthiol.

China, Lac. Lob. ico. Cast. Taber. Chinna sive Cinna, Cæsalp.

Radix



Radix China, Garz. Acost. Lugd. in Florida: part. 2. Amer.

Chinæ radix fruticis more excrefcit, folijs paucis Aurantiorum forma: in China arbor Lampaton dicitur: & radix quo nigrior eo melior: Linscot. par. 4. Ind. Or. c. 33.

Orientalis exterius est colore rubente aut subnigro, interius candicante aut subrubente: Occidentalis colore est interius magis ruffo.

Amatus inter Arundines recenfuit: at Cæfalpino, China orientalis potius ex genere Iridis, quam Calami videtur. De hujus usu Vefalius librum fcripfit.

II. China spuria pyriformis.

China spuria pyriformis, feu turbinata, Lob. icon.

III. China spuria nodofa.

Pseudochina radix ex Virginea, Cluf. exor.

## B R Y O N I A.

**B**ryonia, Dioscoridi l. 4. c. 184. ἀμπέλῳ λουκή, Vitis alba, καὶ βρυονία ἢ ὀφιοστάφυλῳ ἢ ἀμάβερος ἢ ψίλω-τρῳ, &c. dicitur. Theophrasto 6. h. st. 1. ἀμάωτρῳ. Plinio l. 22. c. 1. Vitis alba, quæ Græci Ampeloleuce, alijs Ophioftaphylon, alijs Melothron, alijs Psilothrum, &c.

Genera duo Dioscoridi l. 4. c. 184. & 185. Vitis alba quæ aliquibus Bryonia, & Vitis nigra, alijs Bryonia nigra, alijs Chironia vitis. Sic & Plinio, qui nigram propriè Bryoniam vocari fcribit.

I. Bryonia aspera five alba baccis rubris.

Bryonia, Trag. Gef. hor. Lon. Tab.

Bryonia alba, Dod. ut: Lugd. Thal. Cæf. Ger.

Vitis alba, Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diofc. Ad. Lob. Cast.

Vitis alba fylvestris, Gef. hort.

Bryonia baccis rubris, Camer.

II. Bryonia alba baccis nigris.

Bryonia nigra, Dod. ut: Cord. hift.

Vitis nigra, Cord. in Diofc.

Vitis alba baccis nigris, Castor.

Bryonia baccis nigris, Camer.

Differt à priore radicibus & baccarum colore; hujus radix interius buxæo colore pallet: illius, ex albido sublutei coloris est: hujus bæcæ maturæ nigricant, illius rubent.

III. Bryonia Cretica maculata: in Phytopinace & Prodomo pro. 1. defcripta.

Bryonia dicoccos, Hon. Belli, ep. 1. ad Cluf.

Bryonia Cretica, Pon. Italico.

IV. Bryonia lævis, five nigra racemofa.

Vitis nigra, Matth. Ang. Lac. Cast. Lugd. prima, Tabern.

Vitis fylv. five Sigillum Mariæ, Dod. utroq;

Vitis nigra fylv. Gef. hort.

Malacociffum Damocrati, & Tamus, Eidem.

Vitis vel Bryonia nigra, Ad. fylv. Lob.

Tamarum vulgo, Cæf.

Bryonia nigra, Gerard.

Quibusdam Vitis fyl. Dioscorid. l. 4. c. 183. (fed florem capillaceum, muscosum ei tribuit, qui in noftra non observatur) & Theophrasti 9. hift. 14. & 22. Alijs Cyclaminus ciffanthemos Dioscorid. l. 2. c. 195. de quo vide in Periclymeno.

Alijs Uva taminia Plinij l. 23. c. 1. alijs ejusdem Salicaftrum, quod potius Amarçdulci convenit.

Baccæ maturæ aliquando rufescunt, aliquando nigrefcunt.

V. Bryonia lævis, five nigra baccifera: quæ sub Bryonia fyl. baccifera in Prod. defcribitur.

VI. Bryonia Mechoacana alba.

Mechoacan, Monardi, Dod. Lon. Frag. 1. & 2. Tab. Ger.

Bryoniæ fimilis planta Peruviana Mechoacæ provinciæ, Lob. ob.

Mechoaca Peruviana, Lob. ico. Ger.

Mechoiacan, Lugd. hift.

Rhabarbarum Indicum, Castor.

Radix Mechoacan: par. 9. Ind. Occid.

Mechoacan, à provincia novæ Hispaniæ in qua reperitur, nomen obrinuit. Alij Rheo affimulant, unde Rhabarbarum Indic. & Rhabarbarum Mechoacanum, Monardi: Germanis Rhabarbarum album. Dodonæus Rheo fimile non effe, & cum Bryonia parum convenire, fed Scammonium quoddam Americanum fcribit. Sanè cum Bryonia fyl. magnam affinitatem habet.

Duplex habetur ratione loci: prima annis fupra feptuaginta ex Mechoaca novæ Hispaniæ Infula allata: altera verò ex Continente circa Nicaragua nata, quæ priore longè præftantior est. Refert Fragofus etiam in Aquacathan novæ Galitię nafci. Et Clufius in notis in Monardem, Mechoacan duo feminis genera ex Hispanica accepit: unum lævi cauliculo fine filiqua, femine nigro, quale est Scammonij aut Convolvuli majoris: alterum oblongiore aliquantulum cauliculo & femine rufo, fupiore longiore &



tenuiore utriusque filiqua parte interiore lanuginosa: ex utriusque semine plantulae Scammonij aut Convolvuli modo prodire, &c. De hac quemadmodum & de Nicotiana, Jacobus Gorraeus Luterianus. & Aegidius Everhardus Belga, libellum, ille Gallicè, hic Latine, scripsit.

VII. Bryonia Mechiocana nigricans, quæ ex India Chelapæ sive Celapæ nomine ante an-

nos duodecim allata: & à Massiliensibus Jalapium, vel Celapo vocatur: quæ sub Bryonia 3. in Prodromo exhibetur.

VIII. Bryonia Mechiocana sylvestris. Mechoaca ex promontorio D. Helenæ Monard. Mechoacæ sylv. genus, Lugd. hist.

Hæc priore minor est per omnia, cujus radix gravia symptomata excitat, quare Scammonea, Monarde auctore, nuncupatur.

## RADIX QUIMBAYA.

**R**adix Quimbaya: in provincia Quimbaya, cujus metropolis Carthago, radices tenues, digiti crassitudine, inter arbores nascuntur, quarum fragmentum per noctem in aqua maceratum, aqua partem majorem absunt ex residua unica tres sumptæ benignè instar Khabarbari purgant. Monardes ex Petri Cieci Peruviana historia refert. & ex eo Lugdunensis historia: meminit etiam Fragosus, sed succinctius.

## LUPULUS.

**L**upulum à Plinio l. 21 c. 15 Lupum salictarius nominatum volunt: qui Mesuæ 2. purg. 24. Volubilis folijs affectus dicitur: hodie in Græcia Epovix nominatur.

Sativus est & sylvestris, magnitudine differentes: sic sylv. florum conos minores, rariores, pauciores habet: alijs Lupulus florens fructu caret: & contra, fructum ferens, non floret.

### I. Lupulus mas.

Lupulus, Brunf. Matth. Tur. Dodon. Clus. hist. Tabern.

Lupulus sativus, & sylv. Trag. Lon. Cast. Lugd.

Lupus salictarius, Fuch. Dodon. gal. Gesn. hor.

Læcun. Lobel. (cui & Vitis septentrionalium) Cæsalp.

Lupulus salictarius spontanea, Ad.

### II. Lupulus fœmina: & Cam. ep. & hor.

Folij est rotundioribus, circa radicem sine incisuris tantum serratis: flosculis subpallidis, qui sine fructu pereuntes, in pollinem lu-

teum abeunt.

### III. Lupulus Mechiocanus.

Radix Carlo sancto, Monard. Lugd. Fragoso.

Indica radix, Monardi, part. alt.

Carolus Sanctus, Castori.

Radix huius plantæ, quæ Lupulo similis est, ex provincia Mechiocan adfertur, cujus decoctum & pulvis in Catharro, Epilepsia & lue Venerea commendatur.

### IV. Sippo, sarmenta longa, Lupuli sarmentis non absimilia, quibus ad religandum Brasiliiani utuntur: par. 3. Americ.

## VITIS VINIFERA.

**D**E Αἰνέεις οἰνοπέγης historia Dioscorides l. 5. sedecim capitib. legit. Vitem, Labruscam, Uvam, Oenanthem, Omphacium, Vini naturam differentias & facultates, ex sapore, mixtione, loco nat. ali. desumptas, ex omnis: quemadmodum de Lora, Mulso & similibus. Et Theophrastus sparsim in suis libris de Vite copiosè egit: ut de Vitis 9. hist. 20. & 6. caus. pluribus capitibus. Et Plinius l. 14. capitibus novendecim.

Vitem dividimus in sativam & sylvestrem: sativa major est, cujus plurima species, alia minor. Majoris uva & colore & magnitudine differunt: alterius namq. acini, aut virides albicant, & sive aut sulvi, aut saturato rubore nigricant, aut cærulei, aut subrubentis coloris: alia acinis oblongis magnitudine & forma prunorum, quæ Pergulana dici potest: alia rotundis, ijsq. vel magnis vel parvis: alia acinis sunt frequentioribus, alia rarioribus. Sunt quæ granis aut vinaceis carent, interdum unicum vel alterum granum habent: Rarius uva barbata reperitur. Minor verò est acinis nigris, rarissimè albidis, aut sulvis, nucleo minimo ac molli. Sapore etiam differunt: ut dulci, acerbo, muscato, quæ Vitis Apiana Plinio.

In folijs quoq. differentia, alia majora profundius incisa, ut Italica folijs ad pediculum usq. in lucinias acutæ divisis: alia minora sunt: Sic alia tenuiora, alia crassiora: alia viridia, alia rubentia, alia maculata: alia ad tactum duriora, molliora, alia levia; alia deniq. subhirsuta.

Ratione loci, Vina plurimum variant: apud nos commendantur, ex Germanicis quidem Brisgoica, Alsatia, Ripensia, quæ ex ditione Bernatum habemus, Rhenana, & Necarina, quæ duo posteriora rarior habet.

habemus : ex Gallicis, Burgundiaca, & inter ea potissimum Arbusiaca, Muscatellina, Trontiniana, quæ Lugduno advehuntur : ex Italicis, Rhetica, quæ ex Vallerelina asportantur : ex Hispanis, Cimenens : ex Græcis, Malvaticum.

Sic in Aegypto, vinum tenue atque aquosum existit, licet calidissima regio sit : cuius rei causam Aphrodisaus lib. 2. prob. inquit. Et hoc vinum videtur Hesiodus *diver bibliver* vinum Biblinum vocasse : forrè quia in eadem cum biblo, id est papyro, regione proveniat : licet ipsius interpretæ Tzetius volu à Biblo civitate Libano monti proxima, nomen accepisse, siquidem constet ejus loci incolæ ferè hydroptas esse. Suidas verò tum à Byblo civitate, tum à Biblia vitis genere, dictum putat. Monet Guil. Hippium Rheginum vitem quæ illeus vocatur Bibliam vocare. Sed hæc alterius sunt loci.

In India insula Baly, Vites bis in anno uvas promunt : Linsc. part. 3. Ind. Orient. cap. 40. & in insulis Azores, super meras rupes crescunt, quæ radices in medios hiatus seu saxorum rimas immittunt, quibus succum sibi necessarium prolucunt : & in istis petraeis recessibus, Vites multo letius se proferunt, quam quæ in planitie sunt, quæ ad frugem pervenire nequeunt : Idem cap. 6. Sed in Hispaniola plantata exiguas uvas fundunt, nec admodum jucundi saporis & ferè Februario & Martio vindemiarum silent. authore Benzone sive Amer. ca lib. 4. cap. ult. & ut Josephus Acosta lib. 3. cap. 22. & lib. 4. cap. 50. nec in insulis, nec in firma terra Uva aut vinum nascitur : in nova Hispania, vinea uvas proferunt, sed nunquam probè maturescunt, ut vinum confici possit : nisi in Peru & Chile approbunt vinum nascitur : nam jam vites colere didicere : & vinea plerumque in convalibus Peruanis nascuntur, juxta quas fossas ad aquam colligendam excavant, quæ rursus subinde irrigant.

I. Vitis vinifera, ex cujus Uvis acerbis immaturis succus exprimitur, quem *ομάρων* Omphacium Dioscorides lib. 5. cap. 6. vocat : ex quo Syrupus de Agresta in officinis paratur.

II. Uva passa major *βαύλα* & Græcis. Uvæ passæ majores, Trag. Gesn. hort. Cast. Uva passa, Tur. Lon. Zibebas ferens, Cam. Uvæ Zibebæ. Tab. Ger.

Non solum Uvæ, sed etiam acini præter modum ampli, crassi & oblongi sunt, ut non nisi passæ ad nos deferantur : Arabibus, uva Zibibi, Latinis passa, Germanis, Zibeben/Meertreibel/ id est, uva marina.

III. Uvæ passæ Indicæ gigantis carentes. Uvæ sine vinaceis seu apyrenos, ad Clus. cur. post.

IV. Uvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiæ. Passulæ, Trag. Uvæ passæ minores, Gesn. hort. vel Corinthiæ, Cast.

Folij est rotundis, crassis, subtus incanis, in pauciores lacunas oblongas divisus : Uvis partim fulvis, partim subnigris, dulcibus & vinosis.

V. Vitis sylvestris, Labrusca. Labrusca Trag. Lugd. & alijs.

Labrusca dicta, quod in marginibus terreæ seu labris quibusdam oriatur. Dioscoridi lib. 5.

cap. 2. *ἀμπέλ* & *ἀγρί*, qui genera duo fecit : alterius enim Uva non maturescit, sed florent tantum profert *ειναιέλλ* nominatum : altera fructum perficit, ex parvis acinis nigris subaltrigentibus. Plinius Labruscam vocat & Oenanthen, ex alba Labrusca præstantiorem, quam è nigra scribit. Et Gesnerius libr. de hort. racemiferam tum albis, tum nigris acinis refert. Vocatur autem propriè Oenanthe, fructus Vitis sylvestris cum floret, Dioscoridi lib. & cap. 5. seu ut Plinius loquitur, Vitis labruscæ uva, quæ cum floret colligitur, quando optimè olet.

Apud Floridenses Labrusca in magna copia crescere, author part. 6. Ind. Occid. scribit.

VI. Vitis sylvestris Americana.

Vites sylvestres vicinas arbores scandentes & uvas edules proferentes in nova Francia habentur : part. 2. Amer.

VII. Vitis sylvestris Virginæ.

Vitis duum generum spontè nascuntur : alterum uvis tenuibus acerbis : alterum majoribus & dulcibus : Hariot. desc. Virgin.

VIII. Vitis sylvestris Indicæ acinis pruni sylvestris.

Arbores multæ in India, quæ uvas quasdam ingresses ferunt, quarum Acini prunorum sylv. speciem referunt. & nigro folliculo vestiuntur, sed quia illi multum ligni, parum pulpæ, ex his vinum non faciunt : Benzol. lib. 28.



## S E C T I O S E C U N D A

CLEMATITIS; LIGNUM COLUBRINUM; CLEMATIS; PERICLYMENUM; APOCYNUM; ASCLEPIAS; POLYGONATUM;

Lilium Convallium; Monophyllum; Laurus Alexandrina,  
quibusdam Hippoglossum.

### C L E M A T I T I S.

**K** *Aquatilis* Dioscoridi lib. 4. cap. 182. idem est ac *Sarmentaria*: sic dicta, quoniam ἀθήματα flagella, vitigenis flagellis similia emittat, ac ut illa arbores scandat. Plinio lib. 24. cap. 10. *Clematida* Smilaci similem, per arbores repentem geniculatam & ipsam appellaverunt. A Theophrasto 5. hist. 10. Ἀγλαῖον dicitur, & esse arborem quæ Vitis & Labrusca modo surgat.

#### I. Clematidis sylv. latifolia.

Vitis sylvestris, Trag. Lugd.

Vitis nigra, Fuch. Tur. Lon. 2. Tab.

Vitalba, Dod. ut: Guiland. the. (& Vitis sylv. Dioscoridis) Cæf.

Viburnum Gallorum, Bellon.

Atragene Theophrasti, Ang. Clus. hist.

Vitis sylv. caustica, Gefn. hort.

Clematis 3. Matth. Cast. Thal. 2. Lac.

Clematis altera prima, Cord. in Diosc.

Viorna vulgi, Ad. Lob. Ger.

Clematis five Viorna vulgi, Lobelij, Eyf.

Clematidis est Dioscoridis, Atragene Theophrasti: quibusdam Vitis sylv. Plinij.

In foliorum divisuris mirè ludit & sarmenta aliquando brachiorum crassitudinis sunt.

#### II. Clematidis Peruviana.

Bexugo del Peru, ad Atragene sarmenta proximè accedentia, cortice cinereo obducta, gustus lenti, dein acris, denique fauces urentis: drachma purgat & Mechoacæ præfertur, Clusius in notis ad Monardem.

#### III. Clematidis peregrina folijs pyri incisis.

Clematis altera Bœtica, Clus. hisp. & hist.

Clematis Bœtica, Clusij, Lob. Lugd. Tab. Ger.

#### IV. Clematis five Flammula repens.

Clematis altera, Dod. gal. flore albo, Cast. Cam.

Clematis flammula quibusdam, Gefn. hort.

Clematis altera urens, Ad. Lob.

Flammula, Dod. Lugd. hist.

Viticella, Cæf.

Clematis urens, Tab. Ger.

Flammula dicitur, quod contusa applicata, vesicas flammæ instar excitet, cujus folia aliquando Apij modo dividuntur: est etiam simplex vulgaris, alia multiflora, quæ

Clematis urens 2. Tab.

Clematis urens multiflora, Ger.

V. Clematidis maritima repens: quæ 1. in Pr. Clematites, Ang.

#### VI. Flammula recta.

Flammula, Matth. Lugd. Clus. pan. & hist. Tab.

Flammula frutex, Cord. in Diosc.

Clematis altera, Turn.

Flammula altera, Dod. altera surrecta, Lob.

Flammula recta, Cam. Eyf.

Flammula Jovis surrecta, Ger.

Duplex est: alterius sarmenta & foliorum pediculi virescunt & serius floret: alterius rubent & maturius floret.

Centella herba, quæ trita tumoribus imposita pustulas excitat, in epist. ad Monardem huc referri potest.

VII. Clematidis alpina Geranifolia: quæ 2. in Prodomo.

Clematis cruciata alpina, Ponæ.

#### VIII. Clematidis cærulea erecta.

Clematis altera minor longifolia, Clymenum quorundam, Lob. Lugd.

Clematis cærulea Pannonica 2. Clus. pan.

Clematis cærulea 2. Tab.

Clematis major Pannonica, Ger.

Magnitudine variat: hinc duæ figuræ apud Clusium hist. pan. & Tab. sub

Clematide cærulea pan. 1. (quæ Clematis cærulea pannonica, Eyf.) & 2. Et Ger. sub

Clematis pan. & Clemat. majore pannonica.

Flore est cæruleo, rarius albo.

#### IX. Clematidis cærulea vel purpurea repens.

Clematis altera, Matth. Dod. Cast. ap. Clus. hist. flore purpureo, Cam.

Clematidis alterius altera species, Dod. gal.

Clema-

Clematis peregrina cærulea & purpurea, Lob. Tab. qui duas figuras habet, & Ger. sub cærulea & rubra.

Clematis 3, quæ Flammula, Cæs.

Pothos cæruleus, Lugd.

Clematis peregr. incarnato simpl. flore, &

Clematis peregr. purpurea simpl. flore, Eyf.

Alijs Clematidis Dioscoridis: quidam πῖθος (Desiderium Gaza vertit) Theophrasti 6. hist. ult. faciunt.

X. Clematidis cærulea flore pleno.

Clematis altera fl. pleno, Cam. ep. Clus. cur. post.

Clematis peregr. purpur. flore pleno, &

Clematis peregr. incarnata plena, Eyf.

Flore est cæruleo, purpureo cæruleo, incarna-

to, ad purpureum colorem sed admodum dilutum accedente.

XI. Clematidis trifolia flore roseo clavato. Granadilla, Monardi, Petro de Cieca in hist. Peruana, Lugd. Vide in Americæ par. 9. l. 4. c. 27. at c. 30. Granadilla inter ligna recensetur. Flos passionalis sive Granadille ex India, du Bry.

Granadilla dicitur propter semen, quod ut in malis granatis inclusum continetur: Flos passionalis, quod in flore aliquæ veluti passionis Christi figuræ delineatæ conspiciantur, Monardes.

Hujus folia & flores à Doctis. Simplicista Joh. Pona Veronâ anno 1621. accepi.

## CLEMATITIS INDICA, QUÆ LIGNUM.

Colubrinum.

**C**lematitidem vocamus, quia pleraque sarmentitæ sunt & per arbores repunt: Pao da Cobra, id est Lignum Colubrinum, Lusitani nominant, quia adversus animalium virus ejaculantium morsus & ictus efficax sit.

I. Clematidis Indica folijs Lentiscinis candidis maculis aspersis.

Ligni colubriini tertium genus, Garz. Frag.

II. Clematidis Indica spinosa folijs luteis.

Ligni colubriini alterum genus, Garziæ, Frag. & Clusio, qui ligni frustum pingit, & Lugd. cui malè titulus Ligni colubriini Acoftæ inscriptus Lignum colubrinum, Tab. (est.

III. Clematidis Indica folijs persicæ, fructu Periclymeni.

Ligni Colubriini primum genus, Garziæ, Frag. Palo del Cebra, id est, Lignum serpentinum seu Colubrinum, Linscot. 4. par. Ind. Or. c. 31.

Pao de Cebra lignum seu radix Lusitanis dicta, omnium venenorum antidotus, in Insula S. Laurentij, Ind. Or. part. 4. c. 7.

Et hæc tria ligni genera in insula Zeilan reperiuntur.

IV. Clematidis Malabarensis folijs Vitis, colore dracunculi.

Lignū colubrinum primum, Acoftæ, Cast. Lug.

V. Clematidis Malabarensis altera radice serpente.

Lignum colubrinum alterum, Acoftæ, Lugd.

Palo della Culebra, Cast. ap.

VI. Colubriini ligni tertium genus in eadem provincia, vastæ arboris magnitudine, Acoftæ. an Lignum colubrinum quod pingitur à Clusio notis ad Acoftam.

VII. Radix quædam in Malaca, quæ adversus vulnera sagittis toxico illitis facta, præsentaneum remedium est, Garzias.

## CLEMATIS DAPHNOIDES.

**O**uæ Dioscoridi l. 4. c. 7. κληματὶς, aut δαφνοειδὴς, aut μυρτοειδὴς, aut πολυγονοειδὴς dicitur, ipsi Plinio l. 24. c. 15. Clematis Ægyptia, quæ ab alijs Daphnoides, ab alijs Polygonoides vocatur. Alijs tamen ejusdem l. 21. c. 11. Vinca pervinca censetur: alijs, an ejusdem l. 24. c. 15. Centunculus sit, dubitantibus.

I. Clematis daphnoides minor.

Vinca pervinca, Brunf. Gefn. hort. Lon. Adv. Lugd.

Chamædaphne altera Dioscoridis, Brunf. 4.

Pervinca (quod semper vireat) Trag.

Clematis, Matth. Lac. Cord. in Diof. Tur.

Clematis prima Dioscoridis, Ang.

Clematis daphnoides, Dodon. ut: Fuch. Lob.

Thal. Cam. Tab. Clus. hist.

Clematis Ægyptia fylv. Gefn. hort.

Provinca vulgo. Cæs.

Clematis daphnoides minor flore cæruleo: flore albo: flore purpureo: tres fig. Eyf.

Flores cærulei sunt: quandoque candidi: rarius rubentes, vel subpurpurascens: interdum flos alium florem medium continet.

## II. Clematis daphnoides major.

Clematis Ægyptia hortensis flore purpureo, Gesn. hort.

Pervinca major, Adv. Eyf.

Clematis sive Pervinca major, Lob.

Clematis daphnoides major, Dod. Cam.

Provinca altera major, Cæs.

Clematis major, Lugd. prima major, Cast.

Clematis daphnoides latifolia, Clus. hist.

Hanc Clematidem Ægyptiam Plinij : il-

lam ejusdem Vincam pervinacam, Cæsalpinus statuit.

## III. Clematis flore pleno.

Daphnoides polyflora, Lob.

Clematis flore multiplici, Cam. epit.

Clematis purpurea Austriaca, flore pleno, Camer. hort.

Clematis major flore duplicato, Lugd.

Clematis altera flore pleno, Clus. hist. ap. alt.

Clematis daphnoides fl. purpureo pleno, Eyf.

## P E R I C L Y M E N U M.

**Π**ερικλῡμενον à Dioscoride lib. 4. cap. 14. describitur, quod sit frutex simplex, habens ex intervallis foliola caulem amplectentia, subcandida, hederacea, & inter folia germina nascentia, super quo fructus hederæ similis : florem candidum faba similem subrotundum & quasi in folium procumbentem : semen durum & avulsa difficilem : radicem crassam ac rotundam : Nisi Diosc. radicem rotundam diceret, cum nostra conveniret : at Plinius lib. 27. cap. 12. radicem præterijt. Quare an nostrum Periclymenum, potius sit *κωνιάειον* & *ιτέριον*, quàm *κισσός* aut *κισσός* vocitent, Dioscoridis lib. 2. cap. 195. & Cyclamenos Plinij lib. 25 cap. 7. ambigitur, quod Diosc. scribente, folia fert hederæ, sed minora : caules crassos, gemculatos, quiq. circa vicinas arbores capreolorum modo se volvunt : flores candidi odorati : fructus verò instar acinorum uvæ, similis hederæ, mollis, aliquantulum acrisaporis & lentus : radix inutilis. Etsi sint qui velint, Cyclaminum alteram, item sylvestrem & Periclymenum tribus distinctis locis à Dioscoride descriptum, unius plantæ nomina esse. Periclymenum dictum volunt, quod se adminiculis convolvat.

## I. Periclymenum non perfoliatum Germanicum.

Caprifolium, Brunf. Gesn. hort. Lon. Germanicum, Dod.

Pèriclymenum, Trag. Fuch. Dodon. gal. Turn.

Cord. in Diosc. Gesn. hort. Cam. Thal. Tab. Ger.

Germanicum, Eyf.

Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium, Ad. Lob.

Periclymenum vulgare Septentrionalium, Clus. hist.

Flos candidus, subluteus.

## II. Periclymenum perfoliatum.

Periclymenum, Matth. Ang. Lac. Adv. Cast.

Periclymenum alterum, Dod. gal.

Periclymeni species cujus folia unita, Gesneri hort.

Periclymenum perfoliatum, Lobel. Lugd. (&amp; grandius) Tab. Ger. Eyf.

Periclymenum vulgare alterum, Clus. hist.

Vinciboscum vulgo, Cæs.

Flores ex purpura niveo candore nitent, alibi luteo aspersi : aut albi, aut subruffi.

## III. Periclymenum humile.

Periclymenum 2. &amp; Chamæpericlymenum Prutenicum, Clus. pan.

Periclymenum minus, Tab.

Chamæpericlymenum, Ger. Clus. hist.

## IV. Periclymenum humile Norvegicum.

Chamæpericlymenum tenerius aliud, Cl. hist.

## A P O C Y N U M.

**Α**πόκυνον ἢ κύων, παρὰ διὰ λυγρὸν, κυώμενον Dioscoridi lib. 4. cap. 81. Apocynum, Plinio lib. 25. cap. 11. quod canes, lupos, vulpes & pantheras, Dioscoride auctore, vel ut Plinius, canes & omnes quadrupedes, necet. Dicitur alias περιανθὸν quasi circumplectens, eò quòd proxima amplexetur.

## I. Apocynum folio subrotundo.

Apocynum, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. Adv.

Lob. (cui &amp; Periploca Græca folijs latioribus

hederaceis) Lugd. Cast.

Apocynum primum latifolium, Clus. hist.

Cynocrambe, Lon.

Apocyni alterum genus, Cam.

Periploca repens, Cæs.

## II. Apo-

## II. Apocynum folio oblongo.

Apocynum repens, Matth. Lugd. Camer.  
 Apocynum folijs Oleandri, Anguil.  
 Apocynum 2. angustifolium, Clus. hisp. & hist.  
 Periploca, Cæs. altera, Dod.  
 Periploca serpens angustiore folio, Ad. Lob.

## III. Apocynum angustifolium.

Secamone, Scammonij species Ægyptijs, Alpin.  
 Apocini secundi species altera, Clus. hist. & hist.

## IV. Apocynum Ægyptiacum laetescens siliqua Asclepiadis.

Beidel-sar Alpini.  
 Ossar vulgo in Ægypto: fructus vero Beid el  
 ossar, hoc est, ovum ex Ossar: Arabibus Saccha-  
 rum Alhusar: forte Arbor lanigera, Bellonij l. 2.  
 obs. Hon. Belli ep. 4. & 5. ad Clus.

Apocynum Syriacum, seu Palæstinum, sive Æ-  
 gyptiacum, Clus. hist.

Elula Indica, quibusdam.

## A S C L E P I A S.

**E**tsi Ἀσκληπιάς Dioscoridis lib. 3. cap. 106. & Plinij lib. 27. cap. 6. Asclepias, à quibusdam nostrum censea-  
 tur (dubitat Anguillara, negat Matthiolus) at Apocyno cognata herba videtur.

## I. Asclepias albo flore: &amp; Gerard.

Hirundinaria, Brunf. Trag. Gef. hor. Lonic.

Hederalis, Ruellio.

Vincetoxicum, Matth. Dod. Thal. Cast. Lugd.  
 qui Fuchsi, & Matthioli figuram exhibet.

Asclepias, Fuch. Dod. gal. Cord. hist. Turn. Lac.

Gef. hor. Ad. Lob. Cæs. Tab. duplici figura, Cam.

Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis, Col.

## II. Asclepias nigro flore.

Vincetoxici altera species, Dod.

Asclep. altera fl. nigro, Lob. sive Periploca min.

Asclepias nigra, Lugd. flore nigro, Cam. Taber.  
 Clus. hist.

Vincetoxicum flore nigro, Cam. epit.

Apocynum, Colum.

## III. Asclepias siliqua bifido mucrone.

Asclepias Cretica, Clus. hist. append. 1.

## IV. Asclepias ex Virginea.

Wisauck sive Vincetoxicum Indicum, Gerard.

V. Fructus Asclepiadis siliquæ similis, semi-  
 nibus planis nigris.

Fructus 3. è navigation. Batau. Clus. ex l. 2. c. 15.

## P O L Y G O N A T U M.

**P**olygonon Dioscoridi lib. 4. cap. 6. quod radix crebro geniculata sit: vulgo Sigillum Salomonis, haud  
 dubiè à vestigijs pluribus, radici sigilli instar impressæ.

## I. Polygonatum latifolium vulgare.

Sigillum Salomonis, Brunf. Gef. hor. latifoli-  
 um, Trag.

Polygonatum, Matth. Lac. Cast. vulgare, Cam.  
 vulgatus, Eyst.

Polygonatum latifolium, Fuch. Dod. ut: Cord.  
 in Dioscor. & hist. Gef. hor. Leb. Tab. primum,  
 Gerard.

Polygonatum majus, Lon. Ad. Thal.

Polygonatum latifolium vulgare, Clus. hist.

Fraasinella, Ang. Cæs.

Vulgares herbarij Germ. cum Dictamnio al-  
 bo & Elleboro albo confundunt: alij malè Seca-  
 cul Arabum faciunt. Variat baccis rubetib<sup>9</sup> pur-  
 pureis, quandoq; nigris, ut Cam. in epit. monet.

## II. Polygonatum latifolium maximum.

Polygonatum majus, Clus. pan. Eyst.

Polygonatum latifolium primum, Eid. hist.

Polygonatum Pannonicum, Cam.

## III. Polygonatum latifol. Ellebori albi folijs.

Polygonatum πῶσιπλον, vel 2. Clus. pan.

Polygonatum 3. latiore folio, Eid. hist.

Polygonatum latifolium, Dod. post.

## IV. Polygonatum latifol. flore majore odore.

Polygonatum flore odore, vel 1. Clus. pan.

Polygonatum secundum latiore folio, Eid. hist.

Polygonatum, Ger. latifolium minus, Tab.

an Polygonatum angulosum, Cord. hist.

V. Polygonatum latifolium minus flore ma-  
 jore: 1. in Prodromo.VI. Polygonatum latifolium perfoliatum  
 Brasilianum: 2. in Prodromo.

## VII. Polygonatum latifolium ramosum.

Laurus Alexandrina, Matth. Dod. gal. Cam.

Hippoglossum, Lugd.

Rusco affinis tertia, Cæs.

Polygonat. 3. Clu. pan. latif. 4. ramosum, Eid. hist.

Polygonato affinis planta, Lob. ob.

Polygonatum latifolium 3. & 4. Tab.

Polygonatum ramosum & acutum, Ger.

## VIII. Polygonatum angustif. non ramosum.

Sigillum Salomonis angustifolium, Trag.

Polygonatum angustifol. Fuch. Dod. gal. Tur.

Eyst. Lugd. Clus. pan. vel 5. hist. primum, Tab.

Poly-

Polygonatum tenuifolium, Cord. in hist. Cam.  
 Polygonatum tenuifolium majus, Thal.  
 Polygonatum erectum, Gef. hort.  
 Polygonatum minus, Lon. Ger. folijs rubiæ,  
 Ad. Lob.  
 Polygonatum alterum, Dod.  
 Polygonato similis in alpibus, Cæf.  
 Quibusdam Chamædaphne Dioscoridis l. 4.

c. 149. alijs Ephemerum ejusdem l. 4. c. 85. & Plinij lib. 25. c. 13. qui florem cæruleum tribuit.  
 IX. Polygonatum angustifolium ramosum, Polygon. 4. angustifolium ramosum, Clus. pan.  
 Polygonatum angustifolium secundum, Tab. angustifolium, Ger.  
 Polygonatum 6. five angustifolium 2. Clus. hist.  
 Polygonatum tenuifolium minus, Thal.

## LIL IUM CONVALLIUM.

**L**ilium, quod à loco natali convallium appellatur, à quibusdam Lilium vernum Theophrasti 6. hist. 7. censetur: alijs Oenanthem ejusdem l. 6. c. 7. & Oenanthem Athenæi volunt.

I. Lilium convallium latifolium: in Prodromo describitur.

II. Lilium convallium album.  
 Lilium convallis, vel sylv. Brunf.  
 Lilium convallium, Trag. Matth. Gef. hor. Dod.  
 Cæf. Cast. Lugd. Cam. Tab. Ger. Clus. hist.  
 Lilium Theophrasti, Dod. gal.  
 Ephemerum non lethale, Fuch.  
 Callyonimus vel Chamæcitrinus, Gef. hor.  
 Cacalia, Lonic.  
 Lilium convall. vel vernum Theophr. Ad. Lob.

III. Lilium convallium alpinum.  
 Lilium convallium alterum alpinum flore majore, & odoratiore, Cam.  
 Lilium convallium flore albo, Eyf.  
 IV. Lilium convallium flore rubente.  
 Lilium convallium floribus suaverubentibus, Lob. icon.  
 Lilium convall. rubrum, Tab. fl. subrubro, Cam.  
 Lilium convallium flore incarnato, Eyf.  
 Flore est minore, candore & rubore confusè mixto, & odore minus valet.

## M O N O P H Y L L U M.

**M**onóφυλλον, unifolium dictum, quod cum prodit unico sit folio, nam cum cauliculum acquirit, folia bina habet, rariustria, & quidem in alpibus: propter similitudinem cum Lilio convallium, minus appellare lubet: sunt qui Cyclaminum tertium Plinij l. 25. c. 9. velint.

Lilium convallium minus.  
 Unifolium, Brunf. Dod. ut: Lug Cam. Tab. Eyf.  
 Cotyledon syl. & Unifolium, Trag.  
 Gram. Parnassi, Mat. Lug Cast. Tab. majus, Ger.

Henophyllum vel Monophyllum, Gef. hor.  
 Cyclaminum unico folio, Dalech. in Diosc.  
 Monophyllum, Ad. Lob. Thal. Gerard.  
 Bifolium primum, Lonic.

## LAURUS ALEXANDRINA QUIBUS- dam Hippoglossum.

**L**αύρωρον Dioscoridis l. 4. c. 132. & Hippoglottion Plinij l. 15. c. 30. ubi Laurum Alexandrinam vocat, ab alijs Ideam dictam, sunt qui idem censeant cum Lauro Alexandrina Theophrasti 3. hist. 17. Alijs ιδέα πῖσα, Ideæ radix Dioscoridis l. 4. c. 44. Alijs λαύρα ἀλεξανδρεα, aut ιδέα, aut λαύρωρον, Laurus Alexandrina Dioscoridis l. 4. c. 147. Alijs χαμαιλάφυς, qua & ἀλεξανδρεα Dioscoridis l. 4. c. 149. & Laurus taxa Plinij l. 15. cap. ult. & Chamædaphne ejusdem l. 24. c. 15. Deniq; sunt qui radicem Ideam, Hippoglossum, Laurum Alexandrinam & Chamædaphnen apud Dioscoridem idem esse velint.

I. Laurus Alexandrina fructu pediculo infidente.  
 Uvularia, Brunf. (qui marem & foeminam pingit, sicut & Tabernæmontanus & Gerard.) Lon.  
 Laurus Alexandrina, Brunf. Trag. Fuch. Ang.  
 Gef. hort. Eyf.  
 Hippoglossum, Matth. Dod. ut: Turn, Lac, Ad.  
 Lob. Cast.

Hippoglossum mas & foemina, Ger.  
 Uvularia mas, five Laurus Alexandrina, Tab. icon.  
 Uvularia foemina, five Hippoglossum, Tab. icon.  
 Hippoglossum, quod à Lauro Alexandrina differt, Guil.  
 Hippoglossus, Gefn. hort.  
 Daphne Alexandrina, Fuch.



Bonifacia & Bislingua, Anguil.

Laurus taxa Plinij, Lugd.

Rusco affinis prima, Cæs.

Bislingua, Clus. panon.

Radix Idæa Dioscoridis, Colum.

Laurus Alexandrina Theophrasti, 2. Clus. hist.

II. Laurus Alexandr. fructu folio insidente.

Laurus Alexandrina altera, Matth. Taber.

Laurus Alexandrina & Chamædaphne, Guil.

Laurus Alexandrina, Lac. Lob. ad part. alt. Col. cui & Chamædaphne.

Laurus Alexandrina vera, Lugd. Clus. hist.

Rusco affinis altera, Cæs.

Hippoglossum Matthioli, Ger.

Hæc folio est rotundiore, baccis in medio foliorum impressis, nec ulla epiglottide testis: illa folio est longiore, glossarijs sive ligulis donata, baccis ex oblongis petiolis dependentib.



## SECTIO TERTIA.

HEDERA; HEDERA TERRESTRIS; CYMBALARIA; NASTURTIUM INDICUM; BALSAMINA; NOLI ME TANGERE; Aristolochia; Cyclamen; Gramen Parnassi; Saxifraga; Chelidonia minor; Numularia.

### H E D E R A.

**H**edera κισός Dioscoridi lib. 2. cap. 210. κισός Theophrasto 3. hist. 18.

Differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres: nam quedam candida est, altera nigra, tertia helix: candida, fructum fert candidum: nigra nigrum, aut croci amulum, quam vulgus Dionysiam vocat: Helix fructum non gignit, &c. Dioscorides. Sic Theophr. l. c. multigena hedera est, quedam enim humi repens: quedam in excelsum se attollens: & excelsarum genera plura, sed tria summa patescunt, candida, nigra, tertiaq; clavicula, &c. Plinius l. 16. c. 34. Hedera duo prima genera fecit, marem & feminam (per marem Cistum intelligere oportet, confundit enim Cistum cum Cisso, id est, Hedera) subjungit: species tres esse, candidam, nigram, helicem: quæ species in alias etiam dividuntur, &c. quæ ex Theophrasto sumpsit.

#### I. Hedera arborea.

Hedera, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Diosc. Dod. Cæs. alp.

Hedera arborea, Matth. Gef. hort. Lugd.

Hedera nigra, Fuch. Dod. gal. Lac. Lonic.

Hedera corymbosa communis, Ad. Lob. Taber. Gerard.

Hedera major, Castor.

Variat: cultu enim arborescit, & cum ad eam ætatem pervenit, in qua fructum ferre potest, totam faciem mutat, nam per se erigitur, nullum adminiculum quærens, & hanc Orthocissum antiqui dicunt, quæ

Hedera arborea recta, Ad.

Folia mutat, ut quæ prius in plures angulos desinebant, angulis oblitteratis, excepto eo qui in summo est, rotundantur, maculis albis, aliquando sub rubentibus, inferne distinguuntur. Baccæ maturitate nigræ, raro flavæ.

#### II. Hedera poëtica.

Hedera Dionysias, & Chrysocarpos, Dalech. Lugd.

Dionysias aut Bacchica, quod ex ea poetarum coronæ consuerentur: Chrysocarpos, à fructus colore aureo: hinc folium minimè angulosum est.

#### III. Hedera major sterilis.

Hedera Helix, Brunf. Matth. (& minor) Fuch. Dod. ut: Lac. Lon. Lugd. Cæs. Cam. Tab. Ger.

Hedera sterilis, Anguil.

Hederæ arboreæ sylvestre genus, Gef. hort.

Helix sive provoluta sterilis hedera, Ad. Lob.

Hedera minor, quæ Helix, Castor.

Hederæ species tertia helix vocata, Thal.

Hæc diversa ne sit ab arborea, Theophrastus ambigit: Plinius concedit: at recentiorum aliqui negant, fieri enim utalicubi non arborescat, ob imperfectionem quandam Individui non speciei.

#### IV. Hedera humi repens.

Hederula, Trag.

Hedera minor ἐπίγειος κισός, Dodon.

#### V. Hederaceis folijs planta.

Cyclaminos altera hederaceis folijs, Lob. Lug.

## HEDERA TERRESTRIS.

**H**edera terrestris, χαμαίνιος & Dioscoridi lib. 4. cap. 126. si in descriptione προμαχότις, μιν. τίς λεγέται: à Plinio videtur intelligi, sub Hedera à terra se non attollente: quibusdam Malacocissos, quasi mollis hedera, in Geoponicis: alijs Chamaclena, quasi Clematis humilis repens.

## I. Hedera terrestris vulgaris.

Hedera terrestris, Brunf. Matth. Dod. Lug. Cæs. Thal. Tab. Gerard.

Elatine, Brunf. 4.

Chamæcissos, Trag. Fuch. Dod. gal. Lac. Cam.

Chamæclema, Cord. hist.

Humilis hedera, Ad. corona terræ, Lob.

Malacocissos, Lugd.

Duplex est: major, quæ vulgata: minor elegantior, cauliculis erectioribus, brevioribus ut

& folijs: floribus magis cæruleis, quæ locis humidioribus circa arbores antiquas reperitur.

## II. Hedera terrestris montana.

Hedera terrestris species montana, Cam. epit.

Priore hirsutior est, folijs majoribus & floribus, qui purpurascunt.

## III. Hedera saxatilis magno flore.

Asarina sterilis, Lob. ob.

Asarina sive saxatilis hederula, Ad. Lob. icon.

Asarina Lobelij, Lugd.

## CYMBALARIA.

**C**ymbalaria. à cymbalo nomen duxisse videtur: quibusdam Umbilicus Veneris alter censetur: at Hermolam, Barbarus, Capnon primam Plinij lib. 25. cap. 13. esse credidit.

Cymbalaria, Matth. Lugd. Cæs. Cast. vulgaris, Lac.

Cymbalaria Italica hederaceo folio, Ad. Lob.

Umbilicus Veneris officinarum, Lonic.

Linaria hederæ folio, Col.

Cymbalaria folijs hederacis fl. cæruleo, Eyf.

## NASTURTIIUM INDICUM.

*Nasturtium dictum ob saporem, Indicum à loco natali.*

## I. Nasturtium Indicum majus.

Nasturtium Indicum, Dodon. Lob. Lugd. Cam. Cast. Eyf.

Nasturtium peregrinum, quod Peruvian. Lugd.

Flos sanguineus Monardi, Lugd.

## II. Nasturtium Indicum minus.

Nasturtium Peruanum, Monardi.

Folia habet rotunda, Lenticulæ paulo majora.

## BALSAMINA.

**B**alsamina dicitur, quod ex pomis ipsius maris immaturis oleo injectis, insolatione oleum seu Balsamum, ut Chirurghi vocant, ad vulnera consolidanda præstantissimum conficiatur.

## I. Balsamina rotundifolia repens, sive mas.

Balsamina, sive pomum mirabile, Trag.

Balsamina, Matth. Lac. Lugd. Cæs. alba, Gesn. hort.

Balsamine prima, Fuch. Anguil.

Balsamina pomifera, Gesn. collect.

Charantia, Dod. ut: Lonic.

Cucumis puniceus, Cord. hist.

Balsamina cucumerina punicea, Ad. Lob. Tab.

Balsamina mas, Cam. Gerard.

Momordica, Castor.

Quibusdam Plinij l. 20. c. 3. Cucurbita Somphos à Græcis appellata.

Fructus immaturus colore variat. modò puniceo, modò luteo rubescente.

Balsamina mas fructu

Momordica fructu luteo rubescente, Eyf.

## II. Balsamina fœmina.

Balsamine altera, Trag. Matth. Fuch. Ang. Gesn. hort. Cast.

Balsaminum, Dod. gal. Lon. & Charancia fœmina.

Balsamina, Dod. Lugdun. cum Matth. & Fuch. figura.

Balsamella, Cord. hist.

Balsamina amygdaloides, Gesn. ad Cordum.

Balsamina fœmina, Cam. Tab. Ger. Eyf.

Balsamina fœmina persicifolia, Ad. Lob.

Catanance, Cæsalp.

## III. Balsamina lutea, sive Noli me tangere.

Balsamina lutea altera Trag.

Efula, Eid. & Lugd.  
 Tithymalus sylv. Lon.  
 Noli me tangere, Gesn. hort. & frac. (cui & Milium caprearum) Cam. Tab. Eyft.  
 Perficaria filiquosa, Ad. Lob. Lugd. Cam. Thal.  
 Impatiens herba, Dod.  
 Catanance altera, Cæf.

Chrysæa, Lugd.

Balsamita altera, Col.

Noli me tangere & Impatiens herba dicta, propter siliquas, quæ ubi maturæ levissimo contactu dissiliunt: aliqui Æschinomene Plinij suspicantur: quibusdam Pseudoapocynon. Flore est luteo, est & pallido.

## A R I S T O L O C H I A.

**A**ριστολόχια Dioscoridi l. 3. c. 4. quod existimetur optimè puerperis, seu partus doloribus opitulari: hinc forte Nicandri scholiastes refert, Aristotelem herba hujus inventionem mulierum tribuere. Et Plinio l. 25. c. 8. Aristolochia nomen grvida dedisse videntur, quoniam esset ἀριστή λεγούσα: nostri Malum terra vocant.

Genera tria Dioscorides agnovit, ἀρογύλλιν, μακράν, πλεμυαθιδία. Plinio genera quatuor: unum tuberosibus radicibus rotundis: alterum radice longa: tertium longissima tenuitatem, quæ Clematis, ab alijs Cretica vocata: quarta quæ Pistolochia, tenuiori proxima, quam quidam Polyrhizon cognominant, &c.

I. Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro.

Aristolochia rotunda vera, Trag. Lon. Cam.

Aristolochia rotunda, Matth. Dod. ut: Anguil.

Cord. in Diosc. Gesn. hort. Tur. Lac. Adv. Lob.

Cast. Lugd. Eyft.

Aristolochia rotunda i. Clus. hisp. & hist.

Aristolochia fœmina, Lugd.

Aristolochia prima, Cæf.

II. Aristolochia rotunda flore ex albo purpurascete.

Aristolochia rotunda altera, Clus. hisp. & hist.

Anguillara plures species inveniri scribit: verum hæc non solum colore floris, sed & folijs & fructu à priore differt.

III. Aristolochia longa vera: & Ang. Cam.

Aristolochia longa, Dod. ut: Cord. in Diosc.

Gesn. hort. Ad. Lob. ico. Clus. hisp. & hist. Lugd.

cum Clusij & Fuchsj figura.

Aristolochia altera radice pollicis crassitudine, Cæf.

IV. Aristolochia longa Hispanica.

Aristolochia longa altera, Clus. hisp. & hist.

V. Aristolochia Clematidis testa.

Aristolochia, Brunf. longa, Trag. Matth. Fuch.

Tur. Lac. Lon. Cast. Lugd.

Aristolochia longa altera, quæ Clematidis veteribus, Cord. in Diosc.

Aristolochia longa vulgaris, Ang. Cam. epit. &

hort. Eyft.

Aristolochia Clematidis, Dod. gal. Ang. Gesn.

hort. Adv. Lob. Tab. Ger.

Aristolochia Sarracenica, Dod. Lugd.

Aristolochia Clematidis i. Clus. hisp. clematidis

vulgarior, Eid. hist.

Aristolochia altera radice tenui, Cæf.

VI. Aristolochia Clematidis serpens.

Aristolochia clematidis, Dod. Lugd. Cast. desc.

Belli epist. i. ad Clus. vel

Aristolochia Cretica.

Aristolochia clematidis altera, Clus. hisp. vel

Beotica, Eid. hist.

Aristolochia Clematidis altera Hispanica, Lob.

Flos luteus, aut ex purpura nigricans.

VII. Aristolochia Pistolochia dicta.

Pistolochia, Dod. ut: Gesn. hort. Clus. hisp. &

hist. Cam. epit. Cast. Lugd. cum Clus. & Dodon.

figura.

Aristolochia polyrhizon, sive Pistolochia Plinij, Ad. Lob.

Aristolochia altera plures radices spargens,

Cæf. alp.

Flos aliquando niger, aliquando ex herbido

luteus.

VIII. Pistolochia Cretica.

Pistolochia altera sempervirens, Clus. hist. ap. i.

IX. Aristolochia Maurorum.

Rhasut & Rumigi à Mauris nominata, Rau-

vvolff Lugd. append.

Aristolochia peregrina Rauvvolffij, Clus. hist.

## C Y C L A M E N.

**K**υκλάμινος Dioscoridi lib. 2. cap. 194. folijs est heteræ purpureis, varijs, supra infusis, albicantibus maculis, &c. Theophrasto 9. hist. 10. Gaza tuber terra reddidit, imitatus Plinium, cui lib. 25. cap. 9. Cyclaminus, nostris Tuber terra dicitur.

*Differentia: alius verè, alius autumnò floret: quibusdam flos odoratus, alijs inodorus: & flore rubro, albo, luteo, tum qui autumnò floret & odoratus est. Pettrillium Plinij l. 21. c. 8. Anguillara censet: sic æstivum, Sphæritin Aëtij Bononienses, Camerario notante, credunt.*

I. *Cyclamen orbiculato folio infernè purpurascēte.*

*Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, Trag.*

*Cyclaminus, Matthiol. Dodon. gal. Cord. in*

*Dioscor. & histor. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon.*

*Tabern.*

*Cyclaminus major, Cast.*

*Cyclaminus rotunda, Fuch.*

*Cyclaminus orbicularis rotundifolius, Dod.*

*Cyclamen vulgare, Eystett. officinarum orbiculato folio, Panis porcinus, & Arthanita, Lobel. ico.*

*Cyclaminus flore odorato, Clus. pan. & hist.*

*Cyclaminus vulgaris, & Cyclam. prior, cum*

*icone Matth. & Lobelij, Lugd.*

*Cyclaminus æstivus vulgaris, Cam.*

*Cyclamen orbiculato folio, Ger.*

*Flos nunc dilarius, nunc saturatius purpurascit: albo flore rarius reperitur. Radice est aliquando maxima, & ejus species quædam, radice instar capitis arietis, Gesn. hort.*

II. *Cyclamen orbiculato folio infernè ex viridi pallente.*

*Cyclamini odorati altera species, Clus. pan.*

*Cyclamen odorato flore 2. Eid. hist.*

III. *Cyclamen radice maxima folijs infernè rubentibus.*

*Cyclamen Romanum, Eyst.*

*an Cyclamen à Murono, Clus. hist.*

IV. *Cyclamen folio anguloso.*

*Cyclamen folijs angulosis, Gesn. hort.*

*Cyclamen vernum, Lob. ico. Cam.*

*Cyclamini orbiculati tertia species, Dod.*

*Cyclaminus verno tempore florens, Clus. pan. & histor.*

*Cyclamen vernum, Eyst.*

*Folio est rotundiore rarius oblongiore, floribus intensius quam in vulgari rubentibus, vel omnino albescentibus.*

V. *Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens folio maculato.*

*Cyclamini odorati duplex varietas, Clus. hist.*

*Prima folijs aliquantum angulosis, albis maculis obscure averfa parte notatis: flos saturare purpurascens. Alterius folia averfa parte viridia, averfa maculis albis manifestis, flos dilutius purpurascit, vel omnino albescit.*

VI. *Cyclamen hederæ folio: & Adv. Lob.*

*Clus. pan.*

*Cyclamini alia species, Dod. gal.*

*Cyclaminus orbicularis, Dod. alter orbicularis, Lugd.*

*Cyclaminus inodoro purpurascēte flore, Clus. hist.*

*Cyclaminus æstivus folio hederaceo, Cam.*

*Cyclamen ferotinum folijs hederaceis, Eyst.*

VII. *Cyclamen folio hederaceo po' yanthēs.*

*Cyclaminus Byzantinus alter, tubere palmaris latitudinis πολυανθής: tulit flores 20. 50. 100.*

*Clus. hist.*

VIII. *Cyclamen radice castanæ magnitudinis.*

*Cyclaminum Constantinopolitanum, vel byzantinum, Clus. pan. & hist.*

*Folia prona purpurascētibz supina candicantibus maculis notantur.*

IX. *Cyclamen radice exigua.*

*Hermodyctylus quorundam, Trag.*

*Cyclaminus exigua, Eidem.*

*Cyclaminus montis Juliani, cujus Mesues meminit, Ang.*

*Cyclamini exiguæ veræ species, Lugd.*

*Cyclaminus radice avellanæ, Clus. pan.*

*Cyclaminus æstivus, Eid. hist.*

*Cyclaminus minor, Cast.*

X. *Cyclamen oblonga radice.*

*Cyclaminus radice oblonga malo in fine adnexo, Gesn. hort.*

*Cyclaminus oblongum, Eid. append.*

*Cyclaminus μακρόεις, Cam. epit. longius radicatus, Eyst.*

*Cyclaminus cujus radix digitalem crassitiem non superat, & cubitalis est longitudinis, Clus. pan.*

*Cyclamen odoratum μακρόεις, Clus. hist.*

XI. *Cyclamen vernum luteum.*

*Cyclamen luteo flore, Ang. Ad. Lugd.*

XII. *Cyclamen vernum album.*

*Cyclamen vernum flore albo, Lob. adv. part. 2.*

*Clus. hist. ap. alt. aust. quod folijs circinatæ rotunditatis, Eid. cur. post.*

XIII. *Cyclamen folijs Violarie radice cordis effigie.*

*Cyclamen vernum spurium, Cl. hist. ap. alt. aust.*

GRA-

## GRAMEN PARNASSI.

**G**ramini quod in Parnasso monte provenit, folium hederaceum, florem candidum, &c. Dioscorides l. 4. c. 32. tribuit: ubi & alterius in Cilicia nati meminit, quod incolæ Kivav appellant, cujus virentis esu boves inflammantur: quid velit non assequimur.

I. Gramen Parnassi albo simplici flore.  
Gramen Parnassi, Dod. ut: Gefn. hort. Lobel.  
icon. Eyfett.  
Hepatica alba, Cord. hist.  
Enneadynamis Polonorum, Gefn. hort.  
Unifolium palustre, Gefn. collect.

Gramen Parnassi hederaceum recentiorum,  
Adv. Lob. ob.  
Gramen hederaceum, flos hepaticus, Tab.  
Gramen Parnassi minus, Ger.  
II. Gramen Parnassi albo pleno flore.  
Gramen Parnassi duplicato flore, Lob. Lugd.

## SAXIFRAGA.

**S**axifraga ab effectu dicta, cum ejus stillatitia, ut & decoctum, lapides renales & frangere & pellere dicatur; ut & farina granorum ad radicem, ex decocto sumpta.

I. Saxifraga rotundifolia alba.  
Saxifraga, Brunf. major, Eid. 4. Fuch. Lac.  
Saxifraga alba, Trag. Dod. ut: Fuch. icon. Gefn.  
hort. Lugd. Thal. Cam. Tab.  
Saxifraga quarta, Matth. Cast.  
Saxifraga, Lon. alba chelidonides, Ad. Lob.  
Theligono affinis herba, Cæf.  
Saxifraga alba tuberosa radice, Clus. hist.

Hæc nonnullis locis folijs est majoribus, aliusque exurgit: frequentius tamen minoribus est & humilior.

II. Saxifraga ad folia bulbos gerens.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera montana,  
Colum.

III. Saxifraga rotundifolia aurea.  
Saxifraga aurea, Dod. ut: Gefn. hor. Thal. Cam.  
Ger. Lugd. cum. Dod. & Lobelij figura.  
Saxifraga aurea lichenis facie, & natalitijs, Ad.  
Lobel.

Chrysofplenium, Tab.

Hepatica palustris, Eyf.

Erysimi species Aldroando dicebatur: In historia Lugd. Saxifragæ alpinæ figura jungitur, quam cum priore eandem suspicor.

## CHELIDONIA MINOR.

**C**helidonia duplex habetur, major de qua supra: minor, de qua nunc. quam Dioscorides lib. 2. cap. 212. *Χελιδώνιον τὸ μῆλον, αὐτὸ πικρὸν ὀξύριον* nominat. cujus descriptio, præter vires, nostræ convenit: an foris an ratione soli diversitas obvenit? Plin. lib. 25. cap. 13. *Strumea* censetur, quo loci de Ranunculus agit.

I. Chelidonia rotundifolia major: in Prodromo descripta.

II. Chelidonia rotundifolia minor.

Testiculus sacerdotis, Sylvatico.

Ficaria & scrophularia minor, vel 2. Brunf.

Hæmorrhoidum herba, Hier. Brunf. vic.

Chelidonium minus, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hort. Tur.

Lac. Lon. Guil. (an Amellus sit dubitat) Adv.  
Lob. Lugd. Cast. Thal. Tab. Ger. Eyf.

Malacocissus minor, Fuch. ico.

an Ranunculus latifolius, Lugd.

Favagello, Cæf.

Hujus folia aliquando macula purpurea notantur: flore est luteo simplici: rarius pleno, Camerario monente.

## NUMMULARIA.

**N**umularia à folijs nummi speciem referentibus dicta: alijs Centummorbia, à mirifica in vulneribus medendis facultate: alijs Hirudinaria, quod hirudinis instar passim terræ affixa hæreat. Sunt qui Numulum Plinij lib. 18. cap. 28. censeant, ubi falsò Mimmulus legatur: an foris apud Theophrastum lib. 9. cap. 14. *ἰσχυρίδαρον*, Rubiam Gaza vertit.

I. Nummularia major lutea.

Serpentaria 3. & Centummorbiu, Brunf.

Nummularia, Trag. Matth. (& Lunaria minor) Fuch. Dod. ut: Gefn. hort. Lon. Adv. Lob. Lugd.

Cast. Cæf. Cam. Tab. Ger. Eyf.

Centummorbia, Gefn. Turn.

Hirudinaria minor, Tab.

Ratione soli variat: hortensis per omnia major, sylvestris contra: hinc due icones apud Tab. Hirudinariæ majoris & minoris: & apud Ger.

Numulariæ, & Numulariæ minoris, no-  
mine.

II. Nummularia minor purpurascens flo-  
re: quæ in Prodomo describitur.



## SECTIO QUARTA.

CUCUMIS; MELO; PEPO; MELOPEPO; ANGU-  
RIA; CUCURBITA; COLOCYNTHIS;  
CUCUMIS ASININUS.

### CUCUMIS.

**E**tsi *Σκῦρος* nomen apud Græcos, (quemadmodum Cucumeris apud Latinos) generale sit omnium horariorum fructuum, videlicet Peponum, Melonum, Cucumerum, Anguriarum & cæterorum ejusdem generis, ut Guilandinus quoque notavit: attamen *Σκῦρος* & Dioscoridis l. 2. c. 163. Theophrasti i. hist. 18. alijs *σκῦρος*, & *νῦνός*, Cucumer Plinio l. 19. c. 5. Cucumis Varroni à curvure, quasi Curvimer, dicitur.

Genera duo Dioscoridi & Theophrasto, sativa & sylvestris: sativa, inquit Theophrastus, partim genera esse existimant, ut & Cucurbitæ, partim negant: sed in uno eodemq; genere, alias meliores, alias deteriores affirmant. Cucumeris tria genera notant, Laconicum, Scytalicum, Boæoticum. Plinius l. 6. de Cucumere agens, Melones, Cucumeres & Angurias complectitur: admonens, ea forma qua cogantur crescere: sic flore in fistulam demisso, mira longitudine nasci: subjungens, Græcos Cucumerum tria genera fecisse Laconicum, Scytalicum & Baticum: sic de sylvestri l. 20. c. 1. & de anguino sive erratico l. 20. c. 2. egit.

#### I. Cucumis sativus vulgaris.

Cucumis sativus, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. Lon. Cast.

Cucumis, Trag. Ang. Tur. Lac. Fracast. Tab.

Cucumis vulgaris, Dod. Ger.

Cucumer sativum, Cord. in Diosc.

Cucumis sativus & esculentus, Ad. Lob. Lugd.

Citreolus vulgo, Cæs.

Cucumeres virides, albi, longi, recurvi: læves, asperi: Alijs Sycios Galeni, alijs ejusdem Melopepon. Fructus maturus subluteus est: habetur & totus albus.

#### V. Cucumis sativus major.

Cucumis Turcicus, Fuch. Tab. Ger.

Cucumis ex Hispanico semine natus, Tab. Ger.

#### III. Cucumis flexuosus.

Cucumis longus, Matth. Lugd. oblongus, Dod.

Cucumis anguinus & tortilis, Lac.

Cucumis anguinus, Ang. Gesn. col. Lugd. anguina, Tab. Ger.

Cucumis flexuosus, sive anguinus, Adv. Lob.

Cucumis sativus 2. Cast.

Citreolus alter forma anguis, Cæs.

Hujus species habetur fructu cubitali.

Sic in regno Congiano insignis magnitudinis & suavitatis habentur: part. 1. Ind. Or. l. 2. c. 1.

#### IV. Cucumis pyriformis.

Cucumer minor pyriformis, Tab. Ger.

#### V. Cucumis Ægyptius rotundifolius.

Chate Ægyptijs, cucumerum genus, Alpin.

### M E L O.

**C**ucumerum genera censentur Pepones & Melopepones, potissimum figura & quantitate differentes: majores enim & oblongi, Pepones: mali effigiem referentes, Melopepones. nomine ex Melone & Pepone composito dicuntur. Hoc genus Palladius Melones, quasi *μήλωνας*, id est pomcos, à malorum figura appellavit, quod nomen adhuc in usu est. Sicq; tria Cucumeris genera statui possunt, Cucumer, Melo & Pepo. At Melon Theophrasto Sycion; Plinio, Cucumis mali coronei effigie, Melopepo Galeni: forte Cucumis antiquorum.

#### I. Melo vulgaris.

Melo, Brunf. Trag. (& Melopepo) Lac. Tab. Gerard.

Pepo, Matth. ico. Fuch. Lugd. Cast.

Pepo, grandis Melo, Cord. hist.

Cucumis Galeni & antiquorum, Dod. gal.

Melo vulgaris, Melopepo in Græcia, Guil.

Melo sive Melopepo vulgi, Cucumis Gal. Dod.

Melo vulgi, sive Cucumis antiquorum, Melopepo Dioscoridis, Ad. Lob.

Melon vulgo & Pepon, Sycion Theophrasti,

Melopepon Galeni, Cæs.

Melopepo, Gesn. hort. Lon. Lugd.

Variat fructu, nunc oblongo, alias contra-  
ctiore rotundioris figure, aliàs modicè depresso  
& sessili: Subinde majore, scilicet,

Melo

Melo Hispanic. Tab. & Ger. quandoq; minore. Cortex alijs asper, rugosus & tuberosus; & hinc est Pepo strumosus, Ad.

Alijs lævis: nunc viridis, nunc cinereus, nunc pallidus, nunc varius. Pulpa, alijs rufa, alijs candida & virens: eaque quibusdam suavior, quibusdam moschi odore, qualium Cordus & Dodonæus meminere. Aliqui æstivi, aliqui hyberni ad hyemem perdurantes. Habentur, Camerario monente, Americi & alij Italici, Patavini, item Zatti dicti: tum Neapolitani, quorum semina adeo tenui crustula reguntur, ut excorticata videantur, Gymnospermi appellati: denique pilosi.

## II. Melo rotundus parvus.

Melo succaratus, Lob. ic. saccharinus, Tab. Ger.

D. ntur aurei, parvi, in modum pomorum Arantiorum, Cam. velut Cæs. mali rosei magnitudine. Meminit & Garzias Melonis genus in Hispania, quod Budicæ vocent.

## III. Melo pyriformis moschatus.

Melo Saccharinus variegatus, Eyst

## IV. Melo pyriformis.

P E P O.

**P** *Peponem* Dioscoridi l. 2. c. 164. Theophrastus l. hist. 22. & Plinius l. 2. c. 2. de Peponibus, quæ Dioscorides refert: qui l. 19. c. 5. scribit, Cucumeres cum magnitudine excefferunt, Pepones vocari. Dicitum volunt à πῶν πῶν λέγουσιν, maturiscere, eò quod maturitate flavescent.

## I. Pepo oblongus.

Pepo, Brunf. Lon. Cast. Camer.

Pepo magnus, Dod. gal. Gef. hort.

Pepo major oblon. Dod. max. oblong. Tab. Ger.

Cucumis Pepove oblongus, sive ovalis vulgarissimus, Ad.

Pepo oblongus, Lob.

Melo seu Pepo oblongus, Cæs.

Variat magnitudine: hinc apud Tab. duæ figuræ. Peponis maximi oblongi, & Peponis Indici minoris oblongi: & apud Ger. qui posteriorem Peponem minorem sylv. vocat.

## II. Pepo compressus major.

Pepo maximus Indicus compressus, Lob.

Pepo rotundus major, Dodon.

Melon sive Pep. modicè depressa & sessilis, Cæs.

Corticis colore & substantia variat: qui enim albido est colore, substantia est molliore: qui obscure virente durior.

## III. Pepo compressus minor.

Cucumis seu Zucco marinus, Trag.

Cucumer marinus, Fuch. Tur. Lonic.

Pepo rotund. Dod. gal. Gef. h. rotund. min. Dod.

Pyromelo, Tab. Gerard.

## V. Melo Ægyptius.

Abdellavi Ægyptiorum, Melones a nostratibus diversif. Alpin.

## VI. Melonis Ægyptij alterum genus.

Chajar, Melonum genus apud Ægyptios, Alp.

## VII. Melo Indicus fructu oblongo.

Batie Indi, sive Indicus Melo, Garziæ.

Patecas, Anguria, sive Melo Indicus, Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 10.

Melones aquatici in Java, Batie in universa India: par. 4. Ind. Or. c. 6. & fig. 20.

an Comolanga, Lud. Romani, Clus. in Garz. Scalig. Lugd.

## VIII. Melones Peruani.

Melones in valle Peruana tanta felicitate proveniunt, ut radix caudicis cassitudinem assequatur & viva aliquor annis in solo vigeat, quæ quotannis Melones profert, cujus luxuries non secus ac cæterarum arborum amputatur: Joseph. Acosta l. 4. c. 19.

IX. Fructus Melonum similis, cortice duro vestitus, in Java, Linsc. par. 3. Ind. Or. c. 10.

an Cucurbita rotunda Italica, Lugd.

Corticis colore variat, qui est croceus, luteus, citrinus, niger.

## IV. Pepo rotundus Melonis effigie.

Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trag. Pepo sylv. Dodon.

Pepo rotundus compressus Melonis effigie, Ad. Lob. Lugd.

Pepo Indicus minor rotundus, Tab. Gerard.

## V. Pepo rotundus Arantij forma.

Cucurbita Arantij forma, Eyst.

## VI. Pepo minor clypeatus.

Pepo Indicus minor clypeatus, Taber.

Pepo Indicus fungiformis, Ger.

## VII. Pepo minor angulosus.

Pepo Indicus minor angulosus, Tab. Ger.

Huc & Pepo minor Indicus 4. Tab. referendus.

## VIII. Pepo Virginianus.

Macocqver, peponib. melonibus & cucurbitis valde similis: cujus unum genus mensurat alterum bimestri spatio maturefcit: descr. Virgin.

Macaqver Virginensium, Clus. ex. l. 2. c. 2. & part. 1. Ind. Occid.



## M E L O P E P O .

## I. Melopepo clypeiformis.

Pepolatus, Dod. gal. latoris fructus, Eid. Gef. h.  
 Cucumis Pepové lator clypeiformis, Ad.  
 Melopepolator clypeiformis, Lob. icon.  
 Cucurbita laciniata Dalech. Lugd.  
 Cucurbita fessilis, Gef. append.  
 Melopepoclypeatus, Taber.

Pepo maximus clypeatus, Gerar.

## II. Melopepo compressus.

Melopepo, Anguil.  
 Melopepo compressus alter, Lob. ico. compressus, Tabern.  
 Pepo maximus compressus, Gerard.  
 III. Melopepo teres: & Lob. & Tab.  
 Pepo maximus rotundus, Gerard.

## A N G U R I A .

**A**nguria voce, primum Aëtium usum esse voluit: aliàs Citrullus, à citreo colore dicitur. Peponem Dioscoridis, Galei & Plinij, & Arabum Battecha esse voluit.

## I. Anguria Citrullus dicta.

Citrullus, Trag. Gef. hor. Lon. Tab. officinarum, Ad. Lob. Ger.  
 Anguria, Matth. Ang. Lac. Gef. col. Dod. Lugd. Cast. Camer.  
 Cucumer vel Cucumis citrullus, Fuch. Dod. ut: Gef. hor. Turn.  
 Cucumer vulgò, Cæs.

Corticis colore variat, qui alijs viret, alijs subcandidis masculis aspersus: caro alijs, rubens & dulcior, alijs candida. Semina colore nigro, rubro, fulvo: rarius semine caret, ut Cæs. noravit.

## II. Anguria carne lignosa.

Cucumeris vulgo dicti genus quoddam sylvestre, carne intus lignosa, atq; adeo dura, ut pilæ modo resiliat, nec frangatur projectum, Cæs.

## III. Anguria Egyptiaca.

Anguriæ nostratibus majores, cortice flaviore, quæ intus semina tantum & aquam dulcissimam continent, Alpin.

an Dullaha Arabum, Cæs.

## IV. Anguria Brasiliiana.

Citrullæ rotundæ, Maurongaus nomine: Lero cap. 12.

## C U C U R B I T A .

**K**ολώνυθα ἐρώδιον & Dioscorid. l. 2. c. 162. dicitur, ad differentiam κολώνυθα & de qua l. 4. c. 178. meminuit: & Theophrastus l. hist. 18. Latinis, Cucurbita à concurvatu, quod facile siquid obliterit, quo minus extendatur, incurvescat.

Genera duo prima Cucurbita Plinio l. 19. c. 5. Camerarium & Plebeium quod humi repit: crescit qua cogitur forma, libertate vero pensili concessa, jam visa est novem pedum longitudinis. Semina quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas brevioresq;.

Calabassi seu Cucurbita in India ad miraculum usq; augescunt, quæ in hac sola provincia Chile nascuntur & Capallos nuncupantur: Cucurbitarum species propè infinitæ sunt, quædam immensa mole monstrosa sunt, quæ dissectæ & resiccata excavantur & ex ijs varia vasa effinguntur: ex minoribus pocula, aut pateras ingeniosè calatas concinnant: Joseph. Acosta l. 4. c. 9.

Sic Brasiliiani ex Cucurbitis liquidam pulcem, Mingau vocatum, sorbent: Stad. def. Brasil. l. 2. c. 12.

## I. Cucurbica major fessilis, flore albo.

Cucurbita cujus fructus in orbem collectus intumescit, Trag.  
 Cucurbita fessilis, Matth. epit.  
 Cucurbita major, Fuch. Tur. lator, Dod.  
 Zuccha rotunda, Anguil.  
 Cucurbita Cameraria major, Dod. gal. Lugd.  
 Cucurbita fessili fructu, Cord. in Diosc.

Variat magnitudine, colore corticis, viridi, flavo, candido, maculoso: aliquando sulcis distinguitur: quædam tuberosa est.

## II. Cucur. major rotunda fl. luteo folio aspero.

Cucurbita Indica, Matth. Cast.

Zuccha major rotunda, Cord. hist.

Cucurb. quam Zucca marin. Itali vocant; Gef. h.

Cucurbita rotunda, Cæs. alp.

Cucurbita Indica rotunda, Lugd.

Cucurbita Indica major & minor, Tab.

Citrullus major, & Pepo major syl. Ger. icon.

Varia hujus genera, magnitudine, facie, & colore differentia: earum namq; quoddam genus est, quod utrisq; ulnis vix amplecti potest, & in insula S. Laurentij, ejusmodi colore rubro, flavo, albo & saporis longè gratioris atq; nostrates, ubertim proveniunt. Palud. in notis ad Linscot. sive par. 2. Ind. Or. c. 5.

III. Cu-

III. *Cucurbita lagenaria* fl. albo, folio molli.  
*Cucurbita*, Brunf. prior, Dodon.  
*Cucurbita minor*, Fuch. Dod. gal. Turn.  
*Cucurbita plebeja*, Ges. hort.  
*Cucurbita lagenaria*, Lob. Cast. Gerard.  
*Cucurbita lagenaria major & minor*, Ad. Tab.  
*Cucurbita Cameraria minor*, Lugd.

Variat fructus, quandoq; lagenarum forma, aliquando ventricosa absque collo pyri turbinati figura.

#### IV. *Cucurbita lagenaria Americana.*

*Cucurbitularum* ex quibus Americani lagenulas conficiunt, Americus Vesputius navig. 2. meminit, quas viri de collo suspendunt, quarum una herbâ plena est quam mandunt: altera farinâ, quam bacillo madefacto, herbæ aspergunt.

an *Lagenulæ* *Americanæ* è fructu è mari Australi, Clus. ex. l. 2. c. 8.

Sic in regno Congo, in *Cucurbitis* aquam adferunt: par. 1. Ind. Or. l. 2. c. 1.

V. *Cucurbita oblonga* flore albo, folio molli.  
*Cucurbita* fructu oblongo, Trag. Cord. in Dios.  
*Cucurbita oblonga*, Fuch. longa, Tur. Lon. Cast. Tab. Cam. longior, Dodon.  
*Cucurbita anguina*, Dod. gal. Gerard.  
*Zuccha longa*, Anguil.

*Cucurbita*, Ges. hort. sativa longa, Cæs.

*Cucurbita* sive *Zuccha*, Ad. omnium maxima anguina, Lob.

*Cucurbita Cameraria longa*, Lugd.

Falcata figura sæpe crescit, quædam cervicem tantum recurvam habent: quædam rectitudine servata bicubitalem, etiam tricubitalem longitudinem acquirunt.

#### VI. *Cucurbita capitata.*

*Cucurbita* quædam sessilis alba lata, ab altera parte compressa, Ges. hort.

*Cucurbita capitata*, Taber.

*Cucurbita fungiformis*, Gerard.

*Cucurbita stellata* sive sessilis, Camer.

#### VII. *Cucurbita verrucosa*: & Lugd.

VIII. *Cucurbitæ* parvum genus, fructu pugni magnitudine, cortice rubro, maculis asperso, & semine rubro, Joh. Bauhino.

IX. *Cucurbitacei* generis semen spadicum. Fructus alicujus sem. 19. Gareti, Clus. ex. l. 2. c. 16.

X. *Cucurbitis* non absimilis fructus, Brasilianus.

Fructus in sylvis *cucurbitæ* forma non absimilis, sed longè amplior, quos frustatim concidunt, in aquam conjiciunt, baculo spumam excitant, qua pro sapone utuntur, Leriò desc. Brasilix sive par. 3. Ind. Occid. c. 17.

## COLOCYNTHIS.

**K**ολοκυνθίς αὐτὸ καλεῖται αἰγὴς, αὐτὸ σινὼς πικρὰ, αὐτὸ καλοκύνθος Ἀλεξανδρινῶν, Dioscorid. l. 4. c. 178. *Cucurbita sylvestris*, *Colocynthis dicta*, quæ minor sativa, Plinio l. 20. c. 3.

Genera varia habentur: alia minor fungosa & levis, quæ officinarum est: alia major, oblonga ac flava; alia candida: alia rotunda varia: alia sessilis, nigra, maculata, magna instar *Cucurbitæ*: & alia ab hac differens etiam sessilis, sed minor, alia deniq; turbinata.

#### I. *Colocynthis* fructu rotundo major.

*Cucurbita agrestis*, Brunf.

*Colocynthis vera*, Trag.

*Colocynthis*, Matth. Ang. Cord. in Dios. (& *Cucurbita* deferri) Ges. hort. (& *Cucurbita* sylv.)

Lac. Lon. Ad. Lob. (& *Cucurbitula amara*) Lug. Cast. Gam. Gerard.

*Colocynthis prima*, Dod. gal. mas, Taber.

Colore est viridi, magnitudine utramq; manum replente.

#### II. *Colocynthis* fructu rotundo minor.

*Colocynthis fungosa & levis*, Cord. hist.

*Colocynthis minor*, Ges. append.

*Cucurbita* sylv. fructu rotundo minor, Cæs.

Colore est flavo, hujusq; medullâ aridâ officinæ utuntur.

#### III. *Colocynthis oblonga.*

*Colocynthis grandis oblonga*, Cord. hist.

*Colocynthis grandis candida* solo colore ab oblonga differens, Eid.

Variat colore: alia enim primùm viridentem colorem in cortice ostendit, postea maculis candidantibus conspergitur, postremo totus in luteo pallet, sitque durus & lignosus: alia principio virescit quidem, sed mox albicanibus maculis aspergitur, at in maturitate totus albecit. Cordus in sua historia differentias sex proposuit, & ex eo Lugd. histor.

#### IV. *Colocynthis* pyriformis, seu *Pepe* amarus.

*Colocynthis Germanica*, Trag.

*Colocynthis* 2. Dod. gal. fœmina, Taber.

*Colocynthis turbinata*, Cord. hist.

Colocynthis pyriformis, Ad. Lob. Lugd. Ger.  
 Colocynthis nigra pyriformis, Cam.  
 Cucurbita syl. 7. Dod. figura pyri, Cæs.  
 Pseudocolocynthis pyriformis, Eyft.

Cucurbita syl. Somphos Plin. dicta, quibusdam.  
 V. Colocynthis pomiformis cortice macula-  
 Colocynthis exacte sphaerica, Ad. (to.  
 Pseudocolocynthis pomiformis, Eyft.

## CUCUMIS ASININUS.

*Σίκυς ἀγρία* Dioscoridi l. 4. c. 154. Theophrasto 7. hist. 6. & 9. hist. 10. Cucumis sylvestris Plinio l. 20. c. 1.

Cucumis sylvestris asininus dictus.  
 Cucumis agrestis, Brunf. Cord. in Diosc. Lugd.  
 Cucumis sylv. Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. ut:  
 Lac. Lon. Cæs. Cast.  
 Cucumis anguinus, Tur. Cord. hist.  
 Cucumis erraticus vel asininus, Gef. hort.

Cucumer Elaterij sylv. Ad. Lob.  
 Cucumis asininus, Tab. Ger. Eyft.  
 Ex hujus succo exiccato & in pastillos con-  
 formato fit *ἐλκυστήριον* dictum Dioscoridi l. 4. c. 155.  
 & Theophrast 9. hist. 10. Gaza agitatorium ver-  
 tit, ut infra lib. 12. sect. 6. ostenditur.



## S E C T I O Q U I N T A.

MALVA; ALTHÆA; ALCEA; CORCHORUS; GERANIUM;  
 SANICULA; PES LEONIS; CANNABIS; EUPATORIUM; POTEN-  
 tilla; Herba Molucana; Caryophyllata; Dentaria; Epimedium; Pæq-  
 nia; Leontopetalon; Chrysogonum; Sta-  
 phis agria.

## M A L V A.

**M** *Alva μαλάχη* Dioscoridi l. 2. c. 144. & Theophrasto 1. hist. 5. *ἀμαλάκω* ab emolliendo ventre, nomen habet, etiam Plinio l. 20. c. 21. monente: idq; propter naturalem lentorem suum, ut Paulus asserit: unde a Martiali l. 16. Mollis vocatur. Latinis Malva & Varroni quasi Molva, quod alvum molliat, qua antiqui in acetarijs cum Lactuca ad alvum subducendam utebantur.

Duplex est Dioscoridi & Plinio, sativa & sylvestris: subjungit Plinius, duo esse genera, quæ folij amplitudine discernantur, majorem Græcos Malopen vocare in sativis: alteram Malachen: è sylvestribus cui grande folium & radices albæ. Althæa vocatur, & c. Theophrastus duplicem exprimere videtur, dum 1. hist. 5. & 14. Malvam in arborem transire scribit, Malvam roseam intelligens: dum vero 7. hist. 7. ait, Malvam coqui & cibo idoneam esse, vulgatam Malvam innuit. Antiquitus in Malvarum folijs scriptitatum, Cinna antiquus poëta indicat, cujus vesus ab Isidoro referuntur: quare suspicari licet huc respexisse Pythagoram, qui ut Aelianus auctor est, *μαλάχης*, id est, malvæ folium sanctissimum esse dicebat.

I. Malva sylv. folio rotundo.  
 Malva, Brunf. Matth. Lac. Cast.  
 Malva vulgaris, Lugd. vulgatissima, Trag.  
 Malva sylv. pumila, Fuch. Dod. ut: Tur. Thal.  
 Malva sylv. repens pumila, Lob. Lugd. Ger.  
 Malva sylv. Ang. Ad. sylv. supina, Cord. hist.  
 Malva agrestis minor, Gef. hort.  
 Malva minor, Lon. sylv. minor, Tab. vulgaris minor, Cam.  
 Malva flore candido, Cæs.

Variat folijs rotundioribus & latioribus.

II. Malva sylvestris folio sinuato.

Malva erratica 2. vel Malva equina, Brunf.  
 Malvæ vulgaris altera species, Trag.  
 Malva sylv. elatior, Fuch. Dod. gal.  
 Malva sylv. Tur. Ger. sylv. recta, Cord. hist.  
 Malva sylv. vulgaris, Cord. in Diosc. sylv. pro-  
 cerior, Dod. Ad.  
 Malva sylv. major, Gef. hort. Lugd. Tab. Thal.  
 Malva vulgaris procerior, Lob. major, Lon.  
 Malva vulgaris major, Cam.  
 Malva flore subrubente, Cæs.

Apud veteres in genere domesticarum fuit.

III. Malva Americana: quæ 3. in Prodomo.

IV. Mal-

## I V. Malva hederaceo folio.

Malva quarta, Matth.

Malva hederacea five montana, Eid. ep. Cast

Malva major terria, Lugd.

## V. Malva folijs crispis.

Malvæ species sinuosa, Cord. in Diosc.

Malva sativa laciniola, Eid. hist.

Althæa crispa &amp; major, Gefn. hort.

Malva crispa, Gefn. hort. Dodon. Camer. Taber.

Ger. Eyft.

Malva crispatis oris, Lob.

Flos est albicans, modò roseus.

## VI. Malva folio vario.

Malva trimestris vel pumila, Clus. hist.

## VII. Malva rosea folio subrotundo.

Malva sativa antiquorum: quæ cultu arbore-

scit, Theoph. Malope, Plinij.

an Anadendromalache, Galeni.

Malva hortulana, Brunf.

Malva sativa major, Eid. 4.

Malva hortensis, Trag. Fuch. Tur. Dodon. Lon.

Gerard.

Malva sativa, Dod. gal. Ang.

Malva major Matth. arborea, Eid. 4. five hor-

tensis, Tab.

Malva Romana, Gefn. hort.

Hastula regia, Eid.

Malva major unicaulis, Matth. Cast.

Malva rosea fruticosa, Adv. Lob. rosea simplici

flore, Lugd.

Malvæ alterum genus, Cæf.

Flores candidi, rubentes, modò saturatiùs,

modò dilutiùs, aliàs purpuræ modo relucen-

tes: &amp; ex rubro nigricantes: quare

Malva hortensis flore simplici albo: flore

simplici incarnato: flore simplici rubro, pingi-

tur ab Eyft.

## VIII. Malva rosea folio subrotundo, flore

pleno.

Malva Romana multiplex, Trag. Gefn. hort.

Malva rosea multiplex, Lob. Lugd. Tab.

Malva hortensis multiplici flore, Dod.

Malva major unicaulis multiplex, Cast.

Flos colore variat, albo, incarnato, rubro,

puniceo, nigricante, hinc tres figuræ apud Tab.

&amp; Gerardum, &amp; in horto Eyft. quatuor.

Malva arborea multiflora, Tab.

Malva hortensis multiplici flore, Gerard.

Malva arborea flore nigro multiplici, Tab. &amp;

Gerard.

Malva rosea multiplex, Tab.

Malva purpurea multiplex, Ger.

Malva rosea multiplex flore albo: flore incar-

nato: flore pleno atrorubente: flore pleno

rubro, Eyft.

## IX. Malva rosea folio ficus.

Malva rosea simplex peregrina, Tab. Ger.

## X. Malva folio ficus altera: quæ prima in

Prodomo.

## XI. Malva arborea Veneta dicta parvo flore.

Malva major altera, Matth. Lugd.

Malva arborea, Matth. epit. icon. Cast. &amp; major

unicaulis, Matth. epit. desc.

Malva arborefcens, Gefn. hort. Dodon. Camer.

Cæf. Eyft.

an Malva arborea sylv. Adv.

Flos est cæruleus, nec multo major quàm

Malvæ equinæ flos sit: Malva arbor Plinio.

## XII. Malva Syriaca.

Cobes Malvæ species, Cam.

## A L T H Œ A.

**A**λθία, alij ἰβίσκος, quæ in sylvestrium malvarum genere est: Dioscoridi lib. 3. cap. 163. sic dicta ab αλθία quod remedium, vel αλθία medendo, quod hujus multiplex usus sit: hinc Dioscoridi, quod inter primas utilis sit, & πολύχρηστος, pluribus remedijs polleat: & Plinio lib. 20. cap. 21. ab effectu excellentia nominata, quæ à quibusdam Aristalthea dicatur.

Genera: unius solum meminere, ut & Theophrastus 9. hist. 15. ubi Gaza Hibiscum reddidit: at 9. hist. 19. florem melinum tribuit.

## I. Althæa Dioscoridis &amp; Plinij.

Althæa, Brunf. Trag. Marth. Fuch. Dodon. ut:

Turn. Lac. Cord. in Diosc. &amp; hist. (&amp; Malva pa-

lustris) Gefn. hort. Lon. Adv. Lob. (&amp; Ibiscus)

Lugd. Cast. Tab. (&amp; Bismalva) Ger.

Althæa five Malvaviscus, Ang.

Malvæ agrestis genus, Gefn. hort.

Malva sylv. prima, Cæf.

Althea vulgaris, Camerar. Thal. Clus. histor.

Eyftett.

Flores candidi, aut ex albedo dilute purpurascens.

II. *Althæa flore majore.*

*Althæa pannonica secunda, Clus.pan.& tertia, in hist.*

*Althæa Thuringiaca, Cam.Eyft.*

III. *Althæa laciniato folio.*

*Althæa tertia, Clus.pan.Pannonica quarta, Eidem hist.*

IV. *Althæa frutescens folio rotundiore incano.*

*Althæa frutex, Clus.hisp.Lob. Gerard. prima, Clus. hist.*

*Althæa arborefcens Clusij, Tab.*

*Althæa lignosa Dalechampii, Lugd.*

*Malva altera ad Malopen accedens, Cæf.*

*Althæa fruticans Hispanica, Eyft.*

*Gallica majore est quàm Hispanica flore.*

V. *Althæa frutescens folio acuto parvo flore. Althæa arborea Olbiæ in Galloprovincia, Ad. Lob. ico.*

*Althæa arborefcens, Cam.Tab.Ger.*

*Hæc cum quarta eadem non est, licet Lobelius*

*velit, sed distinguenda, ut rectè Clusius fecit.*

VI. *Althæa frutescens Bryoniæ folio : in Prodromo describitur.*

VII. *Althæa palustris : & Lugd.Tab.Ger.*

*Althæa palustris cytini flore, Ad.Lob.*

*Althæa hortensis sive peregrina, Dod.*

*Sida vulgo, Camer. sicut Theophrasti 4. hist. 11. censetur.*

*Flore est albo & subrubeo.*

VIII. *Althæa Theophrasti flore luteo.*

*Althæa altera, sive Abutilon Avicennæ, Matth.*

*Isiscus Theophrasti, Dod.gal.*

*Althæa Theophrasti, Gesn.hort.Cæf.Lugd.&*

*Althæa altera, Eid.*

*Althæa peregrina, Gesn.hort.*

*Althæa luteis floribus, Ad.Lob.Ger.*

*Abutilon, Ang.Dod.Castor.Camer.Avicennæ, Eyftert.*

*Malva Theophrasti, Tab.*

IX. *Althæa Theophrasti similis.*

*Abutilon Indicum, Cam.*

*Flos magnitudine rosæ sylv. albicans, interiorius luteus.*

## A L C E A.

**A** *Alcea Dioscoridi libr. 3. cap. 164. fortè sic dicta ab ἀλκα, auxilio vel remedio, cum ejus radices Dysentericis & ruptis auxilio sunt. Plinio libr. 27. cap. 4. Alcea. Generi sylvestrium Malvarum Dioscorides, qui unius meminit, adscripsit.*

I. *Alcea vulgaris major.*

*Alcea & herba Simeonis, Brunf.*

*Alcea, malvæ rosæ sylv. genus, Trag.*

*Alcea, Matth. Fuch. Dod.gal.Cord.in Dioscor.*

*Gesn.hort. Lac.Lon.Lugd. qui duas figuras habet, Cæf.Tab.*

*Cannabis sylv. & Herba Ungarica, Ang.*

*Alcea vulgaris, Dod. Adv. Lob. Lugdun. Cam. Clus.hist.Eyft.*

*Malvæ agrestis genus, Gesn.hort.*

*Malva verbenaca, Ger.*

*Alcea est Dioscoridis & Plinij : quibusdam Cannabis sylv. Dioscoridis lib. 3. cap. 166. alijs Malva Theophrasti.*

*Folij variat, acutioribus, rotundioribus, hirsutioribus, levioribus : flore est ex rubro roseo, vel candidiore.*

II. *Alcea vulgaris minor.*

*Dens leonis & Malva querna, Lon.*

*Alcea minor Dalechampii.*

*Folij est in longas lacinias divisis.*

III. *Alcea folio rotundo laciniato.*

*Alcea peregrina, Clus.hist.*

*Malva montana, sive Alcea rotundifolia laciniata, Col.*

*an Alcea tenuifolia Cordi, Thal.*

IV. *Alcea Pannonica & Alcea tenuifolia, Cam. quid?*

V. *Alcea cannabina.*

*Alcea, Ang.*

*Alcea fruticosior, Adv. Lob. pentaphylla folio cannabis sylv. Dioscoridis, Eid. ico.*

*Alcea fruticosa cannabino folio, Clus.hist.*

*Alcea altera, Cæf.*

*Alcea cannabina, Cam.*

*Alcea fruticans, Eyft.*

*Hæc ἀλκαδία αἴγρια, Cannabis sylv. Dioscoridis lib. 3. cap. 166. videtur.*

VI. *Alcea arborefcens Syriaca.*

*Alcea arborefcens, Rauv. Cam.*

*Althæa frutex 2. Clus.hist.*

*Ketmia Syrorum quibusdam.*

*Alcea Syriaca*, Eyft.

Hujus flores è rubro purpurascunt, at vetustate ad cæruleum colorem vergunt: habetur etiam flore candido, quæ

*Alcea Syriaca* flore candido, Eyft.

Hujus & altera species minore flore, quæ *Althæa* frutex tertia, Clus. hist.

VII. *Alcea vesicaria*.

*Alcea Veneta*, Trag. Dod. gal. Lugd. Eyft.

*Alcea Bononiensis*, Gesn. hort.

*Hypecoum*, Matth. (malè sic dicitur Guil. monente) Lac. Lugd. Cæs. Cast.

*Hypecoum* alterum spurium, Gesn. hort.

*Alcea peregrina*, Gesn. hort. Tab. Ger. foliscqua, Adv. Lob.

*Alcea vesicaria*, Dod.

*Malva Veneta*, Gesn. hort. Lon.

*Herba Ungarica*, Lon.

VIII. *Alcea hirsuta*.

*Alcea villosa* Dalechamp. Lugd.

an *Alcea* minor in sylvis folijs *Geranij*, Cæs.

IX. *Alcea Indica* magno flore.

*Sabdariffa*, Lob. Dod. Lugd. Camer. Tab. Ger. Eyftert.

*Alcea Americana*, Clus. hist.

Folijs ludit, prima aliquando integra, communiter in tres lacinias divisa: aliquando instar foliorum *Elleborastri* in septenas profundas lacinias secta observavimus.

X. *Alcea Indica* parvo flore.

*Exotica malvacea*, *Bamia Eben* quibusdam, Advers.

*Trionum Theophrasti*, Rauvv. Lugd. ap.

*Sabdariffa* alia, Lugd.

*Bamia*, Alp. Cam. Belli ep. 5. ad Clus.

*Bamia Alexandrina*, Cæs. Cast. ap.

*Alcea Ægyptia*, Clus. hist.

XI. *Alcea Ægyptiacæ* affinis.

Fructus 18. è navigat. Batau. Clus. ex l. 2. c. 15.

XII. *Alcea Indica* parvo flore altera.

*Bamia Ægyptiaca* filiqua decagona, cum in alijs pentagona duntaxat, Clus. hist. ap. alt. ad lib. 4.

XIII. *Alcea Ægyptiaca* villosa.

*Abelmosch Ægyptiorum*, sive *Abutilon Avicennæ*, Ponæ ital.

*Belmuscus Ægyptiorum* nomine ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

## C O R C H O R U S.

**C**Orchori duplicis Plinius meminit: alterius lib. 25. cap. 13. *Anagallidem* intelligens: alterius lib. 21. cap. 15. inter herbas sponte nascentes & in cibis usitatas: & lib. 21. cap. 32. *Alexandrinorum* cibis, convolutis folijs ad similitudinem mori, &c. Et Alpino, facultate similis est *Althææ* & *Ægyptijs* in cibo nil familiaris, aut gratus. Et Judæi cocta folia cum carne edunt, quæ sapore acetosa prædicta sunt, auctoritate Rauvvolffo in suo *Hodeporico*.

*Corcoros* Plinij, Lob. Lugd.

*Olus Judaicum* *Avicennæ*, quibusdam & *Mo-*  
*luchi Arabum*, Rauvvolff.

*Corcorus* sive *Melochia*, Cam.

*Melochia*, Alpini.

## G E R A N I U M.

**G**eranij *Dioscoridi* lib. 3. cap. 131. à gruini capitis imagine, in summo ejus cacumine visenda, nomen habet: at recentiores, à ciconia rostri effigie, Rostrum ciconia nominant. *Geranium*, & aliquibus *Myrrhis*, alijs *Merrhyda* (rectius *Myrrbida*) *Plinio* lib. 26. cap. 11.

Genera duo *Dioscoridi*: alterum folijs *Anemones*, alterum folijs *Malvæ*. *Plinio* tria sunt: primum similis *cicuta*, folijs minoribus, saporis & odoris jucundi: subjungit ex *Græcorum* sententia, alterum folijs *Malvæ*, & tertium *Anemones*.

*Geranium Anemones* folio rotundo.

I. *Geranium batrachiodes* folio *Aconiti*.

*Geranij* species terria, Gesn. hort.

*Geranij* majoris species prima, Eid. ap.

*Geranium* 2. vel *batrachoides* alterum, Clus. pan. & hist.

*Geranium* sive *batrachium cæruleum*, Tab.

*Geranium batrachiodes*, Ger.

Variat flore cæruleo, albo, albo lineis cæruleis variegato: est & flore cæruleo duplici, sed duplo majore, & dicitur

*Geranium batrachiodes cæruleum*, &

*Geranium batrachiodes* flore albo, Eyft.

II. *Geranium batrachiodes hirsutum*, flore arborubente.

an *Geranij majoris species 2.* Gefn.ap.

*Geranium primum pullo flore*, Clusf. pan. & hiftor.

III. *Geranium batrachiodes odoratum*.

*Geranium montanum*, Gefn.col.

*Geranium batrachioides alterum*, Dod.

*Geranium batrachioides longius radiculatum*, Lob. Lugd.

*Geranium macrorhizon*, Cam. Eyft.

*Pes columbinus in sylvis nascens alter*, Cæf.

IV. *Geranium sanguineum maximo flore*.

*Sanguinaria radix*, & *Geranium 3.* Trag.

*Geranium alterum majus*, Gefn.hort.

*Geranium hæmatodes*, Dod. gal. Lugd. Clusf. pan. Thal. Cam.

*Geranium sextum*, Fuch. Tur. Lac. Lon.

*Geranium gruinum sanguinale hæmatodes supinum radice reptrice*, Lob. ico.

*Geranium 7. hæmatodes*, Clusf. hift.

*Geranium sanguinarium*, Eyft.

V. *Geranium batrachiodes*, Gratia Dei Germanorum, Lob.

*Geranium quartum (sanguinariæ radice species)* Matth. Lugd. Cast.

*Geranium 5.* Fuch. Lac. Lon. sextum, Tur.

*Geranium batrachiodes*, Dodon. Camer. Thal. Lugdun.

*Geranium batrachiodes sive magnum cæruleum*, Adv.

*Geranium batrachiodes primum*, Clusf. pan.

*Geranium sanguinarium*, Tab. majus, Eyft.

*Geranium tertium batrachiodes majus*, Clusf. hiftor.

Duplex est: grandius floribus cæruleis aut albis, & quidemeodem loco: minus, rubris.

VI. *Geranium batrachiodes flore variegato*.

*Geranium Anglicum variegatum*, Eyft.

XII. *Geranium batrachiodes*, Collum gruis Germanorum.

*Geranium quartum*, Fuch.

*Gruinalis*, Dod. Lugd.

VIII. *Geranium montanum fuscum*.

*Geranium montanum*, Dod.

*Geranium fuscum*, Lob. Lugd. Eyft.

*Geranium maculatum*, Tab. sive fuscum, Ger.

IX. *Geranium tuberosum majus*.

*Geranium primum*. Matth. Ang. Lugd. Cast.

*Geranium bulbosum Matthioli*, Tab.

*Geranium subrotunda radice Dioscoridis*, Gef. hort.

*Geranium tuberosum*, Dod. Lugd. vel 10. Tab.

*Geranium tuberosum majus*, Cam.

*Geranium bulbosum*, Dioscoridis primum, Adv. Lob.

X. *Geranium tuberosum minus*.

*Geranium tuberosum minimum*, Cam.

XI. *Geranium radice grumosa*.

*Geranium tertium*, vel *bulbosum Pennæi*, Clusf. pan.

*Geranium 4. vel bulbosum*, Eid. hift.

XII. *Geranium nodosum*.

*Geranium quintum nodosum Plateau*, Cl. hift.

*Geranium sextum tuberosum Plateau*, Idem.

an *Geranium sive batrachium cæruleum*, Tab.

an *Geranium batrachioides*, Ger.

XIII. *Geranium parvum folijs ranunculi*.

*Geranium 8. vel Salmaticense rostratum*, Clusf. hiftor.

XIV. *Geranium argenteum alpinum*.

*Geranium alpinum longius radiculatum*, Ponæ.

XV. *Geranium lucidum saxatile*.

*Geranium saxatile* *ὄζοσμόπελον*, Thal.

*Geranium saxatile*, Cam. Eyft.

*Geranium alterum montanum saxatile rotundifolium*, Colum.

*Geranium Malvæ folio*.

I. *Geranium folio Malvæ rotundo*.

*Geranium alterum*, Hermolai, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dodon. gal. Turn. Lac. Lon. Cast. Thal.

*Geranij vulgaris species*, Gefn. hort.

*Pes columbinus*, Dodon. Adv. (seu *Geranium alterum Dioscoridis*) Lob. Cæf.

*Geranium aliud*, Lugd.

*Geranium columbinum*, Tab. Ger.

*Geranium malvaceum sive Balsaminum*, Cam.

Duplex est majus & minus: majori caules majores & folia paulo molliora: minori omnia minora & folia asperiora. Sic folia modo in

profundiores, modo breviores & latas lacinias divisa sunt: floris magnitudine etiam differunt: flore triplo majore & cærulei elegantioris coloris ex horro Dei habemus.

II. *Geranium columbinum tenuis laciniatum*: quod 2. in Prodromo.

III. *Geranium folio Althææ*.

*Geranium sextum*, Matth. Lugd. Cast.

*Geranium à calceolario missum*, Dod.



*Geranium malacoides*, Ad. Lob. Ger.

*Geranium altheodes*, Cam.

*Geranium Monspeliacum*, Tab.

*Pes columbinus tertius*, Cæs.

Sub Geranio 2. etiam hoc intelligit Dioscorides, dum gruum rostra tribuit. *Geranium folijs candidioribus malvæ*, Plinio.

IV. *Geranium malacoides minus*: quod 1. in Prodomo.

*Geranium folio Cicutæ vel Myrrhidis.*

I. *Geranium Cicutæ folio acutissimo*: quod 3. in Prodomo.

II. *Geranium Cicutæ folio moschatum*: & inodorum.

*Acus moschata*, Eric. Cord. Cæs. Col.

*Herba moschata*, Ang.

*Geranium*, Trag.

*Geranium* 1. Matth. edit. 1. Fuch. Dod. gal. Tur. Lac. Lon. Cast.

*Geranium tertium*, Matth. edit. post. Lugd.

*Geranium supinum*, Dod. majus, Cord. hist.

*Geranium macranthemum*, Thal.

*Myrrhida* Plinij, rostrum Ciconiæ, Ad. Lob.

*Geranium moscatum*, Cam. Ger. Eyst.

*Geranium myrrhinum*, Tab.

Hoc vel odoratum moschum redolens, vel inodorum est.

III. *Geranium Coriandri folio odorum*.

*Geranium Apulum Coriandri folio alterum odorum*, Colum.

IV. *Geranium cicutæ folio minus*, & supinum.

*Herba Roperti & Geranium quartum*, Brunf.

*Geranium minus & primum*, Trag.

*Myrrhida* Plinij & *Rostrum ciconiæ inodorum vulgatum*, Lob. ico.

*Geranium* 7. sive *Geranium gruinum*, Dod.

*Geranium minus vel arvense*, Tab.

*Geranium moschatum inodorum*, Ger. Eyst.

Flos communiter brevilicis coloris: aliquando albus est: hinc duæ figuræ,

1. *Geranium minus*, Tab.

*Geranium moschatum inodorum*, Ger.

2. *Geranium arvense album*, Tab.

*Geranium inodorum album*, Ger.

V. *Geranium Robertianum primum*.

*Geranium tertium*, Brunf. Matth. Fuch. Tur. Lac. Lon. Thal.

*Gratia Dei*, vel *Geranium quibusdam*, Trag.

*Sideritis tertia*, Dod. gal. Ang. Gesn. col. Lac. Lonic.

*Panax Herculeum*, Ang.

*Geranium Robertianum*, Ad. (*Sideritis Achilleadon*, aut congener) Lob. Dod. Cam. Tab.

*Rupertiana vulgo*, Cæs.

*Herba Ruperti & Geranium secundum Dioscoridis*, Lugd.

Duplex est: alia omnino viridis, quam feminam faciunt: alia rubens, quæ præfertur: triplex differentia in Advers.

VI. *Geranium Robertianum alterum*.

*Geranium quartum*, Fuch. Tur. Lac. Lon. quintum, Matth.

*Geranium gruinale*, Dod. gal. Lugd.

*Geranium Robertiani altera species*, Ad.

*Geranium violaceum* (vel 12.) Tab. Ger.

VII. *Geranium latifolium longissima acutissimum*, Ger. Eyst.

*Geranium Creticum annuum hæmarodes*, Lobelio.

*Geranium Creticum*, Camer. Tabern. Gerard. Clus. hist.

## S A N I C U L A.

*Sanicula* à sanandis vulneribus nomen traxisse videtur: Doctissimus Columna sub *Sideritide tertia* Dioscoridis pingit & describit.

*Sanicula officinarum*.

*Diapensia*, Brunf. Matth. Cast. cui & *Pentaphylli* quinque species.

*Sanicula*, Brunf. Trag. Dodon. ut: Anguil. Gesn. hort. Lac. Lon. Cæs. Camer. Thal. Tabern. (cui

& *Consolida quinquefolia*) Eystett.

*Sanicula mas*, Fuch. Lugd.

*Sanicula & Diapensia*, Ad. Lob. Ger.

*Sideritis tertia* Dioscoridis, Col.

## P E S L E O N I S.

*Pes Leonis* à forma foliorum: vulgo *Alchimilla*, quod *Alchimistarum præconijs celebrata sit*.

I. *Alchimilla vulgaris*.

*Pes leonis*, Brunf. Camer. Fuch. Lon.

*Leontopodium*, Brunf.

*Alchimilla*, Trag. Dodon. ut: Lac. Anguil. Adv.

Lob. Cæs. Thal. Tabern. Gerard. Eystett. vulga-

ris, Clus. hist. Cam.

Stella-

Stellaria, Matth. Cast. Lugd.

Drosera & Drosum, sive *ῥόσος*, à rore folijs insidente, Cord. in hist.

Stella herba Italis, Gesn. hort.

Flosculi communiter colore pallidi ac herbacei: rarius albi.

II. Alchimilla alpina quinquefolia, in Prodromo descripta.

## C A N N A B I S.

**K** *Ἀνὰξίς* Dioscoridi lib. 3. cap. 165. & Plinio lib. 20. cap. 23. Cannabis quæ in sylvis primum nata est. Est autem sativa & sylvestris: Sativa, mas & semina. Sic quæ floret fructum non fert, quæ fructum fert, non floret.

### I. Cannabis sativa.

Cannabis, Brunf. Matth. Ang. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Cæs. Cast. Tab. Ger.

Cannabis major, Trag.

Cannabis sativa, Fuch. Cord. in Diosc. fecunda, Dodon.

Cannabis mas, Dod. gal.

### II. Cannabis Virginiana.

Cannabis in Virginea spontè prodit à nostra caule & folijs diversa, materia tamen perinde bona: in def. Virgin.

### III. Cannabis erratica.

Cannabis scemina, Trag. Dod. gal. Lugd.

Cannabis erratica paludosa sylvestris, Ad. Lob.

Cannabis sterilis, Dod. Cam. sylv. Cast.

### IV. Cannabi similis exotica.

Bangue, Garziæ, Acoftæ, Monard. Frag. Cast. Lugdun.

Bangue cum Maslac Turcorum affinitatem habet, Clus. in Acoft.

Bangue arbor cannabi similis ad omnia ferè utilis ceu Amfion (sive Opium) Linscot. part. 4.

Ind. Or. c. 35.

Bangue crebri apud Ægyptios & Turcas usus, quod triplici modo parant, & primum Afsis: alterum, Bofa: tertium, Bernavi, quod verum & genuinum Bangue est, Palud. notis in Linsc.

Cum folia cum cannabi similitudinem habeant, & cortex in fila diduci possit, huc retulimus.

*Herba exotica quæ in fila instar Cannabis diducuntur.*

### I. Herba de Bengala.

In Bengala ex herba quam ad colum instar lini nent, telam texunt, quæ subtilitate sericum antecellit: ex folijs linteamina elaborant acupingentes nunc flosculos, nunc historias vario colore, quæ lectulis insternuntur: Linsc. par. 2. Ind. Oriental. 18. & in Madagascar & in Baya: part. 3. c. 11.

II. Tokaun folia oblonga & acuta ex quibus fila detrahunt, & reticula piscatoria inde contexunt: Stad. in Brasil. l. 2. c. 8.

III. Herba in cujus folijs sericum instar re-nuis pellicula nascitur, cujus folia duos pedes longa, unum lata, & ad binos pedes cum semisse in Virginia & Persia adolescit: def. Virgin.

### IV. Radix filamentosa sericea.

Tit planta in sylvis nascens sine fructu: radice geminorum compressorum pugnorum magnitudine, coma flavescente mollissimum sericum referente, quo pro plumis utuntur ad lectisternia: Linscot. par. 3. Ind. Or. 6.

## E U P A T O R I U M.

**E** *Ἑπάτωρον* Dioscoridi lib. 4. cap. 41. *ἡ πατόριον* Oribasio in collect. & *ἡ πατίρις*, id est, Heparica, quod hepatis medeatur. Plinio lib. 25. c. 6. Eupatoria regiam auctoritatem habet. Sunt qui velint nomen ab inventore Mithridate cognomento Eupatore habere.

### I. Eupatorium cannabinum.

Salvia, Brunf. ico.

Herba S. Kunigundis, Trag. prima, Tab.

Eupatorium vulgare, Matth. Tur. Dodon. Lugdun. Cast.

Eupatorium adulterinum, Fuch.

Pseudohepatorium mas, Dod. gal. Thal.

Eupatorium Avicennæ creditum, Ang. Ges. hor. Lac. Lon. Cam.

Eupatorium aquaticum, Gesn. col.

Trifolium cervinum aquaticum, Ges. hor.

Cannabina aquatica mas, Ad. Lob. (sive Eupatorium mas) Colum.

Eupatorium, Cæs.

II. Can-

II. Cannabina aquatica folio tripartito diviso.

Verbena supina vel tertia, Trag.

Verbena recta, Cord. in Diosc.

Verbesina, Gesn. ap.

Forbesina Bononiensium, Ges. hor.

Pseudohepatorium foemina, Dod. gal. Thal.

Hepatorium aquatile, Dod.

Hydropiper, Lugd.

Bidens folio tripartito diviso, Cæs.

Folia communiter in tres partes, aliquando quinque & sex digitorum instar divisa sunt.

III. Cannabina aquatica folio non diviso.

Eupatorium cannabinum foemina Septentrionalium, Ad. Lob. ico.

Hydropiper aliud Dalechampi, Lugd.

Bidens folio non dissecto, Cæs.

Eupatorium cannabinum chrysanthemum, Tab. Ger.

Conyza palustris, Eyf.

Cannabinae aquaticae similis capitulis nutantibus: in Prodronio.

IV. Eupatorium veterum sive Agrimonia.

Agrimonia, Brunf. Dod. Lon. Cæs.

Eupatorium vulgare, Trag.

Eupatorium, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in

Diosc. & hist. Lac. Tur. Cast. Tab. verum, Lugd.

Eupatorium Græcorum, Ad.

Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum, Ges. hort. Lob. Thal.

Eupatorium Dioscoridis & Avicennae, Anguil. Colum.

Hoc Eupatorium est Græcorum & Avicennae, & Eupatoria Plinij: quibusdam ejusdem Plinij Agrimonia in arvis nascens.

V. Eupatorium odoratum.

Agrimonia odorata, Cam.

Eupatorium Dioscoridis odoratum, Cast.

Eupatorium alterum odoratum & aromaticum, Colum.

VI. Agrimoniae similis.

Agrimonoides, Colum. à quo accepimus: & postmodum etiam ex Italia semē, nomine Pimpinellae folio Agrimoniae missum fuit.

## P O T E N T I L L A.

**P**otentilla ab eximijis viribus nomen obtinuit: alijs Argentina, à foliorum argenteo splendore. Sunt qui Stephanomelidem Plinij l. 26. c. 13. censcant: alij ad Argemonem referunt.

Potentilla, Brunf. Matt. Fuch. Lon. Cæs. Lugd.

(& Argentina sylvestris) Cast. Thal.

Tanacetum agreste, Brunf. 4.

Anserina, Trag. Tab.

Argentina, Dod. ut: Ad. Lob. Ger.

Argemone altera, Fuch. ico. Ges. hort.

## H E R B A M O L U C A N A.

**H**erba Molucana, Acofta, & ex eo Lugd. vulgo remedium pauperum & destructio Chirurgorum, quia insignis vulneraria est: in Maluco abunde nascitur.

## C A R Y O P H Y L L A T A.

**C**aryophyllata, ab odore radices sic dicta, quod vernali tempore eruta, Caryophyllum aromaticum odore referat: vulgus ab insigni ejus efficacia Herbam Benedictam & Sanamundam appellat. Sunt qui ad Lægopum Dioscoridis lib. 4. cap. 17. referant: alij rectius ad Geum Plinij lib. 26. cap. 7. alij ad ejusdem lib. 25. c. 9. Argemoniam cujus radix thus redeat.

I. Caryophyllata vulgaris.

Garyophyllata, Brunf. Trag. Dod. gal. Ges. hor.

Lonic.

Garyophyllata altera, Ang.

Herba benedicta, Brunf. 4.

Benedicta, Gesn. hort.

Caryophyllata, Matth. Lac. Lugd. Thal. Cast.

Tab. Ger. vulgaris, Ad. Lob. Cam. Clus. hist.

Caryophyllata hortensis, Fuch.

Geum, Tur. urbanum, Ges. hort.

Garioflata vulgo, Cæs.

II. Caryophyllata vulgaris majore flore.

Caryophyllata sylvestris, Fuch.

Caryophyllata montana vulgari similis, Cam.

III. Caryophyllata folijs hederæ terrestres.

Caryophyllata sylv. vel quarta, Tab.

IV. Caryophyllata aquatica nutante flore.

Benedicta sylv. Trag.

*Geum rivale*, Gef. hor.

*Caryophyllata Septentrionalium rotundifolia* papposo flore, Ad. Lob.

*Caryophyllata montana* Dalechampij, Lugd. Eyfterr.

*Caryophyllata montana* 1. Cluf. pan. & hist.

*Caryophyllata* major seu purpurea, Thal.

*Caryophyllata aquatica*, Cam. ep. palustris, Camern. Tabern.

V. *Caryophyllata aquatica altera*.

*Caryophyllata montana tertia*, Clu. pan. & hist.

Variat flore simplici & multiplici.

VI. *Caryophyllata alpina lutea*.

*Caryophyllata montana*, Marth. Lugd. 1. montana, Anguil.

*Geum alpinum* & quartum, Gef. hort.

*Caryophyllata major rotundifolia*, Lob.

*Caryophyllata montana*, Dod. Tab. Ger.

*Caryophyllata montana secunda*, Cluf. pan. & hist.

*Caryophyllata alpina*, Cam.

*Gariofilatæ alterum* genus montanum flore luteo, Cæf.

Flore est luteo: rarius purpureo vel albo.

VII. *Caryophyllata alpina minor*: in Phytopinace & Prodromo descripta.

*Caryophyllata alpina omnium minima*, Ponæ.

*Caryophyllatæ alpinae minimæ prima species*, Eid. Ital.

VIII. *Caryophyllata alpina Apij folio*.

*Caryophyllata alpina minima altera*, Ponæ Italic.

IX. *Caryophyllata alpina quinquefolia*.

*Caryophyllata alpina pentaphyllæa*, Ad. Lob. ico. Gerard.

*Caryophyllata montana*, Cast.

*Caryophyllata alpina quinquefolia*, Tab.

an *Polyrrhizos latifolia*, Lugd.

Variat folijs latioribus, angustioribus.

## D E N T A R I A.

**D**entaria à radice forma & colore nominatur, quæ candidissima ex pluribus squamis, quasi dentibus, componitur: quibusdam à colore Coralloides & Alabastrites. Sunt qui ad violas referant: alij inter Scandagines & Symphyta: alij inter Saxifragias: alij inter Saniculas recensent: an Ceratia Plinij l. 26. c. 8?

I. *Dentaria heptaphyllos*.

*Saxifragæ montanæ alia species*, Gef. hor.

*Coralloides altera*, Cord. hist.

*Viola dentaria altera*, Dod.

*Alabastrites altera*, Lob.

*Dentellaria altera*, Lugd.

*Aconiti lycoctoni* genus alterum Dalech. Lugd.

*Dentaria major*, Cæf. altera, Tab.

*Dentaria* πειράφυλλοι, Cluf. pan. & hist. Ger.

II. *Dentaria pentaphyllos*: & Cam. & Ger.

*Dentaria minor*, Marth. Lugd. altera, Cæf. Tab.

*Coralloides*, Cord. hist. ico.

*Pulmonaria* quibusdam, sive *Sanicula alba*, Gef. hort.

*Saxifraga montana* quinis folijs, Eid.

*Viola dentaria prima*, Dod.

*Nemoralis alpina* herbariorum *alabastrites*, Ad. Lob. ico.

*Dentellaria rubra* Dalech. Lugd.

*Coralloides Cordi*, Th. cui & *Rhizocorallium*.

*Dentaria sexta pentaphyllos prima*, Cluf. hist.

*Dentaria corallina altera*, Tab.

Variat folijs, in altera scabris & tactu asperis faturè virentibus: in altera mollioribus, neque

adeo satura viriditate præditis: radice item, hujus enim magis est dentata, sive inæqualis & plurimis crassis squamis exasperata: illa *Dentaria sexta* πειράφυλλοι 1: hæc *Dentaria septima* πειράφυλλοι 2. Cluf. in histor. nominatur.

III. *Dentaria heptaphyllos baccifera*.

*Coralloides*, Cord. hist. descr.

*Coralloidis alia species*, Cord. histor. icone vitiolissima.

*Dentaria bulbifera*, Lob. Cam. Ger.

*Dentaria baccifera*, Cluf. pan. & hist.

*Dentaria minor*, Cæf.

*Dentaria septifolia*, Ger.

Hæc heptaphyllos, rarissimè pentaphyllos: flos albus, aut ex candido leviter purpureus.

IV. *Dentaria baccifera folijs ptarmicæ*.

*Dentaria angustifol. baccifera peculiaris*, Eyf.

V. *Dentaria triphyllos*.

*Dentaria coralloide radice* 2. Cluf. pan. Ger.

*Dentaria enneaphyllos*, Lob.

*Dentaria*, Cast. trifolia, Tab.

*Dentaria quinta* τριφυλλοι, Cluf. hist.

*Ceratia* Plinij, Col.

## E P I M E D I U M.

**E** *πυμήδιον* Dioscoridi lib. 4. cap. 19. *caulis est non magnus, hedera folijs denis aut duodenis, neque semen, neque flores proferens: radicibus tenuibus, nigris, gravis odoris, gustu insipido. Idem habet Plinius lib. 27. cap. 9. ubi aliqui Epimedium, alij Epimenidium legunt: Quibusdam Epipetron ejusdem lib. 21. cap. 15. de qua nil nisi quod nunquam floreat, imitatus Theoph. 7. hist. 8. cui Epimetrum penitus flore caret.*

Epimedium Anguil. (cui & Lunaria quo-|Camerar.  
rundam) Adv. Dodon. Lobel. Lugdun. Tabern. | Planta altera in montibus Liguria, Cæs.

## P Æ O N I A

**P** *Παωνία ἢ γλυκυσιδήν*, quibusdam *πεντοβόρον* cujus radicem aliqui *ιδάκνις ἀκτύλας* vocant, Dioscoridi lib. 3. cap. 157. *Παωνία ἢ γλυκυσιδήν* (casta, alijs dulcissima Gaza reddente) Theophrasto 9. hist. 9. Et Plinio lib. 27. cap. 10. Glycyside, quam aliqui Pæoniam aut Pentorobon appellant. Eidem lib. 25. cap. 4. Pæonia vetustissima inventu est, nomenq; authoris retinet, quam quidam Pentorobon appellant, alij Glycysiden. Dicta Pæonia, à Medico Pæone, quæ a Plutonem ab Hercule vulneratum, Homero Odyss. 5. figente, curasse perhibetur.

Genera duo Dioscoridi: mas, folia juglandis habet, in fœmina Smyrni modo dividuntur: mari radix digitali crassitudine, alba: fœmina radicibus ceu glandes circiter septem aut octo adherent, ut in Aphodelo. Plinio lib. cit. duo genera: fœmina, cujus radicibus balani longiores circiter octo aut sex adherent: mas plures habet, quoniam non una radice mixtus est, palmi altitudine & candida: addit semen in siliquis, aliud grano rubente, aliud nigro.

I. Pæonia folio nigricante splendido, quæ | Pæonia altera vel fœmina Dioscoridis, Cæs.  
mas.

Pæonia nobilior, vel 2. Trag.

Pæonia mas, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Adv. | Pæonia Hispanico semine nata, sive secunda,  
Lob. Dod. Cæs. Lugd. cum duplici figura, Ta- | Clus. hist.

bern. Ger. Eyf.

Pæonia mas folijs nucis, Gesn. hort.

Variat floris colore purpureo, incarnato: & | Pæonia Hispanica sive pumila, Cam.  
hujus herbæ folia latiora segmenta habet, quæ | Pæonia pumila fœmina, Lob. ico.

subtus exalbida; hinc Eyf.

Pæonia mas flore purpureo.

Pæonia mas flore incarnato.

Pæonia mas major.

Pæonia mas major flore incarnato, Eyf.

Floris amplitudine reliquas superat: & her- | an Pæonia minor, Gesn. hort.

bæ folia in latiores & pauciores virentes | V. Pæonia folio subtus incano, flore albo  
particulas dividuntur.

II. Pæonia communis vel fœmina.

Pæonia, Trag. Turn. Lon.

Pæonia fœmina, Brunf. Fuch. Anguil. Dodon. | Pæonia albo flore, Lob.  
gal. Cord. in Diosc. & histor. Gesn. hort. Adv. | Pæonia leucanthemos, Psiphedila Bellonij,  
Lob. Cam. | Camerar.

Pæonia fœmina altera, Dod. Lugd.

Pæonia vulgaris fœmina, Clus. hist.

Pæonia rubra flore simplici, Eyf.

Aglaophotis Æliani censetur.

III. Pæonia fœmina altera.

Pæonia fœmina, Matth. Lac. Cast. Cam.

Pæonia fœmina prior, Dod.

Pæonia promiscua seu neutra, Adv. Lob.

Huc referri potest ea, quæ flore est pallecente.

Pæonia ochranthemom Chamerarij: quamvis

& illa, flore non solum sit albo, &

Pæonia simplex niveo flore, Cl. hist. sed etiam

flore candicante aliquid rubri dilutioris asper-

sum habente.

Pæonia mas flore albo, Eyf.

VI. Pæonia aquilina folijs.

Pæonia quarta folijs supernè virentibus, infer-

nè pubescentibus, Clus. hist.

VII. Pæonia pomi arantij colore.

Pæonia tertia folijs per ora crispis, infernè ci-

nerice coloris, flore carnei dilutioris, Cl. hist.

Pæonia peregrina flore coccineo, Eyft.

VIII. Pæonia flore variegato.

Pæonia quinta, Cluf. hift.

Flos interdum carneus, aut ruber, aliquando media ex parte ruber, alijs carneus, vel utroque colore radiatim distinctus.

IX. Pæonia peregrina flore saturè rubente.

Pæonia Byzantina prior, Cluf. hift.

Pæonia Byzantina major, Eyft.

X. Pæonia peregrina flore dilutè rubente.

Pæonia Byzantina altera, Cluf. hift.

an Pæonia Byzantina minor, Eyft.

Flos illo paulo major, dilutioris coloris, filiquæ breviores, semina rotundiora minusque nigra sunt.

*Pæonia flore pleno.*

I. Pæonia fœmina flore pleno rubro majore.

Pæonia fœmina multiplici flore, Gesn. hort. Dod. Tab. Ger.

Pæonia fœmina polyanthos, Lob. Lugd.

Pæonia πολυανθος, Cluf. hift.

Pæonia polyanthos flore rubro, Eyft.

Flos hujus aliquando folijs quingentis donatur : ex hujus semine tres differentiae natae. 1. flore simplici sex foliorum. 2. flore simplici octo foliorum serie, colore magis saturo rubro. 3. flore pleno matri concolor & etiam major.

II. Pæonia flore pleno rubro minore.

Pæonia pleno rubro flore minor, Cluf. hift.

Pæonia altera flore pleno dilutior & minore, Camer.

III. Pæonia fœmina flore albo pleno.

Pæonia fœmina polianthos flore albo, Taber. Gerard.

IV. Pæonia flore ex albido pleno major & minor.

Pæonia sexta, sive exalbida plena, Cluf. hift.

Pæonia flore pleno incarnato, Eyft.

## LEONTOPETALON.

**Λ**εοντόπεταλον Dioscoridi lib. 3. cap. 110. Leontopetalon, quod alij Rhapejon, Plinio lib. 27. cap. 11. Dioscoridi flos puniceus coloris Anemone similis : cujus Plinius non meminit : at luteum solum observavimus.

Leontopetalon ( id est, leoninum folium ) | Leontopetalum, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. Advers. | Lob. Dod. Lon. Lugd. Cæs. Cast. Eyft.

## CHRYSO G O N U M.

**Χ**ρυσόγυνος Dioscorides lib. 4. cap. 56. meminit, quod aliqui Jacobaeam maritima, alij Tormentillam censent, cum tamen sui generis planta sit.

Leontopetalo affinis folijs quernis. | append. Castor. Ponæ Ital. Chrysogonum Dioscoridis, Rauvvolf. & Lugd. |

## STAPHIS AGRIA.

**Σ**ταφίς άγρία Dioscoridi lib. 4. cap. 156. Astaphis agria, sive Staphis, Plinio lib. 23. cap. 1. Latine, herba pedicularis, ab effectu, unde & Phytroclonon dici potest, cum nunc in Græcia φθειρόκλονος, granum pedicularium nominetur.

Staphis agria, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut : | Lugd. Cæs. Alp. Castor. Camer. Gesn. hort. Turn. Adv. Lob. ( sive Vitifolia ) | Pedicularis, Cord. in Diosc.



## S E C T I O S E X T A.

QUINQUEFOLIUM; HEPTAPHYLLON SIVE  
TORMENTILLA; FRAGARIA; TRIFOLIUM;  
MEDICA; LOTUS; MELILOTUS.

## Q U I N Q U E F O L I U M.

**P**εντάφυλλον (quod nomen à numero foliorum habet) Dioscorides lib. 4. cap. 42. proposuit, cui folia sine Mentha, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata, flores ex candido pallescentes, aurumulos: radice subrubra, oblonga, &c. Sic & Theophrasto 9. hist. 14. πεντάφυλλον, ubi Gaza Quinquefoliam & Quinquepetam vertit. Et Plinius lib. 25. cap. 9. Quinquefolium nulli ignotum est, Græci vocant Pentapetes, sive Chamæzelon, sive Pentaphyllon.

*Quinquefolium flore albo.*

I. Quinquefolium album majus caulescens: quod 1. in Prodomo.

II. Quinquefolium album majus alterum. Pentaphyllum verum ac nobile, Trag. Quinquefolium majus candidum, Fuch. Pentaphyllū albū, Matt. Ad. majus fl. albo, Eysl. Quinquefolium 1. Tur. album, Dod. gal. Gefn. ap. Lugd.

Quinquefol. sive Pentaphyll. 1. Clus. pan. & hist. Quinquefolium sylvaticum, Tab. Ger.

III. Quinquefolium album minus: quod 2. in Prodomo.

IV. Quinquefolium album minus alterum. Quinquefolij albi species quædam, Gefn. ap. Quinquefolium 2. minus albo flore, Clus. pan. & histor.

*Quinquefolium flore luteo.*

I. Quinquefolium majus repens. Pentaphyllum minus, Brunf. vulgare, Trag. Pentaphyllon, Gef. hor. Cast. Dioscoridis, Tab. Pentaphyllon majus, Thal. luteum majus, Dodon. gal. Lugd.

Pentaphyllon 1 & 2. Lon. repens, Cam. Quinquefolium, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac. Adv. Lob. (sive Pentaphyllum vulgare) Cæf. secundum, Turin. (jus, Fuch.

Quinquefolium majus, Dod. Ger. luteum majus. II. Quinquefolium minus repens aureum. Quinquefolij quarti secunda species, Clus. pan. & histor.

III. Quinquefolium minus repens luteum. Quinquefolij minimum genus, vel 1. Trag. Pentaphyllum minus luteum, Adv.

IV. Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum. (hist.

Quinquefolij quarti prima species, Clus. pan. &

Pentaphyllū sive Quinquefolium minus, Tab. Incana pentaphyllæa, Ger. an Pentaphyllon Bavaricum, Cam.

V. Quinquefolium minus repens alpinum aureum.

Quinquefolium tertium, Clus. pan. & hist.

VI. Quinquefolio similis Enneaphyllos: 4. in Prodomo.

*Quinquefolium erectum.*

I. Quinquefolium folio argenteo. Pentaphyllon exiguum alterum, Trag. Pentaphyllon album, Matth. canum, Thal. Pentaphyllon luteum minus, Dod. gal. rectum minus, Cam.

Pentaphyllon tertium, Lon. Quinquefolium luteum minus, Fuch. Tur. Lug. Quinquefolium petræum majus, Tab. Quinquefolium Tormentillæ facie, Ger.

II. Quinquefolium rectum luteum. Pentaphyllon majus, Brunf. Lob. obs. Eyslett. rectum majus, Cam.

Pentaphyllum aliud album, Adv. Quinquefolium luteum rectum, Gefn. ap. Quinquefolium vulgare, Lob. ico. Ger. alterum vulgare, Dod.

Quinquefolium Theophrasti majus, Tab. Heptaphyllon Hermolai, Cæf. Pentaphyllon flore albo, Lugd.

Folia terna, quina, sena, ut plurimum septena, in eadem planta observantur: flores sublu- rei, albi, rubri. Hinc figuræ duæ

Quinquefolij & Pentaphylli albi, & rubri, Lob. Quinquefolij Theophrasti majoris & albi, vel majoris 1. & 2. Tab. (rei, Ger.

Quinquefolij vulgaris & Pentaphylli purpu- III. Quinquefolium montanum erectum

hirsutum, luteum: quod 3. in Prodomo.



IV. *Quinquefolium fragiferum.*

Fragaria quarta, Trag.

Quinquefolium ꝑ. Clus. pan. quintum fragiferum, Eid. hist.

Quinquefolium fragiferum sextum, Tab.

V. *Quinquefolio fragifero affinis.*

Pentaphyllum supinum Tormentillæ facie, Lob. Lugd.

Pentaphyllum supinum Potentillæ facie, Clus. pan. &amp; hist.

Quinquefolium tertium serpens, Lob.

Quinquefolium fragiferum repens, Tab.

Fragaria vesca, Ger.

VI. *Quinquefolium palustre rubrum.*

Pentaphyllum rubrum, Dod. gal. Adv. Lugd. palustre, Lob. ico. Thal. Ger.

Pentaphyllum palustre, Cord. hist. Cam.

Quinquefolium quartum, Dod.

Quinquefolium palustre, Gesn. h. Cam. ep. Tab.

Quinquefolium rubrum, Lugd. (Eyst.

Folijs quinque &amp; sex variat, unde quibusdam heptaphyllum dicitur.

VII. *Quinquefolium lupini folio.*

Pentaphyllum περιόφυλλον, Thal.

VIII. *Quinquefolium tuberosum Indicum.*

Pentaphyllum Indicum, Clus. exot. l. 4. c. 18.

## HEPTAPHYLLON SIVE TORMENTILLA.

**T**ormentilla, quod radice pulvis cum aluminis & pyrethri momento, cavis dentium inditus, dentium tormentum sive cruciatum sedet: quam alij Pentaphyllis: alij Bistortis adnumerant: sunt qui Chrysogonum Dioscoridis sufficantur: Heptaphyllum, id est, Septisolum à quibusdam, à foliorum numero, nominatur.

I. *Tormentilla sylvestris.*

Tormentilla, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc. &amp; hist. Ang. Lac. Lon. Ad. Lob. Cef. Lug.

Thal. Cast. Tab. (&amp; Consolida rubra) Ger. Eyst.

Heptaphyllum, Fuch. Turn. Gesn. hort.

Hujus folia aliquando averfa parte candida sunt: aliquando quina, sæpissime seprena.

II. *Tormentilla alpina vulgaris major.*

Tormentilla alpina, Cam.

Radix odoratior, rubicundior ac major vulgari.

III. *Tormentilla alpina folio sericeo.*

Argentaria petræa, Gesn. hort. alpina, Eid. col.

Pentaphyllum argenteum, Ang.

Pentaphyllum alpinum petrosum &amp; minimum, Adv. Lob. ico. Ger.

Heptaphyllum, Clus. hisp. &amp; hist.

Stellaria argentea, Cam. ep.

Alchimillæ alterum genus, Cæs.

Tormentilla candida Dalechampij, Lugd.

Argentea heptaphylos montana, Cam.

Quinquefolium alpinum, Tab.

Pentaphyllum petræum minus, Eid. quod supinum, Ger.

IV. *Herba Wiapassa in Guajava abundans radicem habet Gingiberi, quoad saporem, non dissimilem, & ad diarrhœam sedandam utilis: part. 8. Ind. Occid.*

## F R A G A R I A.

**F**ragaria à fragro, id est odorem reddo, dicta videtur: Κόμαρον Apulei censetur: inter Pentaphylla flore albo, Dioscoridem intellexisse volunt: & quia Mora terrestria Servio dicta fuere, sunt qui ad Chamaebatum referant. Plinio lib. 25. cap. 9. Fraga. Rubus Idæus non spinosus quibusdam.

Genera: alia montana & sylvestria, in montibus & sylvis nata: alia sativa, quæ in hortis. Fructus magnitudine, figura oblonga, rotunda, & colore variat.

I. *Fragaria vulgaris.*

Fragaria, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut:

Gesn. hort. Lon. Adv. Lob. Lugd. Cast. Ger.

Trifolium alijs Fragaria, Brunf.

Fragula, Cord. hist.

Rubus idæa minor, Lac.

Fragum &amp; Trifolium fragiferum, Tab.

Fragaria major, Thal.

Fraga fructu rubro, Eyst.

Fructus magnitudine &amp; colore variat: quæ-

dam rubra, quædam inter album & rubrum medij, quædam sanguinei coloris: habentur fructu duplo majore vulgari, herbaceo, luteo, pallore & candore confusis: imò & subalba, quæ Fraga major subalba, Lob. fructu albo, Eyst. Fraga alba, Dod.

Fraga æquè magna ac in Anglia in Virginea crescunt.

II. *Fragaria fructu albo.*

Fraga candida, Trag.

Fraga-

Fragaria minor seu nigra, Thal.

Fragum album, Tab.

Fragaria, Ger.

Fructu est aliquando toto candido, minus grumoso, dulciore : aliquando parte superiore rubicundiore, at inferiore candidiore.

III. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine.

Fraga fructu magno, Eyst.

IV. Fragaria folijs hispidis.

Fragariæ tertium genus, Trag.

Fragariæ species minor, *Saarbeer*/Gef. hort.

Fragum tertium, Tab.

Partim rubra, partim candida sunt, vel subpurpurea.

V. Fragaria bis fructum ferens.

Fragariæ genus in albis, Cæf.

Fructus forma compressa, striata, Rubi idæi

sapore : vere & autumnino maturat.

VI. Fragaria flore luteo.

Fragaria parva luteo flore, Gef. hort.

VII. Fragaria sterilis.

Fragaria sterilis, Gef. hort. marem dixeris, Eid. col.

Fragaria syl. minimè vesca sive sterilis, Lob. ico.

VIII. Fragariæ affinis sericea incana, in Prodromo descripta.

Incana Pentaphylli effigie, an Leucas Dioscoridis, Ad.

## TRIFOLIUM.

**T**ρίφυλλον Trifolium Dioscoridi l. 3. c. 123. sic dictum, quod singulis germinationibus, terna exeant folia.

Genera : Dioscorides solum bituminosum proposuit, quod *δρίφυλλον*, *αλειωνοειδές* καὶ *ἀσφαλτικόν* : quiddam bitumen oleat, dicatur. At Plinius l. 21. c. 9. Trifolij tria genera enumerat : *Minyanthes* ait, vocant Græci, alij *asphaltion*, majore folio : alterum acuto, *oxytriphylon* : tertium ex omnibus odoratissimum.

I. Trifolium bitumen redolens.

Trifolium asphaltæum, Matth. Gef. hort. Fracast. Ad. Lob. Lugd.

Trifolium, Dod. gal. Cord. in Diosc. Gef. h. Lon.

Trifolium bituminosum, Ang. Dod. Cæf. Cast.

Cam. Tab. Ger.

Oxytriphylum, Gef. hort.

Folia inferiora, antequam caulem proferat, rotunda sunt, cum verò caulescit, acuta : hinc duæ figuræ in hist. Lugd. altera rotundis, altera longioribus folijs. Semen Italicum in Germania terræ mandatum, profert plantam odore bituminoso : at semen plantæ in Germania educatæ, rursus satum, plantam sapore & odore deficientem producit : hinc duæ figuræ in horto Eyst.

Trifolium bituminosum odoratum, &

Trifolium bituminosum inodorum, Eyst.

II. Trifolium palustre.

Limonium, Cord. in Diosc. pratense, Trag.

Isopyrum, Dod. gal. Gef. hort.

Trifolium palustre, Cord. hist. Dod. Thal. Eyst.

Lotus palustris, Gef. hort.

Trifol. paludosum, Ad. Lob. majus & min. Ger.

Menianthes palustre, Lugd. duplici figura.

Trifolium majus & fibrinum, Tab.

Variat ratione loci, majus datur & minus, rotundiore & acuriore folio : quare Taber. & Ger. figuras duas exhibent.

III. Trifolium Americum.

Trifolium Americ. Lob. Dod. Lugd. Tab. Cam.

Loti sylv. genus latifolium ex Armenia, Cæf.

*Trifolium pratense.*

I. Trifolium pratense purpureum.

Trifolium majus, Brunf. def.

Trifolium pratense purpureum, Trag. Fuch. Ad.

Trifolium pratense rubrum, Cam. Thal.

Trifolium pratense, Matth. Dod. ut : Tur. Lac.

Lob. Lugd. Cæf. Tab. Ger. alterum, Cast.

Hujus differentiarum multæ sunt ratione magnitudinis, tam foliorum, quàm caulium & fructus : folia communissimè rotunda, quibusdam oblonga, rarius in extremo sinuata : nonnunquam unum alterumve folium in binas, ternas, etiam quater nas lacinias dividitur : rarius cauliculo, foliorum minimorum velut fasciculus in umbellæ modum insidet : quibusdam in folio macula est, vel nigra, vel alba, lunæ falcatæ figurâ : floris color alijs purpureus, & modò saturatior, modo pallidior.

III. Trifolium pratense album.

Trifolium pratense alterum, Trag. Matth. Lac.

Trifolium pratense primum, Cast.

Trifolium pratense album, Fuch. Dod. gal. Tur.

Ad. Cam.

Trifolium acutum, Lon.

Trifolium majus primum, Clus. pan. & hist.

Trifolium pratense vulgare fl. candido, Thal.

III. Quadrifolium hortense album.

Quadrifolium phæum fuscum, Ad. Lob. Lugd.

Lotus quadrifolia, Tab.

Folij quaternis, quinis, aliquando septenis donatur.

IV. Tri-

I V. *Trifolium pratense luteum capitulo brevior.*

Melilotum minus, Brunf. 4.

Meliloti exigua species 1. vel 6. vel minor, Trag.

*Trifolium pratense luteum*, Fuch. Tur. Lugd. Cam. pratense tertium, Cast.

Lotus sylvestris, Lon. syl. minor, Dod. gal. Lug.

*Trifolij genus medicæ simile*, Gef. hort.

*Trifolium luteum* 1. capitulo brevior, Thal.

an *Trifolium luteum minimum*, Ad.

*Trifolium arvense*, Tab.

*Trifolium Burgundiacum*, Ger.

V. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, vel agrarium.*

Melilotus 8. vel Lotus campestris, Trag.

*Trifolium agrarium*, Dod.

*Trifolium luteum minimum*, Lob. Lugd.

*Trifolium luteum alterum lupulinum*, vulgo lupulus sylvaticus, Thal.

Illud flore est minore, semen fert, & quibusdam mas: hoc verò flore est majore & speciosiore, sterile & sæmina dicitur.

VI. *Trifolium pratense minus flosculis purpureis.*

Lotus pratensis purpurea, Lugd.

Folia modò terna, modò quaterna habet.

*Trifolium montanum.*

I. *Trifolium montanum purpureum majus.*

*Trifolij altera species & major*, Gef. hort.

*Trifolium majus* 2. Clus. pan. & hist.

*Trifolium aliud montanum majus*, Thal.

II. *Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato: quod 1. in Prodr.*

III. *Trifolium montanum purpurascens folio obtuso crenato: quod 2. in Prodr.*

IV. *Trifolium montan. purpureum minus.*

*Trifolium montanum aliud minus*, Thal.

Variat flore, qui purpureus, reperitur & albus.

V. *Trifolium montanum album.*

*Trifolium majus albo flore*, Clus. pan. majus, primum, Eid. hist.

VI. *Trifolium montanum lupulinum: quod 3. in Prodr.*

*Trifolium alpinum.*

I. *Trifolium alpinum flore magno, radice dulci: quod 42. in Phytopinace: 20. in Prod.*

*Trifolium angustifolium alpinum*, Ponæ.

Glyzyrrhiza alstragaloides quibusdam.

II. *Trifolium alpin. argenteum Persici flore.*

*Trifolium argenteum alpinum*, Ponæ Ital.

III. *Trifolium saxatile hirsutissimum: quod 41. in Phytopinace: 19. in Prodr.*

*Trifolium spicatum.*

I. *Trifolium spica subrotunda rubra.*

*Lagopus maximus folio & facie Trifolij pratensis*, Ad. Lob.

*Lagopus major folio trifolij*, Dod. major flore rubro, Cam.

*Lagopus maximus* Lobel. Clus. pan. & hist. Lug.

*Lagopus peregrina*, Eyft.

II. *Trifolium spicâ oblongâ rubrâ.*

*Trifolium majus tertium*, Clus. pan. & hist.

III. *Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente.*

*Cytisus*, Trag. Lugd. (& *Pes milvi* Pand.) Cam.

*Cytisus Columellæ*, Lon.

*Lagopus altera folio pinnato*, Lob. Lugd.

*Lagopus major*, Eyft. alter, Dod.

*Trifolij majoris tertij, altera species*, Clus. pan. & hist.

*Trifolium spicatum*, Thal.

Folia in calidioribus regionibus marcescentia, nitore, sapore ac strijs elegantissimis avium pennas imitantur.

IV. *Trifolium mont. angustissim. spicatum.*

*Lagopus altera angustifolia*, Ad. Lob. ico. Lug. an *Lagopus minor*, Cæs.

Folijs latoribus in montibus Eugeanæis, & angustioribus circa Monspelium collegimus: aliquando etiam omnibus partibus minor & semipalmaris est, &

*Alopecuros graminea* Dalech. Lugd. dicitur.

V. *Trifolium Hispanicum angustifolium, spica dilutè rubente.*

*Lagopus angustifolius Hispanicus*, Clus. hist.

VI. *Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus.*

*Lagopus & Lotus campestris*, Trag.

*Lagopus sive pes leporinus*, Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Lon.

*Lagopus & Lagopyron*, Ad.

*Leporinus pes*, Cord. in Dioscor.

*Lagopus major*, Cæs. minor, Cam.

*Lagopus vulgaris*, Lug. cum duplici figur. Thal.

*Lagopodium*, Tab. Ger.

*Λαγώπις* Dioscorid. l. 4. c. 17. *λαγόπυρον*, Hippoc.

*Lagopus*, Plinio lib. 26. cap. 8.

Spica colore variat, lutea, aliquando cineritia, aut albescente, ijsq; majoribus, minoribus, rotundioribus, longioribus: folijs latoribus, angu-

angustioribus. Cretici Lagopi nomine habemus folijs latioribus & brevioribus, spicaque brevior & flavescente.

Trifolium capitulo stellat. folliculato, globoso.

I. Trifolium stellatum: quod 16. in Prodromo.

II. Trifolium pratense folliculatum.

Trifolium pratense Salmanticum, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Trifolium Hispanicū, Tab. Salmanticum, Ger.

III. Trifolium globosum, sive capitulo Lagopi rotundior: quod 17. in Prodromo.

IV. Trifolium globosum repens: quod 18. in Prodr.

V. Trifolium capitulo spumoso lævi: quod 4. in Prodr.

VI. Trifolium capitulo spumoso aspero majus: quod 5. in Prodr.

VII. Trifolium capitulo spumoso asperius minus: quod 6. in Prodromo.

VIII. Trifolium fragiferum Friscum, Clus. cur. post.

Aliud floribus dilute rubentibus in globulū, rubi idæi fructum forma & colore æmulantibus collectis: alia species capitulo saturati violacei coloris, ad Rubi vulgaris fructum accedente.

IX. Trifolium capitulis Thymi: quod 7. in Prodromo.

X. Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis.

Dorycnium falso dictum, Gesl. hort.

Dorycnium Monspeliensium, Ad. Lugd. Cam.

Dorycnium, Lob. Hispanicum, Clus. hisp. & hist. Tab. Ger.

Folia terna, quaterna, aliquando quina junguntur: quæ modò latiora, modò angustiora.

XI. Trifolium capitulo oblongo aspero: quod 8. in Prodromo.

*Trifolium peltatum, scutellatum, cochleatum & turbinatum.*

I. Trifolium peltatum Creticum: quod 11. in Prodromo.

II. Trifol. cochleatum vel scutellatum fructu latiore, folio minuto obtuso: quod 9. in Prod.

III. Trifolium cochleatum fructu latiore.

Medica minor, Trifolium tortuosum, Gesl. hort.

Trifolium cochleatum primum, Dod. Ger.

Medicæ species 3. siliqua glomerata, Ad. species 3. Lobel.

Medica, Tur. Anglica, Tab.

Trifolium siliquam habens cochleæ modo implexam, Cæs.

Medica platycarpus, Cam.

Medica sylv. prior, Lugd.

IV. Trifolium cochleatum fructu magis tortili: quod *maxima* Cydoniæ, *noctivida* Retimi nomine, ex Creta Honor. Belli misit.

V. Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo.

Medicæ species secunda, Ad.

Medica sylv. altera, Lugd.

Medica rotundo semine, Cam.

Hoc, sed fructu minore, Loti aut Trifolij nomine, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

VI. Trifolium cochleatum polycarpon: quod 10. in Prodromo.

Duplex est: aliud folio obtuso non crenato: aliud folio acuto crenato: illud Italicum, hoc Gallicum est.

VII. Trifolium cochleatum maritimum tomentosum.

Trifolium maritimum, Gesl. hort.

Medica marina, Ad. Lobel. ico. Clus. hisp. & hist. Tab. Cam.

Trifolij quoddam genus in maritimis, Cæs.

Anthyllis altera, Lugd. ico.

Trifolium cochleatum marinum, Ger.

*Trifolium cochleatum hispidum, echinatum & spinosum.*

I. Trifolium cochleatum fructu nigro hispido.

Trifolium cochleatum alterum, Dod.

Medica folliculo spinoso, Lob. Lugd.

Medica semine minuto hirsuto, Cam.

Medica, Cast. ico.

II. Trifol. cochleatum folio cordato maculato.

an Trifolij species nigris maculis, quod hæmorrhoidum cognominant, Gesl. hort.

Medica Arabica, Cam.

III. Trifolium folio obtuso folliculis cordatis: quod 13. in Prodromo.

IV. Trifol. fructu compresso spinis horrido.

Medica siliqua spinosa, Ad.

Medicæ species, Lob. ico.

V. Trifolium cochleatum echinatum minus: quod 12. in Prodromo.

VI. Trifolium echinatum arvense.

Tribulus terrestris minor repens, Lugd.

Medica pusilla, Cam.

Pilulas habet quaternas, quinas simul junctas: subsequens verò binas, ad summum ternas.

VII. *Trifolium echinatum arvense fructu minore.*

*Tribulus minor rectus.* Dalech. Lugd.

VIII. *Trifolium spinosum Creticum* : in Phytopinace Matthiolo, & Prodomo sub 5. descriptum.

*Trifolium spinosum Creticum*, *ὀφειτέλης* Belli, Clus. hist.

*Trifolium siliqua cornuta & falcata.*

Dioscorides *μυδανκόν*, lib. 2. cap. 177. folijs & caule Trifolij pratenfis, siliquis corniculorum modo intortis describit: *Μυδανκόν*, Theophrasto 8. hist. 8 & 2. cauf. 20. Et Plinio lib. 18 cap. 16. Medica à Medis adveſta per bella Perſarum, &c.

I. *Trifolium siliqua cornuta* five Medica. Medica. Dod. ut: Cord. in Diosc. Lac. Cæſ. Cam. Caſt. deſcr.

Medica vera, Gef. hor. ſativa, Lugd.

Medica flore purpureo, Ang. herba, Lon. deſ.

Medica legitima, Clus. hiſt.

Fœnum Burgundiacum, Ad. Lob.

Medicam veterum & Alfaſar Avicennæ volunt: quæ floris colore variat, communiter cæruleo, violaceo, luteo: ex utriſq; mixto.

II. *Trifolium ſyl. luteum siliqua cornuto*, vel Medica fruteſcens.

Meliloti majoris ſpecies tertia, Trag.

Trifolij genus Medicæ ſimilis, Gef.

Medica flavo flore, Clus. pan. & hiſt.

Lens major repens, Tab.

Apud nos flore eſt luteo: at circa Nemaufum in Gallia Narbonenſi, in arvis reperitur flore luteo albo, viridi, cæruleo, purpureo, nigro, vario, ex cæruleo viridi compoſito.

III. *Trifolium siliqua falcata.*

Lunaria radiata Italarum, Lob.

Medica ſylv. altera lunata, Lugd. cum duplici fig. ra.

Trifolij genus ſiliqua lata & falcata, Cæſ.

Medica lunata, Caſt. ap.

IV. *Trifolium siliqua falcata alterum.*

*Trifolium falcatum*, Clus. hiſtor. append. alt. & cur. poſt.

*Trifolium acetosum.*

*ὀξυτρίφυλλον* quibuſdam, ab acido ſapore, & forma trifolij: Oxys Plinio l. 27. cap. 12. folia ter-  
na habet.

I. *Trifolium acetosum vulgare.*

*Trifolium acetosum*, Brunf. Matth. Dod. Lugd.

Thal. Caſt. flore albo, Eyſt.

*Panicum cuculi*, Brunf. 4.

*Oxytriphylon*, Trag. Lac.

Oxys, Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. hiſt. Cam. alba, Ger. Tab.

Oxys quorundam, Ang. Pliniana, Gefn. hort. Ad. Lob.

Alleluja, Lac. Lon.

Luluia, Fracaſt.

*Trifolium acetosum*, Calabris Juliola, ridiculè barbari corrupere in Alleluja, Scalig. in Thoph. de cauſ.

Floris colore variat: communiter lacteus eſt: rarius purpureſcens, vel ſubcæruleus & luteus.

II. *Trifolium acetosum corniculatum.*

Oxys flore luteo vel flavo, Clus. hiſpan. & hiſt. Dod. Tab.

Oxys, Cæſ. Ger. lutea corniculata repens, Lob. Lugdun.

Lotus urbana, Tur. ico.

*Trifolium acetosum flore luteo*, Caſt. Eyſt.

*Trifolium hepaticum.*

I. *Trifolium hepaticum flore ſimplici.*

Hepatica, Brunf. Dod. gal. aurea, Brunf. 4. Gef. hor. Tab. Thal. quibuſdam Anthera.

*Trifolium magnum seu aureum*, Trag.

Triada & Taura, Hermolao.

Trinitas, Matth. Ang. Cord. hiſt. (ſive Epimedium) Gef. ap. Cæſ. Caſt.

Herba Trinitatis, Gef. hort. Lugd.

*Trifolium aureum*, Dodon. Lon. aureum magnum, Caſt.

Hepaticum trifolium Ad. Lob. Cam. Ger.

Hepatica terreſtris, Gefn. col Hepatica trifolia, Clus. hiſt.

Folijſ ludit, aliquando majoribus & maculis variegatis: floribus communiter cæruleis, vel violaceis, ſubpurpureis, rubris albis, etiam maculis purpureis aſperſis: hinc figuræ duæ apud Lobel. & Gerard.

Hepatici trifolij & rubri:

Hepaticæ aureæ flore cæruleo & rubro, Tab.

Hepatici trifolij cærulei & rubri, apud Clus. & apud Eyſt. fl. albo, rubro, & cæruleo.

II. *Trifolium hepaticum flore pleno.*

Hepatica trifolia polyanthos, Lob. Lugd.

Hepatica trifolia cæruleo pleno flore, Clus. hiſt. ap. alt.

Hepatica multiflora, Gerard. aurea multiflora, Tabern.

Hepatica aurea flore pleno & cæruleo, Eyſt.

LOTUS

**A**ortus Lotus herba (de arbore enim hic sermo non est) Dioscoridi l. 4. c. 111. triplex est: sativa, quam aliqui *τριφυλλον* vocant, quæ in hortis nascitur: sylvestris, quam aliqui *Αλευον*, Libyæ à loco natali appellant, caule bicubitali, aut etiam majore, alis multis, folijs Loti trifolia prætensis, semine sænuigraci, at multo minore, gustu medicato: terria est Lotus Aegyptia, de qua supra. Theophrasto 7. hist. 9. Lotus herba in caule tantum foliolata est: & c. 14. licet, inquit, nomen unum habeat. tamen plura ejus genera sunt, ut sermo equivoca sint, folie, caule, flore, fructuq; discreta: Sic de Loto Aegyptia egit 4. hist. 10. Plin. l. 13. c. 17. de Loto arbore differens subjungit: est autem eodem nomine & herba (Lotum urbanam Dioscoridis intelligens) & in Aegypto caulis in palustrium genere: de hac posteriori egit l. 22. c. 21. Lotometram vocans. Idem l. 22. c. 21. ait, Homerum inter herbas subnascentes Deorum voluptati Loton primam nominasse: haud dubie Lotum sativam Dioscoridis intellexit.

De Meliloto autem Plinius lib. 21. cap. 9. inquit, in coronamenta venit Melilotum, quod Sertulam Campanam vocamus: est enim in Campania Italiae laudatissima: coronas ex hac antiquitus factas, iudicio est nomen Sertula, quod occupavit: odor ejus croco vicinus est, & flos, ipsa cana: placet maxime folijs brevissimis atque pinguisimis. Et c. 11. Melilotos ubique nascitur, laudatissima tamen in Attica: ubicunque verd recens nec candicans & croco quam similima: quanquam in Italia odoratio & candida.

I. Melilotus officinarum Germaniæ.

Melilotum majus, Brunf. Melilotus, Lac. Lon.

Melilotus vera, Gefn. hort.

Melilotus major vulgaris, Trag.

Melilotus vulgaris, Lugd.

(Lugd.)

Lotus urbana, Matth. sativa, Cast. sativa altera,

Saxifraga lutea, Fuch. Sax. altera, Lac.

Lotus sylvestris, Fuch. ico. Cæs. Tab.

Loti sive Trifolij species, Cord. in Diosc.

Melilotus Germanica, Dod. gal. Ad. Lob. Cam.

Gerard. flore luteo, Eyf.

Trifolium odoratum 1. & 2. Dod. Tab.

Flore est communiter luteo, aliquando albo, quæ Melilotus major candida, Trag. hinc duæ apud Tab. figuræ:

Loti sylvestris: & fl. albo. Et apud Gerardum:

Meliloti Germanicæ, & Meliloti coronaræ nomine.

Dodonæus hujus differentias quinque recensuit: 1. flore luteo: 2. flore candido: 3. peregrina flore purpureo-ceruleo inodoro: 4. flore luteo longioribus siliquis: 5. flore luteo folijs per circumferentiam non crenatis.

II. Melilotus corniculis reflexis major.

Melilotus major, vel 3. species, Trag.

Melilotus Italica, Fuch. Dod. gal. Gefn. Ad. Lob.

Meliloti quartum genus, Fuch. ico.

Melilotus sive Sertula campana, Matt. Cord. in

Lotus sylvestris, Gefn. hort.

(Diosc.)

Trifolium corniculatum 2. Dod. Thal.

Melilotus alia, Cæs.

Sertula campana, Cast.

Aliam figuram habet Lobelius, nomine Meliloti Syriacæ odoræ & Sertulæ campanæ. Melilotus Syriaca, Adv.

Hæc Patavij sata, corniculis exit minus falcatis & ignaviore odore. Huc referatur Melilorus altera pusilla Londinensis, Adv.

III. Melilotus corniculis reflexis minor, vel repens.

Melilotus Aegyptia, Alchimelech, Alpino.

IV. Melilorus Italica folliculis rotundis.

Melilotus, Ang. Italica, Cam.

In quibusdam folliculis duo, in reliquis unum granum continetur.

V. Melilotus angustifolia repens, folliculis rotundis: quod sub Trifolio 23. in Pr. describit.

VI. Lotus hortensis odora.

Trifolium Dioscoridis, Trag.

Lotus sylvestris, Matth. Ang. Cast. altera, Lugd.

Lotus sativa, Fuch. ico. Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hort. Cam.

Lotus urbana, Lac. Tur. desc. Eyf.

Trifolium odoratum, Fuch. Tur. Lon.

Trifolium odoratum alterum, Dod. Lugd.

Trifolium caballinum, Gefn. hort.

Lotus hortorum odora, Ad. Lob.

Melilotus vera, Tab. singularis Alpini, Ponæ.

Quibusdam *μελι οίταν* Theophrasti 7. hist. 14. Mel frugum Gaza vertit: Lotus urbana sive sativa Dioscoridis: Septies in die odorem mutare fertur, unde nomen Germanicum *Eibenzeit*: nostris *Schabszügerfraut* / quia Helvetij suis peculiaribus caseis, quos *Schabszüger* vocant, miscere solent.

VII. Lotus sativa Græca maculato folio.

Lotus sativa, & cum folium modo macula rufa modo nigra notatum sit, & caligini oculorum medeatur, à quibusdam *τριφυλλομακτῆ*, id est, Trifolium oculorum vocatur, Ang.



*Lotus pentaphyllos filiquis rectis.*

I. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor  
Lagopus primus, Trag. (glabra.

Meliloti exigui species altera, vel 7. & nobilis,

Melilotus Germanica, Fuch. Lon. (Eid.

Meliloti tertium genus, Fuch. ico.

Lotus sylvestris, Dod. gal.

Trifolij species, Cord. in Diosc.

Lotus pentaphyllos, Gesn. hort.

Trifolium corniculatum primum, Dod. Thal.

Melilotus coronata, Ad Lob.

Lotus sativa Matthioli edit. prima, Lugd.

Melilotum vulgo, Cæs.

Pseudomelilotus, Cam.

Trifolium filiquosum minus, Tab. Ger.

Flos lutei coloris, aliquando ad aureum vergens, nonnunquam subviridis.

II. Lotus pentaphyllos minor hirsutus, filiqua angustissima: sub Trifolio 21. sive corniculato minore piloso, in Prodromo descriptus.

III. Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendente.

Meliloti majoris quarta species, Trag.

Trifolium corniculatum tertium, Dod.

IV. Lotus pentaphyllos major hirsutior candicans.

Melilotus vulgaris alter sylv. Cæs.

V. Lotus pentaphyllos major alter.

Lotus pentaphyllos major & erectus, Gesn. hort.

Hic & glaber & leviter hirsutus apud nos reperitur.

VI. Lotus pentaphyllos frutescens tenuissimis glabris folijs: sub Trifolio 22. vel Corniculato frutescente in Prodromo descriptus.

VII. Lotus Hispanica folijs maculatis: sub Trifolio 24. vel Meliloto Hispanico maculato describitur.

VIII. Lotus pentaphyllos incanus.

Glaux, Ang. quo nomine & Alpinus donabat.

Cytisus Columellæ, Cam. Eyft.

Dorycnium 2. & non descriptum, alijs.

an Idem cum

Dorycnio congenere planta, Cl. hisp. & hist. &

Dorycnij species, Tab. (Lugd.

Dorycnium Monspeliense, Ger.

Clusius enim flores colore viridi: Anguil. & Camer. purpureos, vel ex albo purpurascens adscribit.

IX. Lotus pentaphyllos filiquosus villosus.

Oxytriphyllo alterum Scribonij, Ad. Lob. ic.

Oxytriphylon Scribonij, Lotus syl. Clus. hist. an Trifolium alterum folio acuto oxytriphyllo Plinij?

an Lotus sylvestris ex Cod. Cæsareo, Dod. Lug. Flos est albo, est & purpureo.

X. Lotus filiquosus glaber flore rotundo.

Lotus Lybica Dalechampij, Lugd.

an Oxytriphyllo genus, Clus. hisp.

Hoc duplex Clusio: unum candidioribus ramis & albo radice: alterum caule & ramis ex albo purpurascens, in quibusdam rubentibus.

XI. Lotus fruticosus incanus filiquosus.

Lotus asperior fruticosa, vel Narbonensis incana, Lob. Lugd.

XII. Lotus pratensis filiquosus luteus.

Lotus trifolia pratensis filiquosa Monspeliensium, Adv. Lob. ico.

Lotus filiquosus luteo flore, Clus. pan.

Lotus pratensis filiquosus, Eid. hist.

Lotus trifolia filiquosa, Tab.

Lotus trifolia corniculata, Cer.

Duplex est: major & durior: minor & mollior.

XIII. Lotus ruber filiqua angulosa.

Lotus filiquosus rubro flore, Clus. pan. & hist.

Lotus pulcherrima tetragonolobus, Cam. Eyft. scandalida Cretica Italicorum.

*Lotus pentaphyllos filiqua convexa.*

I. Lotus pentaphyllos filiqua cornuta.

Lotopifos sive Hieranzuni Candia, Ponæ.

Lotus *lepanthes*, quo nomine Bellus ex Creta ad nos misit: & in epist. 5. ad Clus.

II. Lotus filiquis ornithopodij.

Lotus peculiaris filiquosa, Cam.

Lotus sylvestris Dioscoridis, Ponæ.

III. Lotus pentaphyllos filiquis recurvis pedes corvinos referentibus.

Coronopus ex Cod. Cæsareo, Dod. quid?

IV. Lotus pentaphyllos vesicaria.

Dorycnio similis, Ang.

Trifolium vesicarium, Clus. pan.

Trifolium Halicacabum sive vesicarium, Cam.

*Lotis affinis.*

I. Loto affinis Ægyptiaca.

Abfus, Alpini.

II. Loto affinis Vulneraria pratensis.

Anthyllis prior, Dod. gal. Lac. Lugd.

Anthyll. leguminosa, Lob. Cl. pan. & hist. Cam.

Anthyllis lenti similis, Dod.

Vulneraria rustica, Gesn. hort.



Lagopodium, Tab.

Arthetica Saxorum, Thal.

Flore communiter est luteo, rarius albo:  
hinc duæ figuræ apud Tab. & Ger.

1. Lagopodium flore albo, Tab.

Lagopum maximum, Ger.

2. Lagopodium flore luteo, Tab.

Anthyllis leguminosa, Ger.

III. Loto affinis hirsuta flore subrubente.

Anthyllis leguminosa purpurascente flore,

Clus.pan.& hist.

Lotus latifolia Dalechampij, Lugd.

Aliquando tota incana est, qualem ex Hispania habemus.

IV. Loto affinis siliquis hirsutis circinatis:

Auricula muris, Cam.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER NONVS.

## SECTIO PRIMA.

RUBIA; APARINE; ASPERGULA; MOLLUGO;  
GALLION; CRUCIATA.

RUBIA.

**E**ρὺθρόδανον (ab ἐρὺθρον, id est ruber) ἢ ἐρὺθρόδανον, aliquibus τέρβερον, radix est rubra tingendo idonea, Dioscoridi l. 3. c. 160. ἐρὺθρόδανον, Theoph. 6. hist. 1. Rubia (aradici colore) Plin. l. 19. c. 3. ac l. 24. c. 11. Erythrodanum, aliqui Ereuthodanum vocant; nos Rubiam, quæ lanæ tinguntur.

Genera: duplex est, una sylvestris sativa altera, cui caules quadranguli, longi, asperi, quales Aparinae, folijs in orbem per intervalla, circa singula genicula stellæ modo decussatim radiatis, &c. Dioscorides l. c. At Theoph. l. c. plura sunt genera (Dodoneo Rubiæ propriæ species nullæ sunt) & 7. hist. 9. radices rubicundæ: verum 9. hist. 14. folia hederae sed rotundiora tribuit. Plin. l. 19. c. 3. Rubiæ spinosus caulis geniculatus, quibus circa articulos in orbem folijs. Hic Plin. licenter asperum caulem spinosum vocat, cum Theoph. 6. hist. 1. spinis Erythrodanum carere aperte scribat. Laudatissimum ait Plinius, Italicæ & maxime suburbana & omnes penè provinciae scatent, &c.

I. Rubia tinctorum sativa.

Rubia sativa, Brunf. Frag. Matth. Fuch. Dod. gal. Gesn. hort. Lac. Tur. Lou. Frac. Lugd. Cast.

Rubia, Cord. in Diosc. Ang. Dod. Cæf. major, Adv. Lob. Clus. hist.

Thapsia Asclepiadis, Ang.

Seritur non paucis Germaniæ, præsertim apud Silesios, Belgij, Galliæ, Italiæ & Hispaniæ locis, in usum enim tinctorum agri conferuntur: quemadmodum apud Dioscoridem, in Thebana Galliæ, & Ravenna Italiæ, nec non in Arabia inter oleas ferebatur.

II. Rubia syl. aspera, quæ sylvestris Dioscoridi.

Rubia erratica, Trag.

Rubia sylv. vera, Cord. ob.

Rubia maxima, Lob. ob.

Rubia sylvestris, Cæf.

Quibusdam locis spontè in sepibus provenit, sativæ per omnia similis, radice tamen multo majore, & folijs atrovirentibus.

III. Rubia sylvestris lævis.

Rubia sylvestris, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. Gesn. hort. Lac. Tur. Lon. Lob. Lugd. Cam. Cast. Thal. Tab. Ger.

Rubia sylv. minor. Adv. Lob. ob.

Lappago Plinij, Cæf.

Alyssum Plinij l. 24. c. 11. (quod folijs tantum & ramis minoribus, ab Erythrodano distare scribit) quibusdam alijs Lappago ejusdem l. 26. c. 10.

IV. Rubia pratensis lævis acuto folio: quæ Rubia 2. in Prodomo. (Prod.

V. Rubia montana angustifolia: quæ 1. in Rubia sylvatica longioribus & angustioribus folijs, Gesn. hort.

VI. Rubia cynanchica.

Aspergula herba repens, Gesn. col.

Synanchica, quod ad anginas sumpta & admodum valet, Lugd.

Saxifraga altera, Cæf.

Galiū tetraphyllō montanum cruciatum, Col.

VII. Rubia cynanchica saxatilis: quæ 8. in

VIII. Rubia linifolia aspera. (Prod.

Juncaria Salmaticensis, Clus. hisp. & hist. Lob.  
Juncaria, Tab.  
Synanchicæ species, Lugd.

## IX. Rubia maritima.

Rubia marina Norbonensium, Adv. Lob. Dod.  
Clus. hisp. & hist. Tab.

Erythrodanum marinum, Lugd.

Crucialis maritima, Cæs.

## X. Rubia quadrifolia vel latifolia lævis.

Rubia lævis Taurinensium, Lob. Lugd.

XI. Rubia quadrifolia, vel rotundifolia lævis: sub Rubia 3. in Prodromo.

## XII. Rubia latifolia spicata.

Rubia spicata, Imperato: Cretica, Clus. hist.

XIII. Rubia angustifolia spicata: quæ 4. in Prodromo.

## XIV. Rubia Virginea.

Chappavvr, radices tenues quibus ad tinturas utuntur: in desc. Virgin.

## Rubeola.

I. Rubeola arvensis repens cærulea: quæ 5. in Prodromo.

Rubeola arvensis, Cam.

## II. Rubeola repens lutea folijs spinosis.

Rubia minima, Lob. Lugd.

III. Rubeola laxatilis: quæ 6. in Prodromo.  
an Rubia saxatilis, Cam.

## IV. Rubeola echinata saxatilis.

Cruciata muralis, Col.

an Crucialis minima in maritimis, Cæs.

V. Rubeola maritima aspera: quæ 7. in Prodromo.

## A P A R I N E S I V E A S P E R U G O.

**A**πρίνη, ἀμπιλόκαρπον, ὀμφιλόκαρπον, φιλάβρωπον ramis quadrangulis, asperis, folia, ceu & rubia, ramulos in orbem per intervalla cingunt, &c. Dioscoridi lib. 3. cap. 104. Lappam Gaza apud Theophrastum 7. hist. 8. & 14. vertit: Aparinem (scribit Plinius lib. 27. cap. 5.) aliqui Omphalocarpon, alij Philanthropon vocant, ab asperitate vestium tenaci, &c. Eidem lib. 26. cap. 10. Asperugo inter Lappagines, dicitur ab asperioribus folijs, ad quod nomen vulgare alludit.

## I. Aparine vulgaris.

Aparine, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod.  
ut: Cord. in Dioscor. Lac. Turn. Lon. Adv. Lob.

Lugd. Cæsalp. Castor.

Aparine aspera, Thal.

## II. Aparine purpureis floribus.

## A S P E R U L A.

## I. Asperula, sive Rubeola montana odora.

Caprifolium vel Stellaria, Brunf.

Hepatica tertia, Eid. 4.

Matrisylva, Trag. Cord. in Diosc. Lon. Thal.

Asperula, Dod. gal. Frac. Lob. Lugd. Ger.

Asperula odorata, Dod. Cast. Clus. hist.

Aspergula odora nostras, Adv.

Aparine sylvestris quædam, Cord. in Diosc.

Alyssos, Gesn. hort. Lac.

Alyssum Plinij minus, Gesn. collect.

Rubia sylv. alia minor, Gesn. append.

Hepatica stellata, Tab.

## II. Asperula cærulea arvensis.

Alifson, Turn.

Asperula cærulea, Dod. Lob. Cam. Lugd.

Alyssum Galeni quibusdam, sed perperam.

## III. Asperula hexaphyllos purpurea.

Myagrum alterum minus Dalechampi, Lugd.

## IV. Asperula verticillata luteola.

Asperula verticillata muralis minima, Col.

## M O L L U G O.

**M**olluginis Plinius lib. 26. cap. 10. his verbis meminit: Et Lappago similis anagallidi (fortè legendum Galio) nisi esset ramosior, ac pluribus folijs aspera, rugosa, asperioris succi, gravis odoris: quæ talis (fortè mollis legendum) est, Mollugo vocatur: similis sed asperioribus folijs, Asperugo.

## I. Mollugo montana latifolia ramosa.

Matrisylva secunda, Trago.

Rubia sylvatica altera, Gesn. hor. major, Eid. ap.

Alyssum Plinij majus, Gesn. col.

Mollugo montana, Dod. Lugd. Thal. Tab.

Mollugo, Clus. pan. & hist. Belgarum, Lob.

Gallium sive Mollugo montana, Ger.

## II. Mollugo montana angustifolia, vel

Gallium album latifolium.

Gallion tertium, Trag. album, Adv. Cam. Thal.

Gallion candido flore, Cord. in Dioscorid. Cæsalpin.

Mollugo prima, Dod. Lugd. Tab.

Mollugo vulgatiores herbariorum, Lob.

GAL-

## G A L L I U M.

**Γ** Ἀλλιον, γαλλέριον, γαλλάτιον, nomen ex eo traxit, quod coaguli vice γάλα lac cogat & coagulet: ramulum foliumq; habet Aparine similitimum, rectum: florem in cacumine luteum, &c. sic Dioscorid. l. 4. c. 96.

## I. Gallium luteum.

Gallij primum genus, Trag.

Gallium, Matth. Lac. Cast. luteum, Cord. in Diof.

Lob. Lugd. Cam. Ger.

Gallium, Fuch. Dod. ut: Ang. Lon.

Gallium luteum, Ad. Thal. primum, Tab.

## II. Gallium rubrum.

Gallium rubro flore, Clus. hist.

III. Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium, Colum.

## IV. Gallium palustre album.

Gallion palustre, Dodon.

Gallion flore candido in palustribus, Cæsalp. Castor.

Aparine lævis palustris, Thallio.

Gallium album, Lon. Tab. Ger.

## V. Gallium album minus.

Gallium album minus, Tab. rubrum, Ger. ico.

Folia bina plerunque, nonnunquam terna habet.

## C R U C I A T A.

**C**ruciatæ ac Crucialis, à soliorum in crucis formam situ nominatur, licet ad Rubia & Aparines similitudinem aliquomodo accedat.

## I. Cruciatæ hirsuta.

Gallij secundum genus, Trago.

Galton, Turner.

Crucialis, Hermol. Cæf.

Cruciatæ, Dod. ut: Gef. hor. quæ Gallio cognata, Cam. Cast. ico.

Cruciatæ minor, Ad. Lobel. (& Asperula aurea) Lugdun.

Cruciatæ herniaria, Thallio.

Alysson Plinij, Cæsalp. Inguinaria Plinij lib. 26. cap. 9. quibusdam (Inguinaria passim in vepribus nascens, ut proflit inguinibus in manu tantum habenda est: plura non habet) fortè quia in herniosis, rupturis solidandis, admodum præstans habetur.

Eadem in montibus longè exilior.

II. Cruciatæ glabra: hæc sub Gallio latifolii glabro in Prodomo describitur.



## S E C T I O S E C U N D A.

## R U T A : T H A L I C T R V M.

## R U T A.

**Π**ήχων Dioscoridi lib. 3. cap. 52. Theophrasto 1. hist. 10. ita dicitur quod caliditate sua πήχωνος τέλει (semen coagmenter) ut Nicandri schol. tradit. Ruta Plinio lib. 19. cap. 8. ubi ferendi modum recenset. Ruta fortè dicta à Græco πύτη: Scribit enim Jolauus in rebus Peloponesiacis, πήχων in Peloponēso πύτη vocari.

Genera: Dioscoridi l. c. alia sativa & hortensis: alia montana & sylvestris: & hæc eadem duplex: sic ait, Ruta montana & sylvestris, sativa & hortensi acrior est. & in cibis damnata: est autem in hortensi genere esui aptior quæ juxta sicut provenit: sylvestris sativa quodammodo similis est: & c. 33. Vocant etiamnum sylvestrem rutam quod in Cappadocia & Galatia Asiatica, Moly dicitur. Frutex folijs longioribus flore candido &c. Sunt qui rutam hanc Harmala vocent, Syri Betsa, Cappadoces Moly, &c. Theophrasto, Ruta caudice uno constat & arboris quasi naturam adipiscitur: & 2. hist. 1. ex palmitibus exit & avulsione: & 7. hist. 4. plura sunt ejus genera: & 7. hist. 6. sylvestris aspectu vicina urbana est, præterquam folijs minoribus, &c. & 1. hist. 16. Rutula folia carnosa habet, sed caro in latitudinem distenditur, non in rotunditatem crassatur. Plin. l. 20. c. 13. Sativa folia latiora, rami fruticosiores: sylvestris horrida ad effectum est & ad omnia acrior, &c. addit Pythagoram, in hac marem, minoribus herbaceisq; coloris folijs, a femina discernisse: eam letioribus folijs & colore.

## I. Ruta

I. *Ruta hortensis latifolia*.  
*Ruta*, Brunf. Matth. Ang. Frac. Tur. Lac. Cæs.  
 Castor.  
*Ruta domestica*, Trag. hortensis, Fuch. Dod. gal.  
 Gesf. hor. Lob. Cam. Gerard.  
*Ruta sativa*, Cord. in Dioscorid. Lugd. major,  
 Gesf. hort.  
*Ruta major & hortensis*, Ad.  
*Ruta graveolens hortensis*, Dod.  
*Ruta latifolia*, Tab.

Hæc in hortis ita colitur, ut sæpè tres, etiam  
 quatuor cubitos superet: hanc arbusculæ simi-  
 lem cultura evasisse in horto Sturgardiano ob-  
 servavimus.

II. *Ruta hortensis altera*.  
*Ruta hortensis minor*, Trago.  
*Ruta sativa tenuifolia*, Cord. in hist.  
*Ruta hortensis nobilitate præstans*, Gesf. hor.  
*Ruta tenuifolia*, Tab.  
*Ruta sylvestris graveolens*, Ger. ico.

Illa vulgarior est & per omnia major & cæsi-  
 coloris: hæc verò minor, præstantior & nigri-  
 cantior.

III. *Ruta sylvestris major*.  
*Ruta sylv.* Matth. Dod. gal. Ad. Lon. Lugd.  
*Ruta sylv. prima*, Lac. Cast. graveolens, Dod.

*Ruta sylvestris majoribus folijs*, Gesf. horr.  
*Ruta montana*, Tab. Ger. sylv. montana, Lob.

IV. *Ruta sylvestris minor*.  
*Ruta sylvestris minoribus folijs*, Gesf. hort.  
 Peganion Narbonensium sive *Rutula*, Ad.  
*Ruta sylvestris*, Dalechampio in Dioscor. Lob.  
 Lugd. Cam. epit. qui priori adjungit.  
*Ruta sylvestris minima*, Dod. Ger.  
*Ruta montana & sylvestris*, Clus. hisp. & hist.  
*Ruta sylv. tenuifolia*, Cam. sylv. minor, Tab.  
*Ruta montana legitima*, Clus. ap. alt. lib. 2. figu-  
 ram exhibet, priorem minus elegantem & spu-  
 riam dicens.


Huc referenda  
*Ruta sylv. Cretica*, Clus. hist. quæ priore vege-  
 tior & magis luxurians, quia in culto loco nata,  
 folijs valde leniter incisis, & gravis odoris.

V. *Ruta sylvestris flore magno albo*.  
*Ruta sylvestris*, Ang. Cord. in Diosc. Gesf. hort.  
*Ruta sylvestris Harmala*, Matth. Clus. hist. Lug.  
*Ruta sylvestris secunda*, Cast. Camer.  
 Harmel, Gesf. hor. Constantinopolitanum, Cæs.  
 Harmala, Dod. Clus. hisp. Tab. Cæs.  
 Harmala Syriaca, Ad. Lobel.

Huc referri debet  
*Ruta triangulo pericarpio*, Ad.

## THALICTRUM SIVE RUTA

Pratenfis.

 *Ἀλνίς* *folia Coriandri habet at pinguiora: cauliculum ruta crassitudine, in quo folia, Dioscoridi l. 4. cap. 98. Sic dictum fortè à ῥάδιω virco, eò quòd dum germina protrudit eleganter vireat. Phellandrium Plinij aliqui suspicantur.*

I. *Thalictrum majus filiqua angulosa aut striata*.  
*Thalictrum*, Cord. in Dioscor. nigrum, Eid. hist.  
 flor. Thal.  
*Piganum*, Dod. gal. Lugd.  
*Ruta pratensis*, Gesf. hort. herbariorum, Ad.  
 Lobel.  
*Saxifraga lutea*, Gesf. hort.  
*Barba caprina minor*, Gesf. hort.  
*Thalictrum quorundam*, Gesf. hort.  
*Thalictrum secundum sive Germanicum latifolium*, Cam.  
*Thalietrum magnum*, nonnullis *Pseudorhabbarum*, ob radice luteo colore, Dod.  
*Thalietrum pratense* I. vel s. Clus. pan. & hist.  
*Ruta sylvestris*, Cæs.

Florum muscosa stamina è pallido candi-  
 cant, rarius purpurascunt: hinc  
*Thalictrum flore incarnato*, &  
*Thalictrum flore albo*, Eyst.

II. *Thalictrum majus non striatum*.  
*Thalietrum magnum secundum*, Dod.  
*Ruta pratensis major secunda*, Tab.

III. *Thalictrum majus flavum staminibus luteis, vel glauco folio*.  
 an *Pes Milvi*, Anguil.

*Thalietrum majus tertium*, Dod.  
*Thalietrum primum vel Hispanicum*, Clus.  
 pan. & hist.

*Thalictrum primum Italicum*, Cam.  
*Thalietrum in Hetruria vulgo Verdemarum*,  
 Cæsalp.

Ruta

Ruta pratensis major quarta, Tab.

Thalierrum sive Thaliſtrum majus, Ger.

IV. Thaliſtrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus.

Thalierrum majus quartum, Dod.

Thalierrum quartum vel montanum tertium, Cluſ. pan. & hiſt.

Thaliſtrum quintum flore purpureo, Cam.

Ruta pratensis major tertia, Tab.

Florum ſtamina dilutam violæ nigræ purpuram referunt.

V. Thaliſtrum montanum album.

Thalierrum 2. & 3. vel montanum 1. & 2. Cluſ. pan. & hiſt.

Thaliſtrum ſextum flore albo, Camer.

Duplex eſt, unum altius excreſcit, flore candido admodum gravis odoris: alterum flore albo etiam, ſed paulo humilior, minus ingrati odoris.

VI. Thaliſtrum pratense anguſtifolium.

Thalierrum pratense 2. vel 6. Cluſ. pan. & hiſt.

Thaliſtrum tertium anguſtifolium, Cam.

Ruta pratensis major quinta, Tab.

VII. Thaliſtrum pratense anguſtiſſimo folio: quod 1. in Prodomo.

VIII. Thaliſtrum minus.

Hypocoum forte, Dod. gal. Lugd.

Ruta pratensis tenuifolia, Ad.

Thaliſtrum tenuifolium, Cord. hiſt. Lob.

Thalierrum minus, Dodon. Gerard. parvum, Camer.

Thalierrum ſeptimum, Cluſ. pan. & hiſt.

Ruta ſylveſtris altera, Cæſ.

Ruta pratensis minor, Tab.

Stamina florum quandoque pallidi coloris ſunt, quandoque ex luteo languſcunt, & è violaceo purpuraſcunt.

IX. Thaliſtrum minimum fœtidiffimum: quod 2. in Prodomo.

Simile, ſed caule ex puniceo colore purpuraſcente Thaliſtri maritimi nomine, D. Gillenius miſit.



## SECTIO TERTIA.

### DE LEGUMINIBUS CAPREOLIS Donatis.

**L**egumina dicta putat Varro à legendo, quoniam ea non ſecantur, ſed vellendo leguntur. Græci *καπερα* vocant, at Theophrastus *χέδραπα*.

FABA; SMILAX HORTENSIS, SIVE DOLICHUS, SIVE PHASEOLUS; PISUM; OCHRUS, SIVE ERVILIA; LATHYRUS ſive Cicercula; Vicia & Aphaca; Arachus ſive Cracca; Arachidna, & Lentesc.

#### F A B A.

**A**cturi de Leguminibus, primo de Faba ſermo erit, quia inter legumina maximus honos faba: quippe ex qua tentatus etiam ſit panis, cuius farina Lomentum appellatur, ut Plinius lib. 18. c. 12. loquitur: ut a hodie ejus farinam quidam Secale miſcent, & panem conſciunt ſolidum ac multi nutrimenti: Sic & Phryſij etiam hodie magna ex parte fabarum farinâ, bordei farinæ aut avenæ admixta, panes faciunt.

Græci *νύαυ* à ſeracitate dicta: vel *παρά τὸ νέον αἶμα*, ut Euaſtichius vult: quemadmodum *νύαυ* locuſ fabis conſitus, ſeu fabetum apud Theophrastum 4. hiſt. 10. Fabulum Gellio & Feſto.

Duplex Dioſcoridi lib. 2. cap. 127. & 128. altera *νύαυ* *ἐκδομὸς*, altera *ἀγυπτία*: illa Graca, qua eadem cum vulgari videtur & ad differentiam Agyptiaca Graca dicta: hac Agyptia nominata. At Theophrastus 7. hiſt. 3. de communi faba egit, quemadmodum de Graca 4. hiſt. 2. & de Aegypcia, 4. ejusdem 10. Plinius Faba communis deſcriptionem ſparſim, lib. 18. cap. 7. exhibuit, eam ſeri, ait folia habere multiplicia rotunda, ut & magna leguminum pars, ſolam ex leguminibus unicaulem eſſe (inter legumina ſola poſitiſſimum erecto caule conſtat Theophr. 8. hiſt. 3.) quadraginta diebus florere & alterius lateribus ſiliquari: at lib. 18. cap. 12. naſci tamen & ſua ſponte plerique, in locis ſicut Septentrionalis Oceani Inſulis, quas ob id Fabarias (idem Plin. 4. hiſt. 13.)

*appellari: item in Mauritania passim sylvestrem esse: meminit & Aegyptia spinoso caule, folio amplo, capite papaveri simile, colore roseo, &c.*

I Faba, Brunf. Matth. Ang. Fuch. Tur. Cord. in Dioscor. Gesf. hort. Lac. Lon. Cast. Cam. sativa, Lugd.

Faba vulgaris, Trag. Fuch. Cord. hist.

Phaselus sativus, Dod. gal. qui secutus Eriacum Cordum, Fabam esse negat.

Bona sive Phaselus major, Dod.

Faba major vulgaris, Ad.

Faba major recentiorum, Lob. hortensis, Ger.

Variat flore & fructu: floris colore, qui vel ex purpura nigrescit: vel candidus, lituris nigris conspicuus, quas literas lugubres dicunt, idè aliqui ijs non vescuntur: & harum esus à Pythagora prohibitus, vel quia animæ mortuorum in ea sint: vel quia existimant sensus hebetare & insomnia facere. Fructus magnitudine, figura & colore differunt: sunt magnæ & inter legumina maximæ censentur, & quo majores eò magis in longitudinem depressæ: sunt minores quæ rotundiores: in qualibet filiqua ut plurimum ternæ, ad summum quinquæ. Colore plurimum candidæ, vel in candido pallentes, ex rubicundo colore purpurascens, nigræ aut in nigro purpurascens: & has Fabas nigras vocat, majores & minores facit, Cord. hist.

Fabæ duorum aut trium generum in Insula Madagascar reperiuntur: part. 4. Ind. Orient. cap. 1. Sic in Guinea varij generis, in primis aliquæ delicatulae & molles: part. 6. Ind. Orient. cap. 12. varia quoque genera in Anabonæ: part. 8. Ind. Orient.

II. Faba minor sive equina.

Bona sive Phaselus minor, Dod.

Faba minor, Ad. Lugd.

Fructus est teretis quodammodo figuræ, ac in rotunditate oblongus, colore subalbicans aut subflavus, alias nigro, umbilicum supernè parvum ac nigrum habens: medium quoddam genus inter majorem ac sylvestrem fabam: majoribus enim, minor & rotundior, sylvestribus verò major ac longior. Ex hac apud zelandos & finitimos panes fabaceos veterinis dant, & hæc in equorum (hinc Bonam equinam vocant) jumentorumq; pabulum feritur, Dodon. At Sebastiani rustici non alio pane vescuntur, quam confecto ex paululo tritici, secale & rotunda minutaq; faba, Lugdun.

III. Faba sylvestris fructu rotundo atro.

Faba sylvestris, Matth. Ad. Castor. Lugd. Taber. Camer.

Phaselus sylv. & niger, Dod. gal. (quæ forte Faba est) Gesf. hort. (cui Phaselus forte veterum,) Lugdun.

Bona sylvestris, Dod.

Faba Græcorum sylvestris, Lob.

Pisa nigra, Camer.

Aracus, Fuchfij vulgò Vitia Romana, Cam:

Cucophicos Cretensium nomine semen ex Creta, ab Honorio Belli accepimus, quod ex decido semine facillè regenerinat.

IV. Faba Indica purgatrix.

Faba purgatrix, Monardi, Frag. Lugd. quoad descriptionem.

Phaselus Peruanus, Petri de Osma ad Monard.

Fructus peregrinus undecimus, sive Phaseolus colore Macounæ similis, Clus. exor. l. 2. c. 30.

V. Faba purgatrix latissima, ex Insula D. Thomæ.

Phaseolus major, Clus. ad Monard.

Cor Divi Thomæ, à forma & quod in Insula D. Thomæ nascatur, Eid.

Lobus crassus ex Insula S. Thom. Clus. ex. l. 3. c. 8.

Phaseolus novi orbis, Lob.

Phaseolus Americanus purgans, Tab. Ger.

Faba purgatrix, Lugd. ico.

VI. Faba Indica prælonga.

Fructus 11. peregrinus, vel Phaseolus ex spadiceo nigricans, Clus. exor. l. 2. c. 30.

Fructus peregrinus 11. tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VII. Faba arborescens: hujus differentias 6 in Prodromo proposuimus, quas Fabæ arborecentis Anglicæ nomine Amstelredamo à D. Jacobo Guillemi Hooft accepimus.

1. Faba arborescens rufa, sinu ad basin semicirculari uncias quatuor longa, tres lata.

2. Faba arborescens media, umbilico semicirculari, cortice nigro striato.

3. Faba arborescens minor umbilico oblongo, cortice nigro.

an Faba arborescens Tilemanni, Clus. exor. lib. 3. cap. 6.

4. Faba arborescens umbilico oblongo spadiceo cortice.

an Phaseolus peregrinus primus, Clus. exor. lib. 3.

lib. 3. cap. 7. qui & secundum priore minorem exhibet.

5. Faba arborecens scapulæ os referens, spadiceo cortice.

6. Faba arborecens unguis magnitudine nigro cortice.

an Phaeolus peregrinus quintus, Clus.

VIII. Fabæ Brasilianæ.

Fabæ genus pollicis crassitudine à Barbaris Commanda-ouasou appellata: Lerio descript. Brasil. c. 12. Habent & alias fabas crassas & minutas: par. 3. Amer. ep. alt. de Brasil.

## SMILAX HORTENSIS SIVE DOLICHUS, five Phasiolus.

**Σ**μίλαξ κηπάρι folijs est hedera sed mollioribus, cauliculis claviculæ instar propinquæ fruticibus sese implicans, ut operi topiario inserviat, cujus fructus λεία (quasi siliquulas dicas) semina continet renibus similia, non aquali colore, sed ex parte rufescentia, &c. Dioscoridi lib. 2. cap. 176. Hæc ab Hippocrate, Diocle, Theoph. & plerisque alijs λεία vocatur: à nonnullis à siliquarum magnitudine λεία & λείον: ab alijs φασιόλ (à φασιόλ ut aliqui volunt differens) Galeno 1. aliment. scribente. Dolichus Theoph. 8. hist. 3. Et Aëtius Smilacem hortensem Dolichos esse & Phascoli genus, & ab omnibus Lobos nominari, aperte docet. φασιόλ apud Dioscoridem lib. 2. cap. 130. sed sine ullis notis habetur. Sunt tamen qui Smilacem hortensem à Phasiolis, solum siliquis & semine differre censeant, quæ in Smilace majora sint, ut Matthiolus voluit, qui pro Phasiolo & pro Smilace hortensi eandem pingere videtur, nisi quod pictura una recta, altera inflexa est: At Anguillara, phasiolum & phaselum non distinguit: auctor hist. Lugd. asserit Galeno vocem Phasiolum quatuor syllabis prolata, à Phasclo tribus syllabis pronunciato, diversam esse, & de hoc cum Ervilijs simul tractasse. Plinius lib. 18. cap. 7. Faselis folia venosa tribuit.

Duplicem facimus, vulgarem alium, alium peregrinum: vulgarem, alium majorem fructu longiore & renis formam melius referente, qui communiter candidus: alium minorem siliqua angustiore: distant etiam crassitie & tennitate. Hic variat floris & seminis colore: flores plerumque candidi, pallidi, flavescentes, purpurascens sive amethystini, & ut Cordus in sua historia censuit, floris colorem fructus sequuntur. Verum in semine fructuque major est coloris varietas, sunt nivei, flavi, ex flavo obsoleti, purpurei, rubri, latericei sere coloris, amethystini, violacei, atroviolacei, nigri, initio purpurei deinde atrii: vel albi nigri venis & lituris distincti: Item carnei & cinerei similibus venis insignes: Item albi purpurascens, orbibus albis variegati, vel spadicei nigri maculis aspersi: nonnulli incani, atro colore, vel ab una parte, vel utrinque notati.

*Smilax hortensis five Phaeolus  
vulgaris.*

I. Smilax hortensis five Phasiolus major.

Phaselus, Brunf.

Phaeolus, Dod. gal. Camer. vulgaris (vel Faba Turcica multicolor) Adv. Lob. Clus. pan. & hist. albus, Ger.

Smilax hortensis, Brunf. quoad descript. Trag. (cui & Siliqua Theoph.) Matth. (& Phaeolus hortensis) Fuch. Tur. Lac. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Lugd. Tab. (qui, ut & Gerardus, fructus duodecim generum pingit) Cam.

Smilax fativa five lenis, vel Dolichus, Cord. hist.

Dolichos Theophrasti, Ang.

Dolichus (five Phaeolus) Dod. Lon.

Phascoli genus peregrinum, quos Phascolos Turcicos vocant, Cæf.

II. Smilax hortensis minor.

Dolichus alter, an Phaeolus minor five Alexandrinus Tralliani, Dod.

an Phaeolus, Tur.

Sola magnitudine à priori differt.

III. Smilax siliqua sursum rigente: vel

Phaeolus parvus Italicus.

Phaeolus, Matth. albus, Lugd.

Phaeolus, Phaselus, Ang. Cord. in Dioscorid. & hist.

Phasilus, Cæf.

Flore est majore candido papiloni simili, foris in viridi colore pallecente: folijs nullam asperitatem habentibus: sunt majores & minores: sunt albi, subnigri, illi macula nigra, hi alba notati: est & minor albidus, cum orbita rubente aut nigricante.

*Phaeolus peregrinus.*

Non minor sanè varietas est in Phasiolis ex America, Africa atque alijs regionibus, pro-



cul ab orbe nostro remotis, quàm in his quæ in Europa nascuntur: Sunt enim majores, minores, mira colorum varietate inter se differeri. Illorum nonnulli, aut prorsus candidi, aut flavi, aut cinerici, aut fusci, aut atrii, aut rubri, aut amethystini, aut varijs coloribus non uno modo distincti: interdum albo & nigro, rubro & nigro, flavo & nigro: sic alius ex flavo & spadiceo simul mixti coloris, at circa hilum candidus: alius roseus, in quo rubri non nihil elucet, &c.

I. Phaseolus peregrinus hortensi affinis, semine lato albo, multis nigris venis striato.

Phaseolus 1. sive Africanus, Clus. pan.

Phaseoli peregrini primi genus alterum, Clus. hist.

Phaseoli magni lati albi, Lob. ico.

Phaseolus Africanus, Cam.

an Okindiger in Virginea, fabis Anglicanis similes, planiores tamen & diversorum colorum, nitidæ & maculosæ: in desc. Virgin.

Okindiger in Virginea, par. 1. Ind. Occid.

Ex Africa primum allatus.

Variat: ex nigro varius, prorsus niger, coloris regularum, strijs per longitudinem nigris.

II. Phaseolus peregrinus primo similis, fructu lato, albo striato.

Phaseolus peregrinus 9 Clus. hist.

III. Phaseolus peregrinus hortensi affinis, fructu tumidiore minore niveo.

Phaseolus peregrinus 2. sive Phaseolus de Guatimela, Clus. pan. (at icon habetur sub Phaseolo Purkircheriano 2.) & hist.

an Phaseoli parvi pallido albi ex America delati, Lob. ico.

IV. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis, ex nigro subvirescens.

Phaseolus Ægyptiacus 5. Clus. pan. desc. at figura habetur sub 3.

Phaseolus peregrinus 5. Clus. hist.

Phaseolus Ægyptiacus, Tab. Ger. desc.

an Dolichus, Bellonio.

V. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis colore rubescente.

Phaseolus peregrinus 3. qui cum sequenti Lobi Indici nomine ex Hispania missus, Clus. pan. quoad descriptionem: & hist.

VI. Phaseolus peregrinus minore fructu, albo nigra macula insignito.

Phaseolus peregrinus 4. Alubias de Indias, Clus. pan. quoad descriptionem: & hist.

Phaseolus albus, Lugd.

Phaseoli pumiliones, albi & nigri, Cam.

Variat colore: est alius niveus nigra macula notatus: alius in lateribus nigris maculis signatus.

VII. Phaseolus peregrinus angustifolius: an idem cum Smilace hortensi minore.

Phaseolus peregrinus, Dod. sextus, Clus. hist.

Fructu est vulgari minore & planiore, coloris subrubri: ex Hispania Frizoles Guateli nomine missus.

VIII. Phaseolus peregrinus angustifolius alter, fructu ex albo & nigro vario.

Phaseolus peregrinus septimus, Clus. hist.

Variat: nam in fructu striæ, nunc in longitudinem extenduntur: nunc maculæ nigræ majores vel minores, confuso ordine, aspersæ: vel exiguæ albæ maculæ in lobo, vel solum in parte media conspiciuntur.

IX. Phaseolus peregrinus folijs minoribus, fructu exalbido, nonnunquam variegato.

Phaseolus peregrinus octavus, Clus. hist.

Fructus, colore est ex albido: aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notatur: interdum totus penè nigricat.

X. Phaseolus peregrinus lobo & fructu nigro.

Phaseolus peregrinus 10. Clus. hist.

XI. Phaseolus peregrinus fructu variegato.

Phaseolus peregrinus 11. Clus. hist.

Fructus planus dilutè rubens, nigris venis per longitudinem excurrentibus: aliquando maculæ magnæ vel exiguæ confusè asperguntur: interdum altera solum parte nigricat, parvis rubris maculis variegatus.

XII. Phaseolus peregrinus fructu subrubente nigris strijs variegato alter.

Phaseolus peregrinus 12. Clus. hist.

Aliquando plurimæ striæ totum ferè atrum reddunt.

XIII. Phaseolus peregrinus exalbidus cui columbini ferè figura, fuliginosa macula insignitus.

Phaseolus tertius peregrinus, Clus. exot. l. 3. c. 7.

XIV. Phaseolus peregrinus niger macula subalba notatus.

Phaseolus quartus peregrinus, Clus. exot. l. c.

*Phaseolus Æthiopicus vel niger.*

I. Phaseolus Æthiopicus lobis nigris venis aspersis, fructu atro splendente.

Phaseo-

Phaseol. peregrinus 13. vel Æthiopicus, Cl. hist.

II. Phaseolus Æthiopicus lobis flavescentibus fructu nigro.

Phaseolus peregrinus 14. Clus. hist.

III. Phaseolus Æthiopicus lobo saturo purpureo, fructu atro.

Phaseolus peregrinus 15. Clus. hist.

*Phaseolus Guinenfis.*

I. Phaseolus Guinenfis fructu fusco spadiceo.

Phaseolus peregrinus 16. Clus. hist.

Sunt majores, sunt & minores.

II. Phaseolus Guinenfis lobo cortice nigro recto & in cuspidem longam & acuminatam desinente.

Phaseolus peregrinus Nigritarum, Clus. exot. lib. 2. cap. 11.

III. Phaseolus Guinenfis lobo ex fuscocineraceo fructu nigro.

Phaseolus Nigritarum 2. Clus. lib. cit.

IV. Phaseolus Guinenfis lobo ex fusco cineraceo, fructu spadiceo superiore majore.

Phaseolus Nigritarum 3. Clus. exot. lib. cit.

V. Phaseol. Guinenfis siliqua ulnæ lōgitudine.

Fabæ magnæ in siliquis, quarum aliæ ex arboribus pendent ad ulnæ unius longitudinem & palmi latitudinē, partim versicolores ex rubro & nigro, quales Turcicæ vocatæ, sed majores: partim albæ & rotundæ, quarum singulæ suis siliquis insunt, veluti Ciceres: par. 2. Ind. or. c. 4.

*Phaseolus Aegyptiacus sive Lablab.*

I. Phaseolus Aegyptiacus nigro semine.

Phaseoli genus Leplap sive Lablab, Clus. pan.

Phaseolus peregrinus Leblab, Clus. hist.

Phaseolus niger Lablab vocatus, Alpin.

Est & niger & spadiceus, hilo albo.

II. Phaseolus Aegyptiacus semine rufo.

Lablab alterum rufum Alpini, Clus. hist.

*Phaseolus Indicus.*

I. Phaseolus Indicus major bicolor.

Phaseolus peregrinus Indicus, Clus. pan. & hist.

Phaseolus 5. sive Aegyptiacus, Clus. pan. ico.

Phaseolus Aegyptiacus, Tab. Ger. ico.

Fructus est nuce pontica paulo minor, parte superiore niger, inferiore aureus.

II. Phaseolus Indicus minor: est rubens, variegatus, fuscus, maculatus.

III. Phaseolus Indicus minor alter.

Mates, Clus. in Garz. & pan.

Phaseolus Indicus alter, Mates, Clus. hist.

Fructus peregrinus 10. Clus. exot. lib. 2. cap. 30.

Fructu est purpureo, aut albis purpureisque maculis distincto.

IV. Phaseolus Indicus ruber.

Phaseoli rubri Indiani durissimi, Lob. ico.

Est ruber, ex phœniceo croceus, ex rubro spadiceus splendens.

V. Phaseolus Peruvianus ruber subrotundus.

Phaseoli peregrini variorum generum, Clus. exot. lib. 2. cap. 13.

Hujus differentiæ aliquot: alius major, coloris ex atro rubentis, qua parte lobo adhæserat longiore vestigio nigro præditus: alter minor, satis crassus, coloris rubri corallij æmuli: vel alter forma similis, coloris magis saturo & ad puniceum quodammodo vergente: tertius elegantissimus magis orbicularis, qui major & minor, color in utroque bifariam divisus, media ex parte corallij instar rubet, altera ater, lævis & splendens est: & hic Anacok dicitur.

VI. Phaseol. pereg. ex rubro & nigro distinctus. Anacok, Clus. exot. lib. 2. cap. 11. & lib. 3. cap. 13.

VII. Phaseolus peregrinus bifidus duplex: alter orbicularis cineracei coloris, tenui atra membrana: alter durus nigricans, tenui membrana alba rectus.

Phaseoli alij peregrini, Clus. exot. l. 3. c. 14. qui & tertium addit, lævem, spadiceum, durum & solidum, Capotillo del Aldana nomine missum.

VIII. Phaseolus Indicus ovatus: hic varius est colore: est niger, spadiceus umbilico albo eoq; majore vel brevior: sanguineus, hilo nigro.

IX. Phaseolus orbicularis niger Americanus. Parapar, Clus. exot. lib. 2. cap. 21.

*Phaseolus Americanus, vel Brasilianus.*

I. Phaseolus Brasilianus folijs molli lanugine obstitis, fructu magno.

Phaseolus Brasilianus Macouna dictus, Clus. ad Monard.

Phaseol. Brasilian. Lob. Cam. Ger. tertius, Tab.

Phaseolo Nigritarum similis ex Pernambuco Americæ, spadicei coloris Macouna appellatione insignitus, Clus. exot. lib. 2. cap. 6.

Et hic variat colore fructus: alius rufescit, alius dilutioris coloris, alius totus niger, alius punctatus.

Similes ex cinereo candicantes ex Africæ Mauritania adferuntur: quo solo à Brasiliano differunt, Clus. Lugd. (magnitudine.

II. Phaseolus Brasilian. alter fructu nigro pisi Phaseol. Brasilian. alter, Cl. ad Monard. Lob. Tab.

Phascolus alter Indicus, Lugd.

III. Phaseolus Brasiliensis vulgaris similis, sed major & latior.

Phaseoli genus è Brasilia, novi orbis provincia, Clus. ad Monardem.

Hic modo flavus, modo omnino niveus, modo dilutiore colore, modo ater, aut purpureus, aut albis purpureisque maculis distinctus.

IV. Phaseolus Brasiliensis spadicei coloris & circa hilum fusci candicantis.

Phaseolus Brasiliensis, Clus. exot. l. 3. c. 12.

V. Phaseolus Brasiliensis minor.

Phaseoli parvi ex America, Lob. Lugd.

Phaseolus Brasiliensis primus, Tab.

Hujus magna varietas, quare fructus duodecim genera, Tab. & Gerardus pingunt.

VI. Siliquulam angustam, vix uncialem, cui grana aliquot exigua, subviridia, cum hillo albo in medio, ut in Phaseolis, ex India cum quibusdam alijs, Reverendus D. Terentius cum sequenti inscriptione misit: Siliquula, ut & semen huic chartulæ involuta, est herbæ Anil, nec est species Glasti, sed legumen.

## P I S U M.

**P**isum, Græcis πῖσος & τὸ πῖσος vocatur, quod à πῖσος derivatum videtur, quod decorticare significat: plerique etiam λεῦσος dici putant, sed improprie: nam ex farina leguminum pulmentarium, λεῦσος dici à Græcis, Galenus in lib. de cibis boni & mali succi testatur. Pisum verò, à Pisa, loco in quo olim copiosissime nascebatur, nominatum dicunt. Hujus Dioscorides non meminit, nisi sortè cum Phaseolis comprehenderit: at Hippocrates, Theophrastus, Galenus, Aegineta. Nam Theoph. 8. hist. 3. leguminum alia solum habent rotundum, ut Faba: alia oblongius ut Pisum, & hoc caulem humi procumbentem habet: & 8. hist. 5. semina siliquis inclusa, non intersepta, sed quasi invicem contingentia, consistunt: & 3. caus. 27. vermes in ipso generantur, ob alimenti caligine, intemperiem, cum plus minusve alimenti præbetur, aut aer immodicè humidus siccusve est, vel etiam cum non tempestivè humescit. Plinius lib. 18. cap. 7. & 12. Pisi obiter meminit.

Genera duo sunt: est majus & minus: majoris semina resiccata angulosa sunt, inaequales angulos habentia, colore alias candido, alias sordido: Minus similiter duplex, aliud quod in hortis seritur, quod si pedamentis sustentetur, majus est, alias exiguum fructum eumque, serius reddit: & illud est quod in agris seritur: flores habet ut plurimum candidos, aliquando tamen ex purpura obscuros fructus colore ut plurimum luteo (unde ὠχρὸς Græcis, à luteo ochrea colore, quem ipsius fructus medulla interior refert, dicitur) subinde virenti.

I. Pisum majus quadratum.

Phaseoli primum genus, Trago.

Pisum prima species, Dod. gal.

Pisum majus, Dod. Gerard.

Pisum angulosum hortorum quadratum Plinij, Ad.

Pisum quadratum Plinij, Lob. ico. Tab.

Pisa Italica grandia, Cam.

Pisum magnum peregrinum, Eyst.

Fructus dum virent, rotundi sunt: exsiccati angulosi & cinerei fiunt: imò & candida & subflava, Lugd.

II. Pisum umbellatum: & Ger.

Pisum primum genus, Trag.

Pisum proliferum, Tab.

III. Pisum hortense majus.

Cicer arietinum & Pisum alterum genus, Trag. Dod. gal.

Pisum majus, Marth. Fuch. Ang. Lon. Cast.

Pisum minus, Dod.

Pisum vulgarius majus, Ad. Lob. ico.

Pisum ramulare, Lugd.

Piseolus vulgo, qui & Piseoli viridis meminit, Cæs.

Flore est purpureo, aliquando albo & vario, partim albo & partim ex purpura obscuro, Fructus est rotundo albo: est & rufo, aliquando rubro variegato.

Pisa quoque alba in Brasilia habentur, quæ Commanda - miri nuncupant: Ler. descript. Brasil. cap. 12.

IV. Pisa Virginiana.

Wikonzóvvr, nos Pisa appellamus, sapore & bonitate Anglicana superant: desc. Virgin.

V. Pisa Virginiana sylvestria.

Pisa syl. Anglicanis minora, esui apta: desc. Virg.

VI. Pisum arvense.

Pisum, Brunf. Dod. gal. Tur.

Pisum agreste, seu 3. genus, Trago.

Pisum 3. species & minor quæ & Ervilia, Dod. gal.

Pisum minus, Matth. Lon. Dod. Cast.

Pisum minus ex luteo virens, Ad. Lob.

Pisum in arvis humi serpens, Lugd.

Ervilia sive Ochrus, Eid.

Pisa vulgaris, Cam.

Pisum minus 1. & 2. Tab.

Florē est candido, vel diluti rosei coloris: fructu rotundo, albo, viridi, ex luteo virente, cinereo, cæruleo: nigra habet Gesnerus, quæ sapore, odore à communibus nil differunt, quæ Pifa nigra Tabern. nominat.

VII. Pifa sine cortice durior.

Pifa leprolaba, quæ simul cum folliculis comeduntur, Camer.

VIII. Pisum exoticum ochræ colore.

Pisum ochræ colore, Clus. exot. l. 3. c. 15.

IX. Pisum sylvestre perenne.

Pisum sylvestre, Adv. Cl. pan. & hist. Thal. Tab. (qui majus & minus pingit,) Ger.

Pisum sylvestre Pannonicum, Cam.

Phaseolus sylvestris, Lugd.

X. Pisum vesicarium fructu nigro, alba macula notato.

Vesicaria nigra sive peregrina, Trag. Dod. gal.

Vesicaria sive Halicacabum repens, Matth.

Halicacabum peregrinum, Fuch. Dod. Ges. hor.

Lugd. qui & Fuchij & Matthioli figuram exhibet, Tab. (& Cardispermon) Cam. Ger.

Doryenium & granum cordis, Cord. in Diosc. & histor.

Solanum peregrinum, Lac.

Caput monachi, Ges. hor. & collect.

Pisum cordatum, Ad. & cor Indum, Lob. Eyf.

Faba inversa recentiorum, Cæs.

Vesicaria altera, Cast.

*Pisum Indicum.*

I. Pisum Indicum majus.

Variat fructus colore nigro, subfusco, variegato, umbilico eminente.

II. Pisum Indicum minus coccineum.

Pifa rubra ex novo orbe, Ges. hor.

Pisum coccineum Americum, Lob.

Pisum Americanum, Lugd.

Phaseolus ruber Abrus vocatus, Alpin.

Phaseolus ex Ieme, Hon. Belli epist. 5. ad Clus.

Phaseolus Indicus, vulgò falsò Pconia Indica:

non mine Ginge & Abrus mittitur, Cam.

an Sandali rubri semina, Cæs.

Vicia Africana, Clus. exot. l. 4. c. 15.

Fabarum genus quod Ægyptijs Abrus, part. 2.

Ind. Or. cap. 4.

Et hic major coccineus compressus: & minor

coccineus nigra macula notatus, reperitur.

III. Pisum virulentum Chinesense.

Fabarum genus quod Abrus Latinis, Conduri

Malays, Saga Javanis, quibus pro solis ponderibus utuntur, Linscot. par. 4. Ind. Or. cap. 8. &

par. 3. cap. 29.

Sic Fabis rubris & nigris pro ponderibus in

Guinea utuntur: par. 2. Ind. Or. c. 18.

## OCHRUS SIVE ERVILIA.

**Q**ue Theophrasto 4. cons. plant. 2. 228. à luteo Ochra colore quem medulla referat nominatur, & Gaza Cicera reddit, Plinio l. 18. c. 7. & alijs Latinis Ervilia dicitur.

Duplex est, Sativa, quæ Pisum est minus, & Sylvestris, de qua nunc.

Ochrus folio integro capreolos emittente.

Aracus, Matth. (cui & Aracus niger) Cast. (ad- dita Aohace figura) Cam.

Ervilia, Ang. sylvestris, Dod. ut:

Ochrus tyl. sive Ervilia, Ad. Lob.

Cicer ervinum quorundam, Lugd.

Isopyron, Cæs. alp.

Papulles Creticæ nomine. semen ab Honorio

Belli nissum: facillè germinat. Semina colore

sunt subluteo alij pullo, etiam atro observarunt.

## LATHYRUS SIVE CICERCULA.

**L**egumen quod Græci Λάβρος appellant, à Columella & Palladio Cicercula dicitur, de quo Theophr. 8. hist. Plutarch. in probl. Rom. scribit Pythagoricos averfatos esse fabas: ἡ τὴν λαβρὴν, ἡ τὴν ἐγγυλιν, ἡς παρὰ τὴν ἡμετέραν τὴν ἐπὶ τῶν λαβρῶν, ad etymon alludens. Verum λαβρὴς herba ab hac diversa est, de qua inter Turhymalos.

Duplex est: nam vel seritur vel sponte provenit: Et in sylvestri differentia magna est, in foliorum latitudine & angustia: florum colore rubro, purpurascente, albo, flavescente: siliquarum longitudine, brevitate, bursitie, & lavitate.

I. Lathyrus sativus flore fructuq; albo.

Pisum Græcorum sativum, Trago.

Ervum album Sativum, Fuch.

Lathyrus, Cicercula, Dod. gal.

Phaseolus minor, aliquibus Ervum angulosum, Cord. in Diosc.

Ervum, Lacun.

Cicercula, Ang. Lon. Cæs. Castor.

Aracus

Aracus alter sive *Lathyrus minor*, Dod.  
*Lathyrus angustiore gramineo folio*, Ad. Lob.  
*Lathyrus leguminosa angustifolia*, Tab.  
*Lathyrus sativus angustifolius*, Lugd.  
*Lathyrus alter flore albo*, Camer.

II. *Lathyrus sativus flore purpureo*.

Aracus sive *Cicera*, Dodon.

*Lathyrus flore purpureo*, Cam.

Flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes: grana angulosa, alia obsoleta, nigroque proxima.

III. *Lathyrus sylvestris major*.

*Pisum Græcorum* sylv. Trag.

*Ervum sylvestre*, Fuch.

*Cicercula*, Turner.

*Lathyrus sylvestris*, Dod. ut: Clus. hist. Lugd. ico.

*Mochi* in *Hetruria*, Cæs.

*Lathyrus sylvestris*, Eyst.

Variat flore albo: nonnihil ex luteo pallenscente: est & rubente.

IV. *Lathyrus major sylvestris alter*.

V. *Lathyrus sylvestris minor*.

*Catanance*, Dod. gal. Ges. hort. Lugd.

*Ervum sylvestre*, Dod. herbariorum, Ad. Lob.

VI. *Lathyrus latifolius*.

*Clymenum*, Marth. Cast. descr. Clus. pan.

*Ervum sativum*, Cord.

*Lathyrus sylvestris latifolius*, Cam.

*Lathyrus Narbonensis latiore folio*, Ad. Lobel.

Eystett.

*Lathyrus sylv. major*, sive *purpureus*, Thal.

*Ervilium*, Cæs.

*Cicercula sylvestris*, Taber.

VII. *Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta*.

Flore est cæruleo penè violaceo.

VIII. *Lathyrus angustifol. semine maculoso*.  
 Aracus *Hispanicus* sive *Lathyrus Ægyptiacus*, Camer.

*Cicercula Ægyptiaca*, Clus. hist.

an Aracus, Ad. Lob. & Cicera, Lugd.

IX. *Lathyrus angustissimo folio Americanus variegatus*.

Orbi Americani nomine in horto meo crevit.

*Lathyrus peregrinus* è cæruleo purpurascenscente flore: & suaviter rubescens, Eyst.

X. *Lathyrus angustifolius humilior*.

*Ervum Monspelienisum*.

XI. *Lathyrus sylvestris major angustissimo folio*: in *Prodromo* descriptus.

XII. *Lathyrus peregrinus folijs Viciæ: flore subcæruleo, pallidè purpurascenscente*: in horto meo crevit.

XIII. *Lathyrus sylvest. luteus folijs Viciæ*.

an Aracus flore luteo, Adver.

*Legumen terræ glandibus simile*, Dod.

*Glandibus terrestribus congener flore luteo*, Clus. pan.

*Eathyrus sylvestris floribus luteis*, Thal.

*Vicia*, Taber.

XIV. *Lathyrus arvensis repens tuberosus*.

*Apios*, Trag. Fuch. Lugd.

*Pseudoapios*, Matthiol.

*Chamæbalanus*, Dod. gal. Taber.

*Ornithogalum purpureum*, Cord. in Diosc.

*Astragalus*, Tur. Penæ, Lugd.

*Panis porcinus*, Lonic.

*Astragalus arvensis*, Thal.

*Terræ glandes*, Dod. Ad. Lob. Gerard.

*Glandes terrestres*, Clus. pan. & hist.

*Arachidna*, Theophrasti, Colum.

## VICIA ET APHACA.

**G**alenus 2. aliment. scribit ab Asianis βμιορ dici legamen, eoq; solo nomine id vocari: Atticis verò σάγκρον aut νόκρον. Latinis *Vicia* nominatur à vinciendo, ut Varroni placet, quod item capreolas habeat ut vitis, quibus sursum versus serpit ad scapum Lupini, aliūmve calamum, ad quem ut adhæreat, eum vincere solet. Et hac duplex est. *Sativa* & *sylvestris*.

*Aphacam* legumen Dioscorides l. 2. c. 178. ἀφάκην nominat, quæ in arvis nascatur, lente altior, siliquis lentium majoribus, in quibus semina terna, quaternave, nigra lente minora. Theophrasto *Aphaca* duplex, altera olus est, de qua inter *Intubacea*: altera legumen, quod cum *Lente* & *Piso* in leguminum genere 8. hist. 5. posuit, & Plinius l. 27. c. 5. Theophrastum secutus est: Galenus cum *Vicia* conjunxit.

I. *Vicia sativa vulgaris semine nigro*.

*Ervum*, Brunfels.

*Orobis sativus* & *Vicia major* & I. Trag.

*Vicia*, Anguil. Lonic.

*Vicia*, Græcorum *Aphace*, Cord. in Diosc.

Semina alia nigricant, alia cinereum colorem obtinent.

II. *Vicia sativa alba*.

*Ervum candidum*, vel *Faba veterum*, Trago.

*Vicia alba*, Anguil.

Vulgari

Vulgari pifo minus compressum & coloris pallidi.

III. Vicia maxima dumetorum.  
Vicia sylvestris altera, vel 5. Aphace Dioscorid.  
Osmunda Latinorum, Trag.  
Cracca major, Taber.

IV. Vicia sepium folio rotundiore acuto.  
Orobis sylvestr. sive Vicia major syl. & 2. Trag.  
Aphaca, Matth. Ang. Ges. hort. Cast.  
Aphace, Fuch.  
Vicia, Dod. ut: Ad. Lob. Clus. hist. Cæs.  
Vicia sylvestris, Lonic.

Semen nigrum aut maculatum, crassitie, rotunditate & amaritudine differt.

V. Vicia vulgaris acutiore folio, semine parvo nigro.

Vicia, Matthioli, Lac. Cast.  
Aphaca vera, Lugd.

VI. Vicia multiflora.

Galega altera, vel sylvestris, aut German. Dod.

Galega sylvestris Dodonæi, Thal.

Aracus, Tabet.

VII. Vicia Onobrychidis flore in Prodro-mo descripta.

VIII. Vicia sylvestris spicata.  
Vicia sylvestris spicato flore, Clus. pan.  
Vicia sylvestris secunda, Clus. hist.

IX. Vicia sylvestris hirsuta incana.  
Vicia sylvestris flore albo, Clus. pan. & hist.

X. Vicia sylvestris lutea siliqua hirsuta non-dum descripta Monspelij collecta, & Norim-berga à Doct. Doldio Ciceris aut Pisi nomine missa.

XI. Vicia lutea folijs convolvuli minoris.  
Aphace Dioscoridis, Gal. Plinij, non Theophr.  
Dod. ut:

Picine Theophrasti, Ang. Cam.  
Aphaca, Ad. Lob. Cæs. Camer.  
Orobanche leguminum, Lugd.  
Elatine tertia, Taber.

## ARACHUS SIVE CRACCA.

**F**ruentorum vitium quoque est, quod Græci Ἀράχων Theoph. 8. hist. 10. (rem scabram & duram dicit, quæ in lente nascatur) nominant. Ruellius Craccam appellari refert. Differt ab Aphaca & Vicia potissimum se-mine: nam Cracca semina exquisitè rotunda, nigra: & ut Galenus inquit, 1. alim. facult. c. xxxvj. Erro mi-nora. Aphaces verò & Vicia semina, non rotunda, sed aliquanto latiora, veluti Lentium, teste Galeno 1. alim. facult. c. xxxvj.

I. Vicia semine rotundo nigro.

Vicia minor vel 3. Trag.

Arachus, Dod. gal. Ges. hort.

Craccæ primum genus, Dodon.

Aracus, Araca & Cracca major, Ad. Lob.

Arachi primum genus Dodonæi, Thal.

Flores parvi & purpurei.

II. Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis.

Vicia minima vel quarta, Trago.

Arachus altera, Dod. gal. Thal.

Aracus sive Cracca minima, Ad. Lob.

Craccæ alterum genus, Arachis potius, quàm Arachus, Dodon.

Arachus, Lugdun.

Cracca minor, Taber.

Flosculi in parvis spicis candiduli, semina incana ac subalbida.

III. Vicia segetum singularibus siliquis glabris.

Flosculi parvi candiduli, singuli singulis pe-dicillis insidentes.

IV. Viciola flore luteo semine nigro.

Aracus, Cæs. alp.

## ARACHYDNA.

**Q**uadam scribit Theophrastus 1. hist. 11. ex radicibus plures differentias præter prædictas sortiuntur (οἷο τὸ ἀραχιδνὸν ἢ τὸ ὅμοιον τῷ ἀράχων) h. e. cen Arachidna radix, ejusq; quod simile est Araco: ambæ namq; fructum non minorem superno asserunt. & c. neutrum aut folium, aut folio simile quicquam gignit, utrumq; po-tius velut ἀράχων ἐστὶν, h. e. infra supraq; terram fructum edit. Plin. 1. 21. c. 15. Aracidna & Arachos (potius Arachoides) & c. Vox hæc Ἀραχιδνὰ composita videtur: ἀράχων enim Cicercula species est quam hæc solijs & fructu refert: ὄστρον verò tuber significat, cujusmodi similitudinem quandam radices habent.

I. Viciæ similis supra infraque terram fru-ctum edens.

Arachidna Cretica, Belli: quo nomine totam

plantam transmisit.

Arachidna Cretica an potius Aracoydes Theo-phraستي, Ponæ.

Araco *quasi* Theophrasti an? Clus. ex. l. 4. c. 16.

Variat semen in siliquis ad radicem, in alijs nigerrimum, in alijs Orobo simile, in alijs variegatum.

II. Junfa, planta quæ in Angra instar frumenti seritur, ad cujus radices grana rotunda pisi magnitudine, pistaciorum sapore: Linsc. part. 8. Ind. Orient. c. 6.

## L E N S.

**L**ens & Lenticula, *φάνος* Dioscor. l. 2. c. 129. Theoph. & *φάνος* dicitur, etsi aliquibus *φάνος* lentem crudam: *φάνος* vero & lentem, & lentem coltam, & ipsum ex lente pulmentum significet. Dicitur autem Etymologico quasi *φάνος*, ut sit *ἡ τὰ φάνουσι*: oculorum enim aciem hebetare Dioscorides asserit. Alijs *φάνος* ab utroque qui fuit *ἀνός*, metathesi & mutatione unius elementi. Latine Lens quasi lenis dicta: nam ut Plinius l. 18. c. 12. ea rescentibus, æquanimiter fieri apud auctores se invenisse scribit.

Genera: duplex est, arvensis & palustris: hic de arvensi tantum, cujus plura genera Theoph. l. 6. Plinio l. c. duo sunt lentis genera in Aegypto, alterum rotundius nigriusq., alterum sua figura, unde vario usu translatum sit in lenticulas nomen. Recentioribus colore & magnitudine differunt: sunt enim albæ majores & gratiores: ex luteo pallidæ, cinereæ, ruffæ, minores & deteriores: sic flores albis, candidi: cinereis, purpurascens.

### I. Lens vulgaris.

Lens, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. Lon. Ad. Taber.

Lens vulgaris five agrestis, & Lenticulæ primum genus, Trago.

Lens minor, Lob. Dod. Lugd. Cam. epit. Ger.

Flos in candido purpurascit: grana alia sub-ruffa, alia ex luteo pallida, nonnulla ex cano albôve fusca & nigricantia.

### II. Lens major.

Lens sativus & Lenticulæ alterum genus, Trag.

Lens, Matth. Ang. Lob. Cæs. Cast.

Lens major, Gef. hor. Tab. Ger.

Lens Italica, Camer.

Hoc candidius & majus priore: Matthiolo tamen album minus est; & quod cinereo colore, orbe paulo majore est.

III. Frisoles & Palaros peculiare herbarum genus nuncupant, quas eo ferè loco habent, quod nos Pifa, Lentis & Fabas: Joseph. Acofta l. 4. c. 19.



## S E C T I O Q U A R T A.

DE LEGUMINIBUS CAPREOLIS CARENTIBUS.

OROBUS SIVE ERVUM; CICER; LUPINUS;

Fœnumgræcum.

OROBUS SIVE ERVUM.

**O**robos & Græcis, Ervum Latini: Græcorum vocem quidam deducunt *πράσιον τὸ ἐγγύς τῶν βοῶν*, quod boves eo rescantur & saginentur. Dioscoridi l. 2. c. 131. frutex est exiguus, folio angusto, tenuis, in siliquis parva gerens semina: & ut Theophrastus 9. hist. 22. fructu rotundo modo piperis. Plinius l. 18. c. 15. Ervum vocat & cum Vicia conjunxit.

Genera duo, sativum & sylvestre: illud duum generum, candidum & rufum: Galenus tertium addit, nempe pallidum, inter priora medium: est & quartum Creticum, quod semine minore est.

### I. Orobos siliquis articulatis semine majore.

Orobos five Ervum, Matth. Gef. hor. Ang. Cord. in Dioscor. Lugd.

Cicer sativum, Dod. gal.

Ervum, Gef. hor. Guil. (five Mochus) Cast. Tab. verum, Camer.

Mochus five Cicer sativum, Dodon.

Orobos receptus herbariorum, Advers. Lobel. Gerard.

Flores subpurpurascens, aliquando candidantes.

### II. Orobos semine minore.

Orobos Creticus, Matth. Lugd.

### III. Orobos semine obtuso triangulo.

Cicer orobæum Theophrasti, Ad. Lob. Lugd.

Semen est Orobo duplo majore, albido, pal-lente aut subfulvo, & ab Orobo nigredine potissimum distans.

CICER.



## C I C E R.

**C**iceris, qui ἐπίκυβ & Græcis, genera duo Dioscoridi lib.2. cap.126. sativum & sylvestre : sativi genus alterum κίρι (arietinum reddunt, quia κίρις arietem significat) appellatur Theophrasto 8. hist. 5. Cicer & magnitudine & sapore, & colore, & forma plerasque differentias ostendit, οἷον κίρις ὀφθαλμοῖς, ἢ ἐν ἀνὰ μέσους ἐπὶ πᾶσι δὲ τὰ λουκῶ γλουότερα : h. e. veluti Arietinum, Orobaum sive ervinum, & inter hæc medium : præter hæc omnia sunt alba dulcissima. Galeno 6. simpl. duplex, Arietinum & Orobaum. Plinio lib.18. cap.12. est arietinum, quod album est & nigrum (in arietino candidum esse, Dalechampius in Plinium negat:) est columbinum, quod & venerum dicitur, & est candidum : est & dulcissimum quod Ervo similitimum est. At Matthiolo, est Columbinum, quod candidum : est Venerum, quod rubrum : est Arietinum, quod nigrum & ceteris majus est. Anguillara tres sunt species, albi, rufi, arietini : albi duplices sunt arietini & ervini : arietini capiti arietino similes, ervini leves ervi femini similes : ex Galeno 9. de compos. medic. secundum loca. Rubei similiter duplices, arietini & ervini. Nigri simplices sunt solo colore ab alijs differentes.

## I. Cicer sativum.

Cicer, Brunf. Matth. (cui & domesticum) Tur. Cord. in Diosc. Lac. Cæs. Cast. Tab.  
Ciccris altera species, Trago.  
Cicer nigrum, Fuch. seu arietinum, Cord. hist.  
Cicer arietinum, Dod. ut:  
Cicer rubrum & album, Lon.  
Cicer sativum, Lugd. Ger. sive arietinum, Gefn. hort. Adv. Lob.

Flores candidi, aut ex purpura rubescentes : semina alba, vel ex candido pallescentia : purpurea vel rubra, rufæve : nigra vel ex saturo rubente purpura nigra.

## II. Cicer exoticum.

Cicer Nigritarum, Clus. exot. l. 3. c. 16.

Semen vel album, vel nigrum, vel rubens, vel ex albo & rubro variè distinctum.

## Cicer sylvestre.

I. Cicer sylvestre, folijs oblongis hispidis majus.

Cicer sylvestre, Matth. Ang. Dod. gal. Lugdun. Cast. Cam. Ger.

Cicer sylv. herbariorum, Adv. Lob.

Cicer sylv. primum, Dod. Lugd. Tab.

Cicer sylv. majus, Thal. cui & medium habet.

Semen parvum flavescens : at in hist. Lugd. parvum nigrum compressum.

## II. Cicer folijs oblongis hispidis minus.

Cicer sylv. minus, Thal.

## III. Ciceri sylv. minoris affinis si non idem.

Glaux, Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab. Dioscoridis, Gerard.

Glaux Hispanica, Clus. hist.

Anthyllis altera lutei similis, Dod.

Illius flores lutei, hujus purpurascens vel cærulei.

## IV. Cicer montanum lanuginosum erectum.

V. Cicer montanum ἀνακλον : utrumque in Prodromo describitur.

## VI. Cicer sylv. latifolium triphyllon.

Cicer sylvestre, Gefn. hort. Pcnæ, Lugd. latifolium, Ger.

Cicer sylv. alterum, Dod. Tab. Lugd.

Cicer sylv. verius, Adv. Lob.

Et Ciceris sylvestris tertij ramosi meminit Dodonæus, quod cum priore si non idem, certè ab eo parùm differt.

## L U P I N U S.

**L**upinus ἐίκα & Dioscoridi lib.2. cap.132. Theophrasto pluribus in locis & Græcis ceteris. Lupinorum appellatio non aliunde ducta videtur, quàm quod sicut lupus terram appetit, & in same terra vescitur : ita Lupinus tellurem, ut Plinius lib.18. cap.14. ait, adeo amat, ut quàmvis furectoso solo conjectum, inter folia vepresq., ad terram tamen radice perveniat. Vel ita dictus videri potest, velut lupus expositus & relictus, ex eo quod (ut idem Plinius) impunè jaceat, vel derelictus, si non protinus imbres secuti obruant, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutus.

Genera duo Dioscoridi, Galeno & Plinio : sativus & sylvestris.

## I. Lupinus sativus flore albo.

Lupinus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Lac. Cord. in Diosc. Lon. Cæs. Tab. communis, Gefn. hort.

Lupinus albus, Fuch. Turn. Camer. albo flore,

Clus. histor. vulgaris, Eyft.

Lupinus sativus, Ang. Dod. ut : Cord. hist. Adv. Lob. (cui & Faba ficulnea Germanis à folio)

Cast. Lugd. Ger.

II. *Lupinus sylv. flore cæruleo.*  
*Lupinus sylv. Matth. Ang. Dod. ut: Lugd.*  
*Lupinus sylv. segetum flore purpureo, Ad. Lob.*  
*Lupinum flore cæruleo, Clus. hist. Ger. sylvestris flore cæruleo, Gesn. hort. Cam.*  
*Lupinus sylv. flosculis è cæruleo purpureis, Cam. epit.*  
*Lupinus minor, Tab.*  
*Lupinus sylv. angustifolius flore cæruleo, Eyst*  
 Flos ex purpura cæruleus, aut subrubens, vel roseo colore rufescens.  
 III. *Lupinus sylvestris flore luteo.*  
*Lupinus sylv. luteus. Dod. gal. odoratus, Eyst.*  
*Lupinus hispanicus flore luteo, Gesn. hort.*  
*Lupinus flore luteo, Lob. Cam. in Matth. Ger.*  
*Lupinus luteus, Tab. Cam.*  
*Lupinus flavo flore, Clus. hist.*  
 IV. *Lupinus peregrinus major vel villosus*

*cæruleus major, in Prodromo describitur.*  
*Lupini Indici, etiam Cretici nomine accepimus.*  
*an Lupin. albus maximus, cujus flos antequam aperiatur subcæruleus, intus verò albus, Cam.*  
*an Lupini genus quarrum, Clus. hist.*  
*Lupinus sativus major, & Lupinus Æthiopicus quorundam, Eyst.*  
 Huc referatur  
*Lupinus exoticus flore albo, colore floris tantum ab illo varians, Eyst.*  
 V. *Lupinus peregrinus pentaphyllos.*  
*Lupinus Arabicus sive pentaphyllon peregrinum, Ponæ ital.*  
 VI. *Lupinus peregrinus minor sive angustissimo folio.*  
*Lupini Africani nomine accepimus, & sub Lupino minimo in Prodromo descripsi.*

### F O E N U M G R Æ C U M.

**F**oenumgræcum, τήλη Dioſcoridi l. 2. c. 124. Theoph. 3. hist. 17. cui & βήνης 8. hist. 8. νεαίτης & αἰώνιος Græcis, quarum appellationum major pars à siliquarum similitudine desumpta est, qua corniculis similes sunt: ut ceraites, à cornu: agoceros, à caprini: bouceros à bubuli cornu similitudine: quare Columella l. 2. c. 11. simpliciter siliquæm, Varro Siliculam, Plinius l. 18. c. 16. Siliciam. & l. 25. c. ult. Fœnumgræcum vocavit.  
 Genera: unius veteres meminere, recentiores sativum & sylvestre faciunt.

I. *Fœnumgræcum sativum.*  
*Fœnumgræcum, Trag. Matth. Lac. Turn. Lon.*  
*Adv. Lob. Dod. Cast. Cæs. Cam. Alpin.*  
*Fœnumgræcum sativum, Ang. Lugd.*  
*Fœnogræcum, Dod. gal. Fuch. Cord. in Dioſc.*  
*& histor.*  
*Siliqua vel Fœnogræcum ex quo farinam, item vinum multis sapore conficiunt: par. 7. Ind. Oc.*  
*cap. 8. & 11.*

II. *Fœnumgræcum sylvestre.*  
*an Fœnumgræcum alterum, quod spontè nascitur, Ang.*  
*Fœnumgræcum sylv. Dalechampi, Lugd.*  
 III. *Fœnumgræcum sylv. alterum polyceration.*  
*Fœnumgræcum sylvestre, Lob. Cam.*  
*Fœnumgræcum sylv. alterum, Dod. Lugd.*  
*Hedysarum minimum, Lugd.*



## SECTIO QUINTA.

HEDYSARUM SIVE SECURIDACA; FERRUM EQUINUM; POLYGALA; ORNITHOPODIUM; ET TRIBULUS TERRESTRIS.

### HEDYSARUM SIVE SECURIDACA.

**H**ἡδύσαρον & πελένη. ov Græci vocant, quam Latini Securidacam (vel ut Turnebus legendum censet Securidatam à seminis figura, πέλεις enim securim significat: Sic enim Dioſcorides l. 3. c. 146 Hedysarum, quod unguentarij Pelecium, semen rufum in siliquis corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim amulatur, unde nomen accepit. Apud Theophrastum 8. hist. 10. Gaza Securinam (securi similem) reddidit: & Plinius l. 18. c. 17. Securidaca quam Græci a similitudine Pelecium vocant.

Genera: Dioſcorides unius meminit: at recentioribus aliquot differentia sunt.

I. *Securidaca lutea major.*  
*Securidaca major, Matth. Castor.*

*Securidaca, Ang. Cæs. vera; Clus. hist.*  
*Securidaca secunda, Dod. gal.*

*Peleci-*

Pelecinus, Gesn. hort.

Hedysarum, Gesn. hort. Lac. Lon. sive Securidaca major, Adv. Lob.

Hedysarum majus, Lugd. (qui sub 1. & 3. Dodonæi quoque exhibet) Cam.

Hedysarum 1. Dod. legitimum, Clus. pan.

Floribus est luteis: Matthiolo flores dilute purpurascunt.

II. Securidaca lutea minor corniculis recurvis.

Securidaca minor, Matth. Adv. Lob. Cast. Cam.

Hedysarum alterum, Dod. Lugd.

Hedysarum minus, Lugd.

Securidacæ similis quædam, Cæs.

Astragalus Monspeliacus, Clus. hisp. & hist. ico.

III. Securidaca siliquis planis utrinque dentatis.

Securidaca peregrina, Clus. hist.

Scolopendria leguminosa, Cortuso.

IV. Securidaca dumetorum major flore

vario siliquis articulatis.

Melilotus quinta, Trag.

Dogelwiesen/ Lonicer.

Ornithopodium 2. vel quoddam majus, Dod.

Securidaca altera, vel alterius prima species, Clus. pan. & hist.

Hedysarum purpureum, Tab.

Loto enneaphyllo non dissimilis, Lugd.

Hedysarum scorpiuron, Cam.

Securidacæ alterum genus, Cæs.

Hedysarum majus, Ger.

Variat flore: aliquando floris folia superiora dilute rubent, laterum alæ nivæ sunt, rostrum purpureum: aliquando totus candidus est, vel exalbescit, vel intensius purpurascit.

V. Securidaca dumetorum minor pallide cærulea.

Securidacæ secundæ altera species, Clus. pan. & histor.

Securidaca Dioscoridis Penæi, Eidem.

## FERRUM EQUINUM.

**A** Siliquarum figura, planta hæc Solea vel Ferrum equinum nominatur: aliquibus verò ab effectu, quòd equi qui diu plantam hanc virentem calcaverint, ferreis solcis exuantur: Sunt qui ad Securidacam, alij ad Lunariam, alij ad Medicam referant.

I. Ferrum equinum siliqua singulari.

Ferrum equinum, Matth. (cui & Securidaca montana) Gesn. hort. Lob. Ger.

Medicæ species, Gesn. hort.

Sferro cavallo, Adv. Cæs. Cam.

Lunaria minor, Cast.

Solea equinea, Lugd. cum duplici figura.

Hedysarum sive ferrum equinum, Tab.

Ferrum equinum vulgare ἀπλοτέρατον, Col.

II. Ferrum equinum siliqua multiplici.

Ferrum equinum alterum πολυτέρατον, Col.

III. Ferrum equinum Germanicum, siliquis in summitate.

Sferra cavallo sylv. Germanicum, Cam.

Hedysarum minus, Tab.

Hedysarum glyzyrhizata, Ger.

Ferrum equinum capitatum sive comosum, Col.

IV. Ferrum equinum Gallicum, siliquis in summitate.

Lotus enneaphyllos, Lugd.

Hoc priore per omnia minus est, siliquis est paucioribus & minoribus.

V. Ferro equino Gallico affinis.

Astragalo persimilis palmaria pusilla planta, Adv. Lob.

Floribus est luteis, aliquando albis.

## P O L Y G A L A.

**P**ολύγαλον Dioscorides lib. 4. cap. 142. frutex brevis, palmum altus, folijs lenticula, gustu subacerbus: porus lactis abundantiam facere creditur. Et Plinio lib. 27. cap. 12. Polygala, &c.

I. Polygala major Mafsiliotica.

Polygala, Matth. Lugd. Tab.

Astragaloides herbariorum, Lob.

Astragalus fortè Matthioli, vel jam demum

Polygala ejusdem, Eidem.

Polygala Valentina 2. Clus. hisp. & histor. qui

& 3. addit.

II. Polygala altera.

Polygala Valentina prima, Clus. hisp. & hist.

Lugd. Tabern.

Coronilla sive Colutea minima, Lob.

Colutea sive Polygala Valentina, Ger.

an Polygala, Ang.

## O R N I T H O P O D I U M.

**O**rnithopodium id est avis pes à similitudine, quam siliqua adunca cum pedibus parva avicula habent, dicitur: quod veteribus incognitum, nisi forte ad Polygonum Dioscoridis l. 4. c. 142. referatur.

I. Ornithopodium majus.  
Ornithopodium, Dod. ut: Gesn. hort. Adv. Lob.  
Lugd. minus, Cam.  
Polygala, Gesn. hort.

II. Ornithopodium minus.  
Ornithopodium perpusillum, Adv. Lob. Lugd.

III. Ornithopodium radice tuberculis  
nodosa.

Ornithopodium tuberosum Dalechampi, Lug.  
IV. Ornithopodio affinis hirsuta Scorpioides.  
Scorpioides leguminosa, Adv. Lob. Lugd.

V. Ornithopodio affinis hirsuta, fructu  
stellato.  
Arturo, Cortuso.  
Stella leguminosa, Lob. Lugd. Cast. Tab.  
Vicia fefamea Apula, Col.

## T R I B U L U S.

**T**ribulus Latinis dicitur, quod siliqua plantaq; muricata sit: & ut Theophrastus 6. hist. 5.  
Tribulo peculiare est, quod integumentum fructus aculeatum gignit.

Genera duo sunt Dioscoridi l. 4. c. 15. alterum terrestre, alterum aquis familiare: terrestres Theophrasto  
genera duo, unum folium ciceris habet, nullus spinis aculeatum, alterum folijs est spinosis. At Plinius l. 22. c. 10.  
Tribuli unum genus in hortis, alterum in fluminibus: & l. 21. c. 16. Tribulo uni cicerula folia, alteri aculeata.

Tribulus terrestris Ciceris folio fructu  
aculeato.  
Tribulus terrestris, Matth. Cord. in Dioscorid. Tribulus Theophrasti, Ang.



## S E C T I O S E X T A.

ONOBRYCHIS; ASTRAGALUS; OROBUS SYLVATICUS; GALEGA; GLYZYRRHIZA.

## O N O B R Y C H I S.

**O**nobrychis ab asiniruditu nomen obtinuit: Latinis similiter Onobrychis dicitur. Dioscorides l. 3. c. 152. &  
Plinius l. 24. c. 16. folia lentis paulo longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem parvam  
tribuunt, Ad Onobrychidis classem subsequentes plantas, tanquam illi quodammodo affines, authores referant.

I. Onobrychis folijs Viciæ fructu echinato  
major.

Viciæ sylv. alterius secunda species, Dod. gal.  
Onobrychis, Lac. Dod. Clus. pan. & hist. Thal.  
Tab. Ger.

Glaux vel Onobrychis, Gesn. hort.  
Polygalon Rhæticum, Gesn. hort. ap.  
Caput gallinaceum Belgarum, Adv. Lob.  
Lupinus sylv. rusticis, Cæs.  
Polygala multorum, Lugd.  
Onobrychis Dodonæi flore rubro, Eyft.

Flores communiter dilute rubent, aliquando  
elegantè rubent: reperiuntur & albi coloris.

II. Onobrychis fructu echinato minor: sub  
Capite gallinaceo minore in Prodomo descri-  
bitur.

III. Onobrych. femine clypeato aspero major.

Onobrychis altera, Dod.  
Hedysarum alterum clypeatum, Lob. Lugd.

Securidaca clypeata, Cam.  
Hedysarum clypeatum flore suaviter rubente,  
Eyftett.

IV. Onobrychis femine clypeato aspero  
minor: in Prodomo sub 1. describitur.

V. Onobrychis femine clypeato lævi: sub  
2. in Prodomo exhibetur.

VI. Onobrychis incana folijs longioribus:  
vel 3. in Prodomo.

VII. Onobrychis incana folijs rotundis.  
Onobrychis quorundam, Clus. hisp.

VIII. Onobrychis spicata flore purpureo.  
Onobrychis prima, Clus. pan. & hist. Tab.

IX. Onobrychis spicata floribus pallidis,  
nigris radijs notatis.

Onobry-

Onobrychis 3. Clus. pan. & hist. Tab. Ger.

X. Onobrychis floribus Viciæ dilutè cæruleis.

Onobrychis 2. Clus. pan. & hist. Tab. Ger.

Flores dilutè cærulei, vel ex cæruleo purpurascens.

XI. Onobrychis floribus Viciæ majoribus cæruleo purpurascens: vel folijs Tragacanthæ.

Onobrychis quarta, Clus. pan. & hist. Tab.

Onobrychis montana 4. Ger.

XII. Onobrychis tragacanthæ folijs floribus in globum congestis.

Onobrychis quinta, Clus. pan. & hist.

XIII. Onobrychis montana siliquis oblongis nigris Viciæ similibus.

Onobrychis, Cæsalp.

Duplex est, altera angustioribus folijs flore rubente coralli modo: altera latioribus flore purpureo: utraq; siliquis nigris longis.

## A S T R A G A L U S.

**A**στράγαλος. Latine etiam Astragalus Dioscoridi l. 4. c. 57. frutex parvus est, & folijs & ramis Ciceri similibus, flores purpurei parvi: radix rotunda raphani modo grandis, &c. Plinio lib. 26. c. 8. Astragalus folia habet longa, incisuris multis obliquis circa radicem: caules tres aut quatuor foliorum plenos: florem hyacinthi: radices villosas, implicatas, rubras, praduras.

I. Astragalus Syriacus hirsutus.

Astragalus Syriacus, Lob. Lugd. Tab. Ger.

an Astragalus, Ang. Cæsalp.

an Astragalus Dioscoridis, vulgo Christianæ radix, Rauvvol. & Lugd.

Flos cæruleo purpureus, Ang. flores magni & rubri, Lob. flos sanguineus, siliquæ corniculis similes rubentes, Cæs. flos purpureo, fusco & cæruleo distinguitur, folliculi coluteæ modo flatu distenti semen continent, Rauvvol.

II. Astragalus Bœticus lanuginosus radice amplissima.

Astragalus forte primus, Clus. hisp. Lugd.

Astragalus Lusitanicus Clusij, Lob. Tab. Ger.

Astragalus Bœticus, Clus. hist. & cur. post.

Phaseolus peregrinus Belli, Clus. cur. post.

Phaseoli novum genus, Belli in epist. 5. ad Clus.

an Apocynum Amari Lusitani.

III. Astragalus alpinus Helveticus.

Astragalus alpinus & 2. Clus. hisp. & hist.

Polygala, Camer. epit.

Cicer astragaloides Ponæ.

IV. Astragalus alpinus magno flore.

Anthyllis claviculata, Lugd.

Flos in nostra est ex cæruleo purpurascens: at Lugd. hist. suæ flores luteos ascribit.

V. Astragalus villosus floribus globosis.

Astragalus purpureus, Lugd.

Astragalus tertius, Clus. hisp. & hist.

Huic affinis si non idem

Astragalus Monspeliensium, Clus. hisp. & hist.

VI. Astragalus sylvaticus folijs oblongis glabris.

Astragalus, Cord. in Diosc. & hist.

Astragalus sylvaticus, Thal.

Cicer montanum, Cordi schol. & Cam. ad Thal.

VII. Astragalum Matthiolum in editione secunda proposuit, in ultimis verò retractavit: eandem figuram Lacuna, Lonic. & Lugd. proposuere: an forte ejusdem Pseudeapios.

## O R O B U S S Y L V A T I C U S.

I. Orobis alpinus latifolius in Prod. descr.

II. Orobis sylvaticus purpureus vernus.

Phaseolus sylvaticus, Lugd.

Orobis pannonicus primus, Clus. pan. & hist. pannonicus, Eyst.

Orobis sylvestris vernus, Thal.

Astragalus, Colum.

Arachus latifolius alter, Dod. belg.

Flos coloris purpurei elegantissimi: at ubi evanescere incipit, coloris cærulei est.

III. Orobis sylvaticus pallido flore.

Arachus latifolius, Ddon.

Galega montana, Lugd.

Orobis pannonicus 4. Clus. pan. & hist.

IV. Orobis latifolius parvo flore purpureo.

Orobis Venerus, Clus. pan. & hist.

Duplex est: alteri folia dilutè virentia, flores purpurei: alteri folia ex viridi pallescunt, flores prorsus albi, utriusq; semen albicantis coloris oblongiusculum.

V. Orobis sylvestris angustifolius asphodeli radice.

Orobis pannonicus tertius, Clus. pan. & hist.

Semen nigrum interdum maculosum.

VI. Orobis

V I. Orob<sup>us</sup> sylvaticus Viciæ folijs.  
Astragaloides, Dod. altera herbariorum, Lob.  
Orob<sup>us</sup> pannonicus 2. Clus. pan. & hist.

an Lupinus sylvestris, Cæs.  
Flos purpurascens, qui vetustate in cærule-  
um commutatur.

## G A L E G A.

**G**alega ab herbarijs cur dicatur ignoramus: à quibusdam tamen Ruta nomen inditum, ab effectu & vi-  
ribus non verò odore. Quidam Onobrychin, alij Glaucem, nonnulli Polemonium, alij Polygalam veterum  
esse judicant, quibus Dioscoridis descriptiones contradicunt.

## I. Galega vulgaris.

Galega sive Ruta capraria, Matth. Ges. hor. Lac.  
Cast. Cam.

Ruta capraria, Ges. hor. Tab.

Galega quibusdam sænum græcum sylv. Dod.  
gallic.

Galega, Ad. Lob. Dod. Lon. Lugd. Ger. vulgaris,  
Clus. pan.

Onobrychis & herba gallica, Fracastorio.

Caprago vulgè, Cæs.

Galega flore cinereo, flore albo, Eyst.

Floribus est cæruleis, ex cæruleo purpureis:  
penitus candicantibus.

## II. Galega Ægyptiaca siliquis articulatis.

Seban sive Sesban Indicum, Cam.

Sesban, Alpin. & Clus. ad Garz. cujus semen A-  
nij nomine ex Alexandria accepit.

Seysban, Honor. Belli epist. 4. ad Clus.

## III. Galegæ affinis Sophera dicta.

Hoxocoquomaclit, Cam. Clus. cur. post.

Sophera Galegæ proxima, Alpin.

Sofera Lentisci folijs, Honor. Belli epist. 4. ad  
Clusium.

Honorio Belli videtur, suam plurimum ab  
ipsius Alpini differre, quod ex descriptione &  
icone colligere sit: equidem Alpini figura vitio-  
sa, duplici potissimum nomine: primum quod  
in costæ extremitate malè posuerit folium quod  
imparitatem facit: dein quod siliquas depen-  
dentes pinxerit, cum omnes oblongæ cylindra-  
cæ sursum spectent. Non tamen differentes fa-  
cio, cum & ab Honorio Belli integram plantam  
ex Creta, & à Prospero Alpino semina (unde  
plantæ enatæ) acceperim, in utraq; solam diffe-  
rentiam in folijs notavi, quæ in Ægyptiaca acu-  
tiora & atrovirentia sunt. Sic & ex horto Came-  
rarij ramum habeo, in quo peculiare observavi,  
quod in illius alarum cavis, qua parte costarum  
latior extremitas caulem amplectitur, verrucæ  
parvæ rubentes innatæ, quæ æstu intensissimo  
liquorem candidum pellucidum exudant, ut  
etiam Camerarius in suo horto admonet.

## G L Y C Y R R H I Z A.

**Γλυκύριζα**, id est, radix dulcis, à Latinis Glycyrrhiza & Dulcis radix, & à Septasiarijs barbaro nomine Li-  
quiritia appellatur. Dioscoridi lib. 3. c. 7. frutex est exiguus, ramis binum cubitorum, circa quos folia Len-  
tisci, densa, pingua, & tætuq; glutinosa: flos est hyacinthi: fructus pilularum Platani magnitudinis, asperior;  
qui siliquas habet lentium modo ruffas & parvas: radices longæ, buxæ coloris, subacerbæ & dulces: ex quibus  
succus Lycij modo elicitur. Plinio lib. 22. c. 11. Glycyrrhiza, qui eadem scribit quæ Dioscorides, eo excepto quod  
echinata a tribuit. pro *χλωρ*, id est, lentisco echinum legens. Theophrasto 9. hist. 13. *γλυκὴ καὶ σικυδινὴ ρίζα*, dulcis &  
Scythica radix, quam aliqui *σικυδινὴν* vocitent.

## I. Glycyrrhiza capite echinato.

Glycyrrhiza, Matth. Dodon. gal. Lac. Cast. al-  
tera, Anguil.

Glycyrrhiza Italica, Ges. hort. vera Dioscorid.  
Dodon.

Glycyrrhiza echinata Dioscoridis, Ad. Lob.  
Lugd. (qui & Matthioli & Dodon. figuram ha-  
bet) Tab. qui similiter duas figuras sub vulgari  
& echinata proposuit, Ger.

## II. Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica.

Liquiritia, Brunf.

Dulcis radix, Trag. Tur. Ges. hort.

Glycyrrhiza, Fuch. Cord. in Diosc. & hist. Ges.  
hort. Cam.

Glycyrrhiza Germanica, Dod. gal.

Glycyrrhiza Dioscoridis, Anguil.

Glycyrrhiza altera, Matth. vulgaris, Dodon.  
Camer. ep.

Glycyrrhiza lævis, Lac. non echinata, Lugd.

Glycyrrhiza siliquosa, Ad. Lob.

III. Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo-  
palescentibus.



Fœnugræcum sylvestre, Trag. Clus. pan. i. Dod.  
 Polygon, Cord. in Diosc. & hist. Thal.  
 Glyzyrrhiza sylvestris, Ges. hor. Lugd. Cam.  
 Glaux, Tur. vulgaris, Ad. Lob. Clus. hist.  
 IV. Glyzyrrhiza sylvestris altera floribus  
 puniceis, folijs Arachi.  
 Glauca, vel Glaux, quædam leguminosa her-

bariorum, Advers.

Flores communiter ex pallido flavent, rari-  
 us punicant.

Glyzyrrhiza sylvestris, Thal. alia, Cam.

V. Glyzyrrhiza sylvestris primæ similis: hæc  
 sub Glauce leguminosa in Prodr. describitur,  
 cujus semen Araci Bœtici nomine accepimus.

# CASPARI BAVHNI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER DECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

### DE PLANTIS CAPILLARIBVS.

PHYLITIS; HEMIONITIS; OPHIOGLOSSUM; ASPLENIUM  
 SIVE CETERACH; LUNARIA MINOR; ADIANTHUM SIVE

Capillus Veneris; Trichomanes sive Polytrichum; Ruta mu-  
 raria sive Salvia vitæ; Polytrichum aureum;  
 & Ros Solis.

## P H Y L L I T I S.

**Q**Uæ Græci Φυλλίτις, quasi foliosam dicas, cum nihil nisi foliosus cespes appareat. Latini quoq; Græcum  
 asservaverunt nomen: officinis Lingua cervina. Diosc. l. 3. c. 121. folia fert rumici similia, sed oblongio-  
 ra magisq; virentia, senu septenave, recta, quæ parte anteriore levia, posteriore tenues quasi vermiculos annexos  
 ostendunt, neq; caulem neq; semen, neq; florem profert. Theoph. forte l. 9. c. 19. σκολοποειδής, GAZA Linguam  
 cervinam vertit.

I. Lingua cervina officinarium.  
 Scolopendrium, Brunf.  
 Scolopendria vulgaris, Trag.  
 Phyllitis, Matth. Dod. ut: Ang. Lac. Tur. Cord.  
 ut: Ges. hort. Ad. Lob. Thal.  
 Phyllitis vulgaris, Cam. Clus. hist.  
 Hemionitis, Leon. Manar. Rucl. Fuch.  
 Lingua cervina, Ericio Cord. Lonic. Cæs.  
 Phyllitis sive lingua cervina, Tab. emacul.  
 Est & latifolia & angustifolia: sæpe etiam in

fontibus exigua reperitur.

II. Lingua cervina multifido folio.  
 Phyllitis laciniata, Dodon. Clus. hisp. & hist.  
 Lugdun.

Phyllitis folijs laciniatis, Tab.

Phyllitis multifido folio, Lob. multifida, Ger.

Phyllitis, Cast. ap. mucronata, Cam.

Duobus, tribus, etiam pluribus mucronibus  
 in summo folij donatur: aliquando folia ad u-  
 trumq; latus inæqualiter discissa sunt.

## H E M I O N I T I S.

**H**ÆMIONITIS seu αἰμόνιον Græcis, Latinis similiter, quasi Mulariam dicas & Splenium, nominatur, quod ejus  
 folia sicut & Phyllitidis, Medicorum splenia, nimirum oblongas plagulas forma imitentur: quid si potius  
 ab eorum usu, quod spleni medeantur, siquidem ex aceto pota lienem absument, Dioscorid. authore l. 3. c. 152. cui,  
 solum emittit simile dracunculi curvata in cornua luna modo sinuatum: radices habet multas easq; tenues:  
 sed neq; caulem, neq; semen, neq; florem profert. Hæmionion Theophrasto l. 9. c. 19. Mulam GAZA vertit, quam so-  
 lio Lingua cervina constare, & radice numerosa & tenui esse, asserit.

I. Hemionitis vulgaris.  
 Hemionitis, Matth. Dodon. ut: Ang. Ges. hort. Lac. Lon. Cæs. Lugdun.  
 Hemionitis vera, Clus. hist.



Hemionitis sive sterilis, Lob.

II. Hemionitis minus vulgaris.  
Hemionitis peregrina, Dod. Clus. hisp. & hist.  
Lugdun.

Hemionitis, Cast. altera peregrina, Lob.

III. Hemionitis minor.  
Hemionitis sive sterilis, Ad. Lob.  
Hemionitis minor, Penæ, Lugd.

IV. Hemionitis multifida.

Hemionitis altera Dalechampi, Lugd.

Lingua cervina ramosa, Colum.

Agleosotis seu Marmorite, seu Phyllitidis aut  
Scolopendriæ nomine, à Cortuso accepimus.

Et hujus quemadmodum & præcedentis fo-  
lia, parte averfa, sub flavo pulvisculo non con-  
teguntur, qui in alijs id genus plantis cernitur.

## O P H I O G L O S S U M.

**Q**uam recentiores *Ὁφιογλωσσόν* Græci vocant, Latine Lingua serpentis dicitur: quam, alijs veteribus indi-  
catam, quidam Ceratiam Plinij lib. 26. c. 8. esse volunt unico tantum folio assurgentem, radice nodosa &  
magna: quidam linguam Plinij l. 24. c. 19. quam circa fontes nasci, solum scribit: sive Lingulacum l. 25. c. 11.  
quæ circa fontes nascatur, censent: quidam inter Dracunculi species referunt.

I. Ophioglossum vulgatum.  
Serpentaria secunda, Brunf.  
Ophioglossum, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. Gef.  
hor. Lon. Thal. Cast. Cam. Tab. Eyf.  
Ophioglossum sive Eneaphyllum, Ad. Lob.  
Unifolium, Amato.  
Lingula vulneraria, Cord. hist. Cam.  
Lancea Christi, vel Luciola, Gef. hort.  
Lingua serpentina, Cæs. Cast.

Variat: aliquando folio est sinuato: ligula  
communiter simplex est, aliquando duplex, &  
etiam triplex, quemadmodum Camerarius in  
epit. Matth. pingit: est & abortivum à Lobelio  
pictum, quas differentias, una figura in nostro  
Matthiolo emaculato exhibuimus.

II. Ophioglossum anguloso folio.

III. Ophioglossum minus subrotundo folio:  
utrumque in Prodromo describitur.

## A S P L E N I U M S I V E S C O L O P E N D R I A.

**A**σπλένιον καὶ σκολοπενδρία quod splenem juvet: alijs *ἡμίονιον καὶ σκολοπενδρία* ex à foliorum forma: sic enim  
Dioscorides lib. 3. cap. 151. folijs est Scolopendria animalis similibus, pluribus ab una radice in ambitum  
sparsis: nec caulem, nec florem, nec semen habet: folia polypodij modo incisa, subrus flavescencia hirsutaque, su-  
perne verò viridia. Plinio lib. 27. cap. 6. Asplenium sunt qui Hemionion vocant, &c. Alex. Trallanus, Scolopen-  
dria ab Asplenio in varijs medicamentis separat.

Ceterach officinarum.  
Scolopendria, Ang. vera, Trag. Tab. emac.  
Ceterach, Eric. Cord. Cæs.  
Scolopendrium, Cord. hist. verum, Lob.

Asplenium, Matth. Dod. gal. Gef. hor. Lac. Tur.  
Ad. Cast. Lugd. Cam.  
Asplenium, Cordo, in Dioscoride, Dodonæo,  
Lobel.

## L U N A R I A.

**L**unaria recentioribus dicta à folijs luna crescentis modo falcatus. An veteribus cognita, ambigitur: aliqui  
Ceratium Plinij censent: quidam Tragium secundum Dioscoridis l. 4. c. 50. quod in montibus folio Scolo-  
pendrij, radice tenui & candida nasci scribit: nonnullis *ἡμίονιον καὶ σκολοπενδρία*, quia aliqui Hemionitidem  
Lunariam majorem, hanc verò minorem & botryitem à plurimis racemulis utring, thyrsulo harentibus & fo-  
liorum numerum æquantibus: Epipactis quibusdam. An *ἡμίονιον* quod Dioscor. l. 4. c. 19. caule est non magno,  
hederae folijs, denis aut duodenis. neg. semen neg. flores proferens: radicibus tenuibus nigris, gravi odore, gustu  
fatuo. Idem Plin. l. 27. c. 9. sub Epimedio quod fortè Theophr. 7. hist. 8. Epimetrum.

I. Lunaria racemosa minor vel vulgaris.  
Lunaria minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Gef. hor.  
Lon. Lugd. Cæs. Ger.  
Lunaria, Trag. Dod. racemosa, Ad. Lob.  
Lunaria petraea, Taura pastoribus, quod vaccae  
hac degustata taurum requirant, Gef. de Lunar.

Lunaria botryitis, Thal. Cam. Col. Eyflet.  
Lunaria major, Cast.  
Lunaria botryitis minor, Clus. hist.  
Lunaria vulgaris minor, Clus. histor. ap. alt.  
ad libr. 5.  
Ruta lunaria vel jecoraria, Tab.

Epime-

Epimedium Dioscoridis, Col.

Folijs est denis, duodenis: novemdecim in Baldo notavimus: quare putant aliqui totidem folia habere, quot luna dies, unde nomen habeat.

II. Lunaria racemosa ramosa major.

Lunariæ rarior species, Cam. ep.

Lunaria minor ramosa Camerarij, Clus. hist. & in ap. alt ad lib. 5.

III. Lunaria racemosa multifido folio.

Lunaria ramosa Silesiaca, Cam.

Lunaria botryitis πολύφυλλοι, Thal.

Lunaria minor ramosa, Clus. pan. & hist.

IV. Lunaria minor rutaceo folio.

Lunaria botryitis πικνάνθη, Junger. in cat. Altorff.

V. Lunaria Magorum Arabum, Lob. quid?

## ADIANTUM SIVE CAPILLUS VENERIS officinarum.

**A**δίαντον & πολύτριχον Dioscorid. lib. 4. c. 136. & δίαντον Theophrasto 7. hist. 13. dicitur, quod δ' ἀδίαντα, quod in aquis non madescat, nec quicquam humoris adhaesisse constet: velut Nicander in Theriacis, quod imbris è caelo descendens stillicidia, folijs ejus non infideant. πολύτριχον autem quasi multicomam, quod capillos multos ac densos faciat, eorumq; defluvia expleat. Callitrichon verò Apulejæ, quasi pulchricomum, quod capillos tingat, pulchrioreq; reddat. Nec alia ratione Capillus Veneris hæc herba dicta est, quam à speciosis reddendis capillis, nec alio nomine Veneris vox adjecta est, quam quod hac pulcherrima pingatur. Plinio l. 22. c. 21. Adiantum quidam Callitrichon, alij Polytrichon vocant, utrumq; ab effectu, tingit enim capillum & c. crispum densumq; facit & defluere prohibet. Latinis Cincinalis, terræ capillus, supercilium terræ crinita. Dioscoridi folia gerit pusilla coriandri similia, in extremo incisuris divisa: virgulas è quibus ea prodeunt, nigro colore nitentes, pratenues, palmum altas, neq; caulem neq; florem, neq; semen profert: radix supervacua est.

Genera duo sunt, candidum atque nigrum, Theophrasto l. c. Plinio l. c. duo, candidum & nigrum bevisq;: id quod majus est Polytrichon: aliud Trichomanes vocant, utrique ramuli nigro colore nitent, folijs filicis & c. ubi Plinius Trichomanes, alterum Adianti genus sc. candidum facit: cum Theophrasto Trichomanes Adianti genus non sit, sed sui generis planta. Verum Adiantum album & nigrum, nihil differunt, nisi quod Adianto nigro, cauliculi politiore nigore nigricant, foliaq; saturatius virent: albæ minus.

I. Adiantum folijs coriandri.

Adiantum magnum, Trag.

Adiantum, Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Lac. Ad. (sive Capillus Veneris verus) Lob. Cast. Lugd.

Adiantum Lugdunense, Cam.

Adiantum nigrum, Cord. in Diosc. & histor. Fracast. Tab.

Capillus veneris vulgo, Adiantum album Plinij, Cæsalp.

Capillus Veneris verus, Ger.

Hoc variat magnitudine & foliorum crassitie: quare majus & crassioribus folijs.

Adiantum Syriacum, Tab.

Capillum Veneris Syriacum, Ger. vocat.

II. Adiantum folijs longioribus pulverulentis pediculo nigro.

Adiantum pulchrum Lugdunense simile, Thal.

Onopteris nigra, Dod. ut: Lugd.

Adiantum nigrum Plinij, Adv. Lob.

Adianti nigri aliud genus, Cæf.

Onopteris major, Tab. mas, Ger.

III. Adiantum folijs minutim in oblongum scissis, pediculo viridi.

IV. Adiantum fruticosum Brasilianum: quod in Prodromo descriptum est.

V. Adiantum mas, Tab.

Onopteris fœmina, Ger.

Quid sit nondum assequor.

## TRICHOMANES SIVE POLYTRICHUM officinarum.

**T**ριχομάνης, quod etiam nonnulli δίαντον vocant, Dioscoridi lib. 4. cap. 137. Latinis etiam Trichomanes dicitur: officinis Polytrichum, quod nomen, secundum veteres, Adianti est. Dicitur Trichomanes à vi sua, quod rara cute fluentem capillum expleat & subnasci faciat: αὐτὸν enim illi rarum vocant & τριχὰ capillum: hinc Latinis capillaris dicitur. Hoc Dioscoridi l. c. folio est Filici simili at longè exilius: folijs tenuibus, ordine utrinque dispositis lenticula similibus, adversis inter se: in virgulis itidem tenuibus, splendens, nigricantibus, ijsq; acerbis.

- I. Trichomanes sive Polytrichum officinarum.**  
 Saxifraga minor prima, Brunf.  
 Trichomanes, Trag. Matth. Fuch. Anguil. Dod.  
 ut: Cord. hist. Gesn. hort. Turn. Lac. Adv. Lob.  
 Cast. Cam.  
 Trichomanes nigrum, communiter Saxifraga rubra, Thal.  
 Trichomanes mas, Tab.  
 Adiantum rubrum, Lon.
- Polytrichum vulgo, Cæs.**  
 Magnitudine variat: hinc & altera figura  
 Trichomanis maris majoris, Tab.  
 Trichomanis maris, Ger.
- II. Trichomanes minus & tenerius.**  
 Trichomanes candidum, Thal.  
 Trichomanes minor mas, Tab.
- III. Trichomanes ramosum majus & minus.**  
 Trichomanes fœmina, Tab. Ger.  
 Trichomanes minor fœmina, Tab.

## RUTA MURARIA SIVE SALVIA VITÆ.

**R**uta dicitur, ob quandam foliorum cum Ruta similitudinem, qua, ubi Adiantum verum, ut & Trichomanes desunt, aut vetusta sunt, uti licet: aliqui ob natales Empetron, alij ab effectu inter Saxifragas recensent: & hac sumenda quando Medici recentiores Adiantum recipiunt à Capillo veneris diversum.

- Ruta muraria.  
 Capillus Veneris, Brunf. Trag.  
 Saxifraga major 2. Brunf.  
 Saxifraga seu Empetron, Fuch.  
 Paronychia, Matth. Lac. Cast.
- Ruta muraria, Dod. ut: Gesn. hort. Ger.  
 Adiantum candidum, Cord in Diosc. & h. Guil.  
 Adiantum album, Lon. Cam. Tab. (Thal.)  
 Adiantum nigrum, Gesn. hort. Cæs.  
 Salvia vitæ, Adv. Lob. Lugd.

## POLYTRICHUM AUREUM.

πολύτριχον, à ramulis qui capillorum instar tenues sunt, aureum verò à colore dicitur.

- I. Polytrichum aureum majus.**  
 Polytrichum majus, Trag.  
 Polytrichum Apuleij majus, Fuch.  
 Polytrichum aureum, Dod. gal. majus, Lugd.  
 Muscus saxatilis aut sylvestris, Trag.  
 Muscus i. terrestris Tragi Lugd.  
 Adiantum ἀφύλλον majus, Thal.  
 Adiantum aureum, Tab.  
 Muscus capillaris, Ger.
- Polytrichum Apuleij aureum vel 2. Lon.**  
 Muscus capillaris, Dod. minor, Ger.  
 Adiantum ἀφύλλον medium, Thal.  
 Adiantum aureum minus, Tab.  
 Herbula gramine similis in parietibus major & minor, Cæs.
- III. Polytrichum aureum minus.**  
 Capillus Veneris, Brunf.  
 Polytrichum minus, Trag. Apuleij minus, Fuch.  
 Polytrichum aureum minus, Dod. gal. Lugd.  
 Polytrichum aureum tertium, Lon.  
 Musci capillaris altera species, Dod.  
 Muscus quidam in parietibus & regulis, Cæs.  
 Adiantum ἀφύλλον minus, Thal.
- Hoc cubitalis sæpè longitudinis instar cir-  
 rorum inflexum ex Moravia adfertur, & à cir-  
 culatoribus inter radices & Theriacas suas ve-  
 nale circumfertur, de hoc aureos montes polli-  
 centibus.
- II. Polytrichum aureum medium.**  
 Polytrichum nobile vel primum, Trago.
- Hujus speciem Polytrichi nigri Brocnen-  
 gici nomine à D. Fürero accepimus.

## R O S S O L I S.

**R**os Solis & Rorellus, qua veluti stella alicujus jubare sub Sole fulget, à mirabili natura nomen adepta est: nam quantumvis diu sol fervidus æstate eam illustret, ejus tamen folia semper rore & humiditate madent eorumq; lanugo guttulis aspersa manet: & quod admiratione dignum, quod humidum illud in foliorum acetabulis contentum, ubi extremis digitis leviter attingitur, dum adhuc natali suo solo inherens, aut confestim inde evulsa Solis radios experitur, mox velut in exigua filamenta sericea aut canduscula deducitur, qua confestim concreta, ita postea semper perdurant. Hec ob magnam cum capillaribus affinitatem, subjungenda fuit. Recentiorum aliqui ῥεόσιον sed ab Alchimilla diversum nominant, ῥεός enim rorem significat.

## I. Ros Solis folio rotundo.

Polytricho minori figuram sine descriptione  
addit Tragus.

Ros Solis, Dod. ut: Lon. Cast. Camer. (cui &  
Solaria) major, Ger.

Rosa Solis vulgo, Cajo Britanno.

Rorida sive Ros Solis major, Lob.

Solsirora seu Sponsa Solis, Thal.

Rorella minor prima, Tab.

Rorella sive Ros Solis, Eyst.

Mas & femina, inter Musci albicantis &  
subrubentis genera crescunt.

## II. Ros Solis folio oblongo.

Rorella sive Salsiflora, Cord. hist.

Ros Solis, lunaria quibusdam & Artemilla,  
Gefn. delun.

Ros Solis alia, Dod. Lugd. minor, Ger.

Polytrichum Apuleij album, Lon.

Rorida sive Solis ros, Adv. Lob.

Rorella minor 2. Tab.



## S E C T I O S E C U N D A.

FILIX; DRYOPTERIS; LONCHITIS; POLYPODIUM;  
HERBA VIVA; ET HERBA MIMOSA.

## FILIX ET DRYOPTERIS.

**F**ilix, ῥίξ & ῥίξων Græcis dicta, ab alijs avium, quarum speciem ejus folia in ramulis disposita referunt,  
cum folijs pennatus sit Filix: & ut Plinius, folia lateribus pennata, unde nomen Græci imposuere.

Duplex est, Græcis & Plinio: mas & femina. Mas ῥίξ simpliciter dicta Theoph. 9. hist. 20. at Diosc.  
l. 4. c. 186. ῥίξ & βλάχων & πλάττις dicitur, cui folia sine caule, sine flore sine semine, eaq; ex uno pediculo  
cubit alifermè longitudine exeunt, incisa & pennarum modo utrinque expansa, subgravi odore: radicem ha-  
bet per summa cespitum nigram, quadantenus longam, multas propagines fundentem & subastringentis gustus.  
Vel ut Plinius l. 27. c. 9. Filicis duo genera: pterin Græci vocant, aijblechon quam marem existimant, ex una  
radice quam plures exeunt filices bina etiam cubita excedentes longitudine, non graves odore. Theoph. 1.  
hist. 16. Filicis figura multifida, & quasi serrata sicut Abietis.

Femina θάλυξ & ῥυπαίξ ῥίξ Diosc. l. c. θάλυξ Theoph. 9. hist. 20. Plinio l. c. alterum genus thely-  
pterim Græci vocant, alij nymphæam pterin: folijs est Dioscoridi filicis, quæ tamen non singulari, ut illa pediculo  
hærent, sed è numerosis altioribusq; propaginibus exeunt: radices longæ, obliquæ, numerosæ, ex nigro flavescen-  
tes, aliqua etiam rubræ: vel ut Plinius, est singularis, atq; non fruticosa, brevior, molliorq; & densior folijs ad ra-  
dicem canaliculata: radices utriq; longæ, in obliquum nigrae præcipuè cum inaruerunt. Theoph. l. c. differt femina  
Filix à mascula, quod folium unico artu porrectum hæc habeat, & radicem crassam & longam & nigram.

Δρυίξ seu Filix querna: hæc à foliorum figura & loco natali nomen obtinuit: quæ Dioscoridi l. 4.  
c. 189. filici similis, at multo tenuiore foliorum incisura radicibus inter se implicitis, hirsutis, gustu astringenti-  
bus & ad dulcedinem vergentibus: & Plinio l. 27. c. 9. Dryopteris filici similis in arboribus nascitur, tenui  
foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta.

## Filix ramosa.

I. Filix ramosa major pinnulis obtusis non  
dentatis.

Filix sylvestris, Brunf.

Filicis majoris primum genus, Trag.

Filix femina, Matth. Fuch. Dod. Lac. Adv. Lob.

Cast. Lugd. Tab. Ger.

Thlypteris filix femina, Cord. in Diosc.

Filix mas, Gefn. hort.

Filix femina prima, Thal.

Filix, Cæs.

Filix mas major sive femina credita vulgo,

Clus. pan.

Hujus folia communiter per ambitum non  
sunt dentata vel serrata, aliquando tamen folia  
inferiora, ad formam foliorum scabiosæ divisa  
reperiuntur.

II. Filix ramosa major pinnulis acutissimis  
non dentatis.

III. Filix ramosa non dentata florida.

Filicis majoris alterum genus, Trag. Lugd.

Filix aquatica, Dod. gal. Lugd.

Sideritis fortè Ruellio.

Filix mas, Ang.

Filix latifolia, Cord. hist.

Filix palustris, Gefn. ap. Dod.

Filicis genus rarius, Gefn. hort.

Lunaria major seu filix lunaria & Filicastro, Gefn. de lunat.

Osmunda, Adv. Lob.

an Filix palustris, Cæs.

Hujus species tenuiter dentata reperitur.

IV. Filix ramosa minor pinnulis dentatis.

Pteridion masculum, Cord. hist.

Filix foemina altera tenuifolia, Thal.

Filicula petræa foemina 4. Tab. ico.

Filix querna seu Dryopteris, Ger.

*Filix non ramosa.*

I. Filix palustris maxima dentata: in Prodromo describitur.

II. Filix palustris altera subfusco pulvere hirsuta.

Struthiopteris, Cord. hist. Thal.

III. Filix non ramosa dentata.

Filix, Brunf. vulgaris, Trag.

Filix mas, Matth. Fuch. Dod. ut: Tur. Lac. Lon.

Adv. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Filix foemina, Ang. Gefn. hort. Cæs.

Filix mascula, Cord. in Diosc. & hist.

Filix mas altera, Thal.

Dryopteris, Matth. in epit. & Lugd.

Duplex est: altera cui pinnulae in ambitu sunt dentatae, altera cui non sunt ferratae: illa

Filix mas altera: hæc

Filix mas prima, Thallio dicitur.

IV. Filix non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissimè dentatis.

Filicula petræa prima, Tab.

Filicula montana mas, Ger.

V. Filix querna.

Dryopteris, Brunf. Matth. fol. Cord. in Dioscor.

Gefn. hort. Adv. Lob. Cam. ep.

Filix arborea sive Dryopteris, Trag. Lugd.

Dryopteris Tragi & Pteridion foemina Cordi, Thal.

Filix querna, Osmundula, Lon.

Filicis genus parvum alterum in montibus, Cæsalp.

Filicula petræa foemina 2. Tab.

VI. Dryopteris Dalechampij apud Lugd. quid?

*Filix saxatilis.*

I. Filix saxatilis folijs non ferratis.

Filicula petræa foemina tertia, Tab.

Filicis genus parvum primum in montibus, Cæsalp.

II. Filix saxatilis ramosa nigris maculis punctata.

Filix pumila saxatilis prima vel mas, Cluspan. & hist.

an Filicula candida & minor, Gefn. ap.

III. Filix saxatilis non ramosa nigris maculis punctata.

Filix pumila saxatilis altera, vel foemina, Cluspan. & hist.

an Filicula saxatilis, Cam.

Huic similis quam Gefn. in hortor. append. Chlarosticton vocat, cujus folia supina, punctis ad luteum viridemque & album colorem mixtis tendentibus notantur.

IV. Filicula alpina crispa.

Filicula saxatilis crispa, Pon.

an Pteridion, Cord. hist. & Thal.

V. Filix saxatilis corniculata.

Filix nuda sive saxatilis, Trag. Lugd.

Filix petræa, Lon.

Holostium alterum, Adv. Lob.

Holostium petræum, Tab. Ger.

Muscus corniculatus, Tab. Ger.

Adiantum ἀνδροχίτων seu furcatum, Thal.

*Filicula fontana.*

I. Filicula fontana major, sive Adiantum album filicis folio.

Dryopteris candida, Dod. ut: Lugd.

Adiantum album Plinij, Adv. Lob.

II. Filicula fontana minor.

Filicula fontana, Tab.

Filicula fontana foemina, Ger.

III. Filicula maritima ex insulis Stœchadibus.

Chamæfilix marina Anglica, Lob. Lugd.

*Filix aculeata.*

I. Filix aculeata major.

II. Filix aculeata minor: utraque in Prodromo descripta est.

L O N C H I T I S.

Λογχίτις Dioscoridi l. 3. c. 161. duplex est, altera folijs porri, quam & Plinius l. 25. c. 11. Lonchitidem vocat: alia est quam λογχίτιν τραχείαν dicunt: hac fortè ἀλόχυν lancea dicitur, eò quòd folia instar lanceæ in acutum

*acutum desinant. Hæc secundum Dioscoridem folia profert Scolopendrij, sed asperiora majoraq, ac multo magis divisa, de qua in præsens.*

I. Lonchitis aspera.

Lonchitis aspera major, Matth. Lugd. Cam.

Lonchitis altera, Ang. Lac. Cast. Lon. cui & Spicant Germanorum, fortè à radice, Indicam spicam referente.

Lonchitis altera, quibusdam aspera, Cord. in Diosc. Ges. hor. app.

Lonchitis altera mas, Taber.

Lonchitis Maranthæ, Ger. ico.

II Lonchitis minor.

Asplenium sylvestre, Trag. Lugd.

Lonchitis aspera minor, Matth. Lugd. Cam.

Lonchitis aspera, Dod. ut: Lugd. Thal. Ger.

Struthiopteris, Cord. hist. icon. Thal.

Lonchitis altera Dioscoridis, Ges. frac. Ad. Lob.

Scolopendrium majus, Lon.

Lonchitis altera fœmina, Tab.

Lonchitis altera Neotericorum, Clus. pa. & hist.

III. Lonchitis folio Ceterach.

Pseudolonchitis aspera, Matth. Lugd. ubi titulus transpositus.

Lonchitis secunda Dalmatica, Ang.

Lonchitis Maranthæ, Lob. altera Maranthæ, Clus. hist.

Lonchitis aspera Maranthæ, Cam. ep.

Lonchitis aspera Ilvensis, Lugd.

Ceterach genus in Ilva nascens, Cæs.

Lonchitis adulterina, Tab.

Filicis genus quæ Lonchitis altera, Clus. pan.

Polypodium Ilvense, Lugd.

Filicula petræa mas, Ger. ico.

Magnitudine variat: hinc 2. figuræ apud Lug.

Lonchitidis asperæ minoris:

Lonchitidis asperæ Ilvensis.

P O L Y P O D I U M.

**P**ολυπόδιον Dioscoridi l. 4. c. 188. Theophrasto 9. hist. 14. Filiculam Gaza vertit: officina Græcum nomen retinere: ratio nominis ex Dioscoridis descriptione colligitur: nascitur palmi altitudine, filici simile, subhirsutum & incisum, at non perinde tenui divisura: radix subjacet pilosa, cirròs habens ceu polyporum, crassitudine minimi digiti: hæc de rasa coloris intus herbacei comperitur: & Plin. l. 26. c. 8. Polypodium quam nostri filiculam vocant, similis enim est filici: radix pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine minimi digiti, acetabulis cavernosa ceu polyporum cirri, subdulcis: in petris nascens, aut sub arboribus vetustis.

I. Polypodium vulgare.

Polypodium, Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch.

Dod. gal. C. r. in Diosc. & hist. Ges. hor. Tur Lon.

Ad. Lob. cui & herba radioli Apuleji, Cæs. Cast.

Cam. Tab. Gerard.

Polypodium majus, Dod.

Polypodium primum, Lugd.

Laudatur quod in quercu nascitur: reperitur

in fago, corylo: in antiquis & cædvis salubus,

gustu amarior provenit, quæ sylvarica cense-

tur: in rudibus saxosis.

II. Polypodium minus.

Polypodium alterum, Matth. Lac. Lugd. primum, Tab.

Polypodium minus, Dod.

Polypodium quercinum, Ger.

III. Polypodium exoticum folijs quercus.

Polypodium Indicum, Clus. exot. l. 4. c. 17.

Hoc sub incognita Americana, à Jo. Pona Verona accepimus.

HERBA VIVA FOLIIS POLYPODII.

**H**erba Viva dicitur, eò quòd si eam quis apprehendere cupiat, folia illiò contrahant & sub tenues ramulos recondat: si verò quis apprehendat, subito licet, adeo marcida conficiatur, ut exsiccata existimetur: at tamen si quis manum retrahat, illiò nitorem recuperat: & toties marcescit, aut revirescit, quoties comprehenditur, aut manus ab ea retrahitur.

Anonymos in Malavar, Garziæ, Cast.

Planta in Peru nascens, Fran. Lopez de Gomar.

Herba Sentiola, id est, Sensifica Lusitanis, Lins.

par. 4. Ind Or. c. 17.

Herba viva, Guiland. pap. Acoftæ, Clus. Lugd.

cui & herba amoris.

an Æschynomine Apollodori, Scalig. Lugd.

an Planta per terram diffusa, quam si quis attingat statim contrahitur, ut Brassica Murciana,

ex India Occid. missa Monardi, Lugd.

HERBA

## HERBA MIMOSA FOLIIS FOENU.

græci sylvestris.

**H**erba Mimosa nuncupatur, quoniam manu admotā senescit & marcescit, manu verò remota, pristinum virorem recipit, sed non adeo celeriter ut prior: colore & sapore est Glycyrrhica & multis notis cum Fœnugræco sylvestri Tragi, Clusio monente, convenit.

Herba molle & herba delicata vulgo, Acoftæ. Clusius notis suis in Acoftam diversam plane Herba mimosa, Lug. eadem figura quæ Acoftæ. figurâ proposuit, herbam mimosam nominans.



## S E C T I O T E R T I A.

## MUSCUS; LICHEN; LENTICULA PALUSTRIS.

## M U S C U S.

**M**uscus βρύον ἢ σπλάγχνον Græcis appellatur, ut Dioscor. l. 1. c. 20. Attrici Sphagnum & Hypnon: Plinius lib. 12. c. 23. Bryon & Sphagnum: l. 24. c. 7. Sphagnos sive Sphacos sive Bryon vocat: Muscus vocatur omnis villosa substantia, caudicibus annosis, aut saxi madidis, aut aquis palustribus, aut mari adnascens.

Differentiæ: multiplex est: arboreus, de quo Dioscorides l. 1. c. 20. Plinius l. 12. c. 23. terrestris, saxatilis, maritimus, de quo Plinius lib. 4. cap. 99.

## MUSCUS TERRESTRIS.

Muscus terrestris repens.

## I. Muscus vulgarissimus.

Muscus horrensis, Trag.

Muscus terrestris vulgaris, Dod. Lob. ico.

## II. Muscus vulgaris pennatus major.

## III. Muscus vulgaris pennatus minor.

Hi duo sub 1. Musco in Prodr. describuntur.

## IV. Muscus filicinus major.

Muscus filicinus, Tab. Ger.

In hoc triplex varietas observatur.

## V. Muscus filicinus minor floridus: in Prodromo sub 2. descriptus.

## VI. Muscus abietis facie: qui 3. in Prodromo.

## VII. Muscus denticulatus major.

Muscus terrestris denticulatus, Lob. Lugd.

Muscus terrestris minor, Dod.

Muscus tertius, Tab.

Muscus minor denticulatus, Ger.

## VIII. Muscus denticulatus minor.

Muscus terrestris repens, Clus. hisp.

Muscus terrestris minor alter, Dod.

Muscus terrestris denticulatus alter, Lob. Lugd.

Muscus terrestris Lusitanicus, Clus. hist.

Muscus denticulatus, Ger.

Muscus secundus, Tab.

## IX. Musco denticulato similis.

Muscus montanus, Taber.

Muscus terrestris vulgaris, Ger. ico.

## X. Muscus terrestris clavatus.

Weintraut / Brunf. qui vinum pendulum restituit.

Muscus terrestris, Trag. Matth. Lac. Dod. Cast.

Muscus ursinus vel pes ursinus, Gef. frac.

Lycopodium, id est, pes lupi, Dod. gal. Tab.

Chamæpeuce, Cord. hist. ico. Gef. Tur.

Permonaria sive Pulmonaria, qua pro spica Celtica usi sunt, Ang.

Muscus clavatus, &amp; Pes leoninus, Lob. Ger.

Muscus terrestris 2. &amp; alius terrestris, Lugd.

Musci genus, quod pro spica vendebatur, Cæs. Selaginis species altera, Thal.

## XI. Muscus clavatus folijs cupressi.

Savina sylvestris, Trag. Gef. hor. Lon.

Muscus terrestris tertius, Lugd.

Chamæcyparissus, Tur. Tab. Ger.

Savina Tragi sylvestris, seu Silaginis Plinianæ prima species, Thal.

Plinius l. 25. c. 11. hæc habet: Similis herbæ Sabinæ est Selago appellata.

XII. Herbæ Musco similes, quas Terenacenses in fasciculum collectas & funiculo satis longo colligatas in mare abjiciunt, ad pisces capiendas: par. 3. Ind. Or.

XIII. Toucon herba apud Brasilianos qua ad piscandum utuntur, spinas in hamorum modum componunt, lineamq; herba illa conficiunt: Lerijs descr. Brasil. c. 11.

Muscus terrestris ramosus.

## I. Muscus erectus ramosus saturatè viridis.

Selago



*Selago tertiana* Thal.

Hæc inter foliola aliquando granula habet.

II. *Muscus erectus ramosus pallidus.*

*Muscus scoparius*, Lob. Lugd.

*Muscus terrestris*, Tab.

*Muscus terrestris scoparius*, Ger.

Hic claviculo vulgaris modo non infigit.

III. *Muscus terrestris candidus ramosus.*

IV. *Muscus ramosus repens spicatus.*

V. *Muscus ramosus repens apicibus candidibus.*

VI. *Muscus ramosus erectus major.*

VII. *Muscus ramosus erectus minor.*

VIII. *Muscus ceranoides major & minor.*

IX. *Muscus cupressiformis ramosus.*

Septem posteriores in Prodr. describuntur.

X. *Muscus polytrichoides triplex*: in Prodr. describitur.

XI. *Muscus parvus stellaris.*

*Muscus in ericeris proveniens*, Lob. belg.

XII. *Muscus stellaris roseus*: in Prodr. describitur.

XIII. *Muscus pyxiodes terrestris.*

*Muscus terrestris pyxiditatus alabastricolos imitatus*, Lob. belg.

XIV. *Muscus pyxiodes saxatilis*, in Prodr. describitur.

*Muscus terrestris coralloides.*

I. *Muscus terrestris coralloides erectus incanus.*

II. *Muscus terrestris coralloides erectus cornibus rufescentibus*: in Prodr. uterq; sub 11. & 12. describitur.

III. *Muscus coralloides sive cornutus montanus.*

*Muscus corallinus sive Corallina montana*, Tab. Gerard.

IV. *Muscus coralloides saxatilis, cervi cornua referens.*

*Lythobryon coralloides*, Colum.

Variat: major colore virente: minor colore cinereo.

*Muscus arboreus.*

I. *Muscus arboreus*: *Ulna officinarum*.

*Muscus arboreus*, Trag. Matth. Ang. Dod. Lug. Cast. Thal.

*Muscus*, Dod. gal. Cord. in Diosc. arborum, Lon. Tabern.

*Muscus quernus*, Lob. Ger.

Musci genus, quod privatim *Splachnon* vocant, Cæs.

Unus tenuior, crassior alter, brevior, alius prolixior: omnes candescentes, pauci rutilantes, quandoq; nigri.

Reperitur potissimum in quercu, populo, ulmo, betula, pomo, pyro, pinu, picea, piceastro, abiete, cedro, larice & alijs complurimis. Verum primæ nobilitatis & odorati sunt, Cedrinus, lariceus, piceus, pineus & abietinus: Secundum locum tenet populneus, sed candidus præstat, nigricans improbatur: rutilans medium tenet: vilissimus quernus.

II. *Muscus capillaceus longissimus.*

*Muscus capillaceus cinerei coloris*, è ramis Illicis dependens, Clus. hist.

an *Muscus* ex præaltis arboribus ad terram usq; demissus, coloris viridis in cæruleum tendens, qua Regina in Florida cingitur, tenuib. staminibus catenularum instar invicem coherentibus: par. 2. Amer. fig. 39. quemadmodum Rex sedem suam Musco lentiscino tegit: par. 2. Ame. narr. 4.

III. *Muscus arboreus cum orbiculis.*

*Muscus sceniculaceus*, Lugd.

*Muscus ramosus & muscus ramosus floridus*, Taber. Ger.

*Muscus quernus fruticosus* *τρυχώφυλλον*, Col.

Potissimum in Quercu & Fago varians umbellis majorib. & minorib. planiorib. & radijs multo diametro longiorib. ramosis ac hirsutis.

IV. *Muscus arboreus capitulis cavis.*

*Muscus alter* *πλάτυπυκνοδοξίφυλλον*, Col.

V. *Muscus arboreus coralloides.*

*Muscus alter quernus coralloides* *ἀφύλλον*, Col.

VI. *Muscus arboreus nodosus.*

*Dendrobryon geniculatum*, Col.

VII. *Muscus pulmonarius.*

*Pulmonaria*, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Gesn. hor. Lac. Lon. Tab.

*Pulmonaria prima*, Cast. tertia, Clus. pan.

*Pulmonaria fungosa*, Lugd. vulgaris, Thal.

*Muscus pulmonarius*, Lob.

*Pulmonaria*, Lichenis quoddam genus, Cæs.

*Hepatica terrestris*, Ger. ico.

Variat lacinijs latioribus & angustioribus & hæc Lichen arboreum, Tab. & Ger. dicitur. Arboribus præsertim Quercui, Sorbo aucupariæ & alijs adnascitur: petris quoque, sed hoc candidius est.

VIII. *Muscus crustæ modo arboribus adnascens.*

*Lichen Dioscoridis & Plinij alterum*, Col.

Procura Valesianorum.

In arborum caudicibus, in petris, tophis & tectorum tegulis veluti patella adhæret: colore varians, viridante, flavescente & cinereo vetustate petris adhæret: arborum caudicibus lutescens crustosa & major observatur.

## MUSCUS SAXATILIS VEL LICHEN.

**L**ειχλὸν Græcè, Latinè similiter Lichen sic dicitur Galeno, quia lichenes, id est, impetigines curat. Dioscoridi l. 4. c. 53. λευχλὸν, quæ petris innascitur & aliqui βερὼν appellant, seu muscus est roscidus petris inhaerens. At Plinio duplex est l. 26. c. 4. Lichen herba in Lichenis remedijs omnibus præfertur, inde nomine invento: nascitur in saxosis folio uno, ad radicem lato: caule uno parvo, longis folijs dependentibus: est aliud Lichenis genus, petræ tantum inhaerens ut Muscus: qui & ipse illinitur.

I. Lichen petræus latifolius sive Hepatica fontana. in Prodomo sub 15. descriptus.

Hepatica, Brunf. Lon. prima, Tab.

Jecoraria seu Hepatica fontana, Trag.

Lichen, Matt. Fuch. Ang. Dod. ur: Cord. in Dioscor. Lac. Tur. Cast. Lugd. Cæs. Thal.

Lichen primus, Lob. petræa, Ger.

II. Lichen petræus stellatus.

Lichen secundus, Lob. Lugd.

Hepatica secunda, Tab. Ger.

III. Lichen petræus umbellatus.

Lichen tertius, Lob. Lugd.

Hepatica tertia, Tab.

IV. Lichen petræus muscosus racemosus,

V. Lichen petræus cauliculo pileolum sustinente.

Lichen Plinij primus pileatus, Col.

VI. Lichen petræus cauliculo calceato.

Lichen alter minor caule υποδιεμελὲς, Col.

VII. Lichen petræus minimus fructu orobi.

Lichen alter acaulis υποφυλλόμαρτος, Col.

VIII. Muscus saxatilis ericoides: qui 7. in Prodomo.

IX. Muscus saxatilis repens coma sparsa.

Duplex est latiore folio in aquis, qui Muscus est 14. in Prodomo: angustiore expanso, qui supra lapides Harcyoniæ reperitur.

## LENTICULA PALUSTRIS.

**L**ens sive Lenticula palustris, Dioscoridi l. 4. c. 88. Φανὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελευάτων dicitur (quod foliolum sit lenticule forma) qua in aquis pigris stagnantibus reperitur, muscus scilicet lenticula similis.

I. Lenticula palustris vulgaris.

Lenticula aquatica, Brunf. Thal.

Lenticula palustris, Trag. Cæs. Tab.

Lens palustris, Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Dioscor. Tur. Lac. Lob. Lugd. Ger.

Lenticula, Ad.

Lens palustris, Dod.

II. Lenticula palustris bifolia fructu tetragono.

Callitriche Plinij, Colum.

III. Lenticula aquatica trifolca.

Hederula aquatica, Lob. belg. Ger.

Hederula palustris, Tab.

IV. Lenticula palustris quadrifolia.

Lens palustris altera, Matth. Lac. Lugd. Cast. ap.

Lenticula palustris secunda, Tab.

an Lenticulæ alterum genus, Cæs.

Lemna Theophrasti, Lugd.

Theophrasto 4. hist. 12. λέμνα quod vocatur, altius mergitur in aqua.

V. Lenticula palustris latifolia punctata.

Stratiotes aquatica Dioscoridis, Cæs.

VI. Lenticula palustris Ægyptiaca, sive Stratiotes aquatica folijs Sedo majore latioribus, Hayhalem elmaoin, quasi dicas aquosum sedum, Stratiotes Dioscoridis, Alp.

Dioscoridi lib. 4. cap. 102. στρατιώτης sive ποταμιῶ στρατιώτης, ex eo cognomentum traxit, quod aquis supernatet, & sine radice vivit: folium habet Aizoo simile, at majus. Plinio lib. 24. cap. 18. Stratiotis in Ægypto tantum & inundatione Nili nascitur, Aizoo similis, ni majora haberet folia.

VII. Quadrifolium aquaticum nobis incognitum.

Tetraphyllum, Lugd.

## S E C T I O Q U A R T A.

MUSCUS MARITIMUS; FUCUS SIVE ALGA; CORALLINA;  
CORALLUM; PORUS; ANDROSACE; ALCYONIUM;  
SPONGIA; URTICA MARITIMA.

## MUSCUS ET FUCUS MARINUS.

**M**uscus Marinus βρύον θαλάσσιον Dioscoridi lib. 4. cap. 99. in saxis testisq; ad mare nascitur, capillaceus, gracilis sine caule.

Fucus Marinus φύκος θαλάσσιος lib. 4. cap. 100. quoddam latum : alterum oblongum & quadantenus pumiceum : tertium candidum, quod in Creta nascitur juxta terram, pulchrè floridum, neque corruptioni obnoxium. Et Theophrasto 4. hist. 7. φύκος plura sunt genera : quoddam folio lato, colore herbido, quod Porrum quidam appellant, alij cingulum radice hirta, extrinsecus squammata : intrinsecus longa admodum drassag; &c. Aliud folio crinito terra ipsi adharens, sapeq; à mari tantum alluitur. Alterum altius degit, in mari extero circa Hercules columnas nascitur, mira magnitudine & latitudine, & ut serunt, amplius quàm ut manu comprehendi possit, &c. Alga verò proveniens in alto, quam Spongiarj pelagicum deferunt, in Creta insula juxta terram, super saxa plurima optimaq; provenit, qua non solum vittas, sed etiam lanas vestesq; inficiunt, &c. Sunt alia Graminibus proxima, quippe folio simili, radice geniculata, longa, oblique adhaerente modo graminis, & caule calamaceo ut gramen, magnitudine Alga minore. Est aliud βρύον dictum, folio coloris herbidi, amplo, nec Lactuca dissimili, rugosiore tamen & veluti contracto : caret caule : sed ab uno intro plura folia ejusmodi exeunt & rursus ab alio : nascitur super tegulas fœtiliaq; juxta terram. Hïs verbis Theophrastus Fuci marini quinque genera proposuit : Zosteræ sive Prason : capillaceum sive fœniculaceum : tinctorium spongiariorum sive pelagicum : gramineum : lactuceum. Plinio qui βρύον & φύκος confundit lib. 27. cap. 8. Bryon marina herba sine dubitatione est, lactuca folijs similis, rugosa veluti contracta sine caule, ab ima radice exeuntibus folijs : nascitur in scopulis maxime testisq; terra comprehensis. Idem lib. 13. cap. 25. (de Phucus sive Algis agens) Non habet lingua alia nomen, quod Græci Phycos vocant : quoniam Alga herbarum magis vocabulum intelligitur. Folia lata, colore viridi gignit, quod quidam prason vocant, alij Zosteræ. Alterum genus ejusdem capillaceo folio simile fœniculo, in saxis nascitur, superius in vadibus haud procul littore. Verno utrumque & interit autumnò. Circa Cretam insulam nato in petris purpuras quoque inficiunt : laudatissimo à parte Aquilonis unâ cum spongijs. Tertium gramine simile, radice geniculata, & caule qualiter calami. Aliud genus Phycorum, Bryon vocatur folio Lactuca, rugosiore tantum, jam hoc interius nascent.

## Muscus maritimus.

## I. Muscus capillaceus multifido folio albidus.

Muscus marinus vulgarissimus, Lob. Lugd.

Muscus marinus 2. Dod. at primus, Eid. belg.

Muscus marinus 3. Tab. marinus, Ger.

Muscus marinus herbaceus mollior, Cæf.

Muscus albus marinus, Imper.

## II. Muscus capillaceus multifidus niger.

Fuci marini nigri repentis nomine ex mare Balthico accepimus.

## III. Muscus maritimus viridis multifido folio.

Palmula marina, Imper.

Muscus marinus, Clus. hist.

Hujus diversæ sunt species.

## IV. Muscus maritimus tenuissimè dissectus ruber.

an Fucus sive Alga tinctoria, Lugd.

## V. Muscus pennæ similis.

Penna marina, Imper.

## VI. Muscus maritimus filicis folio.

Myrophillum pelagium Cortusi, Clus. hist.

## VII. Muscus maritimus Adianto affinis.

Pennaria marina, Imper.

## VIII. Muscus maritimus Adianto similis alter.

Polypodium marinum, Imper.

## IX. Muscus maritimus Gossypio similis.

Gossypium muscus, Imper.

## X. Alga bombycina, in Prodomo descripta.

Muscus Coralloides.

## I. Muscus maritimus sive Corallina officinarum.

Muscus marinus, Matth. Ang. Dod. ut : Cord. in Diosc. Lac. Tur. Cast. Lugd. Cæf. Tab.

Corallina, Lob. Lon. Lem.

*Fucus capillaceus*, Lugd.

II. *Muscus coralloides squammulis lor-*  
*catus.*

*Bryon thalassion*, Tur.

*Muscus marinus* 3. Dod. vel 2. Eid. belg.

*Muscus candidus coralloides squammatus*,  
Lobel.

*Muscus marinus candidus coralloides*, Lugd.

*Corallina altera*, Tab.

III. *Muscus coralloides latifolius.*

*Muscus coralliformis*, Lob. belg.

IV. *Musc. foliolis latiusculis ambitu dissectis.*

*Muscus marinus* 3. Dod. belg.

*Fuci subrotundi.*

I. *Fucus folio rotundo.*

*Sertolaria*, Imper.

*Corallina latifolia & Opuntia marina*, Cortuf.

*Lichen marinus*, Clus. hist.

II. *Lichen maritimus*, Lob. belg. Tab.

III. *Fucus umbilicus marinus dictus.*

*Umbilicus marinus*, Imper.

IV. *Fucus fungis affinis.*

*Fucus fungularis*, Imper.

*Est major & minor.*

V. *Fucus cavus.*

*Herba cava*, Imper.

*Fucus sive Alga latifolia.*

I. *Muscus marinus Lactucæ folio.*

*Fucus marinus* 1. Dioscoridis, Theoph.

*Bryon Lactucæ folijs* Plin. & Lob.

*Muscus marinus alter*, Matth. Cast.

*Muscus marinus Theophrasti*, Dod. gal. Lugd.

*Therapidion Cratevæ*, Ang.

*Bryon thalassion*, Tur.

*Fucus marinus prior*, Dod.

*Muscus marinus virens latifolius*, Dod. belg.

*Lactuca marina*, Tab.

II. *Muscus lactucæ marinæ similis.*

*Fucus linza dictus*, Imper.

III. *Alga intybacea diversa à Musco primo.*

*Fucus sive Alga intybacea*, Lugd.

IV. *Alga longissimo lato tenuique folio.*

*Sub Fuco* 4. in Prodomo describitur.

V. *Alga longissimo lato crassoque folio.*

*Fucus* 3. in Prodomo.

VI. *Alga latifolia chartæ similis costa*  
*carens.*

*Folium grande ex Algæ genere*, quod ex Ma-  
dera advehitur cum *Saccharo*, Cæsalp. cap. de  
*Alga & de Musa.*

VII. *Alga latifolia coriacea.*

*Palmifolium giganteum sive fucus giganteus*,  
Imper.

an *Urack Nortmanorum*, Lob.

VIII. *Alga membranacea ceranoides.*

*Fucus* 6. in Prodomo.

IX. *Alga maritima gallopavonis plumas*  
*referens.*

*Fucus* 7. in Prodomo.

*Fucus sive Alga angustifolia.*

I. *Fucus arboreus polyichides edulis*: 2. in  
Prodomo.

II. *Fucus alatus sive phasganoides*: 1. in  
Prodomo.

III. *Fucus longo angusto crassoque folio*:  
3. in Prodomo.

an *Fucus Zoster*, Lugd.

*Fuci maritimi* 2. species, Dod. belg.

IV. *Fucus angustifolius ligulas referens.*

*Fucus marinus alter*, Dod. belg.

V. *Alga angustifolia vitrariorum.*

*Fucus marinus primus*, Ang.

*Fucus marinus*, Lac. alter, Dod.

*Alga*, Cæs. Imper. marina, Lob. ico.

*Fucus sive Alga marina graminea*, Lugd. cum  
duplici figura.

*Hæc duplex: folijs alia latioribus, alia an-*  
*gustioribus, utriusque folia initio virent, dein*  
*cum exiccantur albescent: verum etiam angu-*  
*stifolia candidissima reperitur.*

VI. *Alga cornu cervi divifura.*

*Herba Cretica quæ tinctoribus Rubella*, hoc  
nomine Imperatus misit.

VII. *Alga gramineo folio.*

*Algæ minimum genus*, Cæs.

*Fucus sive Alga capillaceo folio.*

I. *Alga viridis capillaceo folio.*

an *Conserva Plinij* Ang.

*Conserva Plinij*, Lob. Lugd. Imper.

*Linum marinum*, Imper. qui hoc nomine misit.

*Duplex est: alia in maritimis quæ Muscus to-*  
*mentosus, sive Conserva; alia in aquis stagnan-*  
*tibus, quæ Linum aquaticum Imper. dicitur.*

II. *Alga nigro capillaceo folio.*

*Filum maritimum Germanicum* in Prod.

III. *Alga fontalis trichodes.*

*Conserva trichodes, vel Trichomanes aquati-*  
*cum*, Lugd.

IV. *Alga in tubulis aquam fontanam du-*  
*centibus.*

## FUCI ARBORIBUS, FRUTICIBUS.

vel etiam herbis assimilati.

**N**ascuntur etiam in mari Fuci qui fruticibus arboribusve assimilantur : quare Theophrastus 4. hist. 7. scribit, nasci Quercus & Abietes super lapides scitilia, radicibus carentes, sed patellarum nudo adherentes, &c. Ibidem & Palma Pelagica meminit. Et Plinius lib. 13. cap. 25. in alto vero Abies & Quercus cubitali altitudine, ramis earum adherent concha : Quercu etiam tingi lana tradunt. Glandem etiam quasdam ferre in alto, &c. Vitis passim nascitur, sed Ficus sine folijs rubro cortice & palma fruticum generis : extra Herculis Columnas, porri fronde nascitur frutex & alius lauri & thymi, &c.

Fuci folliculacei.

I. Fucus maritimus nodosus.

Fucus maritimus 3. Dod. belg.

II. Fucus maritimus alter tuberculis paucissimis.

Fucus marinus 4. Dod. belg.

III. Fucus maritimus, vel Quercus maritima vesiculas habens.

Quercus marina, Lobel. Clus. hisp. Tabern. at 1. Eid. histor.

Fucus marinus primus, Dod. belg.

an Alga vulgaris ramosa, Lem. ocul.

IV. Fucus maritimus vel quercus maritima, foliorum extremis tumidis, quam aliqui glandiferam vocant.

Quercus marina altera, Clus. hist.

Hæc cum priore una figura à Lobelio, Tab. &amp; Clus. in hist. exprimitur.

V. Fucus maritimus folijs tumidis barbatis : in Prodr. sub Quercu maritima 3. describitur.

VI. Fucus folliculaceus fœniculi folio longiore.

Phucus marinus folio fœniculi, Ang.

Fucus ferulaceus, Lob. Lugd.

an Algæ species 2. Lem. ocul.

VII. Fucus folliculaceus folijs fœniculi brevioribus.

Muscus marinus virens tenuifolius, Dod. belg.

VIII. Fucus folliculaceus folijs Abrotani.

Fucus marinus folijs Abrotani maris, Lob.

Fucus marinus tenuifolius, Tab.

Muscus marinus folijs abrotani, Lugd.

Gongularis marina seu Abies marina, Theoph. Imper.

IX. Fucus racemosus vel racemus marinus.

Acinaria marina prima, Imper.

X. Fucus folliculaceus ferratis folijs.

Lenticula marina ferratis folijs, Lob. Lugdun. Tabern.

Sargazo Acoftæ, Lugdun. Linsc. part. 3. Orient. cap. 4. §. 8. &amp; part. 4. fig. 10.

Vitis marina Theoph. Alga prima, Lem. ocul.

Acinariæ marinæ 3. species, Imper.

an Klaptmutsen herba magna copia fluctuans : part. 5. Ind. Orient.

XI. Fucus maritimus bacciferus.

Herba mari innatans folijs rutaceis, baccis Juniperinis similibus : mare ita herbidum efficiens ut pratum referret : Lærio desc. Brasil. c. 20.

XII. Fucus folliculaceus linariæ folio.

Lenticula marina Serapionis &amp; Uva marina quorundam, Lob. Lugd.

Lenticula marina Serapionis, Tab.

Acinariæ marinæ altera species, Imper.

XIII. Abieti similis maritima.

Muscus coralloides alter, Lob. Lugd.

Abies marina belgica, Clus. hisp. &amp; hist.

XIV. Tamarisco similis maritima.

Myrica marina Batavica, Clus. hist.

an Tamariciola Fucus, Imper.

XV. Fucus cupressio similis.

Fucus cupressinus, Imper.

XVI. Salix maritima.

Salix marina testis ostreatum &amp; saxi innascens, Lugd.

XVII. Ericæ similis maritima.

Frutex marinus Ericæ facie, Clus. exot. l. 6. c. 5.

XVIII. Resedæ similis maritima.

Planra marina resedæ facie, Clus. exot. l. 6. c. 6.

XIX. Equiseto similis saxea.

Hippuris saxea, Clus. exot. l. 6. c. 8.

XX. Abrotano similis saxea.

Planta saxea abrotano similis, Clus. exot. l. 6. c. 7.

Fuci diversi ex Imperato : qui cum nobis inco-  
gniti, in certas classes reponi non  
potuere.

I. Fucus marinus Roccella tinctorum.

II. Fucus capillaceus Roccella.

an Fucus 3. Ang.

III. Fucus verrucosus tinctorius Roccella.

IV. Fucus lumbricalis, aliquibus Corallina.

- V. *Fucus marinus lanuta*.  
 VI. *Fucus radicella* five *Vermicularis*.  
 VII. *Fucus terzola*, *Vermicularis* species.  
 VIII. *Fucus forcellata lumbricalis* species.  
 IX. *Fucus tremula*.  
 X. *Fucus scoparia*, *Pennachio marinus*.  
 XI. *Fucus vermicularis laqueus dictus*.  
 XII. *Fuci cristati* sc. *Quercus* & *Ilex marina*.  
 XIII. *Fucus vermicularis duplex Retusa* & *Sempia*.  
 XIV. *Muscus marinus trifolia*.  
 XV. *Muscus marinus Alghetta*.  
 XVI. *Fucus axungiola*.  
 XVII. *Fucus aliquibus palma marina duplex vel cortice rugoso vel lævi*.

## C O R A L L I N A.

- I. *Corallina fruticosa recta alba*.  
*Juncus petrosus*, Ang.  
*Lithophyton marinum albicans*, Gefn. foss.  
*Quercus marina* Theoph. Clus. hisp. & exot.  
*Corallina alba*, Lob. Tab.  
*Corallium album*, Lugd.  
*Muscus marinus fruticosus*, Cast.  
*Corallij similes frutices*, Cæf.  
 Ligno intus durissimo & nigro cui crusta obducitur, alijs candida, alijs cinerea, alijs rubens, testacea substantia.  
 II. *Corallina lutea punctata*.  
 III. *Corallina fruticosa purpurea*.  
*Lithophyton marinum rubri seu purpurei coloris*, Gefn.  
*Corallina rubens Antiphatis facie*, Lob.  
*Corallina rubra*, Tab.  
*Quercus marina* Theophr. Clus. exot. libr. 6. cap. 4.  
*Quercus marina cum sua basi*, Eid. curis post.  
 IV. *Corallina nigra veluti spinis exasperata*.  
 V. *Corallina nigra setacea hirsuta*.  
*Antiphates 2. species*, Ponæ.  
 VI. *Corallina nigra setacea*.  
*Antiphates five Corallina 3. Ponæ ital.*  
 VII. *Corallina nigra setacea circumvoluta*.  
*Antiphatis five Corallina 3. altera species*, Pon. ital.  
 VIII. *Eschara coralloides*, Clus. exot. l. 6. c. 9.  
 IX. *Corallinae affinis Nodularia*.  
*Nodularia*, Imper.  
 Variat colore albo, pullo, puniceo.  
 X. *Corallinae facie grumoso cortice*.  
*Arbuscula marina coralloides*, Clus. exot. l. 6. c. r.  
 XI. *Corallina alba nodosa*: quæ 1. in Prod.  
 XII. *Corallina cinerea rugosa*, 2. in Prod. quæ duplex est.  
 XIII. *Corallina cortice reticulato maculoso purpurascens*.  
*Frutex marinus elegantissimus*, ad *Palmæ marinæ* genus Theoph. accedens, Cl. exot. l. 6. c. 12.  
 XIV. *Corallina reticulato cortice altera*.  
*Planta marina retiformis*, Clus. exot. l. 6. c. 3.  
 XV. *Corallina pallidè flavescens cortice lævi*: quæ 3. in Prodro. mo.

## C O R A L L U M.

- I. *Corallum rubrum*.  
*Corallium*, Gefn. Lob. Lugd. Cæf.  
*Corallum rubrum*, Imper.  
 Variat: coloris vel intense, vel dilutè rubri est, vel subflavescentis, vel fusci.  
 II. *Corallum nigrum*.  
*Corallium nigrum*, Gefn. Cæf.  
*Antiphates five Corallium nigrum*, Lob. Lugd.  
 III. *Corallium extra rubens intus nigrum*, Cæfalp.  
 IV. *Corallium album*: & Lob.  
*Corallium album*, cujus nec apud Græcos, nec Latinos mentio fit, Cæf.  
 In hoc varietas est: asperum est & striatum.  
 V. *Corallum album ramosum*.  
*Corallum album fistulosum*, Imper.  
 VI. *Corallum album ramosum alterum*.  
*Coralloides seu Coralli albi varietas*, Lob. Lug.  
 VII. *Corallum album verrucosum punctatum*.  
*Corallum album punctatum*, Imper.  
 VIII. *Corallum album stellatum*.  
*Corallum stellatum*, Imper.  
 Est majus & minus.  
 IX. *Corallum album articulatum*.  
*Corallum articulatum ex Majorica*, Imper.



Κοράλλιον, inquit Dioscorides l. 5. c. 139. aliqui Λιβάλλον Ἀπορ appellant, marina planta est, qua alto mari exempta duratur statim atq; emergit, quasi à circumfuso nobis acre lapidescat concresecatve. Probatissimum rubens colore Sandracha, aut Sandycis saturata, ut quod in lapidis duritiem coit scabrosum, fistulosum seu concavum, præterea inane seu spongiosum, vitiosum existimatur. Quod αἰτῖναις vocatur corallium quoq; est, sed specie tantummodo distans: est colore nigro, arboris & ipsum figura, at magis ramosum. Plinio l. 32. c. 2. Corallio forma est fruticis, coloris viridis: baccæ ejus candida sub aqua & molles, exempta confestim durantur & rubescunt quasi Corna sativa specie atq; magnitudine: ajunt tractu protinus lapidescere. si vivat: itaq; occupari, evelliq; retibus, aut acriserramento præcidi: hac de causa Curalium vocitatum interpretantur (ὅτε ἐν αἰτῖναις γέται, quoniam in mari tondetur.) Probatissimum quàm maximè rubens & quàm ramosissimum, nec scabrosum aut lapideum, vel rursus inane aut concavum: authoritas baccarum ejus non minus in Indorum viris quoq; prætiosa est, quam seminis nostris uniones Indici (sed putavit Plinius baccarum formam artificio paratam, sponte nasci.) Antiphatis verò l. 7. c. 10. inter gemmas meminit, quæ nigra sit & non translucens. Hujus volunt etiam meminisse lib. 3. cap. ult. his verbis: Ἰσίδος πλοκάμιον, corallio similis sine folijs: præcisum mutato colore in nigrum durefcere: cum cadat frangi: item alium qui vocetur charitoblepharon efficacem in amatorijs: hac Plinius. Hoc posterius nigrum esse corallium, hinc quidam arbutantur, quod olim in supercilijs scæminarum, color niger pulcherrimus & vetustissimus haberetur. Refert Luiscottus par. 3. Ind Orient. cap. 1. ad caput Bonæ spei scopulos esse, qui magna ex parte Corallio, eoq; acutissimo, asperissimoq; & omnisarj coloris, ut nigri, albi, arguginosi seu viridis, constant.

## P O R I C O R A L L O A F F I N E S.

**P**linius l. 36. c. 17. Pori lapidis servandis corporibus idonei meminit: Pario similis candore & duritie, minus tamen ponderosus, qui Porus vocatur. Cùm Plinius ita brevis sit, an de his locutus ignoramus: Equidem lapides substantia sunt Corallijs proximi, & potissimum porositate, unde nomen habent à Corallijs differunt.

- |  |   |
|--|---|
| I. Corallo affinis Porus magnus.           | colore pro partium diversitate reperitur. |
| Porus magnus, Imper.                       | VI. Porus facie Sabinæ, Imper.            |
| II. Corallo albo affinis Porus ramosus.    | VII. Porus cervinus, Imper.               |
| Porus ramosus, Imper.                      | VIII. Porus reticulatus & Eschara marina, |
| III. Milepora, Imper.                      | Imper.                                    |
| IV. Corallis affinis Madrepora stellata.   | IX. Frondipora, Imper.                    |
| Madrepora, Imper.                          | X. Porus tabularius, Imper.               |
| V. Corallis affinis Madrepora ramosa.      | XI. Porus anguinus, Imper.                |
| Madrepora ramosa, Imper.                   | XII. Corallijs affine Alcyonium rubrum.   |
| In eadem planta varietas & in substantia & | Tabularia purpurea, Imper.                |

## A N D R O S A C E.

**A**ndrosaces Dioscoridi l. 3. c. 150. herba est alba tenuibus cirris sine folijs, folliculum habens in cacumine, quo semen continetur: in maritimis Syriæ nascitur. Idem Plinius l. 26. c. 4. Androsaces dicitur, quod Hydropicorum aquas ducat, vel Hydrosaces, quia non nisi in aquis crescat.

- |  |   |
|--|---|
| I. Androsaces petrae innascens vel major.  | Ad. Lobel. icon.  |
| Androsaces, Matth. Lon. Cast. Lugd.  | Androsaces, Lobel. Lugd. (& Umbilicus marinus Monspel.) Cam. ep. utramque una figura                      |
| Musci marini genus, Guil.  | exhibet.  |
| Hanc ex Istria habemus, & à sequenti cirris  | Fungus marinus minimus, Cæf.  |
| longioribus, folliculis sive clypeolis (sed femine carentibus) in cacumine minoribus, differt. | Androsace Matthioli, Tab. Ger.  |
| II. Androsaces Chamæ conchæ innascens, vel minor.  | Hanc communiter conchæ, rarius petrae innascentem in stagnis circa Magalonam & Frongignanum observavimus. |
| Androsaces, Cotyledon foliosum marinum,  |   |



## A L C Y O N I U M.

**A** *Ἀλκυόνιον* Dioscoridi l. 5. c. 136. cuius quinque genera facit: unum spissum est, acerbi saporis, spongiosa facie, insuperq; virosum, grave ac piscem olens: alterum oculorum prerygio aut spongia simile, leve & multivacuum, odore fere algæ: tertium vermiculi forma & colore pene purpureum est, quod Mælesium quidam vocant: quartum succidis velleribus non admodum dissimile, multis inanitatibus hians ac leve: quintum figura fungi, inodorum, intus quidem asperum, quodammodo pumicosum, foris verò leve, acre. Plinius l. 32. c. 8. fit in mari & Halcyoneum appellatum, ex nidu ut aliqui existimant, halcyonum & cecum: ut aliq; è sordibus spumarum crassescens: aliq; è limo, vel quadam maris lanugine. Quatuor ejus genera: cinereum spissum, odoris asperi: alterum molle lenius odore fere algæ: tertium candidioris vermiculi: quartum pumicosius spongiæq; putri simile, pene purpureum, quod optimum: hoc & Mælesium vocatur: quo candidius autem hoc minus probabile est.

I. Alcyonium durum sive 1. Diof. Impér.

II. Favago Australis, Alcyonium 2. Diofcor. quod duplex existit, Imper.

III. Alcyonium vermiculare, Imper. Alcyonium 3. Diof. Cæf.

Hoc non solum purpureum, sed & candidum ac flavescens reperitur.

IV. Alcyonium molle vel 4. Diof. Imp.

V. Alcyonium stuposum, vel 4. Diof. Imp.

VI. Alcyonium foraminosum vel quintum Diof. Imper.

VII. Alcyon. forma fructus alicujus ficus. Alcyonium tuberosum vel 5. Diof. Imp.

VIII. Alcyonium ingens & 3. quod ad 5. Diof. referri potest, Cluf. exor.

IX. Alcyonium cervi cornua cum cranij parte referens.

Alcyonium monstrosus sive 1. Cluf. ex. l. 6. c. 12.

X. Alcyonium chirothecæ facie.

Alcyonium alterum, Cluf. l. c.

Cum secundo Dioscoridis nonnullam affinitatem habet.

XI. Fungus auricularis, Cæf.

Muscus saxatilis, aliquibus Alcyonium quintum Diof. Imp.

XII. Bursa marina & Alcyonij genus 4. Cæf.

XIII. Rosa marina ad quintum Alcyonij speciem referenda, Cæf.

XIV. Pila marina, Cæf.

XV. Pila marina velut ex ampullis constans ad spumæ similitudinem.

Spuma maris, Cæf.

Varia colore modò candido, modò rubro, aliquidando flavescente.

## Z O O P H Y T A.

**Z** *ζώοφυτα* sunt quæ nec animalium, nec plantarum, sed tertiam ex utroq; naturam habent, & ut Aristoteles loquitur, τὰ ἐναυφῶτα ὅντων καὶ ζώων, quæ ambigunt inter plantam & animal, quæ Plantanimalia dici possunt: talia sunt Spongiæ, Urticæ marinæ.

## S P O N G I Æ.

**Σ** *πύγος* Græci, Spongia: Etymologicus sic dici scribit *σπῆγος* τὸ ἀπὸ τῆς ὕλης, quod humorem attrahat & combibat. Dioscoridi lib. 5. cap. 138. è spongiis alias nonnulli mares appellaverunt, quæ tenuibus sunt fistulis ac spissæ densæve, è quibus rursus duriores *τραγῶς* nominaverunt: alias vero seminas, quæ contrario ac antedicta modo se habent. Et Plinio lib. 9. cap. 45. Spongiarum tria genera accepimus: spissum ac prædurum & asperum, tragosid (ab odore gravi) vocatur: minus spissum & mollius, manon: tenue densumq; ex quo penicilli (sive turundæ sinuosis & cavis ulceribus immituntur) parantur. Hæc sane *ζώοφυτα* καὶ *ζώοδενδρεα* dicuntur, quæ ut habet Plinius l. c. neq; fruticum neq; animalium, sed tertiam quandam ex utroq; naturam habent: ejusmodi, inquit idem, sunt Urticæ & Spongiæ.

I. Spongia globosa, Imper.

II. Spongia compressa, Imper.

III. Spongia compressa magna.

Spongia marina alba & flava, Tab. Ger.

Spongia compressa latissima, Imper.

IV. Spongia hircina, Imper.

V. Spongia velaris, Imper.

VI. Spongia ramosa.

Conservæ marinæ genus, Lob. Lugd.

Corallina Britannica Penæ, Lugd.

an Ifidos plocamon corallio similis Pl. l. 1. c. 24.

VII. Spongia ramosa fistulosa.

VIII. Spon-

VIII. Spongiosus fucus, Imper.  
Hujus diversæ species: una barbæ similis: altera arbusculæ in ramos divisæ: alia instar manus

humanæ: aliæ figuræ turbinatæ instar pini.

IX. Spongia forma infundibuli.  
Spongia elegans, Clus. exot. l. 6. c. 11.

## URTICA MARINA, ET ALIA.

**U**rtica dicta, quod adnota contristentis manum pugnat. Sic Plinius lib. 9. cap. 45. Urtica noctu vagatur, noctuq; mutantur: carnosæ frondis his natura & carne rescuntur: vis pruritum mordax eademq; quæ terrestris urtica, &c. Verum Bellonius, inter pisces molles: Rondeletius, inter animalia imperfecta & quidem genere mollia refert.

Genus duplex Aristotelis 5. hist. 16. At Rondeletio species sex sunt. Plinio lib. 9. c. 43. alterum earum quæ soluta sunt, quas vagari scribit Plinius: alterum earum genus saxi affixum semper hæret.

I. Urtica 5. & 6. Rond. (& ex eo Aldroan. Urtica soluta 1. & 2. Tab.

II. Urtica explicata & contracta, Bello. Italis Cunus marinus: & Tab. de his vide Gesn. Bellon. Rondelet. & Aldroandum, qui formas diversas pingit.

III. Pulmo marinus, Matth. Tab. Aldroan.

IV. Holothuria, Aristot. Plin. Rondel. (qui duas species habet) & Aldroan.

V. Tethya, Aristot. Plin. Rond. Bellon. Gesn. Aldroando, cui sex species.

VI. Mentula marina, Rond. cui duplex est. Genitale marinum, Bellon.

Epipetron Gesneri, cum hac convenire vi-

detur, Aldroan.

VII. Penna marina, Rond. Gesn. quæ Mentula alata piscatoribus, Aldro. cui duplex est.

VIII. Manus marina, Gesn. ex eo Aldroan.

IX. Arantia marina.

X. Malum granatum, Aldro.

XI. Malum insanum marinum, Rond. ex eo Aldroan.

XII. Pyrum marinum, Aldr.

XIII. Cucumer marinum, Plin. Rond. ex eo Aldroan.

XIV. Uva marina, Plin. Rondelet. ex eo Aldroan.

XV. Fungus marinus, Aldroando.



## SECTIO QUINTA. FUNGI ET TUBERA. F U N G I.

**F**ungi Græci *μύκης* dicuntur: de quibus Theophrastus 1. hist. 8. & 9. Fungus pediculum longè majorem. æqualem quam Gladiolus habet & radice penitus caret: & 3. hist. 9. verum & radicibus arboris & juxta radices erumpit: & 4. hist. 8. cum autem aquæ plures inceserint fungi juxta mare rubrum quodam in loco erumpunt, qui Sole tacti in lapidem mutantur. Horum origo Plin. l. 22. c. 23. ex pituita arborum. Nam Fungi sicut & Tubera, neg. plantæ, neg. radices, neg. flores, neg. semina sunt, sed nihil aliud quam terræ, arborum, lignorum putridorum, aliarumq; putrilaginum humiditates superflue: id quod inde colligi potest, quod omnes Fungi & Tubera, maxime ea quæ edendo sunt, à tonitribus & pluvioso cæli statu frequentius nasci solent.

Differentia duplex Dioscor. l. 4. c. 83. aut enim edules sunt, aut exitiosi: hi multis de causis tales evadunt: aut qui juxta clavos rubiginosos, aut pannos putridos, aut serpentum latibula gignuntur, aut arboribus privatim fructibus noxiis ferentibus adnascuntur. Habent vero qui tales sunt intra se lentorem quandam concretum & stringenti modo viscosum, & terra eructi si reponantur, celeriter corrupti computrescunt. At Pl. l. c. Fungorum numerosa genera: tenuissimi qui rubent callo (forte carne) minus diluto rubore quæ boleti: mox candidi, velut apice flammis insignib. pediculis: tertium genus suilli, venenis accommodatissimi. Quidam discernere arborum generibus, fico, ferula (potius betula) & gummi ferentibus: nos item fago, aut robore, aut cupresso: omnium color lividus.

Verum alij ex terra nascuntur: alij veterum arborum caudicibus subinde & eorum ramis (vix enim ullæ arbor senescens in quæ non conspiciantur) adnascuntur: alij saxi, testis stramineis, putridis lignis insident, & quandoq; supra finem reperiuntur. Guilan. com. de pap. *μύκας* & aliorum genus sive Ciema alterum dicit.

## I. Fungus porofus.

Fungorum primum genus, Trag. Lon.

Fungorum præcipuum genus, Gef. col.

Spongiola nonnullis, Dod. Imper. Neapolitanorum, Ponæ.

Fungi, favaginosi, sive Fungi rugosi favis mel-  
lis similes, Lob. belg.

Fungus spongiosus Dalechampij, Lugd.

Fungi rugosi, Cast.

Fungi esculenti primum genus, Clus. hist.

Fungi præcoces, Dod. belg.

Hujus quatuor sunt species: nam primus fungus parvus est, rugosus albicans, quasi fuligine infestus: 2. radicem Aristolochiæ rotundæ ex-  
iccata refert, coloris ex ruffo fusci: 3. duplo  
amplior plerunq; orbicularis: 4. in longitudi-  
nem meræ instar excrefcit.

## II. Fungus apice pyramidali &amp; angusto.

Fungi esculenti alterum genus, Clus.

## III. Fungus in metam fastigiatus albus fusco tinctus.

Fungi esculenti quartum genus, Clus.

Hic triplex est: primus & secundus parvus  
& mediocris, ambo coloris albicantis fusco  
tincti: tertius major magis fuscus, interdum  
notis distinctus.

## IV. Fungus orbicularis ex albidus pratensis.

Fungi esculenti tertium genus, vel S. Georgij, Clus.

## V. Fungus angulosus pediculo exiguo.

Fungi esculenti quintum genus, Clus.

Triplex est: 1. angulosus: 2. magis orbicu-  
laris: 3. major, in tres lacinias divisus: ad ar-  
borum radices.

VI. Fungus radice carens dimidium fun-  
gum & orbem referens.

Fungi peziæ esculenti, Colum.

Ad Fagorum radices Agarici modo crescit.

VII. Fungi umbilicum exprimentes plures  
simul alti.

Fungus in populo alba, Matth.

Populnei *ayapirai*, Dod.

Fungi esculenti sextum genus, Clus.

Ad arborum radices, sola magnitudine diffe-  
rens observatur, ex ætate proveniens.Fungorum sub Populo nascentium, qui Turini  
vocantur, subrubentium, pediculo candido, qui  
in cibus minime probantur, Cæs. auctore.Huc referendi Calucci vulgo dicti apud Portam,  
qui bini aut tres ab uno pediculo prodeunt ve-

lut gallicristæ, acri odore, coma velut villosa.

## VIII. Fungus umbilicum referens variegatus.

Fungi esculenti decimum tertium genus, Clus.

Variat: nam in primo supernè color ex cæru-  
leo, viridi & fusco commixtus conspicitur, in-  
fernè ex albo sublatus: 2. supernè color flave-  
scens veluti fuligine infestus, infernè albus fu-  
scis strijs distinctus: 3. supernè ex albo viridis,  
infernè candicans & striatus: 4. supernè ex pur-  
pureo & saturatè rubro, raris albis maculis no-  
tatus; infernè candicans fuscis strijs aspersis,  
oris dilutè purpurascens: 5. asperior reli-  
quis, supernè coloris ex albo fusci, inferius can-  
dicans, fuscis strijs discurrentibus.

IX. Fungus orbicularis sulcatus albus fusco  
permixto.

Fungi esculenti septimum genus, Clus.

Duplex est: alter tumens, coloris vel albi fu-  
sco permixti, vel maculis quibusdam aspersis:  
alter orbicularis candicans.

## X. Fungus pileolo lato orbiculari candicante.

Fungi orbiculari, vel Fungorum tertium ge-  
nus, Trag.

Fungi boleti, Cord. in Diosc. Lon.

Fungi nemorum, Lob. Belg.

Fungi esculenti octavum genus, Clus.

Triplex est: 1. minor candicans: 2. major  
albicans maculis fuscis & flavescentibus asper-  
sis: 3. amplior adhuc ex fusco subrubens.

XI. Fungus pileolo lato orbiculari flave-  
scente.

Fungi quartum genus, Trag.

Capreolini, Tabern.

Fungi esculenti duodecimum genus, Clus.

## XII. Fungus pileolo lato &amp; rotundo.

Fungi esculenti nonum genus, Clus.

Hujus quatuor sunt differentiæ: 1. supina  
parte candicans, infernè magis fuscus evidenti-  
bus strijs donatus: 2. supernè albicans crassis  
strijs insignitus: 3. supernè in albedine magis  
fuscus, pediculo crassiore nigricante: 4. rufescit  
& pediculo est albo.

## XIII. Fungus pileolo lato &amp; rotundo livido.

Fungi vulgares Amanitæ vel Boleti, Trag.

Fungi, Matth. Lac. Lon. Dod. Cast. Lugd.

Fungi vulgarissimi esculenti, Lob. ico.

Hic ad præcedentem referri potest.

XIV. Fungus pileolo in plano orbiculari  
villosa.

Fungi esculenti decimum genus, Clus.

Duplex

Duplex est: alter colore puniceo dilutior: alter coloris ex rufo fusci.

XV. Fungus pileolo magno plano orbiculato venis exasperato.

Fungi esculenti vigesimum genus, Clus.

Triplex est: 1. supernè dilutè rubens, aut latericei coloris venis exasperatus: infernè pallescens, strijs fuscis insignitus: 2. supernè extuberat, coloris ex albo pallido & fusco mixti: infernè candicans, strijs fuliginosis distinctus: 3. major supernè coloris ex albo, pallido, rufo & fuliginoso mixtis: infernè rubescens, strijs ex atro purpurascentibus notatus.

XVI. Fungus pileolo plano subfusco oris lateris.

Fungi esculenti undecimum genus, Clus.

XVII. Fungus pileolo lato puniceo, lateum & dulcem succum fundens.

Fung. sextus, què aliqui crudum devorat, Trag.

XVIII. Fungus candidus odoratissimus orbe magno.

Fungus Richione, quasi magnum fungorum regem dicas, Portæ.

Esui tam suavis ut crudus edatur & ægris innoxie præbeatur, Eid.

XIX. Fungus latus sanguinei coloris.

Linguae in caudicibus castanearum, Cæs.

An ij quos Plinius scribit rutissimos, qui collo rubent, minus diluto rubore, quam Boleti.

XX. Fungus angulosus & velut in lacinias sectus.

Fungi genus magnum à figura auriculi leporinis, Gesn. coll.

Arborum fungi auriculæ Judæ facie, Lob. belg. Gallinacci, Cæs.

Fungi esculenti decimum quartum genus, vel Fungus leporinus, Clus.

Duplex est: 1. supernè pallidus, flavis maculis variegatus: infernè flavescent, fuscis strijs distinctus: 2. duplo major, supernè flavus: infernè strijs distinctus, croceoq; colore infectus. an Fungus leporinus quem 7. facit Tragus, qui formam interaneorum vituli repræsentat, qui incanus & plumbei coloris.

XXI. Fungus orbicularis oris intrò reflexis. Fungi esculenti genus, sive fuilli, Clus.

Duplex est: 1. utrinq; subalbidus veluti fuligine infectus: at supernè aliquot maculæ albæ aspersuntur: infernè strijs crassis nigricantibus notatur: 2. major cujus pars superior coloris est

purpurei rubro saturno commixti, secundum oras maculis albis aspersis: inferior ex albo fuscus, strijs tenuioribus excurrentibus.

Suillos vulgo porcinos dictos, Boletis crassiores, supernè subfulvos, infernè cinereos, internè candidos, habet Cæs.

XXII. Fungus Augusti mensis.

an Fungus octavum genus, Trag. 6. & 7. gen. Lon.

Fungi esculenti decimum sextum genus, Clus.

Triplex est: 1. superius colore est candicante subfusco, inferius albus strijs carens: pediculus coloris ex cæruleo, viridi & fusco mixti: 2. utrinque ex flavo rubescit: 3. supernè ex fusco rufescit: infernè æqualis albus.

XXIII. Fungus planus orbicularis aureus.

Volva Plinij, Elvela, Ciceroni, Boleti, Ang.

Boleti Cæs.

Fungi esculenti decimum septimum genus, Cl.

Differentia notatur, quæ ratione ætatis contingit: nam cum primum erumpit, ovum candore & figura refert, at alba cute quam volvam vocant, lacerato, paulatim in planam orbicularem formam se explicat: supernè aureus est, infernè flavus, strijs distinctus: hic omnium præstantissimus censetur.

XXIV. Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato.

Fungi esculenti decimum octavum genus, Cl.

an Fung. Neapolitanis Conocielle vocat, Portæ.

an Fungus pratensis, quem quidam Scarogias vocant, Cæs.

XXV. Fung. bulbosus fuscus duplici pileolo.

Fungus quercinus dipsacoides, Col.

XXVI. Fungus lariceus aurei coloris.

Fungus in larice præter Agaricum nascens triginta librarum, aureum per ambitum dissectus, in cibis gratissimus, Matth.

XXVII. Fungus albus acris.

an Fungus piperis sapore, Cord. in Diosc.

Fungus piperitis, quia instar piperis linguam vellicat, Portæ.

XXVIII. Fungus minimus odoratus capitulo donatus cinereus.

Prunuli vulgo, Cæs.

XXIX. Fungus ramosus: & Imper.

Fungi esculenti decimum nonum genus, Clus.

Formæ est ab alijs diversæ, qui in tres species, colore inter se differentes, non nihil etiâ forma, dividi potest: nam parte superna vel flavus, vel dilutè rubescens, vel pallidus albo admixto.

## XXX. Fungus digitatus major.

Digitelli genus spectabili magnitudine, ut unus sufficiat, qui in castaneis reperitur, Cæf.

Plinius forte hunc intellexit, cum inquit, mox candidi veluti apice flaminis insignibus pediculis: quos Galenus Amanitas vocat, secundo loco inter innoxios. Lacinia Hermolao dicitur

## XXXI. Fungus candidus digitatus minor.

Digitelli (vel Fungi 5. genus) Trag. Lon.

Digitelli sive Manninæ vulgo, Cæf.

Hic veluti in parvos digitos fissus est.

XXXII. Fungus maximus Ungaricus; multis lacinijs squammatim incumbentibus.

Fungi esculenti genus 21. monstrosum, Cluf.

Tanta molis, ut ternos, aut quaternos passere possit: sunt qui dicant, nonnunquam tanta amplitudine excrecere, ut bigam facile impleat. Variat colore ex rufo nigricante, vel ex albo nigro, aut multis maculis nigris in albo conspersis notatur. an Gallinacea Neapolitanorum, Portæ: quæ mirabilis formæ & ad eam amplitudinem excrecit, ut brachijs diductis homo vix amplecti possit, pondere sexaginta librarum, ut integro universa familia vesci possit.

## XXXIII. Fungus in faxis proveniens.

Fungi è lapidibus, Matth.

Fungorum postremum genus è saxi, Portæ.

Fungus in lapide fungoso Neapoli, Cam. in Matth. ger. Cæf.

Fungus petrosus, Imper.

Ex hoc fungi toto anno nascuntur, si aqua irrigetur etiam domi asservatus, crecit induratis, Cæf. Præciditur ad esum, alius subnascitur, semperq; novos producit, septem diebus perficitur: sexies anno demeritur: terra dodrante operitur. Asseruntur lapides ex Vesuvio, ex Fageto, ex Partenio, ex Gargano & celsioribus montium partibus, Joh. Bapt. Porta.

## XXXIV. Fungi circa Babyloniam.

Fungi boni saporis, quos etiam crudos Æthiop. comedunt, præter quos nihil aliud circa Babyloniam, quàmvis bona & pinguis terra sit, crecit: part. 3. Ind. Orient. c. 5. sed quales?

Fungi noxij.

I. Fungus membranaceus auriculam referens, sive Sambucinus.

Fungus ad Sambucum, Trag.

Auriculæ Judæ vulgo.

an Fungus auricularis, Imper.

Fungorum perniciosorum 1. genus, Cluf.

II. Fungus putridus arborum ramis inhærens, plurimis simul cohærentibus.

Fungorum noxiorum genus 24. Cluf.

Triplex est: 1. & 2. interdum simplex, interdum plures: ille ruber, hic egregie rubet & floridus est: 3. corpore rugoso, bini, plerunq; terni, elegantiore auri colore præditi.

III. Fungus in caudicibus nascens unguis equini figura.

Fungi igniarij, Trag.

Igniarij vulgo Esca, Cæf.

Hic attritu silicis ignem excipiunt.

IV. Fungus ad cutim extergendam aptus.

Fungi igniarij species, qua in tonstrinis prostrigiliutuntur, Cæf.

Fungus furfures capitis depellens, Imper.

V. Fungus acetabulorum modo cavus radice carens.

Fungi Pezicæ Plinij, Col.

VI. Fungus Hepaticæ saxatilis forma.

Fungi Pezicæ altera species, Col.

An hi duo posteriores perniciosi sint, dubiū sum.

VII. Fungus saliginus lichenis forma variegatus.

Fungorum noxiorum 4. genus, Cluf.

VIII. Fungus ceraforum imbricatim alteri innatus variegatus.

Fungorum noxiorum 5. genus, Cluf.

IX. Fungus pannis laceris similis igneus.

Fungus quem ignem sylvestrem vocant, Cæf.

X. Fungi ex eodem pede sed non conspicuo numerosi.

an Prunuli, Trag.

Fungorum perniciosorum 2. genus, Cluf.

Varij sunt magnitudine & forma, omnes coloris ex albo pallido & fusco commixti: sub pruno nascentes.

XI. Fungus smectarius in plano orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum tertium genus, Cluf.

an Præcolis similis, Cæf.

XII. Fungus pileo infernè subrufo aut nigricante, quem aliqui, nec sine periculo comedunt, Cæf. alp.

XIII. Fungus coryleus orbicularis.

Fungorum noxiorum 6. genus, Cluf.

XIV. Fungus buffonius orbiculatus.

Fungorum noxiorum septimum genus, Cluf.

Triplex est: 1. in metam sublatus albus, fuligine

*fuligine infectus, in summo flavescentis: parte cava fuscus, nigris strijs distinctus: 2. magis orbiculatus, supernè modò fuscus ex albo pallescens, modò flavus fuligine infectus, maculis albis & nigris aspersis, rubetæ colorem refert: internè albus, strijs, subfuscis levibus distinctus: 3. major in plano orbicularis, superius albus, rubore admixto & maculis pallescentibus aspersis: internè pallidus, fuliginosis strijs distinctus.*

XV. Fungus fatuus candidus pileolo in metam allurgente.

Fungorum noxiorum undecimum genus, Clus.

XVI. Fungus betulaceus orbiculatus albus. Fungus ad betulam, Trag.

Fungorum noxiorum octavum genus, Clus.

XVII. Fungus orbicularis ex atro rufescens.

Fungorum noxiorum nonum genus, Clus.

XVIII. Fungus minimus flavescentis infundibuli forma.

Fungorum noxiorum decimum genus, Clus.

XIX. Fungus muscas interficiens.

Fungi muscarij, Trag Cord. in Diosc. Lon. Tab.

Fungorum noxiorum 12. genus, Clus.

Hujus quinque species: 1. orbicularis, cui supernè color vel pallescens, rubedine & fuligine admixtis: vel lividus & fuligine infectus, maculis albicantibus atro permixtis inspersis: internè albus, fuscis strijs variegatus. 2. orbicularis, supernè coloribus ex purpura dilutiore & saturatiore, rufo, pallido & albo variè mixtis: internè pallido, nigris strijs sulcato. 3. ætare variat: emergens Ar. radicem imitatur. coloris lateritij, maculis albicantibus aspersis: adultior, orbicularem figuram acquirit, interdum per latera fissus, coloris prona parte rubri, albis maculis infecti: supina albi, cum strijs levi fuligine infectis. 4. junior, minore est orbe, rubro colore saturo, instar concreti sanguinis tincto, maculis plurimis exalbidis aspersis: adultior multo latior, rubro colore remissiore tinctus & præter exalbidas maculas veluti intercurfantibus undis, distinctus. 5. junior coloris ex rufo fusci & velut fuligine infecti: adultior, larius in metæ formam allurgens, oris valde laceris, coloris supernè ex albo rufo, pallido, fusco mixti & id vel radiatum, vel maculis inspersis: inferiore fuliginosis nigris strijs interfecantibus.

XX. Fungus latus orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum 13. genus, Clus.

XXI. Fungus latus orbicularis oris intus conversis.

Fungorum noxiorum 14. genus, Clus.

Duæ sunt species: magnitudine & supinæ partis colore inter se differentes.

XXII. Fungus pediculo in bulbi formam excrescente.

Fungorum noxiorum 15. genus, Clus.

Duplex est: supernè pallidus, maculis dilutè nigricantibus distinctus & oris deorsum reflexis: internè multis strijs expallido fuscis distinctus: 2. tetri coloris est, radices potius fragmentum, quam fungus videtur, quod utraque manu vix comprehendi potest.

XXIII. Fungus clypeiformis major.

Fungus alter venenatus clypeiformis olidus, Lobel. belg.

Fungus alius clypeiformis perniciosus, Cl. ad.

XXIV. Fungus clypeiformis minor.

Fungorum alterius generis alter, Dod.

Fungus clypeiformis lethalis, Lob. belg.

Fungus perniciosus vulgaris, Clus. ad.

Alij albi, aut cineris fuscisve maculis notati, in cavitate nigri: nunc & plani ut acetabula: nonnulli etiam parvis similes.

XXV. Fungus latus oris laceris.

Fungorum noxiorum 17. genus, Clus.

Duplex est: colore superna parte rufo ad nigredinem tendente in medio flavescente: internè pallido, strijs fuliginosis distincto: 2. colore supernè ex pallescente fuliginosus, venis ex albidis maculosis: pars infima ut & fungi substantia, omnia atra, crassis nigris strijs obscurè apparentibus.

XXVI. Fungus oris laceris & in lacinias divisus.

Fungorum noxiorum 16. genus, Clus.

In hoc triplex differentia occurrit.

XXVII. Fungus parvus, parvi galeri formam exprimens, rufus.

Fungorum noxiorum 18. genus, Clus.

XXVIII. Fungus parvus galericulatus alter flavus.

Fungorum alterius generis primus, Dod.

Fungus parvus lethalis galericulatus, Lob. belg.

Fungus exilis perniciosus vulgaris, Clus. ad.

XXIX. Fungus orbicularis secundum vias & in quercetis Autumnino nascens.

Fungorum noxiorum 19. genus, Clus.

Hujus sex species sunt.

1. Supernè coloris ex flavo, rufo, fuliginoso commixti: internè ex pallido fusci, multis strijs

exarato. 2. amplior est, supernè coloris vel rufi, raris maculis conferti, vel fusci & fuliginosi: inferius pallidi, fuscis maculis aspersis, vel ex fusco omnino pallidi. 3. ex cineraceo fusci coloris, notis quibusdam distincto, lacer & hians. 4. supernè, ex atro rufescens: infernè flavus, maculis parvis aspersis: vel fusco supernè & scissuris quibusdam albis lacero: infernè ex flavo tantum pallescente. 5. supernè tumens & latericei, infernè cinericei coloris, & hic Fungi perniciosi generis 19. species dubia, Clus.

XXX. Fungus tuberis figura.

Fungorum noxiorum 19. species 5. Clus.

Hic ætate variat: junior supernè coloris fusci, infernè rubri saturi & nigricantis, oris flavis: dultior orbicularis, supernè fusci coloris, diluto rubore permixto: infernè ex rubro atro & obscuro: ipsum verò corpus contractum cærulei, virescente intercepti est coloris.

XXXI. Fungus cyclamini radicem colore & forma referens.

Fungorum noxiorum 19. generis species 7. Clus.

XXXII. Fung. omnium ampliss. purpureus.

Fungorum noxiorum 19. generis species 3. Clus.

XXXIII. Fung. crallus in metam surrectus.

Fungorum perniciosorum 20. genus, Clus.

Hic quadruplex est:

1. supernè cineraceus, infernè ex flavo pallens. 2. supernè, vel ex pallido fuscus, vel fuliginosus, infernè ochræ colore. 3. rufus: infernè ochræ colore fuligine perfusa. 4. ex rufo & fuliginoso commixti: infernè subrufo colore multis strijs fuliginosis interfecantibus.

XXXIV. Fungus abietinus oris reflexis substantia rubra.

Fungorum noxiorum 21. genus, Clus.

XXXV. Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntium.

Fungorum noxiorum 22. genus, Clus.

Quadruplex est:

1. seni aut septeni orbiculati sed fornicati flavi, macula nigra distincti. 2. octo aut novem coloris flavi, rufo suffusi: infernè flavi, macula nigra distincti. 3. majore est orbe, quindecim aut pluribus ex eodem pede nascentibus, supernè vel rufi, vel ex rufo dilute albescens: infernè subalbidus, crassis fuscis strijs distincti: quinta species, Clus. 4. turbinato corpore seni aut plures, supernè cineracei ex rufo coloris aut fusci: infernè crassis nigris strijs distincti.

XXXVI. Fungus truncis humi jacentibus innatus, pluribus ex uno pede prodeuntibus. Fungorum noxiorum generis 22. species 3. & 4. Clus.

Hic præcedente multo minor: & duplex: 1. viceni & plures ex eodem pede supernè rufi, infernè fuscis strijs exarati. 2. triceni & plures colore inter se varij, vel flavo rufo perfusi, vel omnino rufi & fusci, infernè nigricantibus strijs notari.

XXXVII. Fungus orbicularis in palustribus. Fungorum noxiorum generis 23. species quatuor, Clus.

1. orbe tumido eleganter rubro infernè albicans fuscis strijs exaratus. 2. paulo amplior, supernè coloris rufi & ad lateritium tendentis: infernè dilutioris & strijs frequentioribus distinctus. 3. coloris ex albo, rufo & fusco variè commixti. 4. orbe est inæquali, supernè ex cineraceo candidans: infernè etiam, sed fuscis strijs ad extrimas oras productis.

XXXVIII. Fungus foetidus penis imaginem referens.

Phallus, Hadr. Junio.

Phallus Baravicus, Lugd.

Phallus Holandicus, Sacyrion trifolium Matthiolo, Ponæ Ital.

Fungus virilis penis arrecti facie, Lob. belg.

Fungus marinus, Dod. belg.

Fungi perniciosi 23. generis species 5. Clus.

XXXIX. Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens.

Fungus minimus *ἀνώνυμος*, Clus.

XL. Fungus ramosus candidus.

Fungorum noxiorum 25. genus, Clus. at figura habetur hist. ap. alt.

XLI. Fungus ramosus coriaceus.

Fungus borfaro, Imper.

Hujus ad ignem concipiendum apud Neapolitanos usus est.

XLII. Fungus rotundus orbicularis.

Fungorum noxiorum generis 26. species 3. Clus.

Fungus ovatus, crepitus lupi, Trag. Lon.

Fungus orbicularis, Dod.

Fungus glomeratæ rotunditatis, Lob. belg.

Lupi crepitus, Cast. Col.

Triplex est magnitudine, nonnihil etiâ forma differens. 1. initio eximij candoris, dein pallescens tanquam fuligine suffunditur, maturus contractus pulverulentum fumum effundit.

Pezizæ



**Pezicæ** Plinij in pratis quem esculentum dicit, Cæs.

**Fungus** vesicarius, alijs ovum lupinum, Imper. Fungorum perniciosi generis 26. species 1. Clus.

2. Capitis pueri magnitudine, cute cineracei coloris textus, quæ lacera substantiam spongiosam fuliginosam ostendit, quæ compressa pulverem effundit.

an **Fungus** villosus, Imper.

3. Sola magnitudine à secunda differt. an **Pezicæ** genus in sylvestris aliquando humani capitis, quod sine periculo esitatur, Cæs.

**XLIII.** **Fungus** rotundus cancellatus. **Fungus** coralloides cancellatus, Clus. hist. ap. alt. auct.

**Fungus** lupi crepitus vulgi efflorescens, Col.

Hunc à priore distinguere non oportet: a quo tamen differt (quem & Clus. & Colum. peculiari figura expressere) quod huic sint radices in fibras divise, & quod per medium disrupto veluti florescens speciosum reticulum, vel marsupium reticulatum rubri coloris emittit.

**XLIV.** **Fungus** niger culicis figuram referens.

**Fungus** semiorbicularis niger, Dod. belg.

*Fungi lapidei.*

I. **Fungus** lapideus major in Nilo natus.

**Fungus** saxeus Nili major, Clus. exot.

II. **Fungus** lapideus minor.

**Fungus** saxeus minor, Clus. exot.

III. **Fungus** lapideus forma bubulæ linguæ, Clus. cur. post.

## AGARICUM FUNGUS.

**A**garicus, sorte ab Agaria nomen sibi adscribit gentiles nam ut Dioscorides, in Sarmatia regione quæ Agaria dicitur, gignitur: vel ab Agaro, quem & urbem & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolomæus: & ut Dioscorides l. 3. c. 1. radix fertur Silphij similis, non tamen densa summa facie veluti Silphium, sed tota rarior: sunt qui planta radicem esse affirmant: alij ut Fungos ex putredine nasci in arborum caudicibus. Plinio l. 16. c. 8. Gallicarum glandifera (imò Larices) maxime arbores Agaricum ferunt: est autem Fungus candidus, odoratus, in summis arboribus nascens, noctu lucens (fabulosum hoc) signum hoc ejus quo in tenebris decerpitur. Et l. 25. c. 9. Agaricum ut Fungus nascitur in arboribus circa Bosphorum colore candido.

Genera sunt duo Diosc. l. c. mas & femina: mas rotundus est & undiq; sui similis: femina præfertur, quæ quidem rectas intrus habet pectinum modo venas & quasi divisuras. At in præfatione l. 6. Agarici nigri lethalem vim habentis meminit. Sic Plin. l. 25. c. 9. mas crispior amariorq;: femina solutior, initio dulcis, mox in amaritudinem transit. Mesues feminam eligit, quia masculus malus sit, præcipue qui longus existit & niger & gravis: debet autem esse album, leve, velociter friabile, porosum & valde rarum: primum dulce, dein amarum & astringens.

I. **Agaricus** sive **Fungus** laricis.

**Agaricus** & **Agaricum**, Matth. Dod. ut: Cord. in Diof. Ang. Tur. Lac Lob. Cast. Cæs. Lugd. Tab.

**Agaricum** larignum, Ad.

**Fungus** hic Abieti, Piceæ sylv. Tædæ & Larici adnascitur, sed solum Larignum intra corpus usurpatur.

II. **Agarico** similis fungus diversarum arbo-

rum caudicibus adhærens.

III. **Agaricus** qui in speluncis montium Helveticarum reperitur.

**Agaricus** saxatilis, vel **Fungus**, petræus Lac lunæ incolis à substantia alba & spumosa, Gesn. in fracto.

Lac lunare, Eid. lib. de fig. lapid. c. 2.

Margæ friabilis genus cuidam, ut idem.

## TUBERA.

**T**ubera, quæ radicibus, ut Galenus voluit, adnumeranda vocantur vel à imbris, & vel à tumore, ab oideō tumeo. Dioscoridi l. 3. c. 175. velor radix est orbiculata sine solijs sive caule, flavescent, vere effoditur, ac seu cruda seu cocta esui apta est. Theophrasto 1. hist. 9. Tubera radice penitus carent. Plinio l. 19. c. 2. Tubera undiq; terra circumdata, nulliq; fibris mixta, aut saltem capillamentis, &c. cortice includuntur, ut plane nec terram esse possimus dicere, nec aliud quam terræ callum.

Genera duo eorum (Plinio l. 2.) barenosa dentibus inimica & altera sincera: distinguuntur & colore rufo nigroq; & intrus candido, &c. Sane Tuberum genera duo sunt, quæ magnitudine & colore differunt: majus & minus: majus cute quidem nigra, sed alteri pulpa candida, alteri pulla (subflava aly notant) subest: minus colore rufo insipidum & gustu injucundum.

I. Tube-

I. Tuberæ, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Dod. Cast. Lugd. Tab. Cæs. Tuqera terræ, Tab. Ger.

II. Tuberæ cervina: & Lob. belg. Fungus cervinus, sive Cervi boletus, Matt. Lon. Fungi cervini Boleti officin. Cord. in Diosc. Boleti cervini orbiculati, Thal.

Sic dicta quia reperiuntur ijs in locis ubi cer-

vi libidinem suam exercent: quamvis Cordus invenerit etiam in præruptissimis montium sylvis, quo ne damæ & rupicapra quidem pervenire possunt, ne dum cervi.

III. Tuberibus similis fructus Indicus. Fructus sub terra nascens, Monardi & Lugd. an Mamci Brasilianorum, apud Lerium par. 3. Ind. Occid. c. 12.



## SECTIO SEXTA.

CARDUUS; CIRSIUM; CNICUS ET ATTRACTILIS; ACARNA; CHAMÆLEON SIVE CARLINA; ACANUS; CARDUUS LACTEUS;

Carduus Sphærocephalus; Carduus totentofus; Acantha sive Branca Ursina; Scolymus sive Cinara; Carduus Spinosissimus; Dyssacus; Eryngium; Carduus Stel-latus; Euphorbium & Anteuphorbium; Tragacantha; Poterium;

Drypis; Amonis sive Resta Bovis.

### C A R D U U S.

**P**lantarum spinosarum divisionem universè à Theophrasto, part. 1. hist. 16. part. 6. hist. 3. & 4. sic expressit. Ἀκανθώδης, id est spinosa sive aculeata alia in totum spinosa, alia non in totum: in totum spinosa, ut Cor-ruda, Scorpius: non in totum spinosa πυλᾶκανθῶδης, id est, quæ folia omni ex parte sic in spinas divisa habent, ut tangenti præter spinas undiq; nihil occurrat, ut acorna, drypis, acanacea. Alia eis ἐν πρὸς ὀφθαλμοῖς καὶ περὶ ὤμων, id est, mucronantur & habent latera angulosè dissecta, ut Smilax, Ilex. Alia eis ἐν πρὸς ὀφθαλμοῖς καὶ περὶ ὤμων, ut Ruscus. Alia sunt ἀκανθώδης ἐν τῶν ἄκρων, καὶ περιωδῆς καὶ στήλης, mucronata & insecta pectinum modo, ut abies, pinus, picea, cedrus, juniperus. Alia περὶ ἄκρων δὲ στήλης ἐν τῶν ἄκρων καὶ πλάγιον, id est, quæ spina folijs adnata, & mucrone pungunt & lateribus, ut ilex phellodrys. Alia περὶ τῶν ἄκρων πύλλον ἔχοντα, id est præter folium minimè spinosum horrentia, ut rhamnus, tribulus, ononis, stæbe. Alia ἐν τῶν πύλλων ἀκανθῶν ἔχοντα καὶ πύλλον ἐπὶ ἀκανθῶν, id est, spinas caulibus enascentes habentia, foliumq; insuper aculeatum, ut capparis Aegyptia: quædam ὀφθαλμῶδης, id est, arrectis spinis muricata, ut smilax quædam παραπολεῖται, id est, uncinatis arcuatisq; spinis armata. At Plinius l. 21. c. 15. sic expressit. Spinosarum multa species: in totum spina est asparagus, scorpio: nullum enim folium habent. Quædam spinosa foliata sunt, ut carduus, eryngium, glycyrrhizon, urtica: ijs enim omnibus folijs inest aculeata mordacitas: Aliqua & secundum spinam habent folium, ut tribulus, ononis, phleas, quod aliqui Stæben appellavere: bipophaës spinis angulosis. Quædam in folio habent & in caule, ut Capparis. Tribulo proprietas, quod & fructum spinosum habet. Hæc Plinio.

Verùm hic non de omnibus spinosis agemus, sed potissimum de Carduis & Acanaceis: de cæteris inter arbores & frutices.

### C A R D U U S.

Quem admodum ἀκανθῶδης καὶ ἀκανθῶς generaliter omnem spinam denotat sic & Ἀκανθώδης Græcorum, Latini Carduum generatim interpretantur. Similiter ἀκανθῶς, etsi herba quædam sit spinosa Theophrasto 6. hist. 1. tamen eadem l. 6. c. 4. sic etiam dicitur illud quod in Carduorum genere, velut malum extuberat. Unde quasi dictus Acanaceus spinam Acini genere est. Sic etiam Theoph. 6. hist. 3. illorum quæ folio constant aculeato genus magna ex parte acanaceum est: acanaceum inquam, quoniam conceptus & id cui flos inhaeret, aut etiam fructus, spina vel spinaceum quidpiam sit.

Carduus in pratis humidis vineis  
& avena.

I. Carduus pratensis latifolius. Carduus pratensis, Trag. Gesl. hor. Ad. Lob. ico. Carduus, limonia forte Theophrasti (conjectura ex natalibus sumpta) Gesl. hor.

Brassica pratensis, Lon. Acanthus sylv. Lugd.

Theophr. 6. hist. 3. λεμονία (Gaza malè Betam sylvestrem vertit) in genere carduorum, aculeatis folijs constat.

II. Carduus pratensis folijs tenuib. laciniatis. Eri-  
Eri-

Eriſithales, Ang. Lugd.

Plin. l. 26. c. 13. Eriſithales eſt flore luteo, folijs acanthi.

III. *Carduus pratensis* Aſphodeli radice latifolius.

Leucacantha, Ang.

*Carduus bulbosus* Monſpelienſium, Ad. Lob. ic.

*Cirſio* quinto congener, Cluſ. hiſt.

Hujus alteram ſpeciem multis ſpinis donatam Lobelius notavit.

IV. *Carduus pratensis* Aſphodeli radice, folijs profundè & tenuiter laciniatis.

Acanthus ſylv. alter Dalechampi, Lugd.

Jacea aculeata ſeu tuberofa, vel 4. Tab.

Jacea tuberofa, Ger.

V. *Carduus pratensis* polycephalus, ſub Carduo 6. in Prodr. deſcriptus.

VI. *Carduus palustris*, in Prodomo ſub 5. deſcriptus.

VII. *Carduus vinearum* repens folio Sonchi. Ceanothus, Theoph. Ang. Lugd. Col.

Theophr. l. 4. hiſtor. 11. Hujusmodi verò eſt etiam ſpina *μυρωδὴ* verum non arundinoſa, neq; geniculata radix hujus.

VIII. *Carduus in avena* proveniens.

*Carduus ſylv. in avena*, Trag.

*Carduus avenarius*, Thal.

*Carduus arvensis*, Tab.

*Carduus muscatus*, Ger.

Alius procerior alius humilior: ſorbus ruſis roſeis, candidis.

*Carduus mollis*.

I. *Carduus mollis* folijs Helenij.

*Carduus montanus* folijs Helenij non ſpinofus, Camer.

*Carduus mollis*, Camerarij, Cluſ. pan. & hiſt.

II. *Carduus mollis* latifolius, lappæ capitulis, qui 1. in Prodomo.

III. *Carduus mollis* lapathi folijs.

*Carduus mollis* vel mollior 2. Cluſ. pan. & hiſt.

IV. *Carduus mollis* folio oblongo *Cirſij* capitulo.

*Carduus mollis* 3. Cluſ. pan. & hiſt.

V. *Carduus mollis* laciniato folio.

*Carduus mollis* primus, Cluſ. pan. & hiſt.

*Carduus mollis* tenuifolius, Cam.

Flos cæruleus, quandoque albus, interdum purpureus.

## CARDUUS CIRSIUM DICTUS.

**K** *ρεῖον*, quòd dolores *μυρωδὴν*, id eſt, varicum ſedet, Dioſcoridi l. 4. c. 119. quod his verbis deſcripſit: caule eſt tenero, duum: ſermè cubitorum, triangulari, ab imo folijs roſæ puſillis circumdato qua quidam angulos habent ex intervallis ſpinofos, ſed molles: folijs bugloſſo ſimilibus, modicè hirsutis, longioribus, ſubcandidis & per extremitates aculeatis: eſt autem pars ſumma caulis rotunda & hirsuta illiq; inſident capitula in ſummo purpurea, qua in pappos ſeu lanugines ſolvuntur. *Cirſion* Plinio l. 27. c. 8. qui eodem ſerè modo deſcripſit.

I. *Cirſium* maximum Aſphodeli radice.

*Cirſium* maximum montanum incano folio, vel 5. Cluſ. pan. & hiſt.

II. *Cirſium* latifſimum.

*Cirſium*, Dod. gal. Lugd.

III. *Cirſium* majus ſingulari capitulo magno.

*Cirſium* majus, Lob.

*Cirſium* tertium, Dod. Cluſ. pan. & hiſt.

an *Cirſium* tertium, Cæſ.

Variat flore, ſtaminibus purpureis aliquando niveis: folijs quæ in eadem planta alia integra ſunt, alia profundius diſſecta.

IV. *Cirſium* majus ſingulari capitulo magno: vel incanum variè diſſectum.

*Cirſium* Anglicum, Lob. Lugd.

V. *Cirſium* ſingulari capitulo ſquammato: vel incanum alterum.

*Cirſium* ſecundum vel Britannicum, Cluſ. pan. ſub Carduo 2. deſcriptum.

Anglicum ſecundum, Eid. hiſt.

VI. *Cirſium* ſingularibus capitulis parvis.

*Cirſium*, Dod. alterum, Ad. Lob. an. & Cæſ.

*Cirſium* tertium & montanum primum, Cluſ. pan. & hiſt.

*Cirſium* aliud Dodonæi, Lugd.

VII. *Cirſium* folijs non hirsutis floribus compactis.

*Cirſium*, Matth. Geſn. hort. Lac. Ad. Lob. Caſt. Lugd. Eyſt.

*Cirſium* ſecundum, Dod. quartum, vel montanum ſecundum, Cluſ. pan. & hiſt.

*Cirſium* agri Piſani, Cæſ.

III. *Cirſium* anguſtifolium non laciniatum.

*Cirſium* Pannonicum primum pratense, Cluſ. pan. & hiſt.

IV. *Cirſium* anguſtifolium, in Prodomo

## CNICUS ET ATRACTILIS.

**K** Nicus & Dioscoridi l. 4. c. 196. Theophr. *uviv* & 1. hist. 12. & *uviv* & 6. hist. 13. 4. Cnicus, Plinio: Latinis, Cnicus & Cnecus. Dicitur autem Cnicus, ἀπὸ τῆς κνίσεως, quod mordere & pungere significat: vel ἀπὸ τῆς κνίσεως, quod pungendo pruriginem excitet, quod de sylvestri rectius, quam de sativo dici potest: an potius à floris colore, cum vultus exponatur croceus rutilus. Dioscorides sic describit: folijs constat oblongis, per ambitum divisis, asperis, aculeatis: caulibus cubitalibus, & in eorum cacumine capitulis olivæ magnitudine, flore croci: semine candido aut ruffo, oblongo, anguloso. Ex his duo Cnici genera tradi colligitur, candidum scilicet & ruffum. Quare Theophr. 6. hist. 4. in sylvestrem, urbanumq; divisit. Sic enim sparsim de Cnico inquit: fructum aculeatum ac veluti retorridum fert: florem unà cum staminibus ipsis edit: folijs aculeatis inter Acanthaceæ excipitur, unà cum Struthio & Soncho: quamvis enim natura spinosa sint, seminis tamen conceptum non spinosum habent: multis caulibus constat & ramos fundit: sylvestri urbanoq; discernitur: sylvestris genera duo notantur: alterum urbano admodum simile, recti caulibus tamen: quamobrem ex eo mulierum priscarum nonnulla colo utebantur: fructum nigrum, majusculum amarumq; parit. Verum Dioscorides, per Cnicum ruffum videtur intelligere genus syl. quod ex foliorum descriptione significatur, quod sortè apud Theophrast. etiam Atractylis vocatur. Sic dum Theophr. dicit seminis conceptum non spinosum habere, de urbano intelligendus videtur, & hoc ex Plinio l. 21. c. 15. colligitur. Cnici, inquit, differentia prima sylvestris & sativæ: sylvestriam duas species: una mitior est simili caule, tamen rigido: itaq; & colu antiquæ mulieres utebantur, ex illis, quare quidam Atractylida vocant: semen ejus candidum & grande, amarum (quibus verbis Plinius potius domesticum quam sylvestre demonstrat, & quia mitius, & quia semen candidum.) Altera hirsutior, porosiore caule. & qui pene humi serpat, minuto semine: aculeatarum generis hæc est. Dicitur hodie Carthamum, voce à Mauritaniis mutuata, qui Katten vocant. vel ἀπὸ τῆς καθαίρεως quod est purgare: & Mesues, domesticum & sylvestre fecit.

Atractylidis dicitur, quoniam eo ἀτράκτις, id est, fusi antiquitus conficiebantur. Dioscoridi l. 3. c. 107. spina est Cnico similis sed quæ in summis virgultis folia multo longiora proferat: major autem pars nuda est & aspera, qua etiam famina pro colu utuntur: capitula etiam geri in cacumine aculeata, floremq; pallidum: radix tenuis est & supervæna. Theophr. 6. hist. 3. & 4. Atractylis (salsum agrestem Gaza vertit) spinosa est, & Cnico Acanthaq; candidior est: habetq; peculiare quod in folijs evenit, deceptæ enim carnig; allata succum sanguineum effundunt qua de causa φόνος, id est, cruor, à quibusdam spina hæc est nominata, &c. Et 9. hist. 1. succus sanguineus est spinæ quam Atractylum vocant. At Plinio l. 21. c. 15. Atractylis idem est quod Cnicus mitior: & c. 16. Atractylis sanguineum succum fundit, qua de causa phonos vocatur à quibusdam: & c. 21. Cnicus sive Atractylis, & c. ubi Dalechampsius censet, Plinium & hoc & c. 15. ineptè cum Cnico Atractylidem confundere.

I. Cnicus sativus, sive Cartharum officinarum.

Cnicus urbana & sativa, Theophr. & Plinij.  
Carramus, Brunf. Trag. Fuch. Lon. flore croceo, Camer.

Cnicus, Matth. Dod. ut: Lac. Ad. Cast. sativus, Cæs. (cui & Crocus Sarracenicus) Eyft.

Cnicus sive Crocus sylv. Ang.

Cnecus, Tur. vel Cnicus, Gef. hor.

Cnicus sativus, Theophr. Cord. in Diosc. & hist. Lob. Lugd.

Cnicus vulgaris, Clus. hist.

Flore est croceo, rarius albedo.

II. Cnicus cæruleus asperior.

Cnicus alter, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cnicus flore cæruleo, Lobel. Eyft. cæruleus, Tabern.

Carthamum sive Cnicus flore cæruleo, Cam.

Carchamus sive Cnicus, Ger.

III. Cnicus purpureus folijs non spinosis.

Atractylis purpurea, Cæs.

IV. Cnicus sylv. hirsutior, sive Carduus benedictus.

Carduus benedictus, Brunf. desc. Trag. (cui & Acanthus Germanicus) Matt. Lac. Gef. hor. Ad.

Lob. Lugd. Cast. Tab. Cam. Ger. Eyft.

Atractylis hirsutior, Fuch. Dod. gal.

Atractylis sive Cnicus sylv. 2. Ang.

Acanthium, Cord. in Diosc. Lon.

Cnicus sylv. alter Theophrasti, Cord. in Diosc.

Fracast. Cæs. Lugd. Cam.

Cnicus supinus, Cord. hist.

Cnicus vel Atractylis sylv. Gef. hort.

Carduus benedictus & Atractylis altera species, Dodon.

Carduus sanctus, Atractylis Dioscoridis, Cæs.

V. Cnicus sylv. spinosior.

Carduus & Dipfacus minor, Brunf.

Atractylis

Atractylis sive Cartamus sylv. Trag.  
 Carduus vulgaris, Matth. Lugd.  
 Atractylis vulgaris mitior, Fuch.  
 Carlina sylv. Dod. ut: vulgaris, Clus. hist.  
 Colus rustica, Cord. in Diosc. Gesn. hort.  
 Cnicus sylv. t. Theoph. Atractylis Diosc. Cord.  
 in Diosc.  
 Atractylis media, Gesn. hort.  
 Cirsium luteum Sequanorum, Lob.  
 Carduus vulgarissimus viarum, Eid.  
 Cartamus sylvestris, Lon. Cæs. cui & Cnicum  
 ruffum Dioscoridis.  
 Cnicus sylv. prior, Lugd. Atractylis, Eidem.  
 Atractylis, sive Cnicus sylv. procerior, Thal.  
 Carduus sylv. & Scolymus Plinij, Dodon. qui  
 flosculos purpureos tribuit.  
 Acarna, Lugd. quoad z. ico.  
 Carduus & Scolymus sylv. Cam. ep.  
 Hecacantha, Tab. Eyft.  
 Carlina sylv. major, Ger.

an Acarna Theophrasti, Acorna Plinij, Col.  
 Vulgaris procerior est: altera quæ rarior &  
 pumila locis montanis reperitur.  
 VI. Cnicus sylv. spinosior polycephalos.  
 VII. Carduus monstrosus figura Cornu-  
 piæ, Imper.

## Atractylis.

I. Atractylis lutea.  
 Atractylis, Matth. Dod. ut: Lac. Adv. Lob. Cast.  
 Cam. Tab. Ger. vulgaris, Ang.  
 Atractylis quorundam, Lugd.  
 Atractylis Theophrasti & Dioscor. sanguineo  
 succo, Col.  
 II. Atractylis purpurea.  
 Atractylis cypria, Ang. Lugd.  
 Atractylis flore purpurco, Dod. Adv. Lugd.  
 Hæc aliquando non pubescit: at Cretica  
 valde lanuginosa est.  
 III. Atractylidi & Cnico sylvestri similis.  
 Calochiorni, Belli ep. s. ad Clus.

## ACARNA SIVE ACORNA.

**A**κάρνα Theophrasto 6. hist. 4. aspectu Cnico urbano similis est, colore flavicans, succo pinguis. Et Plinio  
 l. 21. c. 16. Acorna colore tantum ruffo distinguitur (scilicet à Scolymo) & pinguiore succo.

I. Acarna flore luteo parulo.  
 Eryngium Archigenis, Ang.  
 Carlina sylv. minor, Dod. Ger.  
 Carlina sylv. minor Hispanica, Clus. hisp. & hist.  
 Acarnæ sive Sequanorum Cirsij, Carlinæve  
 varietas, Lob.  
 Acarnæ similis Carlina sylv. minor, Lugd.  
 Acorna, Cæs.  
 Carlina sylvestris, Tab.  
 II. Acarna flore purpurorubente parulo.  
 Acanthioides parva Apula, Col.  
 III. Acarna capitulis parvis luteis in umbella.  
 Acarna sive Acorna altera Apula, Col.  
 IV. Acarna capitulis globosis.  
 Carlinæ sylv. aliud genus, Clus. cur. post.  
 V. Acarna humilis caule folioso.

Picnomos Creticæ Salonenfis Galloprovinciæ.  
 Adv. Lob. Lugd.  
 Chamæleon niger, Tab. Ger.  
 Eandem suspicor cum sequente  
 Acarna Valerandi altera, Lob. Lugd. Tab. Ger.  
 VI. Acarna major caule folioso.  
 Chamæleon niger Salmaticensis, Clus. hisp. &  
 hist. Dod. Ger.  
 Chamæleon Salmaticensis, Lob. Lugd.  
 Chamæleon Hispanicus, Tab.  
 VII. Acarna major caule non folioso.  
 Acarna Theophrasti, Ang. Lob. Lugd. Tab. Ger.  
 VIII. Acarna minor caule non folioso.  
 Leo, Carduus ferox, Dod.  
 Phoenix, Leo, Carduus ferox, Lob.  
 Carduus ferox, Lugd. Tab. Ger.

## CHAMÆLEON SIVE CARLINA.

**X**αμῑλέων à foliorum varietate dicitur, Dioscoride & Plinio testibus: at ille de nigro, hic verò de utroque  
 testatur: eo quod cū terra colorē mutet: hic enim viridia, illic albicantia, alicubi carulea, nonnusquam  
 rubra inveniuntur, Dioscoridi: at Plinio hic niger, illic viridis, aliubi cyanens, aliubi croceus atq; alijs coloribus.

Duplex est Dioscoridi l. 3. c. 10. & 11. albus & niger, albus ideo ἰσῑν dicitur, quod quibusdam locis viscum ad  
 ipsius radices inveniatur: At Plinio l. 22. c. 18. Chamæleonem ixiam vocant (de utroque intelligens) duo genera  
 ejus, candidior, &c. & sub alis foliorum gigni asserit, quo mulieres etiam pro mastiche utuntur, utroq; monente.  
 At Guiland. Chamæleonem & Ixiam Dioscoridis lib. 6. qui inter venena recenset, plantas diversas facit.

Et Theophrasto 9. hist. 13. una candida, altera nigra : Vernilaginem Gaza reddit. Dioscoridi albus caulem non promit, verum ex medio spinam echino marino aut cinara similem erigit, floribus purpurascens & Plinio scribit in terra echini modo spinas erigens : Et Theophrasto, capite est magno Acano simili, unde quidam Acanum vocarunt. At niger caulem habet dodrantalem, qui umbellam gerit, floribus spinosis tenuibus, hyacinthi amulis & versicoloribus. Verum Plinio duplex est : ex nigris, scribit, aliqui marem dixere cui flos purpureus esset, & seminam cui violaceus & una nascuntur cubitali, &c. Carlina vulgo quasi Carolina, quod credatur hanc herbam Carolo magno ab Angelo demonstratam fuisse, tanquam certissimum remedium ad pestem ab exercitu suo propulsandam.

I. Carlina acaulos magno flore.  
 Ebermurgy id est apri radix, Brunf.  
 Carduus panis seu pacis, Ericio Cord.  
 Chamæleon albus, Matth. Cord. in Diosc. Lac.  
 Cast. Lugd.  
 Exine Theophrasti, Ang.  
 Helxine Pliniana, Eid.  
 Spina arabica, Dod. gal.  
 Cardopatum caule nullo, Gesn. hort.  
 Carlina herbariorum, Adv. Lob. ob.  
 Chamæleon albus Dioscoridis, Guil. pap. Lob.  
 ico. Clus. hist.  
 Carlina humilis (vel altera) Dod. Col.  
 Carlina vulgo, Cæf.  
 Carlina sessili flore, Cam.

Flore est albo : est & purpureo.

II. Carlina caulescens magno flore.  
 Chamæleon niger vulgaris, Trag. Eyf.  
 Chamæleon niger alter, Matth. Lugd.  
 Chamæleon, Lon. niger, Lac.  
 Chamæleon albus, Fuch.  
 Leucacantha, Dod. gal.  
 Cardopatum flore albo caulem habens, Gesn. hort.  
 Carlina sive Leucacantha, Dod.  
 Chamæleon albus caule donatus, Lob.  
 Crocodilium, Carlina caulem habens, Lugd.  
 Carlina major, Clus. pan. elatior, Eid. hist.  
 Carlinae alterum genus, Cæf.  
 Carlina caulescens, Cam. ep. & hort.

Carlina vulgaris caulem emittens, Col.

Flos albicans, rarissimè rubens.

Hanc aliqui à priore nihil differre censent, nisi quod caulem proferat : alij negant : certe priori congener est.

III. Carlina acaulis gummifera.

Chamæleon albus gummi, ut mastix ferens, Belli ep. i. ad Clus.

Chamæleon albus Apulus purpureo flore gummi fer, Col.

IV. Carlina acaulos minore purpureo flore.

Chamæleon albus seu exiguus, Trag.

Chamæleon parvus, Lon. exiguus, Lugd.

Carduus acaulis septentrionalium & Chamæleon albus Cordi, Lob.

Carlina minor purpureo flore, Clus. hist.

Chamæleon Septentrionalium exiguus appellatus, Col.

V. Carlina polycephalos alba : ad bicubitalem altitudinem excrescit, cujus folia superiora candida sunt : apud Helvetios in pascuis provenit.

VI. Chamæleon niger umbellatus flore cæruleo hyacinthino.

Chamæleon niger, Matth. Cast. Lugd.

Chamæleon niger Dioscoridis, Ang. Maranthæ, Adv. Lob. Cam. Col.

Chamæleon niger Cortusi, Dod. verus Dalechamp. Lugd.

Crocodilion, Tab.

## A C A N U S.

**D**E Acano apud antiquos pauca reperiuntur, fortasse quia vulgarissima planta, omnibusq; cognita. Notas describere superfluum visum fuit : à qua reliqua spinarum genera Acanacea nuncupata. Apud Theophrastum 1. hist. 6. Ἀκανὺς inter ποικιλονόμα recensetur : & 6. hist. 1. alia folijs aculeatis constant, ut ἄκανα, ἔριγγον, ὠνά, &c. Guiland. in pap. Ixina à Theophr. aliter Acanus vocatur : quam vocem ἰγύλω Carduum pineam Gaza exposuit. Plinius lib. 22. cap. 9. Sunt qui Acanon Eryngio ascribant, spinosam brevemq; ac latam herbam, spinisq; latioribus.

Carduus latifolius echinos obsoletæ purpureæ ferens.

Acanus, Anguil. Lugdun.

Agavanus Cretensium, fortè Acanus Theophrasti, Honor. Belli epistol. 5. ad Clus. & Ponæ Ital.



## SILYBUM SIVE CARDUUS LACTEUS.

Σινυβον Dioscoridi lib. 4. cap. 159. spina est lata folijs Chamæleonti albo similis. Plinio lib. 22. cap. 22. Silybum Chamæleonti albo simile aque spinosum.

I. Carduus albis maculis notatus vulgaris.  
Carduus albus & Chamæleon, Brunf.  
Carduus Mariæ, Trag. Fuch. ico. Gefn. hor. Lon.  
Cast. Ger. vulgaris, Cam.  
Carduus lacteus, Matth. Lugd.  
Spina alba, Dod. gal. Lac. hortensis, Fuch.  
Silybum, Ang. Adv. Lob.  
Carduus Marianus, Cord. in Diosc. Tab.  
Leucacantha, Lac. Cornaro.

Carduus leucographus, Dod.  
Leucographis Plinij, Lugd.  
Cardui sylv. aliud genus & Acanon Theophrasti, Cæsalp.

II. Carduus albis maculis notatus exoticus.  
Carduus lacteus Syriacus, Cam.  
Carduus lacteus vel Bedeguar Arabum, Ravvolff.  
Aga Crerenfium nomine, semen accepimus.

## CARDUUS SPHÆROCEPHALUS.

I. Carduus Sphærocephalus latifolius vulgaris.  
Chamæleon verus, Trag. niger, Fuch.  
Spina alba altera, Matth. (at in prima edit. & ep.  
Spina alba) Spina alba putata, Cam. ep.  
Spina incognita, Fuch. ico.  
Spina peregrina, Dod. gal.  
Carduus Sphærocephalus, Cord. hist. Dodon.  
Tab. Eyf.  
Echinopus, Gefn. hort.  
Crocodilium, Lac. Adv. Lob. ob.  
Ritro five Rutro Theoph. Lob. ico.  
Chalceios, Lugd.  
Terralix spinosa, Lugd.  
Silybum, Lugd. de f.  
Spina alba: item Arabica, Lugd.  
Ruthrum alterum, Eid.  
Sphærocephalus annuus, Cam.  
Carduus globosus, Ger.

Fructu est pilæ modo rotundo, flore candido vel cæruleo, vel staminibus in medio cæruleis.  
Κρονοδύλιον Dioscoridi lib. 3. c. 12. Chamæleontis nigri figuram habet: nascitur in sylvis, radice longa, levi, aliquantulum lata, odore ut nasturtij acri. Idem Plinio l. 27. c. 8. qui radicem scribit longam, æqualiter crassam, odoris asperi.  
Χάλας (Ærariam Gaza vertit) apud Theophrastum & Plinium esse volunt, cum tamen ejus historia apud neutrum extet: Sic Theoph. 6. hist. 3. inter natura spinosas Chalceios, quæ tamen non aculeatis folijs constat: Et Plinius l. 21. c. 16. Item acarna, leucacanthos, chalceos &c. in folijs non habent aculeos.

Τετραλὶς (quam cum reliquis aculeatis plantis

enumerat Theoph. 6. hist. 3.) inquit, à quibusdam vocata æstate floret: Et Plinius l. 21. c. 16. quædam æstate florent ut Terralix. Sed non est confundenda cum Erica, quam Athenienses Tetralicen vocant, eodem l. 11. c. 16. authore.  
Ἀνθελεσσὺν five Spina alba, folia fert Chamæleontis albi, sed angustiora & candidiora, aliquantulum hirsuta & aculeata: caulis bicubitalis candicans, &c. in cacumine capitulum spinosum, echini marini æmulum, at minus & oblongum: flores purpurei, in quibus semen seu Cnici, sed rotundius. Dioscorides lib. 3. c. 14. & Plinius l. 25. c. 12. cui Spina alba dicitur.

Ἀναβλά ἀραβίαν, Spina Arabica, natura spinæ albæ similis esse creditur, Diosc. l. 3. c. 15. & Plinius l. 25. c. 12. Spinæ Arabicæ vires recenset.  
Ἰβύς: Theophrastus 6. hist. 3. hæc solum habet: alia superne cacumine tantum ramos spargunt, quemadmodum Ruthrum. Sunt tamen qui velint mendose pro Ἰβύδι apud Theophrastum legi, quod ex Pliniana l. 21. c. 16. loci illius Theophrasti interpretatione colligitur, cum ibi non Ruthrum sed Eryngium legatur.

Hæc lubuit aspergere cum huic & sequentibus, hæc nomina à quibusdam tribuantur: at verborum brevitatis obstat quo minus certi quid statui possit.

II. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor.  
an Ritrum five Rutrum Theoph. Ang.  
Ritro floribus cæruleis, Adv. Lob.  
Carduus sphærocephalus, Dod. Lugd.  
Crocodilium Monspeliensium Dalech. Lugd.  
Ruthrum Theophrasti, Eid.  
Spina alba putata flore cæruleo, Cam. ep.



III. Carduus sphærocephalus capitulo longis spinis armato.

Spina alba, Ang. Adv. Lob.

Cardus sphærocephalus acutus, Dod. Lugd. an Sphærocephalus maximus, Cam.

Hujus major & minor species sive 2. & 3. Dodon. & Lugd.

IV. Carduus sphærocephalus minimus acutissimis folijs.

Carduus Sphærocephalus 4. Dod. Lugd.

V. Carduus capite rotundo tomentoso.

Carduus eriocephalus, Dod. Clus. pan. & hist. Cam. Lugd. desc.

Carduus tomentosus & corona fratrum, Lob.

Acanthium montanum Dalech. Lugd.

Jacea lutea, Clusij, Lugd. ico.

Onopordon, Lugd.

Spina alba, Cæs.

Flore est purpureo, interdum albo.

Onopordon Plinius lib. 27. cap. 12. si comederint asini, crepitus reddere dicunt: de hoc idem testatur Dalechampi.

## CARDUUS TOMENTOSUS CAPITULO LATIORE.

I. Carduus tomentosus capitulo majore.

an Spina Arabica, Ang.

Carduus tomentosus, Adv. Lob. ico.

Spina Arabica Dioscoridis & Plinij, Matthiolum emend. & Cæs.

II. Carduus tomentosus capitulo minore.

Spina alba, Matth. Cast. altera, Matth. Lugd.

Carduus sphærocephalus quintus, Dod.

Spina alba altera, Cæs.

Hujus folia aliquando maculis albis notantur.

III. Carduus tomentosus capitulis minimè aculeatis.

Carduus aræophyllos Dalechampi, Lugd.

IV. Carduus tomentosus capitulis echinatis. Leucacantha Monspelienis Dalech. Lugd.

## ACANTHION.

**A** *Καρίων* Dioscoridi l. 3. c. 18. folia gerit spina alba similia, in summo verò eminentias aculeatas araneosa lanugine obductas, è qua collecta texta q̄ vestes bombycinis similes fieri ajunt. Plinius l. 25. c. 12. Spina alba similis est spina illa, quam Græci Acanthion vocant, minoribus multo folijs, aculeatis per extremitates, & araneosa lanugine obductis, quæ collecta etiam vestes bombycinis similes fiunt in Oriente.

Carduus tomentosus latifolius.

I. Spina alba tomentosa latifolia sylvestris.

Spina alba 3. Trag.

Spina alba sylv. Fuch Lon.

Acanthium, Matth. Dod. ut: Ad. Lob. Cast. Cam.

Lugd. qui Matth. & Fuch. figuram exhibet.

Onopordon Athenæi, Ang. Gesn. hort.

Onogyros Nicandri, Eidem.

Acanthium vulgare, Tabern. flore albo & flore purpureo.

Acanthium album, Ger.

Silybum sive Leucacantha Loniceri, Lugd. ico.

Carduus sylvestris, Cæs.

Floribus communiter purpureis, aliquando albis: hinc duæ figuræ apud Tabernæmont. & Gerardum.

Hæc duplex: altera folijs latioribus densa lanugine: altera angustioribus, tenuiore lanugine obsitis, & in hac capitula majora & innocentioribus spinis horrentia: hinc apud Dodonæum figuræ duæ, altera Lobelij, altera Fuchij.

II. Spina tomentosa altera spinosior.

Acanos forte Bellonij.

Onopordon, Dod. Cam. Tab. cui 1. & 2.

Acanthium Illyricum, Adv. Lob.

Onopyxus 3. Dalechampi, Lugd.

Carduus viarum, & Card. viarum fl. albo, Ger.

Acanthium sylv. flore albo, Eyf.

Floris color ut prior variat: hinc duæ figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum.

III. Acanthium peregrinum, Tab. quid? Solstitialis lutea peregrina, Ger.

## ACANTHA SIVE BRANCA URSINA.

**A** *Κανθα ἢ ἐπιδανθα* (quasi serpens spina) Dioscoridi l. 3. c. 19. folia habet lactuceis latiora multò & longiora, eruce divisura, nigricantia, pingua ac levia: caulem levem, binum cubitorum, digitali crassitudine, propè verticem ex intervallis foliolis quibusdam cœn alveolis circumdatum oblongis hyacinthinis, è quibus

quibus flos prodit albus: semen oblongum ac luteum: caput verò thyrsi specie: radices subjacent viscosa, mucosa, ruffa ac longa. Plin. l. 22. c. 22. Acanthos est topiaria & urbana herba, elato longoq; folio crepidines marginum adfurgentiumq; pulvinorum toros vestiens. An hac sit Acantha apud Theoph. 4. hi. 11. inter herbas, quam Gaza Spinam vertit, de qua inquit: pari modo & spina quæ Ceanothos (ἀκανθὴ καὶ νωδὸς) appellatur, ut Cyperus germinat: verum hujus radix non harundinosa neq; gemiculata est: & utrum ea qua pro Acantho exhibetur, sit Dioscoridis Acanthus aliqui dubitant, qua de re suo loco.

Genera duo sunt, est sativa & sylvestris: de hac Dioscorides l. 3. c. 20. est & sylvestris Acantha, carduo similis, aculeata. brevior sativa: & Plinius l. c. duo genera ejus sunt, aculeatum & crispum, quod brevius: alterum laxe, quod aliqui Paderota vocant, alij Melanphyllum.

I. Acanthus sativus vel mollis Vergilij.

Acanthus, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Cast.

Cæs. lævis, Eyf.

Acanthus verus, Trag. (cui & Branca ursina Italica vera) Fuch. Cam.

Acanth. sativ. Dod. ut: Ges. h. Ad. Lob. Lug. Tab.

Branca ursina Italorum, Guil. epist.

Et plantæ succo glutinoso & quasi mucoso quidam gummi Tragacanthæ æmulum faciunt.

II. Acanthus aculeatus.

Acanthus sylvestris, Dodon. spinosus, Eyf.

Acanth. syl. Scolymo similis aculeat<sup>9</sup>, Diosc. Lob.

Chamæleonta Monspeliensium, Lob. ico.

Branca ursina aculeata, Lugd.

### SCOLYMUS SIVE CINARA.

Σκόλυμος Dioscoridi l. 3. c. 16. folia habet Chamæleonis & Leucacantha, at nigriora & crassiora: canlem edit longum, folijs oblitum, in quo capitulum est spinosum: radix crassa nigra. Plinio l. 19. c. 7. Carduus dicitur, ubi & maximus quæstus esse testatur, & ferendi modum describit. Ἀγρίων, Tralliano: Κύναρα, Galeno de alimentis: Cinara (a cinere quo stercoreari amat) Columella & Palladio.

Genera: sativus est qui folijs est spinosis & non spinosis: est & sylvestris, qui videtur esse apud Theophr. 6. hist. 4. Κύνῃς nuncupatus. Cactos, inquit, statim a radice caules repentes in terram mittit, folio lato atq; spinoso: caules hos Cactos appellant, desquamati cibidonei sunt fructus in quo semen spinata specie est, &c. Et Plinio l. 21. c. 16. Cactos in Sicilia tantum crescit, sua proprietate & ipsa, cujus in terra serpunt caules a radice emissi, lato folio & spinoso: caules vocant cactos, &c.

I. Cinara hortensis folijs non aculeatis.

Cardui alterum genus, Trag.

Carduus non aculeatus, Matth.

Cinara, Dod. gal. Lacun. Eyf.

Scolymus non aculeatus, Ang. Tab.

Carduus hortensis, Ges. hort.

Carduus aut Scolymus non aculeatus, Lon.

Cinara non aculeata, Matthioli & Dod. Lugd.

Carduus sativus, Ges.

Cinara seu Artischochi vulgarior, Eyf.

Carduus hortensis non spinosus, Cast.

II. Cinara hortensis aculeata.

Scolymus, Trag. Fuch. Cord. ut: Ges. hort. Ad. Lobel.

Carduus hortensis folijs spinosis, Ges. hor. Cast.

Cynaræ aliud genus, Dod. gal.

Carduus, Lac. Tur. sive Scolymus, Lon.

Carduus altilis, Lugd.

Scolymus Dioscoridis, Clus. hist.

Utamq; qui eandem fecerit non repugnabimus: quia folijs est aliquando aculeatis, aliquando mitibus: Sic caput nonnunquam in gracilescientem metam erigitur: nonnunquam in compreiorem & rotundiorum globum extuberrat,

laminis interdum sponte sese recludentibus, interdum arctius compactis: capitum squamæ nunc virides, nunc pallentes, nunc subrubentes in aculeum delincentes, nunc brevem nunc robustum, nunc infirmum, cumq; in alijs sursum erectum in alijs deorsum inclinatum, nunc prope nullum. Est quædam capite maximo, quæ dicitur & pingitur sub

III. Cinara maxima Anglica, Lob. ico. Ger. Scolymo majore, Taber.

Scolymus seu Cinara maxima, Eyf.

Additur in horto Eyf. tetrensi

Cinara major Boloniensis quod è Polonia allatum, folijs est minus aculeatis. Item

Cinara Genuensium, squamis circa latera inæqualibus & aculeo infirmo.

IV. Cinara spinosa cujus pediculi estantur.

Carduus aculeatus, Matth.

Cinara spinosissima, Scolymus Dioscoridis, &

Cactos Theophrasti, Ang.

Cactos Matthioli, Lugd.

Cardones, Cæs. alp.

Scolymus aculeatus, Tabern.

Carduus hortensis, quem Cardum vulgo, Cam.

Folio-

Foliorum pediculi terra obruti candidi, à cute emundati, hyeme crudi cum sale & pipere in cibos veniunt: & licet capitulis sint spinosissimis, longissimis aculeis armatis & vix velsis; colitur tamen, ut stolones teneri gulę arrideant.

V. *Cinara sylvestris latifolia.*

*Scolymus sylvestris*, Ad. Lob.

*Scolymus Dioscoridis*, Lugd.

VI. *Cinara sylv. Cretica.*

*Agriocinari*, Belli ep. 2. ad Clus.

*Agrioancinara Cretica*, Ponæ Ital.

an *Cynara sylv. Bœtica*, Clus. cur. post.

*Echini* licet spinosissimi antequam aperiantur & crudi & elixi esitantur.

## CARDUI ALIQUOT EXOTICI.

I. *Melocactus Indiæ occidentalis.*

*Echinomelocactus*, Ad. Lob. ico. Clus. ex. lib. 4. cap. 24.

*Melocarduus echinatus* Penæ, Lugd. Tab. Ger.

*Melocactus*, Eyst.

Ex melone, pepone & carduo coaluisse videtur.

II. *Carduus Guyavenfis.*

*Spina ex Guyava ex cardui capite detracta*, Clus. exot. l. 2. c. 6.

III. *Carduus spinosissimus brachiatis ex Hispaniola.*

*Pithaja*, Card. de variet. Ges. hort.

*Carduus pithaya* Oviedi, Lugd.

Hujus fructus esitatus, urinas sanguini similis non secus quam *Ficus Indiæ* fructus causat.

IV. *Carduus Insulæ Madagascar.*

*Cardui* cujusdam elegantissimi caput sub fructu 15. Clus. exot. l. 2. c. 15.

V. *Carduus Brasilianus folijs Aloës.*

*Nanas Theveti*, Lugd. Clus. Garz. & par. 3. Americ. epist. 1. de Brasil.

*Strobilus sive nux pinea*, Monardi.

*Ananas Acoftæ*, Lugd. ap. Cast. & par. 4. Ind. Or. cap. 5. fig. 14.

*Ananas*, *Ananafa*: *Brasilianis*, *Nana*: *Hispaniola*, *Jajama*: *Hispanis*, *Pinas*, cujus duo genera, mas & fœmina, par. 6. Ind. Or. c. 38.

*Pinæ nuces* in America, Joseph. Acoftæ lib. 4. cap. 19.

*Pinæ* in arbusculis, Benzoni lib. 1. c. 28. vel par. 4. Ind. Occid.

*Ananas optimus Americæ fructus*, qui *Panacous Brasilianis*, Lerio cap. 12.

*Aizoi majoris ortu* per similes exotica planta, Lob. icon.

*Aberas* nomine fructus *Francofurti* venalis fuit.

Species hujus tres secundum Oviedum: prior *Jajama*: altera *Bonjama*: tertia *Jajagua* dicitur.

VI. *Carduus Brasilianus sylvestris.*

*Ananas sylvestris*, Acoftæ, Lugd. Cast.

VII. *Carduo Ananæ similis.*

*Hoyniri*, Theveto.

## SCOLYMUS THEOPHRASTI.

**Σ**κόλυμος Theophrasto 6. histor. 4. (*Carduus à Gaz avertitur*) sive *Limonia* inter *Acanacea*, folijs constat aculeatis: pulchre diu floret, &c. radix lacteum succum emittit: floris quoq; proventus peculiaris videtur: etenim circa solstitium incipit: carnosam ciboq; idoneam partem crassescens sortitur: ortus autem ejus non spinosus, sed oblongus fieri assolet, &c. Plinio lib. 21. cap. 16. *Scolymus* floret sero & diu, *Carduorum* generis, ab ijs distat, quod radix ejus vascendo est, decocta: mirumq; quod sine intervallo tota æstate aliud floret in eo genere, aliud concipit.

*Scolymus chrysanthemus.*

*Eryngium Vegetij*, Ang. Cam.

*Ascolimbros*, Bellonio.

*Scolymus Theophrasti*, Clus. hisp. Ad. (& *Eryngium luteum* Monsp.) Lob. Cæs. Lugd. Taber. Camer.

*Carduus chrysanthemus*, Dod. Ger.

*Atractylis marina*, Lugd.

Variat ratione loci: qui circa Monspelium provenit magis luxuriat, ramis latius sparsis &

longioribus: cujus folia lacteis maculis notata sunt: florib; est paucioribus, quam in ea planta quam Hispania profert: hinc duæ icones à Dodonæo & Clusio in sua historia proponuntur: illa quidem nomine

*Scolymi Theophrasti Narbonensis*, Clus.

*Cardui chrysanthemii* alterius figura, Dod. hæc

*Scolymi Theophrasti Hispanici*, Clus.

*Cardui chrysanthemii*, Dod.

## CARDUUS SPINOSISSIMUS.

**O** *Νότος* à Theophrasto 6. hist. 3. & à Plinio l. 21. c. 16. inter spinosas stirpes numeratur (natura, inquit Theophrast. spinosus est) *Buxum asininum* GAZA vertit, quod sit carduus asinus in cibo gratissimus.

I. Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris.

Scolymus, Dod. gal.

Carduus asininus, Gef. col.

Carduus sylvestris primus, Dod.

Onopyxus Dodonæi, Lugd.

II. Carduus spinosissimus sphærocephalus rigidis aculeis armatus.

Cujus semen Cardui Arabici nomine missum fuit: excrevit caule crispo cubitum superante, folijs latis, longitudine palmum excedentibus per caulem rarioribus: capite est rotundo supernè æquali, spinis oblongis atrociter pungentibus armato: flore albo odorato: in cuius lanuginoso capitulo semen continetur striatû & transversim canaliculatum, caucalidis Hispanic. ferè modo sed rudius & crassi? Hortis facile assuefcit

III. Card. spinosissimus angustif. vulgaris. Agriacantha, Ruellio.

Carduus sylv. tertius, Dod. ut:

Aculeosa Gazæ, Ad.

Carduus spinosissimus vulgaris, Lob.

Polyacanthos Theophrasti, Lugd. Tab.

Onopordon, Gerard.

IV. Carduus spinosissimus capitulis parum aculeatus.

Onopyxos alter, Lugd.

V. Carduus spinosissimus segetibus frequens.

Carduus avenarius, Lonic.

Drypis, Lugdun.

Capitulis est ut in Scolymo echinatis, flore alias purpureo, alias candicante, alias puniceo.

VI. Carduus lanceatus latifolius.

Carduus lanceolatus, Tab. Ger.

II. Carduus lanceatus angustifolius: qui pro 4. in Prodro-mo describitur.

VIII. Carduus vertice corticoso.

Carduus chondrilloides Dalechamp. Lugd.

## DIPSACUS SIVE CARDUUS FULLONUM.

**Δ** *ΐψακος*, id est, sitibundus, nomen à contrario invenit: quoniam ut Dioscorid. l. 3. c. 13. monet, alarum sinu concavo rorem vel imbrem recipiat, quo velut ad sitis injurias abigendas abutitur. Latinis, Labrum Veneris, à foliorum carinato habitu, quæ se ambage anfractuosa sinuantia pelvis speciem constituunt, & intra se humorem continent. Caulem habet, inquit Dioscorides, altum, spinis horridum, & folia caulem amplectentia lateuca foliorum amula, bina in singulis geniculis aculeata, &c. in cacumine caulis singulis surculus, singula capita in sunt echino similia, oblonga aculeata, quæ divisa in medulla vermiculos ostendunt, &c. Plinius l. 26. c. ult. Labri Veneris meminit, at non descripsit: quare dubium an Dipsacum intellexerit. At l. 27. c. 11. Galedragon Xenocratis vocasse videtur, sic describens: leucacanthæ similis, palustris & spinosa, caule serulaceo, alto, cui summo caput inhaeret simile ovo: in hoc crescente atate vermiculos nasci tradunt, &c.

Genera: duplex est, Sativus & sylvestris: hic major & minor:

I. Dipsacus sativus.

Carduus fullonum sativus, Trag.

Labrum Veneris, Matth. Cord. in Dioscor. flore candido, Cæs.

Dipsacus hortensis albus, Fuch.

Galedragon Xenocratis, Anguil.

Dipsacus sativus, Dod. ut: Cord. hist. Gef. hort. Gerard.

Dipsacus sativus fullonum, Ad.

Carduus fullonum, Lob. & an Spina Selenitis Theophrasti, Guiland.

Dipsacus sive Labrum Veneris, Lugd.

II. Dipsacus foliolaciniato.

Dipsacus secundus, Tab. syl. Ger.

III. Dipsacus syl. aut Virga pastoris major.

Carduus fullonum, Brunf.

Carduus fullonius erraticus, Trag.

Labrum Veneris alterum, Matth.

Dipsacus, Lac. Lon. Tab. purpureus, Fuch.

Dipsacus sylv. Dod. ut: Tur. Cord. hist. Gef. hor. Thal.

Labrum Veneris, Cord. in Dioscorid. Ad. Lob. sylv. Cast.

Labrum Veneris flore purpureo, Cæs.

Dipsacus sativ. alter, & Dipsacus syl. major, Lug.

IV. Dipsacus syl. capitulo minore, vel Virga pastoris minor.

Cardui fullonij tertium genus, Trag.

Virga pastoris, Matth. Ad. Lob.

Dipsacus 3. & Galedragon Plinij, Dod. ut:

Dipsacus minor, Gef. hor. Thal. syl. minor, Lug.

Virga pastoris & Dipsacus fatuus, Cam.

Molybdena Plinij, vulgo Dipsacus secundus

capite rotundo, Dalech. in Plin.

## ERYNGIUM SIVE IRINGUS OFFICINAR.

**E** Ἐρύγγιον ἢ ἰρύγγιον Græci Philosophi Eryngium, quasi ἰρύγλη, id est, ructum, dictum putant, quòd capra quæ morsu furculum Eryngij præciderint, vel deglutiverint, cunctum gregem pone sequentem quasi stupore attonitum sistunt, donec Eryngium ructu rejecerint. Eryngio Diosc. l. 3. c. 24. folia lata sunt & extremo ambitu aspera, & ubi augeſcunt circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur, in quorum summitatib. globosa sunt capitula, spinarum acutissimarum durarumq; ambitu stellatim circumvallata: radix oblonga, &c. Plin. l. 22. c. 7. Erynge & Eryngion, dura fruticosa, spinosis folijs, caule gemulato, cubitali & majore aliquando, alia albicans, alia nigra, radice odorata: &c. seq. ex his candidam nostri centum capita vocant. Sunt qui velint apud Theophrastum 6. hist. 3. περὶ τοῦ ἐρύγγιον exaratum esse, quod ex Plinio colligatur.

Genera: Dioscorides unius quidem meminit: sed capitulorum colorem alias viridem, nunc pallidum, alias album, interdum cæruleum inveniri scribit: & Plinio sativum est: est & fonte nascent in asperis: & in litorebus maris durior nigriorq; folio apij.

### I. Eryngium maritimum: & Gef. hor.

Eryngium marinum, Matth. Dod. ur: Ang. Tur. Ad. Lob. (cui & Acanos Plinij) Cast. Lugd. Cæs. (cui & Crocodilium Dioscoridis & Plinij) Camer. Clus. hist. Eyf.

Glyzyrrhiza spinosa, Lacun.

Eryngium rotundo folio, Colum.

### II. Eryngium vulgare: & Cam.

Eryngium primum, Trag. Lon.

Eryngium montanum sive campeſtre, Matth. Cast. Lugd.

Eryngium, Fuch. Ang. Lac. Cord. in Diosc. Cæs. Tab. vulgare, Dod. gal.

Eryngium mediterraneum, Turn. Gef. hor. Gerard.

Eryngium campeſtre, Dod. Cast. vulgare, Clus. hist.

Eryngium campeſtre mediterraneum, Ad. Lob.

### III. Eryngium montanum amethistinum.

Eryngium caule & flore cæruleo, Ang.

Eryngium aliud in montibus, Cæs.

Eryngium totum cæruleum, Cam. hort. Eyf.

Eryngium montanum cæruleum, Ad. Col.

Interdum tora planta est coloris saturate cærulei, aliquando solum pars superior: cujus etiam pumila species, Camerario monente.

### IV. Eryngium montanum pumilum.

Eryngium pumilum, Clus. hisp. & hist. Dodon. Lugd. Tab. Ger.

### V. Eryngium montanum minimum, capitulo magnò.

Carduncellus montis Lupi, Ad. Lob. ico.

Carduncellus Penæ, sive Cardui minimi species, Lugdun.

### VI. Eryngium alpinum cæruleum, capitulis dipsaci.

Eryngium alpinum, Gef. ho. cæruleum, Eid. col.

Eryngium magnis latifq; capitulis, Gef. hor. ap.

Eryngium alpinum cæruleum, Ad. Lob. ico. Tab.

Eryngium montanum tenuifolium ambitu profundè sinuatum, Lob.

Eryngium planum Matthioli, Dod. ico.

Eryngium aliud montanum Dalechamp. Lug.

Spina alba Dalechampi, Eid.

Herba peregrina folijs acanthi, Cæs.

Eryngium capite dipsaci, nobile dictum Gef. nero, Cam.

Eryngium spurium primum, Ger. ico.

### VII. Eryngium latifolium planum.

Eryngium planum, Matth. Cast. Lugd.

Eryngium spurium primum, Dod.

Eryngium pannonicum latifolium, Eyf. Clus.

pan. latifolium primum, Eid. hist.

Eryngium cæruleum, Ger. 1. & 2. Tab.

Flore est cæruleo: est & albo: caulis in illo purpurascens, in hoc ex viridi pallescens: à priore differt potissimum capitulis, quæ in illo oblonga lata: in hoc rotunda sunt.

### VIII. Eryngium planum minus.

Eryngium pusillum planum Mutoni, Lob. Lug. Clus. hist.

### IX. Eryngium arvense folijs serræ similibus.

Crythamus agrestis, Trag.

Crithmum quartum, Matth. Cast. Tab. Cam. an. *negioris* Tralliano.

Eryngium quartum, Dod.

Eryng. mont. recentiorum, Ad. Lob. Lugd. Ger.

Ammi quorundam Dalechampi, Lugd.

CAR-

## CARDUUS STELLATUS.

I. *Carduus stellatus latifolius acaulos.*  
*ὁ φθαλλοσφηνιστά*, sive findens oculos, Cast. quid?

II. *Carduus stellatus latifolius caulescens.*  
*Carduus stellatus Dalech.* Lugd.

III. *Carduus stellatus folijs papaveris erratici.*

*Eryngium, Brunf. alterum, Trag. Lon.*

*Calcatreppola, Matthiol. cap. de Eryngio : & Cæsalpino, quasi caccotribulus, id est, infestus tribulus : qui Stræbe Theophrasti putat.*

*Carduus stellatus, Dod. ut : Adv. (sive Calci-trapa) Lob. Cam. Ger.*

*Carduus stellariorius sive stellario, Gefn. hort.*

*Polyacantha, Cord. hist.*

*Myacanthos Theophrasti Dalechampion, Lug.*

*Spinastella, & Spinastella alba, Tab.*

*Hippophæstum vel Hippophæes Dioscoridis, Colum.*

*Carduus muricatus, Clus. hist.*

Variat florum colore, communiter subrubus, aliquando albus : hinc duæ figuræ apud Tab. & Ger.

IV. *Carduus stellatus luteus folijs cyani.*  
*Spina citrina vel lutea, Gefn. hort.*

*Spina solstitialis, Eid. Dod. Ad. Lob. ico. Cam.*

*Leucacantha quorundam, Lugd.*

*Calcatreppola altera, Cæf.*

*Carduus solstitialis, Cam.*

*Spina solstitialis mitior Apula, sive Carduus stellatus minor, Col.*

V. *Carduus caule stellato Peruanus.*

*Carduus, Monardi.*

*Arundinacea pinnata & spinosa exotica plan-ta, Adv. Lob. ico.*

*Palmacea seu arundinacea pinnata spinosa 1. Lugd. desc. at ipsa figura sub titulo Nerei facit, habetur.*

*Calamus Peruvianus asteroides, Tab.*

*Calamus Peruvianus spinosus, Ger.*

*Λουναίνανθα Dioscoridi l. 3. c. 22. radice est cyperi amara & calida : Idem Plinius l. 22. c. 16. Apud Theophrastum 6. hist. 4. (spina candida Gazæ) spinosa est, sed non aculeatis folijs constat.*

*Alij ἀκανθών βασιλιννήν spinam regiam Theophrasti volunt, de qua 1. caus. 10. Spina regia aculeis constat, & radix in caput excrefcit, ceu nepa. Utriusque descriptio brevior, quam ut quid statui possit.*

## EUPHORBIIUM ET ANTEUPHORBIIUM.

**E**ὐφώβιον auctore Dioscoride l. 3. c. 96. Juba in Libya regnante primo inventum est : & ut Plinius l. 25. c. 7. Invenit rex Juba quam appellavit Euphorbiam, medici sui nomine & fratris Musæ, à quo Divus Augustus conservatus fuit. Dioscoridi Libyæ arbor est ferula speciem habens, quæ in Atlante Mauritania monte nascitur, acerrimo liquore referta, quem propter eximium fervorem non citra metum incolæ colligunt : ventres ovillos lotos arbori circumligant & è longinquo caudicem contis vulnerant, unde statim copiosus liquor effluit. Plinius scribit folijs acanthinis spectari, & colligendi & adulterandi modum ex Dioscoride subjungit, qui herbam Euphorbiam, succum vero Euphorbium vocavit. Leo Africanus inter Africa plantas describit : herba, inquit, est ex toto aculeata, quæ caput cardui sylv. æmulatur : inter ejus ramos ab radice exennt fructus cubitales & ampliores, crassitudine citruli, virides, granulosi quibusdam tuberculis distincti ut Citrulus, veluti caudices viginti & triginta ex eodem cespite. Rustici hos gladijs pungunt, cum ad maturitatem pervenerint : effluit autem humor lacti similis, qui paulo mox densatur & tandem siccatur utribus collectus. Vide infra l. 12. sect. 6.

Plantam ipsam primus Dodonæus expressit, quæ Bruxellis Anno 1570. est nata : quam ex Anglia unxit cum Ant euphorbio, à Lobelio accepimus.

I. *Euphorbium à Dodon. Lob. Lugd. Lon. Tabernæm. Gerard. pingitur : de ipsius succo plures egere, ut Matth. Cord. Lac. Cæsalp. Lugd. & alij.*

*Euphorbia, Cord. hist.*

II. *Ant euphorbium, Dodon. Lob. Lugdun.*

*Castor. Tabern. Gerard.*

Sic dictum à contrarijs Euphorbio facultatibus, hoc enim adversus Euphorbij acrimoniam, indigenis remedio esse fertur. Dodonæus hanc herbam ad Telephium referri posse censet.

## T R A G A C A N T H A.

**T**ραγάκανθα, quam Gaza Hircispinam vertit, & de herba & de ejus lacryma dicitur. Diosc. l. 3. c. 23. radice est lata & lignosa, ac supra terram eminente: à qua surculi humiles robusti latissime fusi: & in ipsis foliola numerosa, tenuia, inter quæ aculei sese proferunt, quos ipsa occulunt, candidi, firmi rectiq;. Theoph. 9. hist. 1. lacrymam gignit: & 8. hist. 9. & succus sponte consistit spissaturq; lacrima modo: & 9. hist. 15. large in Arcadia nascitur, nec deterior Cretica existimatur, sed etiã visu pulchrior. Plin. l. 13. c. 21. Creta gignit & Tragacanthem spinæ albæ radice multum prælatum apud Medos aut in Achaja nascenti. Sed de lacryma vide infra l. 12. sect. 6.

## I. Tragacantha.

Tragacantha, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. Lon.

Adv. Lob. Lugd. Clus. cur. post.

Tragacantha prima, Tab.

Tragacantha sive Hircispina, Clus. in corol. ad

Dodon. gal. & Dodon. Gerard.

## II. Tragacantha humilior luteis floribus.

Tragacanthæ alterum genus, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Addit & tertium florib. purpureis & speciosis.

## P O T E R I U M.

**P**οτήριον secundum aliquos dictum, quia potrix herba paludosum riguumq; solum amat: & νερὴς, quod nervis amica sit. Dioscorides l. 3. c. 17. Poterium Jones Neurada vocant, frutex grandis est, ramulis longis, mollibus, lori modo lentis ac flexilibus, tenuibus, tragacanthæ proximis: folijs verò parvis & rotundis: totus autem frutex tenui lanosa lanugine obducitur, estq; spinis horridus: flores sunt parvi & candidi: radices binum ternumve cubitorum firma ac nervosa, quæ proximè terram recisa lacrymam fundunt gummi similem. Plin. l. 27. c. 12. Poterion aut Phrynion aut neurada, qui eodem fere modo descripsit, nisi quod florem dicat longum herbacei coloris: at l. 25. c. 10. flores parvos tribuit.

## I. Tragacanthæ affinis lanuginosa, sive Poterium.

Poterium, Matth. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Tragacantha altera forte Poterium, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab. fortè & Bellonio.

Tragacanthæ primum genus, Rauvvolf. & Lugdun. ap.

Spina hirci minor, Ger.

## II. Poterio affinis folijs Pimpinellæ spinosa.

Chalcios sive Ereria, Ang.

Chalceion Anguillaræ, Lugd. Clus. hist.

Poterion, Adv. Lob. Lugd. Cæs. Tab. Ger.

Pimpinella spinosa, Clus. hisp. Cam.

Bellan, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Stœbe legitima Dioscoridis & τριβύδα in Græcia, Honor. Belli ep. 2. ad Clus.

## D R Y P I S.

**Δ**ρυπίς Theophrastus 1. hist. 16. semel tantum meminit scribens, Acornam, Drypida, Acanum in genere spinoso esse, loco enim folij spina oritur. Sic dicitur ἀπὸ τῆς ἀρνύτειν id est σπᾶνξαι τεύειν, ῥύτειν, ἔχειν à lancinando, pungendo, vellicando, quod aculeis suis attrēctantes & colligere volentes vulneret.

Spina umbella folijs vidua.

(Tab. Drypis ab Anguillara descripta, fortè Cenno-

Drypis Theophrasti, Ang. & ex eo Lob. Lugd. thus, Col.

## A N O N I S S I V E R E S T A B O V I S.

**A**νωνίς Dioscoridi, & ὄνωνι Theophrasto. Anonis dicta videtur à non juvando quòd nullam utilitatem præbeat, cum aratoribus (hinc Remora aratri dicitur) inimica sit: nisi quis ex adverso nomen impostum censuerit. Ἀνωνίς quidam deducunt ἀπὸ τῆς ὄνως & ὄνωνι, quasi dicas asini oblectationem: nam ex Græcis quidam affirmant, asinos in ea se volutare, & dorsum sub aculeis ejus herba libenter exterere. Dioscorides l. 3. c. 21. Anonis quam aliqui Ononida vocant ramos habet dodrantales, etiam majores & fruticosos, frequentibus geniculis cinctos, multis alarum cavis præditos & capitulis rotundis: foliolis pusillis, tenuibus ceu lenticulae, ad ruta aut lini prætenfis folia accedentibus, subhirsutis, odoratis: ramuli spinis acutioribus horrent: radix candida est. Ac Theophrasto 6. hist. 4. ὄνωνις juxta folium aculeata est, altero quoque folio conditur: & c. 5. verum ramis aculeigerum est: folio ruta similis, sed per totum apposito caulem, ut veluti coronam ex intervallis totam speciem representet: florem minutum & in siliqua non undique septum edit. Plinio l. 21. c. 15. Ononis secundum spinam habet folium: & c. 16. in ramis spinas habet apposito folio ruta simili, toto caule foliatum in modum coronæ: & l. 27. c. 4. Anonin quidam Ononida malunt vocare, ramosam, similem sænu-graco, nisi fruticosior hirsutiorq; esset, odore jucundo: post Ver spinosa.



**I. Anonis spinosa flore purpureo.**

Resta bovis, Trag. Lon.

Ægyptiron Cratevæ, Ang.

Anonis sive Ononis, Matth. Lac. Tab.

Anonis, Fuch. Dod. ut: Tur. Cast. spinosa, Eyf.

Anonis, Cord. in Diosc. (cui &amp; Acutella,) Gesn.

hort. Adv. Lob. Lugd. Thal. Cæs.

Anonis sive resta bovis, Ger.

Flore est communiter coloris dilutioris purpureæ, raro albidæ, quæ

Anonis flore albo, Tab. Ger. rarissimè luteo.

**II. Anonis spinosa lutea major.**

Ononis montana lutea, Gesn. hort.

**III. Anonis spinosa lutea minor.**

Ononis lutea sylv. minima, Col.

**IV. Anonis spinis carens purpurea.**

Ononis perpetuo lævis, Gesn. hort.

Anonis non spinosa, Clus. pan. Eyf. purpurea, Tab. Ger.

Anonis sive Ononis sine spinis, Cam.

Anonis mitior prima, Clus. hist.

Hæc &amp; candidis floribus reperitur, quæ

Ononis candidis floribus, Adv.

**V. Anonis viscosa spinis carens lutea major.**

Natrix Plinij herbariorum, Adv. Lob.

Anonis mitis flore luteo, Clus. pan.

Ononis lutea montana, Cam. ep.

Anonis flore luteo, Eid. hort.

Anonis non spinosa lutea, Cast. Tab. Ger.

Ononis mitis luteo flore, Eyf.

**VI. Anonis non spinosa flore luteo variegato.**

Ononis lutea non spinosa: alij Melilotus major, vel sylv. pinguis, Lugd.

Ononis flore luteo variegato, mitis, Eyf.

A priori differt floris colore, qui luteus, sed pallidior, est &amp; lineis subrubris variegatus.

**VII. Anonis viscosa spinis carens lutea minor, vel Anonis viscosa minor flore pendulo: in Prodomo describitur.****VIII. Anonis non spinosa capreolis donata. Ononis Senensis, Spigelio. Sed quid?**

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER VNDECIMVS.

**SECTIO PRIMA.**CYTISUS; ANAGYRIS; LABURNUM; ACACIA;  
ASPALATHUS; SANTALUM; ARBOR BRASILIA; AGALLOCHUM;

sive Xyloaloes; Genista-Spartium; Genista spinosa sive Scorpius; Geni-

sta non spinosa; Chamægenista; Spartium; Colutea;

Senna &amp; Jovis barba.

**C Y T I S U S.**

**F**rutices & Arbores proposituri, à Cytiso ordiri lubet, qui *κύτις* & *Græcis* dicitur, Latinis *Cytisus*, à *Cythino* insula, in qua, Plinio l. 13. c. 24. auctore, inventus est, unde in omnes Cycladas, mox in urbes Græciæ magno casu proventu, translatus: Est autem Dioscoridi l. 4. c. 113. *Cytisus* frutex totus albus, uti *Rhamnus*, ramos spargens cubitales, etiam majores, in quibus folia similia *Fœnugraci* aut *Loti* trifolia, sed minora & dorsum prominentiorem habentia. Theophrasto 1. hist. 9. & 5. caus. 6. *Cytisus* medullam duram, spissam & nigram habet: & 4. hist. 5. fruticosa est veluti *Hebennus*. Plinio l. c. *Cytisus* frutex est canus aspectu, breviterq; si quis exprimere similitudinem velit, angustioris trifolij frutex. Columella l. 9. c. 4. Sativum est & sue spontis.

*Cytisus incanus vel hirsutus.***I. Cytisus incanus, siliquis falcatis.***Cytisus Maranthæ*, Matth. Lob. Lugd.*Cytisus* ut existimatur, Dod.

Ccc 3

*Cytisus*,

Cytifus, Cæfalp. Galeni, Cam.

Cytifus tertius cornutus, Tabern. septimus cornutus, Ger.

Cytifus Galeni Maranthæ cornutus, Eyft.

Lignum Rhodium, five Cytifus verus, Honor. Belli epist. 4. ad Cluf. qui hujus ut & fequentis ramum ad nos mifit.

II. Cytifus incanus Creticus.

Barba Jovis altera, Ang.

Cytifus Creticus ἀρχονδόφυλον, id est, nobile lignum, Hon. Belli epist. 1. ad Cluf.

Ebenus Cretica, Eid. epist. 4. ad Cluf. & Ponæ.

III. Cytifus incanus folio oblongo Austruacus.

Cytifus 2. Cluf. pan. quintus, Eid. hist. Eyft.

Cytifus sextus, Tab. ico. alias undecimus.

Cytifus incanus, Ger.

Pseudocytifus 2. Dod. belg.

Hujus altera species angustis folijs, ijsque velut in aculeum definentibus, quemadmodum in Italia reperitur, qui

Cytifus acuminatis folijs dici poffet.

IV. Cytifus incanus filiqua longiore.

Cytifus, Adv. Lob. ico. Cast.

Cytifus prior Penæ, Lugd.

Cytifus quarrus, Tab. octavus, Ger.

Cytifi fylv. species prima, Cæf.

In hortos translata canitiem amittit.

V. Cytifus albicans, folio trifolij vulgaris.

Cytifus albus sylvestris, Cord. in hist.

an Cytifus alpinus Dalech. Lugd.

VI. Cytifus folijs subrufa lanugine hirsutis.

an Cytifus, Tur.

Cytifus 4. Cluf. hisp. tertius, Eid. hist.

Cytifus quartus Hispanicus Clusij, Lob. Lugd.

Cytifus 12. Hispanicus 4. Tabernæm. ico. alias decimus.

Pseudocytifus hirsutus, Ger.

an Cytifus fylv. alter, Cæf.

VII. Cytifus hirsutus major folijs pinnatis.

Cytifi fecundi species altera, Cluf. pan. 5. species altera, Eid. hist.

Cytifus septimus, Tab. ico. alias duodecimus.

Cytifus pinnatus, Ger.

VIII Cytifus incanus folio medio longiore.

Cytifus 3. Cluf. hisp. sextus, Eid. hist.

Cytifus tertius Hispanicus Clusij, Lob. Lugd.

Cytifus undecimus Hispanicus 3. Tabernæm. ico. alias nonus.

Cytifus sempervirens, Gerard. icon.

IX. Cytifus hirsutus flore luteo purpurascens.

Cytifus magnus flore luteo purpurascens, Ponæ Ital.

X. Cytifus supinus folijs incana lanugine infernè pubescentibus.

Cytifus tertius, Cluf. pan. septimus, Eid. hist.

Cytifus 2. Tab. ico. alias sextus.

Cytifus hirsutus, Ger.

an Cytifus supinus, Cam.

XI. Cytifus supinus folijs infernè & filiquis molli hirsutie pubescentibus.

Cytifi septimi species altera, Cluf. hist.

Cytifus septimus, Eyft.

XII. Cytifus minoribus folijs ramulis tenellis villosis.

Cytifus primus, Cluf. hisp. & hist.

Cytifus Hispanicus primus, Lob. Lugd.

Pseudocytifus prior, Dod. Ger.

Cytifus nonus: Hispanicus 1. Tabern. ico. alias septimus.

XIII. Pseudocytifus flore Leucoij luteo.

Cytifi facie Alysson fruticans quorundam, Lobel. Lugd.

Cytifus adulterinus, Tab. Ger.

*Cytifus glaber.*

I. Cytifus glabris folijs subrotundis, pediculis brevissimis.

an Cytifus primus, Ang.

Cytifus alter minor, Adv. Lob. ico. Lugd.

Cytifus quintus rotundifolius, Tab.

Cytifus, Ger.

Trifolium arborefcens, Eyft.

II. Cytifus glaber viridis.

Cytifus secundus, Tab.

Cytifus filiquosus, Ger.

Trifolium fruticans Guilandinus nominabat.

III. Cytifus glaber nigricans.

Pseudocytifus five niger, Cord. hist.

Cytifus, Lac. Ger. & apud Cordum pingitur.

Cytifus Gesneri, Lugd.

Cytifus & Cytifus minor, Gesn. hort.

Cytifus primus, Cluf. pan. Tab.

Cytifus quartus, Cluf. hist.

Cytifus niger five major, Cam.

Pseudocytifus primus, Dod. Belg.

Cytifus 1. Tab. spicatus, Eyft.

IV. Cytifus folijs incanis angustis quasi complicatis.

Cytifus

Cytisus secundus, Clus. hisp. & hist.

Cytisus secundus Hispanicus, Lob. Lugd.

Pseudocytisus alter, Dod. Ger.

Cytisus decimus: Hispanicus secundus, Tab. icon. alias octavus.

Hic circa Monspelium folijs est viridibus, in

Hispania prorsus incanis.

V. Cytisus foliolis glabris filiquis Ornithopodij hirsutis, in Prodromo descriptus.

VI. Cytisi in Thraciæ & Macedoniæ pratis, quam neq; Gallia neq; Italia alat: his solum ver. bis meminit Bellon. l. i. obs. c. 56. 60. 63. Sed quid?

## ANAGYRIS ET LABURNUM.

**A**νάγυρις sive ἀνάγυρις, alijs ἀνονιον Dioscoridi l. 3. c. 167. fructus est arboris instar, folijs & virgis Vitici assimilis, perquam gravis odoris: flore brassica simili: semen in longis corniculis renum figura, versicolore ac solido quod ura muturescente durescit: Et Plinio l. 27. c. 4. Anagyros, quam aliqui Acopon vocant. fruticosa est, gravis odoris: flore oleris: semen in corniculis non brevibus gignit, simile renibus, quod durescit per menses.

Laburnum Plinio lib. 1. cap. 18. alpina arbor est, nec vulgo nota, dura ac candida materie, cujus flos cubitali longitudine: apes non attingunt.

### I. Anagyris fœtida.

Anagyris, Dod. utr. Ang. Cord. in Diosc. & hist. Tur. Lon. Ad. Cæs. Lug. qui & Colyteam Theophrast. suspicatur.

Anagyris prope Arelatum, Ges. hor. Lugd. Clus. histor.

Anagyris folio fœtido, Ges. hor. fœtida, Ger.

Anagyris fœtida arboreascens, Lob.

Anagyris vera, Clus. hisp. Lugd.

Anagyris prima, Cam. Tab.

Semina superficie glabra quidem sunt, sed colore inter se diversa; quædam enim purpureo, quædam livente, quædam in cinereo pallido.

### II. Anagyris fœtida altera, rotundo folio.

Anagyris Cretica, à Clusij diversa, Hon. Bell. ep. 2. ad Clus.

Anagyris, Anagyros vulgo in Creta circa Idam montem, Bellon. obs.

### III. Anagyris non fœtida major, vel Alpina.

Anagyris prima & major, Matth. Cast.

Egano, forte Ebeni 2. species, Theoph. Ang.

Trifolia arbor, Cord. hist. Bellon. de cult.

Laburnum, Dod. gal. Bellon. de cult. Lugd. Camer. Cæs. alp.

Anagyris latifolia, Eystett.

Trifolia quidem communiter est, attamen sæpe quatuor, etiam quinque folia uni pediculo adhærent, ut ei qui antea non observârit, diversa ab altera videatur.

In horto Lugduno Batavo habetur folio longiore angustiore, solidiore & atrovirente, quod Laburnum latifolium nominant.

### IV. Anagyris non fœtens minor.

Faba inversa, Trag. Lon.

Anagyris altera, Matth. Lac. Cam. Tab. minor, Castor.

Anagyris alia species, Ges. hort.

Eghelo, Dodon.

Anagyris minus fœtens, Ad. Lob.

Laburnum alterum, Lugd.

Anagyris fœtens, Ger. ico.

Anagyris angustifolia, Eystett.

## A C A C I A.

**A**κασία Dioscoridi & Græcis, ab ἀκάζω, id est, acuo, unde Acacia quasi acuta: quam Theophrast l. 4. hist. 3. Ἀκασίαν, id est, Spinam, sive Ἀκασίαν ἀγυρίαν spinam Aegyptiam 9. hist. 1. esse volunt: & Dioscoridi l. 1. c. 133. spina est arboreascens fruticosa in rectum non assurgens, florem habens album, fructum vero instar Lupini siliquis inclusum: ex hac succus exprimitur & gummi ex ea spina manat: de hoc succo Plin l. 24. c. 12. Est, inquit, & Acacia spina succus: fit in Aegypto, alba nigraq; arbore, &c. Et Theophr. Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horret excepto caudice: nam & super germina, foliaq; aculeos gerit, magnitudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum, testis idonea caditur: ejus duo genera, quædam candida imbecillis facileq; putrescens: quædam nigra, quæ robustior & incorrupta, &c. fructus in siliqua modo leguminum, flos pulcher aspectu ut coronas ex eo facerent, &c. Eadem serè Plinius l. 13. c. 9. nomine Spina Aegyptiaca. Et Diosc. duplex est: altera longè minor humilis ac tenerior, aculeis vallorum in modum obstita, folia rufa similia habens: semen in folliculis connexis, ternum quaternumve capacibus, lenticula minus.

### I. Aca-

I. *Acacia folijs Scorpioidis leguminosæ.*  
*Acantha & Acantha Ægyptiaca, Hippoc.*  
*Acacia Ægyptia, Dod. gal. Lugd. Cam. Alexandrina, Cam.*  
*Acacia prima, Ang. Lac.*  
*Acanthus Theophrasti, Ang.*  
*Acacia, Bellon. (quæ Akakia in offic. Constantinop.) Dod. Cam. ep. Alp. vera, Clus. ad Garz.*  
*Spina Acaciæ Dioscoridis, Ad. Lob.*  
*Acacia, Arabibus Schamuth, Schack, Halepi, Rauvvolf.*  
*Acaciam I. à Matth. & Lugd. propositam quam*

*Acaciam majorem Durantes vocat, Arborem Judæ cui aculei adpicti sunt, multi existimant.*  
 II. *Acacia trifolia.*  
*Acacia altera, Matth. Dod. ut: Lac. Bellon. Rauvvolf. Lugd.*  
*Acacia, Lon. altera Dioscoridis, Ad. Lob. Tab.*  
*Aspalathus, Cæs. sive Acacia 2. Matthioli, Gefn. hort. Cam.*  
*Aspalathus 2. Dioscoridis, Guil. epist. & Hon. Belli ep. r. ad Clus. (quo nomine & Græcis indigenis hodie donatur) Ponæ Ital.*  
*Acacia Dioscoridis, Ger.*

## A S P A L A T H U S.

**A**spalathus, Ἀσπλάθῳ alijs Erysisceptrum, frutex est lignosus, spinis crebris aculeatus: duplex est, alter detracto cortice rubens aut purpurascens, alterum genus candidum est Dioscoridi l. i. c. 19. At Plinius non eadem omnino tradit l. 22. c. 24. in eodem tractu Aspalathus, inquit, nascitur spina candida, magnitudine arboris modica, flore rosea, radix unguentis expetitur: quidam Erysisceptrum, alijs Sceptrum vocant, & c. l. 24. c. 13. Orientalem, alium à Rhodio facit.

I. Aspalathus cortice cinereo, ligno purpureo. Aspalathi prima species Dioscoridis, Ponæ Ital. à quo portionem accepimus.

II. Aspalathus colore buxi. Aspalathi primum genus, Ad. & Lugd. Lignum Americ. buxei coloris, Leri de Brasilia Lignum aureum & flavum in Terza insula, Linscot. 3. part. Ind. Or. c. 6.

III. Aspalathus albicans torulo citreo. Rhodium lignum, quibusdam Agallochum, Olea æthiopica videtur, Cord. in Diosc. Agallochum fortè, id est, Xyloaloe solida, quibusdam lignum rhodium, rhodisum & aspalathum, alijs Oleastrum lignum, Cord. hist. Aspalathi tertium genus, Ad. & Lugd. Aspalathus Rhodius, Lob. ico. Lignum rosei odoris in Brasilia, Leri de descr. Bras. vel par. 3. Ind. Occid. c. 12.

IV. Aspalathus rubeus. Rhodium lignum rubescens & purpurascens Ruellij, Cord. in Diosc. Aspalathi secundum genus, Penæ & Lugd. Aspalathus roseus, Ad. Lob. ico. Lignum Americanum rubrum diversi à Brasilio generis, è quibus claves suas barbari conficiunt, Leri l. c. an Lignum Sanguinho dictum, totum rubrum & cruentulum in Terza insula, Linscotto l. c. V. Lignum Americanum album. Lignum album ut charta, Leri l. c. Lignum cretæ candore nivium, Linscot. l. c. VI. Lignum Americanum violaceum, quæ ligna solius naturæ miraculo distincta, terra illa profert, Leri l. c. VII. Lignum Feixo, & varij generis ligna præstantissima, insula Pico promit, Linscot. l. c.

## S A N T A L U M.

**C**um multi Santalum pro Aspalatho vero sumpserint: & aliqui Agallochum, lignum rhodium, crediderint, utrumq; subjungemus.

Santalum veteribus Græcis inditum videtur, & Sandal Avicennæ, Serapioni & Mauritani: Indis verò Sarcanda, Garzia auctore, dicitur: quod folijs est Lentisci æmulis, flore ex caruleo nigricante, fructu cerasi magnitudine nigro, insipido: trium generum, rubrum album pallidum, quæ uno in loco non proveniunt: eadem A costa & Lugdunensis historia habent. Santali cinericei quoq; in regni Congiani descriptione mentio fit.

I. Santalum album, Matth. Lac. Lon. Cord. hist. Cast. Garz. Lugd. Tab. Ger. Linscot. part. 4. Ind. Or. 30. Lignum odoratum candidum, Cæs. II. Santalum pallidum, Matt. Lac. Garz. Lugd.

Santalum citrinum, Cord. hist. Lon. Cast. Linscot. l. c. Santalum flavum, Tab. Cæs. cui flavum quod hodie habetur, candidi medulla est & citrinum Serapioni dicitur.

III. San-

III. Santalum rubrum, Matt. Lac. Lon. Cast. Garz. Lugd. Tab. Ger. Linscor. l. c.  
Lorus veterum, Sandalus rubea officinarum, Cord. in Diosc.  
Santalum rubeum, Cord. hist.  
Lignum odoratum rubrum, Cæs.  
Santali rubri, quod in officinis Lignum aquilinum dicatur, & quo in regno Congiano febres curentur, Pigafetta in desc. regni Congiani c. 7. meminit.

IV. Santal. cinericeum, quo Scabiem Gallic. sanant, tanti apud eos precij, ut vel parva ejus particula servo robusto comutetur, id. proponit.

V. Pseudosantalum rubr. sive arbor Brasilia. Arbor Brasilia Theveti, Lugd.  
Bersilicum, Lon.  
Persilium rubrum & citrinum, Cord. hist.  
Bresilienis arbor in Guajana: par. 8. Ind. Occid. Brasilia arbor, barbaris Araboutau, quercum proceritate & ramorum copia adæquat, folijs buxeis persimilibus: fructum non ferens: harum quædam, quam vix trium: altera, quam vix octo: & altera quam vix sedecim hominum ulnæ amplecterentur, Leri. in desc. Brasil.

VI. Arbori Brasiliænæ affinis: in regno Guinæ. in Insula Caisco, arbores sunt, quæ vel Brasilienses rubedine superant, quarum lignum instar politissimi speculi niter, tantæ duritiei, ut vix ingenti labore inflecti possit, ut habetur in 6. parte Indiæ Orientalis cap. 56.

an Lignum Brasilianum quod flammei coloris est, & tincturis adhibetur, Joseph. Acoftæ l. 4. c. 29. meminit.

VII. Arbores pigmentiferæ.  
Arborum peculiaria genera ex quibus rubrum, nigrum, flavum & purpureum colorem extrahunt, in Insula Madagascar seu Laur. p. 4. Ind. or.

VIII. Ligno Brasiliano simile.  
Lignum Sapou lanis tingendis percommodum, Linsc. par. 2. Ind. Or. c. 24.

IV. Pseudosantalum Creticum.  
Αβελιέα, Abelicea folijs Alaterni, fructu piperis, ligno rubro, cujus pulvis Santalum imitatur, Hon. Belli epist. 2. ad Clus. Ponæ Ital.

X. Pseudosantalum album.  
Lign. Sambarane Santalo albo persimile, Garz. Sambarane, Acoftæ.

XI. Lignum ex freto Magellanico medulla flavescente.

Lignum exoticum alterum, Clus. exot. l. 1. c. 7.  
Fructum fert nigrum myrtillis similem.

XII. Lignum Moluccense folijs malvæ, fructu avellanâ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis, Lugd.

Lignum Molucense, Acoftæ.

Lignum Pavanum, Tab.

XIII. Ligna preciosissima ex Havana & Insula Cuba in Hispaniam vehuntur, cujus generis sunt Ebanos, Caovana, Granadillos, Cedrus & similia: Joseph. Acofta l. 4. c. 30.

## A G A L L O C H U M.

**A**ΓΑΛΛΟΧΟΝ veteribus, at recentioribus etiam ΞΥΛΟΧΟΝ: Agallochum & Lignum aloës. Dioscoridi l. 1. c. 21. Lignum est quod ex India & Arabia deportatur, Thyæ ligno simile, maculatum, odoratum gustu adstringens, cum quadam amaritudine, cute verius quam cortice vestitur, aliquantum versicolore. At Garzia arbor est olea instar, interdum minor, quæ non nisi in Indiâ nascitur. Tarum Plinyl 12. c. 20. aliqui existimant, quod Agallochum syl. esse, Dalechampius, notis in Plinium, suspicatur: sed brevior est Plinius, quam ut quod pronuntiare liceat. Agalagen & Xyloaloës, Avicenna.

Hujus plura genera Serapio l. simp. c. 197. enumerat, Indum Mondunum, Scificum, Alcum, & Ruell. l. 1. c. 36. quatuor Agallochi genera recenset. Lud. Romano triplex genus ejus arboris: 1. quod Calampart vocatur, duo alia in Insula Taprobana, quorum 1. Lubam, alterum Bochor nominat, quæ duo genera ad nos convehantur.

I. Agallochum præstantissimum.

Agallochum primum quod Calampart vocatur, & solum inter Reges Indiæ distribuitur, Lud. Romano.

Lignum Calamba, quod syncerum cum auro argentove persæpè deponderatur, Linsc. part. 2. Ind. Or. c. 24.

Lign. Aloës Calamba dictum, Ei. p. 4. Ind. or. c. 32.

Lignum Calambes sive Aloës, par. 8. Ind. Or.

II. Agallochum officinarum.

Agalloch. esse Lignum aloës, multi credunt, Ang. Aloë & Aloa, Vartomano.

Agallochum, lignum aloë, vel paradyfi, vel S. Crucis, Cornaro.

Agallochus sive Xyloaloës, Cord. in Diosc. Ad. Lob. Cast. Garz. Lugd.

Tarum, id est, Xyloaloë fissilis, levis & aromatica, Cord. hist. & Tarum crispum, Eidem

Lignum aloës, Lon. Frag. Tabern. Cæsalp. qui Tarum Aëtij facit: at Cornarus Xyloaloën Aëtij dicit.

Lignum aloës quod Palo d'Agula dicitur, Linscot. par. 2. Ind. Or. c. 24. sive Palo d'Aguilla, Eid. par. 4. Ind. Or. c. 32.

III. Agallochum sylvestre.

Lignum aloës sylv. Garziæ, Frag.

Xyloaloë sylv. Lugd.

Aquilla brava sive sylvestre, Malaice Garro, Linsc. l. c.

Ex illo, sed ex hoc frequentius, sphaerulæ precatioræ odoris jucunditate & precij magnitudine commendabiles conficiuntur, sunt etiam ex alio ligni genere, quod Agallochum æmulatur, sed inodorum est.

## GENISTASPARTIUM.

I. Genistaspartium spinosum majus primum flore luteo.

Aspalathus alter primus, Clus. hisp. & hist.

Aspalathus, Cast. primus Monspel. Lugd.

Acacia altera, Ang.

Aspalathus secunda Monspel. Lob.

Genistaspartium spinosum majus, Ad. Lob. icon.

Scorpius primus, Tab.

Genista spinosa minor, Ger.

II. Genistaspartium spinosum majus secundum flore pallido.

Aspalathus alter secundus, Clus. hisp. & hist.

III. Genistaspartium spinosum majus tertium hirsutum.

Aspalathus alter tertius, Clus. hisp. & hist.

IV. Genistaspartium spinosum minus.

Scorpius secundus, Clus. hisp. & hist. Cast.

Genistaspartium spinosum alterum, Lob.

Genistæ spinosæ altera icon. Dod.

Aspalathus alter Hispanicus, Lugd.

Scorpius tertius, Tab.

Spina Christi, Cæsalp.

Genista spinosa major, Ger.

V. Genistaspartium spinosum folijs polygoni.

Alhagi Maurorum in cujus fronde, præcipue apud Persas, Manna colligitur, Rauvvolf.

Planta spinosa Maurorum Alhagi, Lugdunensi app.

VI. Genistaspartium spinosum folijs lentikulæ, floribus ex cæruleo purpurascens.

Spartum aphyllon fruticosum junceis aculeis lanatis capitulis, Ad. Lob. Lugd.

Erinacea, Clus. hisp. & hist. Lugd. Belli.

Genistæ rotundæ alterum genus, Cæf.

Scorpius quartus, Taber.

Spartium aculeatum aphyllon, Eid.

Genista spinosa humilis, Ger.

VII. Genistaspartium spinosum aphyllon alterum, tribus aculeis semper junctis, floribus luteis.

Achinopoda Cretensium, Bellonio.

Echinopoda Cretica.

Chenopoda Plinij l. 11. c. 8.

Echinopoda Plutarchi & Athenæi, } Hon. Belli, epist. 2. ad Clus.

an idem sit cum quarta, dubitat Clusius.

## GENISTA SPINOSA

sive Scorpius.

**S**corpius, Theophrasto 6. hist. 1. (Nepam Gaza vertit) spinosa planta, tota spinis constat ut Corruca: sic hæc adulta, nullo modo foliosa est, sed spinas tantum pro folijs habet: præterea radice singulari brevique, constat, ante æstatem non germinat, germinationem in autumnum prorogat: floret etiam post æquinoctium Autumni: florem in carne exuberante, sub extrema aculei profert.

I. Genista spinosa major brevibus aculeis.

Scorpius sive Nepa, Anguil.

Nepa Theophrasti, Ad. Lobel. Tabern. Camer.

Rauvvolf.

Scorpius Theophrasti, Lugdun.

Genista aculeata minor, sive Nepa Theop. Ger.

II. Genista spinosa major longioribus aculeis.

Ulex Plinij quibusdam l. 32. c. 4. qui nullas notas addidit.

Genista spinosa, Dod. ut.

Scorpius primus, Clus. hisp. & hist.

Scorpius

Scorpius alter, five Genista spinosa, Lugd.

Scorpius secundus, Tab.

Genista spinosa flore albo, Ger.

Floribus est luteis, at in regionibus calidioribus ruffo colore, ut rubere videantur, nitent: & ratione loci variat magnitudine & aculeorum multitudine, paucitateve.

III. Genista spinosa minor Germanica.

Genistella, Trag. Fuch. Dod. ut: Lugd. Tab.

Genista vel Genistella spinosa, Gefn. hort.

Genistella aculeata, Ad. Lob. Tab. spinosa, Cam.

Genista minor vel aculeata, Lon.

Genista minor, vel Genistella, Cast.

Genistæ species spinis & aculeis horrens, Clus. hist.

Coroneolæ similis suffrutex, Cæf.

IV. Genista spinosa minor Hispanica villosissima.

Genistella Monspeliaca spinosa in Prodomo.

V. Genista minor aspalathioides, vel

Genista spinosa Anglica in Prodomo descripta.

## GENISTA NON SPINOSA.

I. Genista angulosa & scoparia.

Genista, Brunf. Trag. Fuch. Dodon. ut: Cord. in Dioscor. Cam. ep. Tabernæm. Ger. vulgaris, Bellon. Clus. hist.

Genista angulosa, Cord. hist. descr. (ubi male Chamæspartij icon additur) Lugd.

Genista minor seu non aculeata, Lon.

Genista scoparia vulgi, Lob. Eyf.

Genista quadrato junco t. Cæf.

Spartium, Turn. Adv.

Flos communiter luteus, rarius albus, hinc duæ figuræ apud Tab.

Genistæ & Genistæ albæ: & apud Gerardum

Genistæ & Genistæ tenuifoliæ nomine: hujus flores nondum apertos, vicini nostri in Brisgoja muria condiunt & Capparum loco utuntur.

Radici quinetiam sæpè Orobanche adnascitur, & Rapum Genistæ vocant.

Genistellam Taber. pingit, quam Chamægenistam Anglicam Ger. nominat, quæ sola magnitudine à priore differre videtur.

Hujus generis exiguum in alpibus lato cespice, palmaribus juncis, mollibus, sine folijs crescere, Cæsalpinus scribit.

II. Genista tinctoria frutescens folijs incanis.

Genista tinctoria Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Genistæ tinctoriæ altera icon, Dod.

Genistella infectoria, Lob. Ger.

Genista tinctoria Clusij, Oricella Theveti, Lug.

Genista infectoria Hispanica, Tab.

Sub hac, quo tempore florēt, Hæmodori quoddam genus elegans, brachialis interdum

longitudinis, floribus magnis & luteis crescit, Clusio monente.

Meminit Dodonæus Genistæ hirsutæ Hispanicæ, quam tertiam facit, cujus Calphurnius meminit: hanc non novi.

III. Genista tinctoria Germanica.

Luteam herbam Plinij l. 33. c. 5. aliqui volunt.

Flos tinctorum, Brunf. tinctorius, Fuch. Lon. Castor.

Ferula, Trag.

Lyfimachia, Leoniceno.

Coroneola, Ang. Cæf.

Genista humilis, Dod. gal. Gefn. hort. Lugdun. Thal.

Genista tinctoria, Dod. vulgaris, Clus. hist.

Genistella infectoria vulgi, Adv. Lob.

Genistella tinctoria, Tab. Ger. Eyf.

Chamæleuce, Cord. hist. quoad iconem, nam Hederam terrestrem describit.

Variat folijs latoribus angustioribus, ramulis modò erectis, modò procumbentibus: quinetiam magnitudine, quare

Florem tinctorium minorem Lonicerus addit.

IV. Genista ramosa folijs hyperici.

Genista minima, Lugd.

Hæc variat: eam non longè Friburgo, & ad Petram pertusam frutescentem, & Monspelij humilem collegimus.

V. Genista Arabica quæ à nostra diversa, planities ad montem Sinai obsiri sunt: quæ etiam in Arabiæ solitudinibus nascitur, Belon. ob. sed quid?

## CHAMÆGENISTA.

I. Chamægenista folijs Genistæ vulgaris.

Chamægenista prima, Clus. hist. seu Pannonica,

Genistella pannonica, Tab.

(Ger.

II. Chamægenista sagittalis.

Chamæspartium, Trag. Lon. Lugd. Tab.

Genista angulosa, Cord. hist. quoad iconem.



Genista minima, Gesn. hort.  
 Genistella graminea montana, Adv.  
 Genistella montana, Lob.  
 Chamægenista altera, Clus. pan. & hist.  
 Genista sagittalis pannonica, Cam.  
 Genistella lagopoides, Ger.  
 Variar magnitudine, hinc  
 Chamæspartium 1. & 2. Tab.  
 Genistella lagopoides major & minor, Ger.  
 III. Chamægenista caule foliato.  
 Genista humilis, Dod. pumila, Cam.

Chamægenista peregrina, Cl. hisp. & hist. Lug.  
 Genistella pinnata altera Hispanica, Lob.  
 Genistella pinnata, Ger.  
 Chamæspartium tertium, Tab.  
 IV. Chamægenista folio articulato.  
 Chamæspartium Narbonense, Tab.  
 Genistella globulata, Ger.  
 V. Chamægenista Cretica, in Prodromo  
 descripta.  
 VI. Chamægenista montana hispida.  
 Genistæ minoris species, Thallio.

## S P A R T I U M.

**Σ**πέρτα frutex est proferens virgas longas, sine folijs, firmas. fractu contumaces, quibus vites alligantur : fert lobos ceu Phaeolus, in quibus semina parva lenticula similia, florem luteum instar Leucoij, Diosc. lib. 2. cap. 158. quod nusquam in Europa gigni Guiland. scribit. Et Theoph. 1. hist. 8. ἀνίσταται. Linogenistam Gaz a vertit, cujus cortex multiplex tunicis cadit. At Plinio lib. 24. cap. 9. Genista est, cui easdem vires, quas Dioscorides Spartio ascribit.

I. Spartium arboreescens seminibus lentis  
 similibus.  
 Genista, Matt. Tur Italica, Dod. Hispanica, Ger.  
 Genista major, Cast.  
 Spartium, Matth. Lon. Lugd. alterum, Lac.  
 Spartum, Fuch. Dod. gal. Tur.  
 Genista ἀναγρὸς Græcis, Ang. Guiland. pap.  
 Genista juncea, Cord. hist. Gesn. hort.  
 Spartus vel Spartium, Gesn. hort.  
 Spartium Dioscoridis, Genista Plinij sive Hi-  
 spanica, sive Africana, Clus. hist. Lugd.  
 Spartium Dioscorideum Narbonense & Hi-  
 spanicum, Adv. Lob.  
 Genista altera junco rotundo, Cæs.  
 Genista transalpina, Cam.  
 Spartium Hispanicum, Eyf. 1. 2. & 3. Tab.  
 Pseudospartium Hispanicum, Ger.

Spartium Hispanicum alterum, Lugd.  
 Spartium Hispanicum 4. Tab.  
 Pseudospartium Hispanicum ἀφύλλον, Ger.  
 III. Spartium tertium flore albo.  
 Spartium 2. Clus. hisp. at in hist. 3. Hispanicum.  
 Spartum frutex minus, Dod.  
 Spartium 2. flore albo, Lob.  
 Spartium aliud Hispanicum Clusij, Lugd.  
 Spartium Hispanicum quintum, Tab.  
 Pseudospartium album ἀφύλλον, Ger.  
 IV. Sparto primo affinis.  
 Genistæ Hispanicæ affinis, in Prodromo.  
 V. Spartum triphyllon.  
 Genista Ilvenlis, Lugd.  
 Genistæ rotundæ genus in Ilva, Cæs.  
 Cassia Latinorum. Guilandino.  
 an Spartum minimum montanum triphyllum,  
 Colum.

II. Spartium alterum monospermon semi-  
 nereni simili.  
 Spartum frutex majus, Dod.  
 Spartium primum, Clus. hisp. at in hist. Spar-  
 tium 2. Hisp.  
 Spartium Hispanicum alterum flore luteo, Lob.

VI. Spartum sterile.  
 Sparti genus, in Hispania & Africa, juncus  
 propriè aridi foli, quod neque folium, neque  
 florem, neque semen fert, quo ad varia utuntur,  
 Guiland. pap.

## C O L U T E A.

**Κ**ολούτα Colutea, Liparia peculiaris inquit Theophrastus 3. hist. 17. arbor procera, fructum fert in siliqua, magnitudine lentis, folium mittit sanograce non absimile, &c.

I. Colutea vesicaria.  
 Colutea, Theophrasti, Trag. (cui vulgo Sena)  
 Dod. gal. (cui & Cytisus Latinorum) Ges. hor.  
 Lob. Clus. hist. Tab. Ger.  
 Colutea Foch. Matth. Lac. Lon. Dod. Ad. Cast.  
 Sena Mauritanorum, Ruellio.

Sena, Cord. hist.  
 Senna sylv. quibusdam malè, Gesn. hort.  
 Colutea, Senæ genus non est, cum nullas facul-  
 tates cum Senna communes habeat, Bellon.  
 Colutea vesicaria, Lugd. (cum duplici figura)  
 Cam. Eyfett.

Emeri alterum genus, Cæsalp.

II. Colutea siliquosa sive scorpioides major. Colutea scorpioides, Ad. Lob. Lugd. Cæ. ep. Ger. Colutea scorpioides prima, Clus. pan. Tab. Colutea scorpioides prima elatior, Clus. hist. Emerus vulgo, Cæsalp.

III. Colutea siliquosa minor. Colutea scorpioides humilior, Clus. pan. Ger. Colutea scorpioides 1. humilior, Clus. hist. Colutea scorpioides 2. Tab.

IV. Colutea siliquosa minor coronata. Colutea scorpioides altera, Clus. pan. & hist. Colutea scorpioides tertia, Tab. Colutea scorpioides montana, Ger.

V. Colutea scorpioides maritima glauco folio: in Prodro-mo descripta.

VI. Siliqua oblonga cinericea granis Coluteæ.

Fructus minor 12. Paludani, Clus. exot. libr. 2. cap. 20.

## S E N N A.

**S**ennam, quidam Dioscoridis Delphinium, alij Pelecium, alij Peplium, alij Empetron, alij Alypon: alij Theophrasti Cercidem sive Coluteam tertiam, alij Colyteam primam esse putant: at rem novam veteribus Græcis & Latinis Scriptoribus inditam, & à Mauritanijs primo propositam à Serapione sub Sene, à Mesue, qui domesticam & sylvestrem facit, sub Senna, censemus: cujus, ex Græcis solus Actuarius meminit.

I. Senna Alexandrina, sive folijs acutis. Senna Alexandrina, Trag. Gesn. hort. Cam. epit. & hort.

Senna Orientalis, Ang. Bellon. Ad. Cæf. Tab. Ger. Senna Ægyptia sive Alexandrina & Syriaca, quæ præstantissima, Lugd.

II. Senna Italica sive folijs obtusis. Senna, Hermolao.

Senna Italica, Trag. Tabernæm. Adv. Gerard. Cam. ep. & hort.

Senna, Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Cord. histor. Lon. Lob. Cast. Lugd.

Senna altera, Ang. forte Androsace.

Senna altera media dicta, Bellon.

Senna communis & vilior, Gesn. hort.

Senna nostras, Cæsalp.

## B A R B A J O V I S.

**P**linius lib. 16. cap. 18. inter arbores, inquit, odit aquas & quæ Jovis Barba appellatur, in opere topiario consilis: & in rotunditatem spissa, argenteo folio. Hujus Anguillara species duas facit, alteram de qua inter Cytisos egimus: alteram de qua præsens.

Barbæ Jovis prima species, Ang. Barba Jovis, Cæf. Cam.

Jovis barba, Lugd. Clus. hist.



## S E C T I O S E C U N D A.

JASMINUM; SYRINGA; LENTISCUS; MOLLE; THURIFERA ARBOR; TEREBINTHUS; BALSAMUM; PISTACIA; STAPHYLODENDRON; Glans Unguentaria; Ceratia sive Siliqua; Cassia nigra sive Fistula; Tamarindus; Lobi & Fructus exotici.

## J A S M I N U M.

**J**asminum Arabes Zambach & Sambach Serapione auctore appellant, & Græcos imitari volentes, Jese-min, à Jasme Græca voce. Jasme autem dicta fuit, quasi medicatus odor, aut immutata litera Josome, quasi viola odor.

Genera tria Serapio trahit: unum cui flos albus, alterum cui luteus, tertium cui caeruleus: etiam rubro flore in Asiaticis hortis reperi, Clusius refert: Dalechâmpius puniceum addit.

I. Jasminum vulgarius flore albo. Gelseminum vel Jasminum, Matth. Cast. Cam. Gesminum, Anguil. Jasminum, Dod. ut: cui & Apiaria, Cord. in Dios. Jasme & Sambac, Gesn. hort.

Gelseminum vulgarius, Adv. Lob. Cæsalp. cui Smilax lævis Dioscoridis.

Jasminum album, Lugd. Tab. Ger. fl. albo, Eyst.

II. Jasminum humiles luteum.

Gelseminum luteum, Adv.

Dd 3.

Jasmi-

Jasminum luteum, Lob. in ico. Tab. Ger. flore luteo, Eyst.

Gelseminum humilium alterum fl. luteo, Cæs.

III. Jasminum humilium magno flore.

Gesmini 3. species, Ang.

Chamægelseminum grandiflorum, Lob.

Gelseminum humilium primum, Clus.

Jasminum puniceum, Dalech. Lugd.

Gelseminum Catalanicum, Cam. ep. (sive Hispanicum) Eyst.

Jasminum candidiflorum, Tab. majus, Ger.

Flos candidus est averfa parte rubens.

IV. Jasminum cæruleum, Serapioni.

Jasminum cæruleum, Tab. Ger.

In hoc genere cæruleum nondum vidimus: an Arabes Ligustrum Orientale, quod alias Syringa cærulea dicitur intellexerint, Cæsalpinus dubitat: alij Clematidem cæruleam esse volunt.

V. Jasm. luteum vulgo dictum, bacciferum.

Polemonium Monspeliensium, Gesn. Ad. Lob. Lugd. Cam. Eyst.

Ruta capraria Gallorum Monspel. Gesn.

Trifolium fruticans, Dod. Tab.

Ruta baccifera sive trifolia, Tab.

Jasmini species trifolia non videtur a Polemonium accedere, Colum.

Folij ludit: nam licet communiter, præsertim si in hortis colatur, trifolium sit, attamen circa Monspelum aliquando unico folio reperitur.

VI. Jasminum millefolij folio.

Gelseminum alterum rubrum, Cæs.

Quamoclit, Cam.

Gelseminum Indianum pennatum: flore sanguineo, Ponæ Ital.

Convolvulus pennatus exoticus, Col.

Quamoclit sive Jasminum Americanum, Clus. cur. post.

## S Y R I N G A.

**S**yringa licet Africum vocabulum videatur, aliquibus tamen à virgarum rectarum longitudine & inferioris medulla fungosa copia dicitur: vel potius quod ramuli exempta medulla fistulosi sint.

I. Syringa cærulea.

Lilac, Matthiol. (qui glandem unguentariam existimat) Adv.

Lillach, Dod.

Cauda vulpina Turcarum, Bellon.

Syringa cærulea Lusitanica, Lob. Eyst.

Syringa flore cæruleo, Clus. hisp. & hist. Lugd. Cam. Ger.

Syringa Lusitanica, Tab.

Ligustrum Orientale, forte Jasminum cæruleum Mauritanorum, Cæs.

Ostryam Theoph. 3. hist. 10. esse aliqui volunt, auctore Lugd. historiæ monente: est Ostrya, inquit, quam nonnulli Ostryam vocant, unica species Oxyæ (Plin. l. 13. c. 21. *ὄξυς*, id est fraxino, legit) cum saturo cortice similis: folio pyrorum, multo oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibris multis & crassis, à medio dorsi in modum costarum recta secundum magnam fibram porrectis, in fibris ipsis rugato & in ambitu leviter serrato, materie dura, decolore albida: fructu parvo, oblongo, hordeo simili, flavo: radices sublimes habet. Idem ferè Plinius.

Variat floris colore, qui communiter cæruleus: aliquando cinereus & quasi argenteus: hinc figuræ duæ apud Eyst. nomine Syringæ flore lacteo & flore cæruleo.

II. Syringa Arabica folijs mali arantij.

Sambac Arabum sive Gelseminum Arabicum, Alpini.

Jasminum Arabicum sive Syringa Arabica, Clus. cur. post.

III. Syringa alba sive Philadelphus Athenæi.

Syringa, Dod. Cæs. alba, Tab. Ger.

Syringa flore albo, Clus. hisp. Lugdun. (quam Ostrya Theophr. volunt, quod Clusius negat) odorato, Cam.

Syringa Italica, Lob. Eyst.

Frutex coronarius, Clus. hist.

Flore communiter est simplici, rarius pleno, quare Syringa Italica flore albo pleno, & Syringa flore albo simplici, apud Eyst.

IV. Syringæ albæ affinis.

Fructus miscellaneus undecimus, Clus. exot. lib. 2. cap. 21.

## LENTISCUS ET MOLLE

**L**entiscus fortasse dicta, quod folia lentore quodam lentescant: *ῥιν* Dioscoridi l. 1. c. 89. quasi *ῥινός* fissilis, quod facile & frequenter in dentiscopia findatur: quod & Diosc. tempore scilicet arborum, qui arborem ut notam non describit, sed ejus resinam quam *μαρίν* nominari ait: de qua inter Resinas. Hujus baccas Hippoc. de nat. mulieb. *ῥινίδας* (non *ἰνίδας*) appellat.

I. Len-

I. *Lentiscus vulgaris.*

*Lentiscus*, Matth. Ang. Dod. ut : Bell. Lac. Lon. Ad. Clus. Lob. Cæs. Lugd. Cast. Rauvvolf. *Lentisci* in Chio similes sunt ijs qui in Gallia Narbonensi & Italia nascuntur: solæ tamen quæ in Chio Mastichen præbent, Bellon. obs.

II. *Lentiscus Peruana.*

Molle, Clus. in Monardem, Lob. & lib. de Balf. Cam. Ger. Colum. addens, quod si in Creta nasceretur, pro Tragio supponi posset.

Mollis, Cast. arbor, Tab.

Molle arbor, Lugd. & hist. Ind. Occid. p. 9. lib. 4. c. 30. quæ in Moxu vocatur arbor ex Peru, quod hinc primum alio translata sit.

Moly, molle & muelle, Frag.

Variat folijs, quæ in tenella dissecta: in adultâ nec incisa, nec crenata sunt, quemadmodum ramus adultioris arboris in Matthiolo nostro, & Clus. cur. post. exhibetur. Uvæ quoddam genus producit, unde Indi vinum premunt, Ind. Occid. l. c.

III. *Arbor exotica folijs alatis.*

Juvv apud Amazones nascens, Clus. exot. l. 4. cap. 14.

IV. *Arbor exotica Lentisci folijs.*

Moringa, Acoftæ, Cast. Lugd.

Fructus raphani crassitie, radix unicornu vi-

ces supplet; & ejus in Theriaca usus est.

V. *Arbor exotica spinosa folijs lentisci.*

Bonduch Indorum, Ponæ Ital.

Fructus peregrinus primus, Clus. l. 2. exot. c. 30.

Lobus ἐχινώτης, Clus. exot. l. 3. c. 15.

Mates Indorum cinericei coloris, id est, Legumen Indicum, Eid. & Ponæ.

Fructus peregrinus prior, Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

Hujus fructum Millij Indici primum, dein Bonduch nomine à Pona, Veronâ accepimus, qui Avellanæ magnitudine, durissimus, splendens & cinericei coloris.

Ex Brasilia, Java, & Virginea etiam Pisorum nudorum nomine multi adferuntur.

VI. *Lobus orbicularis fuscus spinosis tuberculis obsitus, binos phaseolos nigros continens.*

Fructus quartus qui Indis Samparantam, ex navigatione. Batau. Clus. exot. l. 2. c. 15.

Lobus echinatus Molucensis, Ponæ Ital.

an Samparanton radix valida & amara quæ in Sunda nascitur, in Ind. Or. par. 4. c. 8. hujus arboris radix est?

VII. *Arbor Malabarensium fructu Lentisci.*

Pauare, Acoftæ, Lugd. Cast. ap.

Arbor erysipelas curans, Lusitanis.

## THURIFERA ARBOR.

**T**hurifera arbor, Græcis Λιβανός & δένδρον Λιβανός: quemadmodum lachryma Λιβανώτης, quæ Hippocrati Λιβανώτης καπνός dicitur: Λιβανός à Λιβώ stillo: licet Græci fabulentur à juvene Assyrio hujus nominis, quod Deos studiosissime coleret, ab invidio occiso & in hunc fructum converso dici: hinc Dys thure gratius nihil esse. Loran Arabibus: de qua sic Theophrast. 9. hist. 4. arborem nonnunquam qua quinus fere cubitus atollatur & ramosam ferunt, folio pyri sed multo minore, coloris herbacei ut Ruta, cortice levi Lauri modo: 4. hist. 6. in Arabia, Syria, India nascitur: 9. hist. 2. sub eane & ferventissimis diebus incidi referunt: 9. hist. 3. & tam sponte quam incisa thuris prodire posse. Idem 9. hist. 4. alij thuris arborem lentisco similem prodidere, & fructum quoq; lentisci folium subrutum: Idem folia Lauri & Lavia tribuit. At Garzia arbor est humilis, folia lentisco similia habens, & Arabia peculiaris: Theveto pinis resiniferis similis. Non solum ipsius lachryma in usu fuit sed & cortex arboris apud Diosc. l. 1. c. 82. & μαννα, manna thuris c. 83. & αββα fuligo c. 84. Vide inter Resinas.

Duplex est: alia montana, alia in planis nascens Garzia, Fragofo.

## Arbor thurifera Theveto, Lugd.

Thuris limpidi folium, Ad. Lob. ico. Lug. Tab.

pingunt: & Taber. arboris caudicem cum Stagonia thure adpingit.

## TEREBINTHUS.

**T**erebinthus, Græcis Τερβινθός nominatur, quam Dioscorides l. 1. c. 9. velut arborem cognitam non descripsit. Theophrasto 3. hist. 15. alia mascula est, alia femina: & mascula quidem sine fructu: feminarum altera fructum statim rubentem edit, lentis magnitudine, qui coqui nequit: altera viridem (ἔχλωρον Plinius pallidum l. 13. c. 6. vertit) deinde rubentem & cum vite maturescens, tandem nigrum fabæ magnitudine, resinofum, odore jucundiore, & c. flos oleæ similis, rubens: folia in uno pediculo multa, Laurinis similia, bina velut

veluti Sorbo, in summis ramusculorum partibus imparia, nisi quod minus angulosa quam Sorbo, & ambitu laurini similia, pinguis cum toto fructu: fert & illa folliculos quosdam cavae ut Ulmus, in quibus animalcula culicibus similia nascuntur. Et 4. hist. 5. Terebinthi Indica meminit. Plinius l. c. sed brevius de ea egit. Resina terebinthina ex hac colligitur, de qua cap. de Resinis.

### I. Terebinthus vulgaris.

Terebinthus foemina altera Theophrasti.

Terebinthus, Matth. Dod. ur: Cord. in Diosc. & hist. Turn. Lac. Lon. Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Terebinth. minor in Lombard. & Hetruria, Ang.

Terebinthus lentiscifolia minor, Ad.

Terebinthus vulgaris, Rauvvolf.

II. Terebinthus peregrina fructu majore Pistacijs simili, eduli.

Terebinthus major cujus fructum Arabes Botn quibir appellant, Rauvvolf.

Terebinth. nostras Juglandes aequans, Bell. cult.

Terebinthus major pistaciae folio, Ad. Lob.

Terebinthus Indica major Theophr. ex Rauvvolf. Lugd. ap.

Terebinthus latifolia, Tab. Ger.

Terebinthi majus genus ad Terebinth. Indicam Theophr. & Fael Serap. Avicen. & Rhasis ferri potest, Clus. hist.

Folij oblongiusculis à Pistacijs, quæ rotundiora habet, & fructu sive nuce brevior & rotundior differt, quo inquilini, perinde ut nos Avellanis vescuntur.

Gallarum genus quoddam nucis ponticae magnitudine, Terebinthi arbores in Thracia & Macedonia producunt, quarum apud Turcas usus est, tenuissimis sericeis pannis inficiendis, Bellon. obs.

III. Terebinthus peregrina fructu minore & caeruleo, eduli.

Terebinthus Syriaca, Theophr.

Terebinthus in Cilicia & Syria. Bellon. obs.

Terebinthi peregrini alterum genus, Clus. notis in Bellon.

Terebinthus minor, qui Arabibus Botn fougier dicitur, Rauvvolf.

Terebinthus in Mesopotamia & Armenia, Eid.

Terebinthus minor, qui ad Bel Arabum referri potest, Clus. hist.

Et hujus fructus, qui cum suo cortice Piso majori æqualis est, perinde ut nos Pineos nucleos comedunt: quo & Persæ plus quam bis mille annis ante panis usum vitam sustentarunt, & etiamnum totius Syriæ incolæ ijs cum pane vescuntur: & propter colorem inter viridem & caeruleum medium, Arabes veteres, Granum viride, Bellonio attestante, appellarunt.

## B A L S A M U M.

**B**alsamum, βαλσαμον Dioscoridi l. c. 18. arbor Lycij seu Pyræantha magnitudine conficitur: folia habet Rutæ proxima, sed candidiora multo & perpetuo magis virentia, &c. qui & ὀποβάλαμον, φυlobάλαμον ἢ ὑακπὸν, sive succum, lignum & fructum commendat: & vim efficacissimam balsami liquori tribuit: proximum fructui, minimum vero ligno. Et Theophrasto 9. hist. 6. arboris magnitudo, quæ malo punica magnæ, ramus multi, folium rutæ simili, candidum tamen, perpetuo virens, fructus similis terebintho tam magnitudine, quam colore, valde odoratus & lacrymâ ipsâ odorator, &c. Plinius lib. 12. cap. 25. quadam alia scribit, alia ex utroque mutuatus videtur.

### I. Balsamum Syriacum rutæ folio.

Balsamum, Matt. Lac. Ad. Col. Cast. Cæs. Alpino, Hon. Belli ep. 5. ad Clus. Liquor ejus Opobalsamum & Balsamælæon, de quo & Cord. hist.

Balsamum lentisci folio Ægyptiacum, Bellonius obs.

Carpobalsamum veterum flavum.

Carpobalsamum & Cassamum verum, Cord. in Diosc. & hist. Cæs.

Lignum Xylbalsamum, Cæs. sunt aliquando festucae tenues, quæ cum Carpobalsamo adferuntur.

Ar Terebinthus geminus, omnibus partibus, liquori, ligno & semini succedaneum esse potest.

Fontem esse in Sumatra Insula, qui Balsami pretiosissimi oleo scaturiat, Linscot. par. 2. Ind. Or. 21. scribit.

II. Carpobalsamum nigrum Alexandrin. an Semen Hyperico simile, quod, à Petra Palestinæ oppido etiam Dioscorid. tempore adferebatur.

Carpobalsamum non legitimum, Matth.

Carpobalsamum offic. Cord. in Diosc. (qui addit, aliquando inter ea reperiri adulterinis granis majora, odoris & saporis suavissimi) Tab. Balsa-

Balsami veri fructus, Alpino.

III. Xylobalsamum officinarum.

Myrtum potius quam Balsamum refert, Matth.

Alterius fruticis furculi, quàmvis aliquando inter eos mirum in modum odoris & saporis gratia commendabiles reperiantur, Cord. in Diosc. & hist.

Xylobalsam. vulgo nuncupatum, quod ex felici Arabia defertur cum Ægyptio convenit. Bel. ob. Lignum Balsami ex Arabia felici, Linscot. par. 2. Ind. Orient. 7.

IV. Balsamum Indicum, ex arbore Punicâ malo majore Xylo dicta, folijs Urticæ.

Balsamum Indicum novum, Matth.

Balsamum ex nova Hispania, Lacun.

Balsamum ex Occidentali India, Monard. Lugd. & Ind. Occid. p. 9. l. 4. c. 28.

Balsami genus novum, Cæs. Frag.

Hujus genus limpidum, quod pura est exstilians lacryma, opobalsamum vocant: aliud imperfectius, quod ex ligno, cortice & folijs expressum est, aut ignis vi prolicitur, quod Xylobalsamum appellatur, Ind. Occ. l. c.

V. Balsamum fructu racemoso ex Hispaniola. Balsamum novum ex Hispaniola, Auctori hist. gener. Indiæ, Lugd.

Ex planta sponte nascente arboris magnitudine folijs amplis (quale Lug. hist. exhibet) sex digitos longis, 4. cum dimidio latis, elicitur.

VI. Balsamum Americanum.

Balsamum aliud ex Americæ continente, Lugd. Ex arbore vasta, ramosa fructu pisti magnitudine siliqua digitum longa inclusa, quæ pingitur nomine Fructus balsami Monardis, Lugd.

Lobus oblongus aromaticus, Clus. exot. l. 1. c. 18.

Balsami Peruani fructus, Ponæ, Clus. cur. post.

Balsamum quod ex India occidentali adfertur primum in Hispaniola inventum: arbor unde elicitur Goaconazab indigenis vocatur, Ovied. hist. Ind. l. 10. c. 12.

Balsamum ex Nicaraguæ, Benzoni, Ind. Occid. part 5. cap. 16.

an Balsamum ex Gueana, Ind. Occid. p. 8.

VII. Balsamum Tolutanum folijs Ceratiæ similibus, quod candidum est.

Balsamum de Tolu, Monardi, ex Insulis Tolu, Ind. Occid. q. 9. l. 4. c. 28.

Balsamum Tolutanum ex arboribus pumilibus pinis similibus, Lugd. ap.

an Balsam. album Curcas vocatum, Ind. occ. p. 8.

VIII Frutex Indiæ Orient. Lavendulæ folio. Arbor Lavendulæ folio, Clus. exot. l. 1. c. 5.

## P I S T A C I A.

**P**istacia Dioscor. l. 1. c. 177. in Syria gignuntur pineis nucibus similia. Theoph. 4 hist. 5. ferunt & in India Terebinthum esse, arborem alteri terebintho similem, cujus folia, rami & reliqua omnia terebintho similia: fructus autē diversus, similis enim amygdalis, non magnus sed aspectu similis & suavitate amygdalis præstantior.

I. Pistacia peregrina fructu racemoso, sive Terebinthus Indica, Theoph.

Pistacia, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diosc. & hist. Lon. Dod. Lob. Cæs. Alp. Cast. Cam. Tab. Ger. Eyst.

Pistacium, Gef. hort.

Terebinthus Indica Theophrasti, Ad.

Pistachia, incolis Fislic, Rauvvolf.

Pistaciarum arbor, Dod. gal. Lugd.

Fructus dicuntur *πιστακια*: Nicandro *πιστακια*: Popsidonio, monente Athenæo, *βιστακια*: Latinis Pistacia: officinis & barbaris Fistic.

II. Arbor exotica fructu racemoso, Charamaï di&ta.

Charamais & Ambela, Acoftæ, Lugd. Cast.

Duo genera, unum pyrifolio, alterum malo minore, fructu avellanæ acido.

III. Pistacia sylvestris.

Staphylodendron Plinij, lib. & c. 16. est & trans alpes arbor similima aceri, alba materia, quæ vocatur Staphylodendron: fert siliquas & in ijs nucleos sapore nucis avellanæ.

Nux vesicaria, Trag. Dod. Ger.

Staphylodendron, Matth. Bellon. Ad. Lob. Lugd. Cam. Tab. Plinij, Dod. gal. Gef. hort. Eyst.

Arbor vitis & Lacryma Joppi, Ang.

Pistaciorum species, Scaligero in Aristot.

Pistacia Germanica, Lon. sylvestris, Cast.

Coulcoul & Hebulben Turcarum, Matth. epist.

At Bellonio obs. Hebulben semina sunt in officinis Turcarum venalia, quæ nobis in usu non sunt: quemadmodum nec Nux quædam gemini pungi magnitudine, parvis granis esui aptis, avellanæ instar dulcib<sup>9</sup>, plena, quam Coulcoul, hoc est, nucem de Coulcoul nominant.

Ex fructu sphærulæ precatorię sunt.



## GLANS UNGUENTARIA.

**G**lans unguentaria, βάλανος μύρτιος Dioscoridi l. 4. c. 154. fructus est arboris Myrica similis, magnitudine nucis Avellana, cujus interior pars expressa, veluti amygdala amara humorem emittit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur: at Theoph. 4. hist. 1. βάλανος simpliciter: Balano, inquit, a fructu nomen inditum: folium ejus Myrto simile est, sed oblongius fructus magnitudine & aspectu capparis fructus similis, cujus corticibus contritis unguentarij utuntur, &c. Hac unguentaria nomine à ceteris glandibus distinguitur, quod ea unguentarij plurimum utantur. Plinio libr. 12. cap. 21. Myrobalanus Troglolytis nascens unguento, ut ipso nomine apparet, fructus magnitudine avellanae nucis, &c. Arabes Habel, Ben & Granum ben nominant: inter quos Mesues qui duplex facit, aliud Ben magnum ut Avellana, quod Monardes Avellanas purgatrices esse vult: aliud parvum Ciceris magnitudine: ex quo Monardes moriente, Itali oleum de Ben conficiunt.

Glans unguentaria, Matt. Lac. Cord in Diosc.  
Clus. in corol. Dodonæi, Lugd. Cæs.  
Granum ben, Lon.  
Balanus myrepica, Pharagon incolis ad montem Sinai, Bellon.

Macalep album, Rauvvolf.  
Glans unguentaria cathartica siliquata, Adv. Lob. icon.  
Balanus myrepica, Cord. hist. Tab. Ger. Pon.  
Ben parvum, Monardi.

## CERATIA SIVE SILIQUA.

**K**εράτις, id est, siliqua, à corniculorum similitudine, à Dioscoride l. 1. c. 158. qui eam non descripsit: à Galeno & Aegineta verò κεράτις, quasi cornuta siliqua, hac arbor appellatur: à recentioribus Græcis χυλοcerata: Arabibus Charnub: à Plinio l. 15. c. 24. Siliqua (quia semen fert in siliqua leguminum modo) de qua hac: haud procul abesse videntur & prædulces Siliquæ, nisi quod Cortex in ijs manditur: digitorum hominis longitudo illis, interim falcatis pollicari latitudine, &c.

## I. Siliqua edulis.

Siliqua, Matt. Ang. Tur. def. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lac Lon. Rauvv. Cast. Cam. arbor, Cæs. cui & Ceronia Theophr.  
Siliqua sive Ceratia, Bellon.  
Siliqua dulcis Alpino.  
Ceratonia, Dod. ut: Gef. hor. Lugd. Frag.  
Cerata vel siliqua, Ad Lob. Tab. Ger. Clus. hisp. siliqua κεράτις, Eid. hist.  
Ceraunia siliqua Theoph. 4. hist. 2. & Plin. l. 13. c. 8. Dalech. in Plinium: at hist. Lugd. auctor diversam facit.  
Fructus κεράτις, siliqua, vulgo Carobe nominatur: cujus semen sex grana pendens, ponderi illi auri quod Karat dicitur, nomen dedit.

## II. Siliqua purgatrix.

Caroba sive Sili. ex Guinea purgatrix, Pon. Ital.

## III. Siliqua sylvestris rotundifolia.

Arbor Judæ, Bellon. (quæ Græcis vulgo Couchias) Gef. hor. Dod. Ad Lob. Rauvv. Lugd. Tab. Cam. Ger. Eyft.

Fabago sive siliquastrum, Bellon. Gef. hor.

Ceratia agrestis, Eid.

Siliqua syl. Bellon. Clus. hisp. & hist. Cam. ep. & hor. Cæs. cui Cercis Theophr.

Siliquastrum & Siliqua sylv. & fatua, & arbor amoris, Cast.

## Quibusdam Cercis siliquata Theophr. 1. hist.

18. alijs Colytea tertia Theophr. 3. hist. 14. quibusdam Laburnum vel ejus species.

Acacia vera Matth. quibusdam videtur, quam spinis horridam pingit, quas commentitias suspicantur.

Flores eleganter purpurei, quandoque albi & cortice candicante.

## IV. Siliqua sylv. rotundifolia Indica.

Semen nummi instar rotundum planum denarii magnitudine, crassiusculum, rufum, à Rev. D. Terentio ex India accepi, cum hac inscriptione: Semen numulariæ est arboris Judæ Indicæ, cujus flos magnus elegans & odoratus est.

## V. Siliqua sylv. spinosa arbor Indica.

Coral arbor, ob flores colore Corallij æmulos, Clus. append. 1. hist. plant. & append. altera ad appendicem primam.

an Acacia prima, Matthiol. & Lugd.

an Acacia major, Cast.

## VI. Siliquæ sylv. similis.

Acacalis, vel Syriacè Kismisen sive Sifime, Cam. Acacalis Kismesen, Bellon.

an Acacia Dioscoridis, Rauvvolf.

Semen hoc Cairine & Kismisen nomine à Doct. Paludano ex Syria reduce an. 1579. Patavij accepimus: an Dioscoridis Acacalis? cum hæc nostra



nostra folijs rotundis enata sit. Dioscoridi verò | quadantenus similis. Valer. Cordus in Diosc. non  
l. 1. c. 118. & ex eo Æginetæ ἀνάκλις, fructus sit | cognosci scribit, nisi aliquis ex Myrobalanis  
fruticis in Ægypto nascentis, myricæ fructui | Emblicis sive Belliricis hunc esse existimet.

## CASSIA NIGRA SEU FISTULOSA.

**C**assia Fistula ab Arabibus inventa est, & à recentioribus Græcis, ut Actuarius, κασσία μέλαινα nominatur.  
Fabam Indicam veterum, ut Aristobuli, Valerius Cordus credidit. Siliquam Ægyptiam Theophrasti i.  
hist. 18. nonnulli censent.

I. Cassia fistula Alexandrina.  
Cassia solutiva sive Ægyptia siliqua, Matth.  
Cassia fistula, Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc. Gesn.  
hort. Cast. Alpino, Frag. Tabern. Ger. Pigafette  
desc. regni Congiani & Ind. or. p. 1. & 4.  
Cassia fistula laxativa, Lon.  
Cassia solutiva, Bellon. Monard. Garziæ, Lin-  
scot. p. 4. Ind. or. fig. 17.  
Cassia stercorearia, Guiland. pap.  
Cassia nigra, Dod.  
Siliqua Ind. vererum, Cord. hist. Ind. Gesn. hor.  
Canna fistula seu fistularis, Lins. p. 4. Ind. or. c. 37.  
Cassiam quæ hujus arboris fructus est, Ægyptij  
Chaja-ar-xambar vocitant, Paludanus in Lins.  
Siliqua aut Cassia purgatrix Arabum, Ad. Lob.  
Siliqua sive Cassia cathartica, Lugd.  
Cassia, siliqua Ægyptia Theoph. videtur, Cæs.  
Cassia Ægyptia sive purgans, Cam.  
Canna fistula, Acostæ.  
Canna fistula sive Cassia: Joseph. Acostæ, lib. 3.  
cap. 22. quæ in Hispaniola copiosissima: Idem  
lib. 4. cap. 29.

Eligenda fistula insignis, plena, gravis & re-  
cens, & quæ concussa, inclusis seminibus mi-  
nimè contreat, splendens, foris ac etiam in  
pulpa pinguis: pulpam (quæ non ante usum  
extrahi debet) florem Cassiæ & Cassiam ex-  
tractam vocant.

II. Cassia fistula Brasiliensis.  
Cassia siliqua Brasiliensis purgatrix compressa,  
Lob. in pharm. Rondel.

Hæc ex Brasilia advehi cepit, cujus pulpæ  
uncia una, plus quam uncia duæ alterius Æ-  
gyptiacæ, purgat.

III. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus.  
Arabicam vocamus, eò quod ex Arabia in  
Indiam aliasque regiones deferatur: à quibus

Tamarindus nominata, quasi dicas Daðtylos  
Indos, sive Palmulas Indicas: Tamar enim  
illis Daðtylum significat: licet arbor Palmæ  
similis non sit, nec ex Palmarum generibus,  
nisi ad fructus effigiem, quæ daðtylum sive di-  
gitum iuflexum refert, respexerint. Sunt qui  
velint Plinium lib. 12. cap. 6. de hac intelligen-  
dum esse, cum inquit: est & alia similis huic  
(Palmæ scilicet) dulcior pomo, sed interaneorum  
valetudini infesta.

Tamarindi, daðtyli Indici } Mesuæo, Lac. qui à  
Palmæ syl. Indicæ fructus }  
Palmulis Thebaicis non differe vult.

Tamarindus Serapioni, Cæs.  
Tamarindi, Matth. Bellon. Garz. Acostæ, Frag.  
Lob. qui addit perperam Oxyphœnicum ap-  
pellari, Lugdun. qui in ap. & alteram figuram  
Acostæ exhibet.

Thamarindus, id est, Acacia Indica, Cord. hist.  
Palmæ sylv. fructus Oxyphœnica, Lonic. Cast.  
cum ficta figura.

Thamarindi, Cam. ep.  
Tamarindus Derelside appellata, Alpin.  
Tamarinio, Puly & Ambisy Indis, Linscotto  
Ind. or. p. 4. c. 37.

Affa sive Tamarindus: par. 4. Ind. or. fig. 15.  
Folliculi recentes, cum melle aut Saccharo  
in India condiuntur: ex substantia intinctum  
(Caryl vocant) parant, cum cibis utendum.

IV. Tamarindis simile semen spadiceum  
dentatum.

Fructus alicujus semen num. 20. à Gareto, Clu-  
sio exot. lib. 2. cap. 16.

V. Tamarindo similis frutex.  
Queillos frutex folij Tamarindi, fructu ut fabæ  
Romanæ subduplo longiore, quo in cibis u-  
tuntur: par. 4. Ind. or. 8.

## D E L O B I S.

**E**t si Dioscorides Smilacis hortenensis fructum λέβις, quasi siliquulas dicas, vocavit, eamque ob causam de Lobis  
post Phaseolos dicendum videretur, tamen cum alij sint Lobi, qui arborum fructus sunt, de alijs verò non  
satis constet, placuit de omnibus hic agere, usque dum certius quid cognoverimus.

I. Arbor filiquosa Juglandis folio Brasili-  
ana, lobo longissimo Acaciæ siliquæ instar di-  
stincto.

Lobus Brasilianus ingens, Clus. exot. l. 3. c. 1.

Lobus cineraceus binos pedes Romanos  
cum triente longus, quatuor uncias latus: se-  
mina ex albo rufescentia pene orbicularia, nu-  
ci vomica non admodum dissimilia.

II. Arbor filiquosa Brasiliانا lobo latissimo.  
Lobus Brasilianus alter, Clus. exot. l. 3. c. 2.

Hic Lobus, duplex est: major ex fusco cine-  
raceus, octo uncias longus, quatuor cum semis-  
se latus, semine quasi quadrangulo: alter mi-  
nor, ex fusco rubescens, semine citrij mali se-  
mini non valdè dissimili.

III. Arbor filiquosa ex Virginea lobo fusco  
scabro.

Lobus ex Wingandecaovv, Clus. exot. l. 3. c. 3.

In hoc osicula verius, quam Phaseoli, nigra,  
dura, Avellanæ magnitudine.

Hic duplex est: alius ex Virginea fuscus,  
quinque vel etiam sex uncias longus, duas vel  
duas cum semisse latus, unam crassus. Alius ex  
insula Hayti sive Isabellæ vicina, spadicei colo-  
ris, septem uncias longus, tres cum semisse latus.

IV. Arbor filiquosa ex qua gummi Anime  
elicitur.

Lobo ex Wingandecaovv similis, Clus. l. c.

an Guama Oviedi horum duorum alteruter.

V. Arbor filiquosa lobo quadrangulo fusco.  
Lobus peregrinus quadrangularis, Clus. exot.  
lib. 3. cap. 5.

Lobus sulcis distinctus, septem uncias lon-  
gus, binas latus.

VI. Arbor filiquosa Africana, folijs fere pyri  
semine fabaceo.

Phaseolus quintus peregrinus, sive Phaseolus  
Coles, Clus. exot. l. 3. c. 7.

Siliquæ candidæ, phaseolis longiores &  
maiores: semina albo putamine ablato minij  
colorem habent & siccata in binas partes spon-  
tè finduntur.

VII. Fructus oblongus cineraceus rugosus  
& gibbosus.

Fructus ex Bengala ad Coles accedens, Clus.  
exot. l. 2. c. 14.

VIII. Fructus compressus quadrangulus  
venis candicantibus & nigricantibus, ut Coles  
fructus distinctus.

Fructus 6. Parduyni, Clus. exot. l. 2. c. 12.

IX. Lobus orbicularis fuscus spinosis tu-  
berculis oblitus, binos phaseolos nigros con-  
tinent.

X. Arbor filiquosa Guinenfis lobo spadi-  
ceo, fusco.

Lobus ex Guinea, Clus. exot. l. 3. c. 4.

Lobus decem uncias longus, tres latus, grana  
dura ex spadiceo fusca, medulla tetri odoris.

XI. Arbor filiquosa Guinenfis, fructu faba-  
ceo, lobo longissimo.

Lobus fabæ arborecentis, Clus. exot. l. 3. c. 6.

Lobus nigricans & fuliginosus, uncias no-  
vendecim, vel viginti longus, tres latus, pha-  
seolos septem, binas uncias cum semisse lon-  
gos, semunciam latus, planos, ex spadiceo ni-  
gricantes & splendentes continens.

an Arbor fabas majores proferens, par. 6. Ind.  
Orient. tab. 14. lit. H.

XII. Lobus cortice cartilagineo, rugoso,  
fusco, duplici crista sinuosa donatus.

Lobus primus cartilagineus ex insula Mauritij  
3. Clus. exot. l. 3. c. 9. & 10.

Hic vel uncias quatuor cum semisse, vel tres  
longus, binas latus; ille tres, hic duos phaseo-  
los orbiculatos ex puniceo nigros, veluti annu-  
lo cinctos, eosque duos continet.

XIII. Fructus subrotundus durus elegan-  
ter rubens.

Fructus peregrinus 10. Mares nomine acceptus,  
Clus. exot. l. 2. c. 30. & tab. 3. Lugd.

XIV. Lobus cortice membranaceo, atro  
rumido.

Lobus niger primus turgidus, Clus. exot. lib. 3.  
cap. 18.

Hic uncias binas longus, unam latus, semina  
nigra, plana, Acaciæ fructu similia continet.

XV. Lobus membranaceus atros padiceus,  
planus Guinenfis.

Lobus niger 2. planus, Clus. l. c.

XVI. Lobus quadrangularis, Clus. exot.  
lib. 3. cap. 17.

Hic ex fusco fuliginosus, grana quadrangula,  
in binas partes dividua continet.

XVII. Lobus aromaticus subfuscus Tere-  
binthi corniculis similis.

Lobus oblongus aromaticus, Clus. exot. lib. 3.  
cap. 18.

Hic sex, septem, etiam octo uncias longus;  
vix semunciam latus, tenuem pollinem ni-  
grum tenacem; Benzoini ferè odore, continet.

## FRUCTUS EXOTICI.

**F**ruetus exoticos plurimos Clusius proposuit, plurimos etiam à D. Jacobo Guiljelmo Hooft Amstelrodamo ante octennium accepimus: quos quantum licuit in aliquem ordinem digessimus, aliquos ad arbores quibus consimiles sunt, vel saltem fructu, retulimus: alios verò ratione formæ distributos, hic recensemus.

*Fruetus rotundi & orbiculares.*

I. Fructus magnus ex rotunditate compressus, cortice rugoso fusco.

Fructus crassus peregrinus, Clus. exot. l. 2. c. 7.

II. Fructus rotundus cortice fungoso subpurpurascente.

Fructus 1. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

III. Fructus orbicularis spadiceus lævis.

Fructus miscellaneus 3. Clus. exot. l. 2. c. 25.

IV. Fructus orbicularis fuscus, nucleo cineraceo.

Fructus miscellaneus 4. Clus. exot. l. 2. c. 25.

V. Fructus orbicularis flavus maculâ subfusca notatus.

Fructus peregrinus 6. Clus. exot. l. 2. c. 29. Lugd. Tab. Ger.

VI. Fructus orbicularis spadiceus nucleo duro.

Fructus exoticus 4. Clus. exot. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis ex ruffo nigricans.

Fructus peregrinus 3. Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. altera, Lugd. Tab. Ger.

VIII. Fructus orbicularis fuliginosus.

Fructus 15. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

IX. Fructus orbicularis ater & acidus.

Fructus peregrinus acidus saporis, Cl. ex. l. 2. c. 13.

X. Fructus orbicularis cinericeus ut Chamaeriphes nucleus.

Fructus 12. navigat. Botau. Clus. exot. l. 2. c. 15.

XI. Fructus orbicularis Arantij forma cineraceus.

Fructus minor 7 Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

XII. Fructus rotundus parvus putamine spadiceo flavescente, nucleo subacido.

Fructus 7. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

XIII. Fructus orbicularis compressus cineraceus.

Fructus minor 1. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

*Fruetus orbiculares sulcis nervisque distincti.*

I. Fructus orbicularis major fuscus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 1. Clus. ex. l. 2. c. 9.

II. Fructus orbicularis minor cineraceus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 2. Clus. ex. l. 2. c. 9.

III. Fructus orbicularis subniger & splendens sulcis distinctus.

Fructus 1. è Walachria, Clus. exot. l. 2. c. 22.

IV. Fructus alter splendens quatuor sulcis distinctus.

Fructus 9. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

V. Fructus orbicularis in summo lineâ trigonâ distinctus.

Fructus 10. à Gareto, Clus. exot. l. 2. l. 16.

VI. Fructus orbicularis Arantium siccum referens, quatuor venis distinctus.

Fructus 2. Jacobi Plateau, Clus. exot. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis fuscus senis nervis distinctus ex Guinea.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Cl. ex. l. c. 10.

VIII. Fructus orbicularis spadiceus novem venis distinctus major.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 1. Clus. exot. l. 2. c. 10.

IX. Fructus orbicularis minor novem venis, ut & semen, distinctus.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 2. Clus. exot. l. 2. c. 10.

*Fruetus figura oblonga ovali.*

I. Fructus ovi anserini magnitudine fusco cinereus.

Fructus peregrini pulpa, Clus. exot. l. 2. c. 13.

II. Fructus ovi anserini forma.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Clus. ex. l. 3. c. 9.

III. Fructus ovalis fuscus nucleo avellanæ simili.

Fructus 2. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

IV. Fructus ovalis putamine crasso fibroso.

Fructus 3. à Gareto, Clus. l. c.

V. Fructus ovalis fuscus.

Fructus miscellaneus 1. Clus. exot. l. 2. c. 25.

VI. Fructus ovalis lapidi Judaico similis ex ruffo nigricans.

Fructus peregrinus alter, Clus. exot. l. 2. c. 2. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

VII. Fructus olivæ ossiculum referens.

Fructus minor 5. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

VIII. Fructus ovalis spadiceus.

Nux peregrina 2. Clus. exot. l. 2. c. 13.

IX. Fructus oblongus fuscus striatus.

Fruſtus exoticus 3. Cluſ.ex.l.2.c.24.

X. Fruſtus oblongus arcuatus fufcus.

Fruſtus 1. è navigat. Batav. Cluſ.ex.l.2.c.15.

XI. Fruſtus oblongus fufcus ſplendens.

Fruſtus 1. Simonis Tovar Coxco cypote, id eſt nux ſive oſſiculum Cypote, Cluſ.ex.l.2.c.18.

XII. Fruſtus oblongus cineraceus nervis craſſis.

Fruſtus 3. Parduyni, Cluſ.ex.l.2.c.22.

XIII. Fruſtus oblongus cineraceus acidulus.

Fruſtus 12. & Oregioella, ex quo Cacao portionem conficiunt, Cluſ.ex.l.2.c.16.

XIV. Fruſt. oblongus cortice flavo ſpadiceo.

Fruſtus 13. à Gareto, Cluſ.ex.l.2.c.16.

XV. Fruſtus oblongus lobum referens niger.

Fruſtus 13. Gareti, Cluſ.l.c.

*Fruſtus pyriformes.*

I. Fruſtus pyriformis major rugoſus niger, binis cellulis diſtinctus.

Fruſtus exoticus 1. Cluſ.ex.l.2.c.24.

II. Fruſtus pyriformis minor ſpadiceo cinereus.

Fruſtus exoticus 2. Cluſ.ex.l.2.c.24.

*Fruſtus orbiculares & rotundi: & ovales tuberculis obſiti.*

I. Fruſtus orbicularis fufcus tuberculis obſitus.

Fruſtus 2. Parduyni è Guinea, Cluſ.ex.l.2.c.22.

II. Fruſtus orbicularis cineraceus tribus foraminibus donatus.

Fruſtus 8. à Gareto, Cluſ.ex.l.2.c.16.

III. Fruſtus rotundus flavus tuberculis obſitus, linea eminentiore tranſverſa.

Fruſtus peregrinus 4. Cluſ. ex. l.2.c.30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

IV. Fruſt. rotundus flavus tuberculis obſitus.

Fruſtus peregrinus 5. Cluſ.ex.l.2.c.30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

V. Fruſtus ovalis ex fuſco ſubruberis tuberculis mucronatis obſitus.

Fruſtus 5. è navigat. Batav. Cluſ.ex.l.2.c.15.

VI. Fruſtus olivæ oſſiculum referens tuberculis obſitus.

Fruſtus minor 6. Paludani, Cluſ.ex.l.2.c.20.

VII. Fruſtus oblongus cineraceus durus tuberculis exaſperatus.

Fruſtus 1. Plateau, Cluſ.ex.l.2.c.19.

VIII. Fruſtus cordis formam referens, fuſcus tuberculis inæqualis.

Fruſtus minor 2. Paludani, Cluſ.ex.l.2.c.20.

IX. Fruſtus ſubrotundus rugoſus, ater.

Nux peregrina 1. Cluſ.ex.l.2.c.13.

X. Fruſtus Frago ſimilis.

Garnitre fruſtus parvus & ſubtilis fragi ſimilitudine, qui globulorum vicem ſupplet, Linſc. p.3. Ind. or. 21.

*Fruſtus angulis donati.*

I. Fruſtus orbicularis fufcus triſidus granis refertus.

Fruſtus miſcellaneus 5. Cluſ.ex.l.2.c.25.

II. Fruſt. rotund. inæqualis cineraceus ſaxeus.

Fruſtus 6. Camiri Indis, ex navig. Batav. Cluſ. ex. lib 2. cap. 15.

Fruſtus peregrinus 2. Eid. l.2.c.29.

Nucis eſt magnitudine, putamine ſaxeae duritie, nucleo albo amygdalino.

III. Fruſtus Braſilianus inæqualis ſemine fuſco fervido.

Fruſt. 1. à Gareto Aratucon dictus, Cl. ex. l.2.c.17.

IV. Fruſt. anguloſus cineraceus cortice fibroſo.

Fruſtus miſcellaneus 2. Cluſ.ex.l.2.c.25.

V. Fruſtus in gibbum extuberans cortice reticulato villoſo.

Fruſtus peregrinus reticulato corio ex Guinea, Cluſ.ex.l.2.c.11.

VI. Fruſtus niger in duas partes ſeparabilis aciduſculus.

Fruſtus 10. à Gareto, Cluſ.ex.l.2.c.16.

VII. Fruſtus avellanæ magnitudine putamine velut in duas partes diviſo.

Fruſtus peregrinus 4. Cluſ.ex.l.2.c.29. Lugdun. Tabern. Ger.

VIII. Fruſtus ſubrotundus cineraceus duplici angulo.

Fruſtus 9. è navig. Batav. Cluſ.ex.l.2.c.15.

IX. Fruſtus triangularis fufcus.

Fruſtus minor 4. Paludani, Cluſ.ex.l.2.c.20.

X. Fruſt. pentagonus tuberibus inanis obſitus

Fruſtus minor 9. Paludani, Cluſ.ex.l.2.c.20.

XI. Fruſtus oblongus pentagonus fufcus.

Fruſtus 2. è navigat. Batav. Cluſ.ex.l.2.c.15.

XII. Fruſtus criſtatus ſpadicei coloris.

Fruſtus 11. è navig. Batav. Cluſ.ex.l.2.c.15.

*Fruſtus diverſarum figurarum.*

I. Fruſtus in orbem convolutus fufcus.

Fruſtus minor 11. Paludani, Cluſ.ex.l.2.c.20.

II. Fruſtus eſt quatuor membranaceis folijs compoſitus nucleo orbiculari.

Fruſtus 17. navigat. Batav. Cluſ.ex.l.2.c.15.

III. Fruſt. è multis fibris contextus ſpadiceus.

Fruſtus miſcellaneus 6. Cluſ.ex.l.2.c.25.

IV. Fruſtus metæ figuram referens cineraceus

Fruſtus

**Fruſtus mior** 3. **Paludani**, ad quem pro **Balfami** Peruanî fruſtu miſſus, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

**V. Fruſtus juli figuram** quaſi exprimens cineraceus, grana ſpadicea continens.

**Fruſtus miſcellaneus** 8. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

**VI. Fruſtus Braſil. ex fuſco cinereus acidus.**

**Fruſtus ſecundus Gareti**, Cluſ. ex. l. 2. c. 17.

**VII. Fruſtus Quittentſis.**

**Fruſtus ad Dyſenteriam**, Monardi, Lugd.

*Fruſtus varij.*

**I. Fruſtus in Bali Inſula**, ſub terra juglandis magnitudine ſed durior & oleaginoſior, quo ad cibos condiendos utuntur: Linſ. p. 3 Ind. or. c. 39.

**II. Fruſtus purpureus alij ſapore**: par. 6. Ind. Orient. c. 54.

**III. Cautior fruſtus frequenter cibus adhiberi ſolitus**, uberrimè in Guinea provenit: par. 4. Ind. Or. 8.

**IV. Gato Gambar**, fruſtus olivis aut **Arecæ** ſimilis in Cambaja, qui dentium dolori medetur, par. 4. Ind. Or. 8.

**V. Jalave Malays**, arboris fruſtus glandis magnitudine, què infirmi potiunculis miſcent, l. c.

**VI. Javanos fruſtus in Bantan**: par. 3. Ind. Orient. 35.

**VII. Indiamas fruſtus in Guinea**: par. 6. Ind. Or. 19.

**VIII. Lucumas fruſtus in India**, quem nihil aliud quam lignum eſſe diſſimulatum ajunt: Joſeph. Acoſta l. 4. c. 26.

**IX. Madian, Main, Coraſſani**, ex civitate Dachen importantur, ad acuendam gulam & ebrietatem facilius ciendam: par. 4. Ind. Or. 8.

**X. Tianco**, fruſtus copioſè in Malacca, quem tuſum cum liquore bibunt, quoties malè habent: l. c.

\*\*\*\*\*

## SECTIO TERTIA.

A R O M A T A.

**NUX MYRISTICA; MACIS ET MACER; CASSIA SIVE CANNELLA; CINAMOMUM; TAMALABATRUM SIVE FOLIUM; BETHRE** ſive Tembul; **Caryophylli Aromatici; Piper; Cubebæ; Fagara; Mungo; Amomum & Amomis; Grana Paradifi & Cardamomum.**

N U X M O S C H A T A.

**N**ux Moſchata, quæ veteribus Græcis cum ſua Maci incognita ſunt at recentioribus *μωσχάτης* vel *μαχάτης* dicitur: ſorte Nux Indica, in ſuffimento moſcato Aëry.

**I. Nux moſchata fruſtu rotundo.**

**Chryſobalanos Galeni** quibuſdam.

**Comacum Theophraſti & Cinnamum Caryopon Plinij, Guilandino.**

**Nux Bandenſis**, Jauſibant Arab. Avicennæ.

**Nux myriſtica**, Matth. Caſt. Lugd. qui & Acoſtæ figuram in appen habet, Cluſ. ex.

**Nux muſcata**, Lac. Lon. Ad. Lob. ico. Frag.

**Nux moſchata**, Cord. hiſt. Lob. (cui & odorata & aromatica) Cæſ. Tab. Acoſtæ.

**Nux aromatites**, quæ incolis Palla & lapatri, Garz. Linſc. Ind. Orient. p. 4. c. 22.

**Arbor in Inſula Banda** quæ nucem & macim proſert, Pyri magnitudine, folijs laurinis, latioribus brevioribus: fruſtus cortice denſo, ut in noſtris Nucibus tegitur, cui alter tenuior reticulatus, rubeſcens ſubest, qui Macis dicitur.

**Fruſtus cum utroq; cortice muria conditus adfertur** quem & Saccharo condiunt & externum

corticem in capitis affectib. commendant. In Java majore, ex nucib. Conſervas & confeſiones, & tam ex nucib. quam folijs, oleum conſciunt. Sic aliam in planis, quæ ad nos adfertur, aliam in montanis provenire ſcribunt, à cujus fruſtu cum vix matureſcat, ſaltem Macis adimitur.

**II. Nux moſchata fruſtu rotundo parvo.**

**Nux moſchata humilis & fruſtu puſillo in Moluccis**, Acoſtæ.

**Nux aromatites infructifera in Moluccis & Zeilan, Garziæ.**

**III. Nux moſchata fruſtu oblongo.**

**Nux moſchata maſcula vel major**, Cord. hiſt.

**Nux moſchata mas oblongior**, Lob.

**Nux myriſtica mas**, Cluſ. exot.

**IV. Macis Officinarum.**

**Macis dicitur cortex alter tenuis rubeſcens, à Maceris Græcorum ſimilitudine**, qui aëri expoſitus paulatim flaveſcit.

Macer,

|  |  |
|--|--|
| Macer, officinarum Macis, Cord. in Diosc.                        | Oriental. part. 4. cap. 22.  |
| Macis, veterum Macer seu medius nucis mosch. cortex, Cord. hist. | Macis Javanensibus Massa & Fœlien, Linscot. Ind. Orient. part. 2. c. 22. |
| Macis, Ad. Garziæ, Acoftæ, Frag.                                 | Befhase Arab. Avicennæ cui odoratæ nucis involucrum est.                 |
| Macer, Tab. qui cum fructu pingit.                               | Nucum myristicarum flos, 4. par. Ind. Or. c. 21.                         |
| Bunapalla & Jaisol incolis, Garziæ, Linsc. Ind.                  |  |

## MACER VETERUM.

**M**acer Veterum, cortex est arboris sui nominis, res à Maci recentiorum planè diversa: de quo sic Dioscor. l. 1. c. 110. *μακίς*, cortex est à Barbaria advehi solitus, sublavus, crassus & gustu per quam astringens: & Plinius lib. 12. c. 8. *Macir* ex India (Galenus se. utus) advehitur, cortex rubens, radice magna, nomine arboris sua. Arbor Ulmo multò major in India Orientali, præsertim in Provincia Malabar, Acofta.

|   |   |
|---|---|
| Macer & Macir, Talisafar radice cortex, Avic.   | Macer veterum est alter cortex crassior nucis moschatæ, Cæsalp. |
| Macer, arbor dysentericiæ, à radice corticis usu & arbor sancti, Acoftæ, Lugd. in ap. | An idem.  |
| Cortex Xylocassiciæ facie, Ad. Lob. ico.  | Cortex ad alvi profluvia in novo orbe, Monar.                   |
| Macer veterum, C. us. exot. l. 4. c. 4.   | Arbor contra fluxum, Cast.                                      |
| Macer Græcorum verum, ignotum putat Garz.   | Cortex ad dysenteriam, Lugd.                                    |
| Macer veterum, Macir officinarum censent, Cord. in Diosc. & hist.                     | Anonymos arbor in novo orbe folijs cordis figura, Frag.         |

## CASSIA SIVE CANELLA ET CINAMOMUM.

**K**assia sive κασία, πικρὰ τὸ καίει, quasi κασιόσαν, διὰ τὴν σιόσιν τὰς καϊθήρας. Kaosia Dioscoridi l. 1. c. 12. complura sunt genera, quæ circa aromatisferam Arabiam gignitur: habet autem sarmentum crassi corticis, folia verò piperis: primum locum habet γλίσσε rosarum odorem spirans: 2. ἄχιν indigenis, mercatoribus Alexandrinis daphnitis, odore vinoso: 3. μουλὴτης βλαστὴς, mosyleticus germen: reliquæ viles habentur, ut quæ ἀνυφύμων, nigra in cunila: & ea quæ μύστα ἢ ἀλγύνα vocatur: est & quadam ὑσσώνα κασία illi simillima, quæ neq. acris, neq. aromatica, & corticem medulla coherentem habet, &c.

Kινάμωμος plura genera Diosc. l. 1. c. 13. regionum in quibus nascuntur nominibus designata: excellit quod μουσχορον dicunt, quod similitudinem aliquam habet cum Mosylitide cassia, & quæ recens colore nigrum ex vino so in cinereum vergens, nodosum, colore rufa, aut cardamomo proximum est, hujus genera quinq. recenset.

Fabulosa varia & incerta, de Cassia & Cinamomo à veteribus Græcis & Latinis, ob longas & difficiles navigationes scripta sunt. Hinc Diosc. scribit Cassiam, esse virgulta crassi corticis, piperis folijs: Cinamomi verò descriptionem prorsus omittit. At Theoph. Cassiam & Cinamomum, magnitudine Viticis, multos ramos lignosos habere. Plin. l. 12. c. 19. Cinamomum dixit fruticem esse duorum cubitorum altitudine amplissimum, palmig. mininum: Cassiam fruticem esse trium cubitorum amplitudine. Galenus 1. Antid. arcam Romam delatam à Barbarorum regione tradit, longitudine cubitorum quatuor cum dimidio: & licet Cassiam & Cinamomum diversas arbores esse statuatur, scribit tamen Cassiam sæpe in Cinamomum transmutari: sic Cinamomi surculos, Cassia prorsus per similes. Genera Cassia, eadem Galenus quæ Dioscor. recenset: item Cinamomi sex à Dioscor. etiam declarata. Theophr. 6. hist. 2. & Plinio, Cassia duo duntaxat genera sunt, candidum & nigrum. Recentiores, qui judicio valent, Cinamomum officinarum vulgo Canella dictum, legitimam antiquorum Cassiam dicunt: cujus genera à Dioscor. & Galeno tradita, apud Mercatores qui magnam copiam habent, internosci possunt. Et in compositionibus Græcorum Xylocassiam, id est, Cassiam ligneam sive Cassiam odoratam postulanti-bus, Canella nostra adhibenda: in Mauritanorum enim Medicamentis, Cassia fistula purgatrix intelligenda.

|   |  |
|---|--|
| I. Cinamomum sive Canella Zeilanica.  | Darfini Avicennæ & Arabibus, quod Persis Lignum Sinense sonat. |
| Cassia, Cinam. & Canella orientalis, Monard.  | Canella legitima, Matth. Lugd. Acoftæ.                         |
| Cinamomum, i.e. lignum odoratum quasi Amomum ex Sina, Canella & Cassia idem sunt, Garz. | Cassia, Aug. Lob.  |



Cinamomum, Lac.

Cinamomum & Calsia unius plantæ cortices, Guil. the.

Cinamomum & Calsia Græcorum, Ad.

Cinamomum Seylense, Linscotto Ind. Orient. part. 2. c. 16. & par. 4. c. 19.

Arbor in Zeilan frequens oleæ magnitudine, folijs forma ad Citri folia accedentibus, fructu rotundo exiguis olivis simili. Canella est secundus & interior arboris cortex, in tubulos convolutus, qui singulo triennio adimitur, & ab exteriori cinerea pellicula, qua obductus est, repurgatur: In Canarijs etiam Insulis Cinamomi nulla est penuria, 3. part. Ind. Or. c. 5.

II. Cinamomum sive Canella Malavarica & Javanensis.

Canella ignobilior, Garziæ.

Calsia veterum forte, Clus. ex.

Canella in sylvis Malabar, Acoftæ.

Cinamomum Malabaricum, Canella de Mato, seu sylv. cinamomum, Linsc. Ind. Orient. par. 4. c. 19. & figura 17.

Cinamomum sylv. Canella de mare, 2. par. Ind. Orient. c. 13.

Cortice est enodi cinereo in Malavar & Java: & ut Acofta, fructus oleæ baccis parvisculum continens, qui fructus sessili parte, parvo calice præditus est.

III. Cinamomum sive Canella Peruana.

Canella in America, quæ calices & glandes Superis modo fert, quam sui generis arborem, non Canellam esse, Garzias scribit.

Canella Peruana quam Gomara, August. Carate, Petrus Cieca, & ex his Clus. notis in Garziam proponit.

Canella novi orbis Monardi, cui Calsia, Cinamomum & Calsia lignea, unius arboris cortices sunt, & sola loci varietate, altera alteram præstantiorem facit: itaque Calsiam & Cinamomum solis nominibus differre asserit.

Hujus fructum, qui parvo pileo similis, sua latitudine Taleri Germanici amplitudine æquat, in usu esse scribit.

IV. Cinamomum sive Canella tubis minoribus alba.

Canella alba quorundam, Clus. ex.

Duplex est: altera majoribus, longioribus & crassioribus tubis: altera tubis tenuioribus & minoribus: Idem habet,

Canellam albam à radice: &

Canellam albam ex arbore.

Lignum aromaticum Monardi, Lugdun. Cast. Frag. Clus. ex.

an Ascopo, arbor lauro similis, cujus cortex calidus & acris est, in Insul. Virgin. descript. vel Ind. Occid. par. 1.

V. Cinamomum crassior cortice.

Xylocalsia, Ad. Lobel. qui an Pseudocinamomum Dioscoridis sit, dubitat, Lugd.

VI. Calsia lignea fusca aromatica.

Xylocalsia subnigra, Lob. belg. & ico.

an Calsia Syringitis, vel Syringis Cinamomo cognata, Cord. in Diosc.

an Calsic genus, quod Galeno referente, junior Andromachus, Calsiam fistulam nominavit, quia inanis & cava & crassi corticis, cujusmodi in vulgari Cinamomo frequentissimè conspiciuntur.

VII. Cinamomum seu Calsia crassior, quæ præter odorem & saporem in officinis occurrit, Pseudocalsiam esse non temerè quis dixerit.

VIII. Correx cinereus acris sapore.

Correx eriophorus, Clus. ex. l. 4. c. 5.

#### *Cinamomum veterum.*

Cinamomum veterum, à Calsia sive Canella diversum esse volunt, cujus se tres surculos vidisse Clusius asserit, qui recti, sed non enodes, cortice tenui, subcinerei coloris, jucundi & suavis gustus, acrimonia linguam vellicante: lignum verò inodorum & inspidum.

Galenus primus de Antidot. Calsiam quæ Zizir cognominatur, adeo Cinamomo similem scribit, ut ejus loco divendita fuerit: & pro qualibet Cinamomi parte, duas Calsiæ adhiberi posse.

### TAMALAPATRUM SIVE FOLIUM.

**M**αλάβαρον φύλλον, Latinis similiter Malabathrum & Folium simpliciter, & Folium Indicum dicitur, Diosc. l. 1. c. 11. μαλάβαρον, inquit, nonnulli Nardi Indica folium esse arbitrantur, odoris quadam cognitione decepti: peculiare genus est, quod in paludibus Indicis gignitur: folium, id est, quod lentis palustris modo aqua innatat, radicem non habens, &c. Er Plin. l. 12. c. 26. dat & Malabathron Syria arborem folio convolutum, arido colore: mox subjungit: in paludib. India gigni tradunt lentis modo, oleratius croco, nigricans scabrumq,



quodam salis gustu: minus probatur candidum. Quibus verbis Plinius diversa Malabathri genera proposuisse videtur: at Dioscorides unicum. Sed quid velint, non assequimur: nostrum enim non innat at aquis, sed in procera arbore, procul ab aquis in Cambaya nascitur, secundum Garziam: at Linsc. 4. par. Ind. Or. c. 39. arbor est mediocris magnitudinis, quæ non nisi ad fluminum ripas aut lacus enascitur, in omni quidem India vulgaris, præcipue tamen in Cambaya: solij odor qui Caryophyllorum, quare aliqui malè Caryophyll. folium esse putant.

Cadegi Indi, id est, folium indum, Arabib.  
Folium Indi, Seplasiariorum, Trag.  
Malabathr Mat. (cui & Folium) Lac. Lob. Tab.  
Cassia folium, Cord. in Diosc.  
Cassia aromatica, folium malè, nec Cinamomi folium, nec Malabathrum, Cord. hist.  
Malabathrum, Folium, & folium barbaricum, res differentes sunt, Ang.  
Malabathrum & Folium, medicamenta duo sunt, Guil. the.  
Tamalapatra, ex qua voce corrupta Malabathrum, Garz. Clus. Lugd.  
Folium nostrate, Malabathrum est, Ad.

Folium Indicum Acoftæ, Cast. Frag.  
Folium Indum vocatum, Tembul Avicen. Cæs.  
Folium Indum, incolis Tamalapatra.  
Figuræ: fructus glandis exiguæ effigie adpingitur à Clus. Lobel. & Lugd. quem Fructum Canellæ quorundam, alijs Tembul convolvuli in India nomine à Corrufo, Clusius, uti in notis in Garziam monet, accepit: qui tamen Malabathri nostri fructum esse suspicatur.  
Huc referantur  
Folia saporem Garyophyllorum referentia, in Insula St. Maria, ad littus Madagascar: part. 3. Ind. Orient. c. 12.

### BETRE SIVE TEMBUL.

*Betre Mallaccensium volubilis modo arborescens, fructu lactæ caudam emulante.*

I. Tembul pro Tambul, Avicennæ.  
Betre, Garz. Frag. Lugd. qui in append. figuram Clusij habet.  
Betre sive Berle, Aloyf. Cadamusto, Clus. ad Gar.  
Betella, Lud. Romano, Odovardo Barbosa.  
Betel, Cast. Berele, Acoft.  
Betle vel Betre, Tab.  
Betelle sive Betre, Linsc. 4. par. Ind. Orient. c. 16.  
● figura 14.

Sunt qui Folium Indum putant, ut Barbosa & Amatus utrumq; confundit, cum Betre folio acutius & tenerius sit.  
Hoc Indi Orientales perpetuò mandunt, apud quos in maritimis regionibus provenit: at in Malaca Vitis modo feritur, & additis pedamentis, Hederæ modo se sustinet.  
II. Kaate, ex hujus arboris ligno pastillos concinnatos cū Betelle comedunt: Linsc. p. 4. I. O. 16.

### CARYOPHYLLUS AROMATICUS.

**F**ructus qui καρύφλλον sive καρύφλλον, (i.e. si verbum verboreddas, Nucifolium, cum quoramen similitudinem nullam habet) Latinis Caryophyllum & Caryophyllus dicitur: à Germanis & Gallis, Clavus nominatur, quod clavi modo capitatus sit. Hujus, nec Dioscor. nec Galenus meminisse videntur, licet Serapio Galenum falsò citet, forsitan rectius Aeginetam, vel Sethi nominaturus. Apud Pl. l. 12. c. 7. hæc leguntur: est etiamnum in India Piperis grano simile, quod vocatur Garyophyllon grandius fragiliusq;. Verum hunc Plinij, aliqui καρύφλλον Theoph. 9. hist. esse putant: Comacum, inquit, ex India & Arabia deportatur, ad unguenta idoneum est.

I. Caryophyllus aromaticus fructu oblongo.  
Caryophyllon, ipse frutex. Ægin. Sethi.  
Charunfel, Arabibus.  
Caryophylli Matth. Lac. Ludov. Romano, Maximiliano Transylvano de Moluc. Tab. qui & Matthioli & Clusij figuram (à Clusio tamen improbatam) exhibet.  
Caryophyllus Cord. hist. Ad. Cast. Cæs. qui Carpesium Q. Medici suspicatur.  
Caryophyllon sive Garyophyllon, Arabibus &

Perisq; Indis, Calafur, in Maluccis Chanque, Garz.  
Chamkein Maluco Insulis, in quibus solis nascuntur, Linsc. 4. par. Ind. Orient. c. 12.  
Caryophylla arbor quæ Arabibus Siger: fructus, Carnuful, Acoftæ.  
Caryophylli, Lob. Linsc. l. c.  
Caryophylli aromatici, Lugd. cui etiam in append. Caryophyllus Acoftæ.  
Caryophyllus florens & Caryophylli veri, Ger. cum utraq; Tabern. figura.

Arbor

Arbor est, nostris Malis, aut Pyris non minor, folijs venosis: & ut Linscottus, Lauri similibus, (mea verò ad Pyri folia accedunt) non ita angustis & oblongis, ut Lobelius, Tabernemontanus, Gerardus ex Clusij editione prima pinxere, & Lugd. suæ figuræ, ex Matthiolo desumptæ, folium adposuit: sic fructus non sparsim ramis inhæret, ut Acosta, & ex eo Lugd. in append. pinxere, sed extrema parte bacillis oblongis insident, ut Clusius in notis postremis ad Garziam, Acostam, & exot. lib. 1. pinxit: qui demum in Auctario ad exot. lib. Caryophyllorum ramulum cum fructus rudimento, florem nondum expletum sustinente, & eo qui primum formari incipit, exhibet. In Maluccis ut etiam Makian & Tidore fructifera: in Zeilan, infructifera gignitur: & in Ambona insula summa diligentia nunc colitur, ut ad curas posteriores Clusij plenius habetur. Hos rectè siccatos subflavescere, & ut nigriores evadant infumari, & ex recentibus aquam destillatione elici, & cum Sacchara Eleætarium confici, Linscottus l.c. scribit. Fructus qui in arbore remanentes crassiores sunt, & quos Javanenses magis expetunt, dicuntur Caryophylli mares, Avicennæ. Caryophylli maturi seu majores, Cord. hist.

## P I P E R.

**P**iper, πέρυσι Græcis, Arabibus Fulsel & Fulsul dicitur. Dioscoridi lib. 2. cap. 182. arbor brevis, quæ fructum oblongum instar siliquæ profert, &c. & Plinio lib. 12. cap. 7. Piperis arbores Juniperis nostris similes sunt, & semina à Junipero distant parvis siliquis.

Genera: Dioscorides (& cum eo Galenus) eandem arborem & longum & candidum & nigrum proferre, & sola maturatione differre credidit: quæ utraque & Plinius habet: quæ cum falsa sint, hic non adscribemus. At Theoph. 9. hist. 22. piperis genera duo: unum rotundum Ervi modo, cute carneq; constans sicuti lauri barba, subrubrum: alterum oblongum, nigrum semina parva papaveris continens, quod altero longè validius. Verum Piper ad arbores, potissimum Fausel feritur, quas circumvolvendo conscendit, folijs latius non serratis, Betre similibus, fructum habens racemosum, semper virentem, donec perfectè maturuerit: alia tamen est quæ Piper album, alia quæ nigrum fert, tam parva inter arbores differentia, quanta inter Vites, quæ uvam nigram vel albam profert, quamvis Ludovic. Romanus arborem quæ album profert proceriorem, crassiore caudice, majoribus folijs esse dicat. & Piper longum, non plus cum illis similitudinis habet, quam faba cum ovo.

## I. Piper rotundum nigrum.

Piper nigrum, Match. Lac. Cast. Garz. Frag. Clus. exot. Lugd. qui in Append. Acostæ fig. habet, & insuper, Arborem piperiferam ex Thevetò, Tabern. Linscottò in Arabia, Filfil; in Java, Sahan. 4. part. Ind. or. c. 18. & fig. 15.

Piper rotundum nigrum, Cord. hist. Adv. Cæs.

Piper nigrum in Calecut, Ludov. Romano.

Piper rotundum Hippocratis, Garz.

Antophylli, Lob. Lon. Tab. Ger. Linscott.

Antophylli apud Nicolaum, Cæs.

Sic fructus qui ab arbore decutiuntur & maxime expetuntur, aliqui

Flores Caryophyllorum vocant, cum fructus rudimentum sint:

Caryophyllus immaturus aut minor, Cord. hist. Ita pediculi oblongi, à quibus flores dependent, festucae Cordo, alijs Fusti, Lusitanis Bastan, dicuntur.

## II. Caryophyllus albus spurius.

Clusius in auctario ad lib. exotic. Solani Beladonnæ, aut ei congeneris flores suspicatur: hoc Caryophylli quoque nomine à J. Pons Veronæ accepimus.

## III. Caryophylli odore fructus exoticus.

Fructus caryophyllum olens avellanæ magnitudine, Garziæ, Fragofo.

Fructus avellanæ nucis magnitudine, cujus folia Caryophyllos odore referunt, in B. 1. y. a: par. 3. Ind. or. 15.

## IV. Caryophyllus aromaticus fructu rotundo. Caryophyllon, Plinij.

Amomum quorundam, Clus. exot. l. 1. c. 17.

## V. Fructus fuscus formâ caryophylli aromatici majoris.

Fructus 7. ex navigat. Batavor. Clus. ex. l. 2. c. 15.

Grana perpetuo virent, at Decembri & Januario, ubi maturari incipiunt, sensim nigrescunt: & hoc vulgatissimum est, cum albi proventus rarior sit: cum viride est, ab indigenis sale & aceto conditur.

Quid sibi velit Matthiolum cum sua figura, quam & Cast. Lug. Tab. & Ger. habent, non assequimur. de qua figura sic Guilandinus scribit: Si frutex ille Piper est, vel etiam Amomum, ut

alij somniant, parum aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum esse possit.

## II. Piper rotundum album.

Piper album, Matth. Lac. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. Cast. Lugd. Tab. Linscot. 4. part. Ind. orient. c. 18.

Piper rotundum album, Cord. hist. Adv.

Piperis alterum genus, quod in Taprobana Molaga vocant, Lud. Romano.

Piper alterum candidum, Cæs.

Sabanh pute seu piper album, reliquis paulo exilius, in Sunda: part. 4. Ind. or. c. 8.

Hoc crassiore est grano, nequaquam rugoso & acriore.

## III. Piper longum orientale.

Piper longum, Matth. Lac. Cord. hist. Adv. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. & exot. lib. 1. cap. 20. Linscotto & Javanensibus Pepileni.

Piper longum Orientale, Cast.

Macropiper minus, Tab.

Hujus arboris facies longè alia existit, Linscoto, non autem Clusio.

IV. Piper longum Occidentale dimidij pedis longitudine.

Piper, Monardi.

Piper longum Occidentale, Cast.

Piperis longi genus in India occidentali, Cæs.

Macropiper majus, Tab.

Piperis longi genus ex Carthagine, Frag.

Piper longum incolis Chiabe dictum, Linsc. 4. part. Ind. Orient. fig. 20.

Hoc priore longius, acrius & veluti ex multis granulis compositum.

## V. Piper longum angustissimum ex Florida.

Piper longum, Felfel, Alpino.

Plantula peregrina, Clus. ex. l. 4. c. 11.

## VI. Piper oblongum nigrum.

an Piper longum, Diosc.

Habzeli & Piper Nigrorum, Serapioni.

Piper Æthiopicum, Matth. Lob. Cast. Lug. Tab.

Crone & Granum Anescen Avicennæ, Ang. Carpesium, Cord. hist.

Piperis aliud genus Æthiopicum, Frag.

Amomum officinarum nonnullarum & longa vita, Lob. ico.

## VII. Piper similis fructus striatus.

Haernia Serapionis.

Fructus cap. de Mungo additus, forte Negundo, Clus. ad Garz.

Mungo similis fructus, Lugd.

Caryophyllus Plinianus sive Negundo, Imper. Negundo, Garziæ, Acoftæ, Fragofo: mas procul aspicienti Sambuco similis: femina folijs populi albæ similibus: fructus utriusque piperi similis & acris.

## VIII. Lobus Æthiopico piperi similis,

Clus. ex. l. 3. c. 16.

## IX. Piper abortivum.

Dioscor. l. 2. c. 182. reperitur etiam quoddam in genere nigri, nutrimenti defectu, callum seu inane & leve, quod *βράσμα* vocant.

Bresma sive Brasma, Cord. hist.

An exoticus fructus 4. ex Valachia, Clus. exot. lib. 2. cap. 22.

## X. Piper inane.

Piper quod lingua Malavarica à Canara nomen sumpsit, Garz.

Piper Canarynum, Frag. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. orient. c. 18.

Hoc cæruleum est, intus cavum, in cujus spacio granula quædam continentur, quod pauperculæ plebis usibus cedit: quare Canarynum, i. e. rusticanum vocari solet; & propter vilitatem, ad externos non effertur.

## XI. Piper racemosum caudatum ex Guinea.

Amomum, Ang.

Piper caudatum, Adv. quod pimenta del rabo Lusitanis, Clus. ad Garz. Frag. Lugd.

Piperis nova species, Imperato.

Pimento del Rabo, Linsc. 4. part. Ind. or. fig. 15.

## CUBE BÆ; FAGARAS; MUNGO.

**Q**uas Cubebas officina vocant, *Actuarius* *νομῆβας*. Arabes Cubebe & Quabebe nominant: cujus arbor folijs est Piperis sed angustioribus, simili modo in altum repens, cujus fructus & forma & magnitudine piper referunt.

I. Cubebæ vulgares, nec Arabum Cubebæ, nec Galeni Carpesium, Matth.

Cubebæ, Lac. Cord. hist. Garz. Acoftæ, Frag. Lugd. Cast. Tab. Linsc. 4. part. Ind. or. c. 29.

Cubebæ Græcorum *καρπῖσιον*, Lon.

Cubebæ officin. Piper rotundum, Theop. Piper

simpliciter Hippocrati cui & Myrtidanum, Guicubebæ officinarum, Adv. (land.

Cubebæ vulgo, Amomi fructum putarim, Cæs.

Hæ à Javanensibus, nunquam nisi prius aqua decoctæ venduntur, ne apud externos quoq; plan-

II. Cubebis affinis Fagara major. (rentur: Fagaras

Fagaras Avicennæ, Clus. in Garz. Lob.

Fagara, Cast. Tab. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. or. c. 7. & fig. 18.

Fagara major, Imperato.

III. Cubebis affinis Fagara minor.

Fagara minor, Imperato.

IV. Fructus niger Coriandro similis.

Mungo, Garziæ.

Melle Avicennæ pro Mex.

Mens, Bellunenſi.

## AMOMUM ET AMONIS.

**A** Momum, Græcis *ἄμωμον*, & Arabibus Hamana sive Hamanus, & Constantinopoli in mercatorum officinis Amama nominatur. Dioscoridi l. i. c. 14. parvus frutex est, in uva modum suo pre ligno in seipsum convolutus: florem habet parvum ceu Leucoium: folia verò Bryonia similia. Differentias verò facit ratione loci, Armeniacum præstantissimum: Medicum infirmis: Ponticum racemosum, fructu plenum & odore nares feriens. Et Plinio l. 12. c. 13. Amomi uva in usu est Indica vite labrusca, uti alij existimavêre, frutice myrteoſo palmi altitudine, carpitur 3, cum radice &c. addit: est & quæ vocetur Amomis, minus venosa atque durior, ac minus odorata: quo apparet aut aliud esse, aut immaturum colligi. At sic Dioscorides: Sunt qui Amomum, herba simili quæ *ἄμωμον* dicitur, adulterent, sed quæ & modica sit & fructu careat. Theoph. 9. hist. 7. Amomum alij ex Media, alij ex India cum Nardo advehi narrant. Verum alij Rosam Hiericunticam: alij Cubebas: alij Piper racemosum: alij Piper Aethiopicum: alij quid aliud esse volunt. Vide & Adversar. auctores.

I. Amomum racemosum, quod verum credimus Amomum, Martinelli & Ponæ, de quo Nicol. Marogna Medicus Veronenſis librum Latinè scripsit, quem Doct. Franciscus Pona Italicum dedit.

Amomum spurium, Clus. exot. austario.

Fructus 5. è Walachria, Clus. exot. l. 2. c. 22.

Amomum verum Ponæ, Clus. cur. post. & ibidem sub Amomo.

II. Amomum spurium foliosum.

Amomum, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.

III. Amom. arborè, folijs bryoniæ florib. violæ pingit Castor Durantes, sed quid sit ignoramus.

IV. Amomis, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.

## GRANA PARADISI ET CARDAMOMUM.

**C**ardamomum, Græcis *καρδάμωμον* (quasi Nasturtium suave) Arabibus Cordumeni nominatur: quod Diosc. l. 1. c. 5. non descripsit, sed solum quibus in locis optimum nascatur, his verbis expressit: Cardamomum optimum est, quod ex Comagine, Armenia, Bosphoroq; devehitur: in India quoque & Arabia provenit: eligitur, quod est frangenti contumax, plenum, oclusum & caput odore tentans, gustu acre & subamarum. Plinio l. 12. c. 13. Simile his (Amomo & Amomidi) & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo, &c. Et licet Dioscorides, Galenus & ceteri Græci, unus tantum meminerint, Plinius tamen quatuor genera fecit: viridissimam ac pingue, acutis angulis: proximum è rufo candicans: tertium brevius atque nigrius: pejus tamen varium, odorifq; parvi. Est autem Cardamomum aroma Indorum culinæ familiare, carnem quam elixant condientes, quod frumenti modo provenit, & ocymi plantam ferè emulatur.

I. Grana paradyſi officin. cujus folia (quæ ut & Nucis moschatae à D. Clurio Amstelrodamo accepimus) sub Melegueta in Prodomo descripsimus.

Cardamomum majus, Matth. Lon. Lac. (cui etiam Cardamomum hortense) Cast. Lugd.

Grana paradyſi, Cord. in Diosc.

Mellegetta seu Cardamomum piperatum, Eid. histor.

Milleguetta, Adv. Lob.

Malaguetta Garziæ (cui & Combazbange, Avicenn.) & ad Clus. cur. post.

Cardamomum primum, Cam. ep. alterum, Cæf.

Cardamomum Arabum majus, Tab.

Grana paradyſi seu Mellegettas, Linscot. par. 3. c. 14.

Hoc Cardamomi minoris loco aliqui utuntur & Melegera dicitur, propter similitudinem, quam cum Melicæ semine habet.

II. Granis paradyſi sive Mellegetæ affinis fructus.

Fructus 14. sive Melegueta spuria, Clus. exot. lib. 2. cap. 15.

III. Cardamomum majus officinarum.

Saccolaa Arabum, aut Sacoule Avicennæ, Elachi Mauritanis.

Cardamomum medium, Matth. Lonic. Castor. Lugdun.

Cardamomum majus, Cord. in Dioscor. (cui

Heyl Arabum) & hist. Clus. ad Dod. Linscot. 4. part. Ind. orient. c. 23.

Cardamomum majus vulgare, Adv. Lob. Clus. in Garz. Tab.

Cardamomum, Garz. Frag. secundum, Cam. ep.

Avicennæ duum generum, alterum Saccolaa quebir, id est, magnum: alterum Saccolaa ce-guer, id est minus.

IV. Cardamomum medium: Adv. & Lob. Tabernæm.

Cardamomum mediocre, Cord. hist.

V. Cardamomum simpliciter in officinis dictum.

Cardamomum minus, Matth. Lac. Lonic. Adv. Lugd. Tab. Linscot. l. c.

Cardamomum verum, Ang.

Cardamomum minus, Cord. in Diosc. & hist. cui & Helbane Arabum.

Cardamomum minus vulgare, Lob. Cl. in Garz.

Cardamomum primum, Cæs. tertium, Cam. ep.

VI. Cardamomum minimum: & Lob. Tab.

Cardamomum quartum, Cam. ep.



## SECTIO QUARTA.

RHUS; COCCONILEA SIVE COGGYGRIA; SORBUS;

AZEDARAETH; FRAXINUS; NUX JUGLANS; NUX AVEL-

lana, sive Corylus; Castanea; Fagus; Quercus; Robur; Quercus

excrementa; Viscum; Phellodrys; Suber; Smilax

Arcadum & Ilex.

### R H U S.

**P**οῦς & Hippocrati πόνος, à coccineo acinorum colore dicitur: πῶς enim ἐρυθρὸν interpretantur, unde rufus vox Latina: Rhus, inquit Diosc. lib. 1. cap. 147. quam aliqui Erythron, id est rubrum vocant, fructus est (πόδες βυρροδελφῶν) rhois coriaria, sic vocata, quod coriarij eā utantur ad coria spissanda: est verò arbuscula binum cubitorum, in qua folia oblonga subrubentia, per ambitum Illicis modo serrata: fructus autem racemulis similis, densus, terebinthini magnitudine, quadantenus latus, cujus corticosa tunica ambiens perutilis est. At Plinio lib. 24. cap. 11. Rhus quia Erythros appellatur, frutex est, & hujus semen aspergitur pro sale obsonijs. Verum Plinius malè à Rhoë coriariarum distinguit: de Theophrasti Rhoë vide in Viburno.

#### I. Rhus folio Ulmi.

Rhus, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac. Lugd. Tabernæm.

Rhus coriaria, Dod. ut: Ger. & desc. Virgin.

Rhus, Rhus veterum, coriaria, obsoniorum & Sumac, Bellon.

Rhus obsoniorum, Ad. Lob. Cæs. Cam. Clus. hist. Sumach Arabum, Lon. Cast. Rauvvolf.

Rhus obsoniorum, sive rubrum, sive culinarium, sive coriariarum, idem sunt: cujus seminis tunica externa, quæ sapore acido est, vice salis condimentis aspergebatur.

II. Rhus angustifolium, sub Sumach angustifolio in Prodomo describitur.

#### III. Rhus myrtifolia Monspelica.

Rhus Plinij exstimatus Monspelij, Cefn. hort.

Rhus Plinij myrtifolia Monspelienfium, Adv. Lob. ico.

Rhus sylvestris Plinij, Lob. Dod. Lugd.

Rhus myrtifolius, Tab. Cam. Cæs. alp.

Rhus Plinij nonnullorum, alij Driophanon ejusdem lib. 27. cap. 9. arbitrantur.

#### IV. Rhus myrtifolia Belgica.

an Myrtus nemoralis & Dryophanon Plinij, Ruell.

Elæagnus lacus Orcomenij Theophrast. Bellon. cult.

Rhus sylv. Plinij, Dod. gal.

Chamælagmus Dod. sed melior figura in editione Belgica.

Gagel Germanorum & Myrtus Brabantica quibusdam, Adv. Lob. vel Belgarum, Eid. Adv. parte altera.

Elæagnus Cordij, Lob. ico.

Rhus sylv. altera, Lugd.

Rhus herba Plinij, Clus. hist.

Plinius l. 24. c. 11. nec Rhus inquit, Latinum nomen habet, cum in pluribus modis veniat: nam

nam & herba est sylvestris, folijs myrti, cauliculis brevibus, quæ venena & tinea pellit, & fruticorarius appellatur, subrutilus, &c. Variat folijs aliquando latioribus, aliquando longè angustioribus: aliquando foliorum Arbuti instar crenatis, ut Rostochio, nomine Rosmarini Septentrionalium, seu Myrti nostratis, à Doct. Backmeistero accepimus.

## COCCONILEA SIVE COGGYGRIA.

**K**οκκονιλέα apud Theophrastum 3. hist. 16. habetur, ubi plerique, κοκκονιλέα legunt, & Gaza, Prunum translulit: de qua, ubi de κοκκωνία & ἀνδροεινία (Arbutum & Portulacam Gaza reddit) egisset, subjungit: his folio similis arbor parva, quæ hoc proprium habet, quod fructus in lanuginem abeat: hoc enim de nulla alia arbore audivimus: Plin. l. 13. c. 22. Coggygriam legit: nam cum Andrachnen delineasset, subjicit: similis & Coggygria folio, magnitudine minor, proprietatem habet fructum amittendi lanugine, pappum vocant, quod nulli alij arborum evenit (imo Salici, Populo & Nerio similiter contingit) Verum & Plinij Cotinum lib. 16. c. 18. esse volunt, de qua sic: est in Apennino frutex, qui vocatur Cotinus, ad lineamenta, modo Conchilij colore insignis. Sane Allobroges Rhu vocant, & cortice (sicut & Austriaci circa Viennam) coria spissant: etiam ad pannos luteo colore tingendos utuntur: imò & radicibus pannos rubro colore inficiunt, Anguillara notante.

Cotinus, Mart. Ang. Ges. hor. Cast. Cam. Tab. Coccigria Theophrasti, Ad. Lob.  
Cotinus coriaria, Dod. Eystet. coriarius Plinij, Coggygria Plinij, Clus. pan. & hist. Tab. Ger. u-  
Ger. Rhus, Turn. terq; bis pingit. sub Coggygria & Cotino Plinij.  
Coccigria, forte Barba Jovis Plinij, Ges. hor. Coggygria Theophrasti, Cotinus Plinij, Lugd.  
Cotinus Plinij, Rauvvolf. Scotanum vulgo, Cæfalp.

## S O R B U S.

**S**orbus arbor ὄμβρα nominatur Dioscor. l. 1. c. 137. qui non descripsit: at Theoph. 3. hist. 12. Sorbi folium totum prolixo nervaceoq; pediculo constat, pinnis similia è lateribus exeunt, perinde ac si id unicum folium sit ad nervosum usq; pediculum, tanquam in lacinias divisum: omnibus in postremo pediculi folium impar prominat, ambitu serrata, nec in extremum tam acutè mucronata, sed rotundiora: florem racemosum habet ex una veluti clava ex multis parvis & albis constantem: fructus quoq; cum magnus ejus proventus est, racematim coit, &c.

Sorborum genera (eisdem) duo sunt, scilicet fructifera, mas sterilis (& 3. hist. 3. sylvestris maturior urbana est) fructu differt, quod alia orbiculatum, alia ovatum ferant: distant & succis: nam orbiculati magna ex parte odoratiore sunt & dulciores: ovati, sæpè acidi & minus odorati. At Plin. l. 15. c. 21. Sorbis quadruplex differentia: alijs enim rotunditas Mali, alijs turbinata pyri, alijs ovata species, cum malorum aliquibus: odore & suavitate rotunda præcellunt: ceteris vim sapor: quantum genus torminale appellant.

I. Sorbus sativa.  
Sorbus, Brunf. Trag. Dod. ut: Ang. Lac. Cord. in Diosc. Ges. hor. Lon. Lugd. Tab. Ger.  
Sorbus domestica, Mart. Ad. Lob. (qui Ostriam Theoph. l. 3. c. 10 suspicatur) Cast.  
Sorbum ovatum, Fuch. Tur.  
Sorbus legitima, Clus. pan. & hist.  
Sorbus esculenta, Cam.  
II. Sorbus sylv. folijs domesticæ similis.  
Fraxinea arbor, Trag.  
Grosser Mehlbaum/ Eid. Lon.  
Sorbus sylvestris, Matth. Lugdun. Cast. Taber. Gerard.  
Fraxinus bubula, Dod. gal.  
Fraxinus aucuparia, Ges. col.  
Ornus, Ruell. Ges. frac. Dod. Portæ.  
Sorbi prima species, Tur.  
Sorbi 5. genus aucuparium, Cord in Diosc.  
Sorbus sylv. alpina, Ad. Lob. Cæf.  
Sorbus aucuparia, Bello. Clus. pan. & hist. Thal.  
aucupalis, Cam.  
Sorbus torminalis, Lugd.

## A Z E D A R A E T H.

**A**zedaraeth Avicen. l. 2. c. 17. arbor est nota, habens fructum similem Nabach (i.e. Loto) & nominant eam in Rechi, arborè Myrobalanor. & est ex magnis arborib. Hanc esse eam quam subjecimus plures existimant.  
Arbor fraxini folio flore cæruleo.  
Pseudosycomorus, Matth. Cast. Tab. Eyst.  
Sycomorus Italicorum malè, Cord. in Diosc. Ges. h.  
Perlaro, falso Sycomorus Italicorum, Bellon. cult.  
Azedaracht Avicennæ, Ges. hor. Rauvvolf. cui & Astergir Rhasis, incolis Zenselacht.

Azeda-



Azedarach, Dod.

Azedarac, Lotus alba Pelicerio, Clus. hisp. & hist. Camer.

Laurus Græca Plinij & Myxus alba, Gef. hor.

Zizypha candida Monspel. Lob. Ger.

Zizyphus alba Matthioli, Lugd.

Tuber, Zizypha Columellæ videtur forte & Plinij, Cæs.

Plinio lib. 15. cap. 14. de Malorum generibus agentium Tuberum duo genera: candidum & a-

colore fericum dictum: penè peregrina sunt, in uno Italiae agro Veronensi nascentia, quæ lanata appellantur: lanugo ea obducit, &c. ex his Plinij verbis quid colligas?

Ex nucleis precatorios globulos Monachi conficiunt, hinc arbor de gli patre nostro, Italici: Gallis verò, arbor Sancta dicitur.

Variat folijs, quæ in Italica laciniata, in Gallica solum crenata sunt, quod herbarij Lugd. auditor, duplici figura demonstrare voluisse videtur.

## F R A X I N U S.

**F**raxinus, *μελις* arbor nota est inquit Dioscor. l. 1. c. 198. Theophrastus 3. hist. 11. descripsit, ejusque genera duo fecit: unum excelsum, procerum, ligno candido, nervoso, molliore, crispiore, magis enodi. Alterum humilius, minus augefcens, scabrius, durius & magis flavum. Et Plinius l. 16. c. 13. inquit, Græci fraxini duo genera scèrre, longam, enodem: alteram brevem, duriorē fusciorēque, laurinis folijs. Atque situ divisere: campestem enim crispam esse: montanā verò spissam.

I. Fraxinus excelsior.

Fraxinus prior & *βραμυλ* (Fraxinus bubula Ga- zæ) Theophrasto.

Fraxinus bumelia, Plinio & Bellon.

Fraxinus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Gef. hor.

Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Tab. Lugd. Cast.

Fraxinus prima, & major, Anguil.

Theophr. monet Ideos existimasse fructu & flore carere: ferre tamen in siliqua fructum minutum nucis modo, qualem Amygdalæ, gustu subamarum: ferre & quædam alia *δι βρύα*, veluti muscos, ut Laurus: cæterum densiores & magis compactos, globosos, non aliter, quam Platani pilulas. Sane globosos hos muscos, unā cum fructu hist. Lug. pingit, qui circa Veris initium observantur: qui veluti ex musco glutinoso impensius resiccato concreti videntur: Sic Camer. mas floret nigris racemis seu granulis, sed fructum non fert, qui absque fructu, ut juglandiū julii decidunt: quare Thal. alia sterilis, alia frugifera.

Fructus ipsius sive semen, Ornoglossum & Lingua avis dicitur, Anguil. alijs fructus Fraxini: alijs lingua passeris: alijs anseris. Avicenna inter medullas computat.

Ex fraxino hastæ, mensæ, vasa & utensilia mul-

ta fiunt: fiunt & pocula, ex quibus si quis assidue bibat, lienem extenuari ajunt: cujus nomine & corticis decoctum quidam exhibent: quo etiam aliqui vice ligni Guajaci felici successu utuntur, Cæsal. monente: addens ejus corticem internū, aquam, in qua maduerit, cæruleam reddere.

II. Fraxinus humilior, sive altera Theophr.

minore & tenuiore folio.

Fraxinus sylvestris, Columellæ.

Ornus, Bellon. cult. (cui & pumila fraxinus & *ὀρτομελία*) Lugd.

Triplicem Fraxinum facit Thalius: 1. Fraxinum passim nascentem.

2. Fraxinum Fago similem, Buchâschen.

3. Fraxinum duram seu *λιθόγειον*, Steinâschen.

III. Fraxinus rotundior folio.

Ornus, Galli Pressani lib. de re rustica.

IV. Lign. peregrin. aquam cæruleam reddens.

Lignum ad renum affectiones & urinæ incommoda, Monard.

Lignum ad Nephritidem, Lugd.

Lignum in Nova Hispania repertum, Cæs.

Lignum ex novo mundo Pyro simile, Frag.

V. Arbor Indica fraxino similis, oleæ fructu. Nimbo, Garzia, Acostæ, Cast. Lugd. Frag.

## N U X J U G L A N S.

**N**uces juglandes, Dioscor. l. 1. c. 178. *νάσσα βασιλιά*, nonnullis *περαμά* dicuntur: & Theophr. 1. hist. 18. *νάσσα*, Nux Juglans, Persica & Basilica nuncupatur, quod è Perside à regibus translata sit. Juglans verò quasi *Jovis glans*: hinc Cloatius, Macrobio referente, Dinglandem primo vocatam scribit, quasi *Διὸς βιάλαν*. Arbor, *νάσσα*: fructus, *νάσσα* dicitur, quod caput, *νῆπε τὰ ἀνὰ*, i. e. τὸν κεφαλὴν odoris gravitate offendat, ut Pl. l. 15. c. 22. habet: imo l. 17. c. 12. juglandis umbra capiti noxia: & l. 23. c. 8. asserit nuces juglandes Græcos à capitis gravedine sic vocare. Genera: Pl. l. 15. c. 22. sola differentia generum in putamine duro, fragiliore & tenui, crasso, loculofo. ac simpl. Addamus etiam in magnitudine & parvitate: quare recentiores 5. differentias potissimum notarunt.

I. Nux



## I. Nux juglans sive regia vulgaris.

Nux regia, Brunf. Cord. in Diosc.

Nux juglans, Trago, Matthiol. Lac. Gef. hor.

Lon. Dod. Ad. Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Nux, Dod. gal.

Juglans, Fuch. Tur.

Has à duo cortice & frangendi mora, Moracias & Moracillas appellari Hermolaus tradit, & Lug. & quæ à putamine vix purgari possunt, Surdæ nominantur, Cæs. alp.

Nuces regię maxima frequentia in Virginea habentur, eaq; duorum generum: unum forma & sapore parum ab Anglicis differt, putamine crassiore & duriore: alterum majus cortice scabro & duro, nucleo magno, dulci & oleaginoso, ex quibus contusis Lac conficiunt cum suis cibis miscentes: harum arborum nonnullę octuaginta pedes longę, part. 1. Ind. Occid.

## II. Nux juglans fructu maximo.

Nuces caballinæ, Lugd.

Ex hærũ cuppis, marſupia pueris gestanda fiunt.

## III. Nux juglans fructu tenero &amp; fragili putamine.

Nuces juglandes cortice tenuissimo, Gef. hor. Mollusca & Persica, Suevio poetæ apud Macrobius: cum Tarentina eadem, aut proximæ naturæ, Lugd.

## IV. Nux juglans bifera.

Harum & Plinius meminit, & in agro Patavino provenire Hermolaus asserit, Lugd.

## V. Nux juglans fructu serotino.

Nuces S. Johannis, quia ante diem S. Johannis sacrum, neq; folia, neq; nuces ostendunt: cum verò id tempus adest par reliquis nucibꝰ, quoad

fructum & folia: harum Tragus meminit: Johan. Bauhinus circa Tigurum, Dalechampiꝰ circa Lugdunum observavit, Lugd.

## VI. Nux juglans folio serrato.

Juglandis genus alterum; fructu teneriore & longiore, Clus. hist.

Arbores Indica Juglandi similes.

## I. Arbor Indica Mamei dicta.

Mamei arbor juglandis proceritate, folijs paribus, fructu duorum pugnorum, aliquando minore, Oviedo, Lugd.

Mamay, Gomaræ hist. Indicæ.

Mamei arbor Castaneę forma, fructu etiam maximi cydonij globum superante, Scalig. Lugd.

Mamei arbor mediocris nucis magnitudine, fructu in Hispaniola rotundo, in continente longo, & crassiore, Benzo Americ. lib. 4.

Mamei fructus, par. 6. Ind. Occid.

Mameyen fructus melocorones sive Persica æquant superantve, Joseph. Acost. parte 9. Amer. l. 4. c. 24. Alias dulces, alias acidi. Idem.

## II. Arbor Indica folijs Juglandis, fructus nucis magnitudine.

Ambare, Garz. Acostæ, Frag.

Ambares, Cast.

## III. Fructui prædicto affinis.

Fructus Brasilianus 1. & 2. Clus. ex. l. 2. c. 7.

## IV. Arbor Brasiliiana juglandi similis nucibus carens.

Copau, Ind. Occid. p. 3. c. 12.

## V. Hobos, Pacayes sive Guavas multi pro nuce juglande habuerunt: sæpius transplantatas, nuces Hispanicis similes gignere ajunt: part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 26.

## N U X A V E L L A N A.

**N**uces avellana, *νύγες πορταῖνῃ καὶ λεπτοκέρυα*, Dioscor. l. 1. c. 169. id est. nux Pontica & tenuis dicitur: at Theophrasto 3. hist. 15. *ἡρακλειώτινῃ νύγες*, nuces Heracleotica (quod ex Heraclea Ponti translata) alijs Prænestina & Avellana dicuntur. Avellana Plinio l. 15. c. 22. quas antea Abellinas, patrio nomine vocabant: in Asiam Graciamq; à Ponto venere: & ideo Pontica nuces vocantur. At arbor Latinis Corylus dicitur. Theoph. 1. hist. 16. folia insecta habet ut Ulmus & Robur: 3. hist. 6. quidam florere exissimant: 3. hist. 7. sed postquam fructus decedit, racemosum quiddam vermis prægrandis magnitudine nascitur, ex uno pediculo pingui: 3. hist. 8. julos nonnulli vocant, quod ex minutis squammis innumeris ordine nucis pineæ constat. &c.

Genera: Sylvestris est & urbana: ambobus genere constant, quadam enim rotundam, quadam oblongam nucem largiuntur: sed urbanarum fructus candidior est, Theoph. 3. hist. 15.

## I. Corylus sativa fructu albo minore sive vulgaris.

Nux avellana rotunda, alba, domestica, Brunf.

Nux avellana fructu rotundo, Matth. Lac. Cæs.

Corylus hortensis, Dod. gal. sativa, Lon. Lugd.

domestica, Clus. histor.

Avellana domestica, Fuch. Tur.

Avellanæ tertium genus, Cord. in Diosc.

Corylus domestica rotunda alba, Cast.

Corylus perfoliata albo, Ad. Lob.

**Nux avellana** sive Pontica, Cam.

**Corylus sativa** rotundis nucibus, Lugd.

Fructus major est, & suavior sylvestri.

II. **Corylus sativa** fructu rotundo maximo.

**Avellana urbana** rotunda circa Lugdunum, G. in hort.

**Avellana major** Lugdunensis, Cam.

III. **Corylus sativa** fructu oblongo rubente.

**Nux avellana domestica** oblonga, rubra, Brunf. Matthiol.

**Corylus sativa** rubris oblongis nucibus, Trag.

**Corylus hortensis** fructu rubro, quæ nux Pontica veterum, Dod. gal.

**Nux avellana urbana** cute rubente, Eid.

**Avellanæ urbanæ** oblongæ rubicundæ Lombardicæ quibusdam, Gef. hor.

**Corylus domestica** longa rubra, Cord. domesticæ oblonga, Clus. hist.

**Corylus sativa** nuce oblonga, Lugd.

**Nux avellana** fructu oblongo, Cæf.

**Pontica nux hortensis**, ruffa ut plurimum membrana, Cord. in Diosc.

Hæc præstantior, & tardius rotunda maturatur: hanc quæ fructu est oblongo etiam duplicem faciunt, cuius alterius nucleus rubra, alterius alba pellicula integatur.

IV. **Corylus** nucibus in racemum congestis.

**Corylus Macedonica**, Cord. in Diosc. Gef. hor.

V. **Corylus sylvestris**.

**Nux avellana sylvestris**, Brunf. Matth. Lac. sive **Corylus**, Dodon.

**Corylus sylvestris**, Trag. Matth. Dod. gal. Gef. hort. Lon. Lob. Cast. Lugd. Cuf. hist.

**Avellana** nux sylv. Fuch.

**Pontica nux** in Corylo vulgari, Cord. in Diosc.

**Corylus avellana**, Tur.

**Avellana** **Corylus** sylv. Gef. hor.

Fructu est minore, albidior & rotundior, quàm sativa sit.

VI. **Avellana peregrina** humilis.

**Nux barbata** Plinij lib. 19. cap. 1.

**Avell. pumila** Byzantina, Clus. pan. & hist. Ger.

**Avellana Byzantina**, Tab.

Variat fructu majore & minore.

VII. **Avellana purgatrix**.

**Avellanæ purgatrices**, Monar. Lugd. Frag. Clus.

**Avellanæ purgativæ**, Cæf.

**Nuces purgantes**, Tab. Ger.

**Ben magnum** Medicorum vulgo, Monard.

**Ex novi orbis** Insula S. Dominici adfertur.

VIII. **Avellana Indica** osculo trifido.

**Avellanæ Indicæ** 2. Matth. & Lugd. adpinxit.

**Mehenbethe**, Lob. Clus. ad Garz. (cui Nucis unguentariæ genus) Tab. Lugd.

IX. **Avellanæ prædictæ** affinis fructu spadiceo, velut in binas partes secto.

Fructus miscellaneus 7. Clus. ex. l. 2. c. 25.

X. **Avellana quadrifida**.

**Avellana purgativa**, Oviedo.

Fructus exotici 6. Clus. ex. l. 2. c. 16.

Hic velut ex quatuor avellanis simul connexis lævibus & spadiceis constat.

XI. **Nux purgatrix**.

Fructus exotici 17. Clus. ex. l. 2. c. 16.

XII. **Avellanæ Indicæ** 3. genus, Matt. Lugd.

**Avellana Indica** 2. Clusij, secundum, Lugd.

Fructus exotici 2. Clusij in Garz.

Fructus peregrinus 1. quem etiam pro Balsamo

Peruana accepit, Clus. ex. l. 2. c. 29.

**Balsama fructus**, Lugd.

## C A S T A N E A.

**Castanea**, Græcis καστανή καὶ καστορέα, à Castano Magnesiæ urbe: vel ut Stephanus scribit, Apulia, non procul à Tarento, unde advecta sunt. Fructus ejus αμυγδαλὸν κάλανον, ἢ λόπιμα, ἢ καστανά, ἢ διὸς κάλανον, Diosc. l. 1. c. 145. i. e. Sardiæ glandes, quod Sardib. eæ primum provenerint: lopima, à cortice crassiore, qui Græcis λέπες dicitur: Theoph. 3. hist. 3. & 4. διὸς κάλανον, Gaza Nucem castaneam vertit: dicuntur etiam καστορέα καρύνα, nuces castanicæ, Diodoro: καρύνα σιθονίη, καρύον καστορέων, διὸ κάλανον, distinctis locis Theophr. nominat.

Genera: antiqui plura ferere, nominibus plerisque, à locis unde importabantur, inditis, ut ex Plin. l. 15. c. 13. colligere est: à quorecensentur, Tarentina, figura plana: Balanitis, quæ rotundior & sponte profilit: & Salaria plana est: Coralliana laudatior ipsa Tarentina: Metereana rubenti cortice. Sane fructus magnitudine & parvitate: item figurâ, cum quadam in ventrem magis crescant, quadam in longitudinem: & sapore, differunt.

I. **Castanea sativa**.

**Castaneæ domesticæ**, Matth. Cæf. Cast.

**Castanea sativa grandis**, Cord. in Diosc.

**Castaneæ crassiores**, Bellonio.

**Castaneæ majores**, Gef. hort. Lugd.

At sativæ duplices sunt, grandiores quas Maronæ vocant, quæ divitum mensas claudunt, quæ cineribus obrutæ igne coquuntur: sunt & minores.

II. **Cast-**

II. *Castanea sylvestris*, quæ peculiariter *Castanea*.

*Castaneæ populares & coctivæ*, Plinio.

*Castanea*, Brunf. Trag. Tur. Fuch. Ang. Dod. ut:

Gefn. hort. Guil. Lac. Lon. Adv. Lob. Tab. Ger.

*Castaneæ minores*, Matth. Lugd.

*Castaneæ sylv.* Cord. in Diof. Cæf. Cast.

Hæ in aqua decoctæ pauperum jejunia saturant: & ex earum farina panis conficitur. Sic in Virginia *Castanearū* magna quantitas est, & in Florida, sed Gallicis magis *sylvestres*: p. 2. Am.

III. *Castanea humilis racemosa*.

*Castanea humilis*, Joh. du Choul in hist. montis Pilati, Lugd.

IV. *Castanea folio multifido*.

*Castanea equina*, Matth. Dod. Ad. Lob. Cast. Cl. pan. & hist. & hist. app. alt. Lugd. Cæf. Tab. Ger. an sit *Myrobalanus folio heliotropij* Plinij l. 12. c. 21. dubitat Cæfalpinus.

Ex Oriente primum Constantinopolim, hinc Viennam, ubi provenit, delata: & quia equis anhelosis prodest, equina dicitur.

V. *Castanea leporino reni similis*.

*Castanea Peruana*, Clus. hist.

VI. *Castanea purgatrix*.

*Castaneæ purgativæ*, Monard. Cast.

*Fructus cholagogus*, Monard. Lugd.

Ex maritimis Nicaragua in Hispaniam delatus.

VII. *Castanea ex Bali insula*.

*Fructus pyri* magnitudine, *castaneæ* forma cortice tenui minus tamen aculeato, albicans, sapore jucundo, Ind. or. par. 3. c. 39.

VIII. *Arbor Mexiocana fructu castaneæ coccifera*.

*Arbor finium regundorum*, Scalig. & ex eo Lug. quia in fructu coccos, quo ad picturas utuntur, & in tabellis pictis, cum literas non habeant, agrorum facies, finesque prædiorum servant. an Daburi, Clus. exot. l. 3. c. 19.

Bixa Oviedi, Clus. exot. l. 3. c. 20.

IX. *Fructus peregrinus Castaneæ similis*.

Gor *fructus castaneæ similis* sed amarus, Scalig. Lugdun.

## F A G U S.

**F**agus Theoph. 3. hist. 7. *ἔφυ* (*Gaza* Scisima vertit, quod sit in laminas sectilis) cujus fructum 3. hist. 10. describit, lavem, glandem, in calice echinato placido tamen & lavi non hispido ut *Castaneas* illi tamen dulcedine & succo similem. Sed præter glandem etiam baccam parvam gignit, de qua sic Plinius l. 16. c. 16. *Fagi glans nucleis similis, triangula cute includitur, &c. media parte folij, plerunque gignens superne parvulam baccam viridem cacumine aculeatam*. Theophrastus 3. hist. 10. & 5. hist. 8. duplex est: altera montana candida: altera campestris, nigra: sed campestris minus utilis montanâ, quæ ad multa perutilis.

Fagus, Brunf. Trag. Matth. Anguil. Dod. ut: Oxya, Bellonio.

Gefn. hort. Lac. Tur. Lon. Adv. Lob. Cast. Lugd.

Cæf. Tab. Ger.

Oxya Græcorum, *Fragus recentiorum*, Gefn. de

Ornus, Pandestario.

## Q U E R C U S.

**Q**uercus *Ἀϋς* Græcis: licet præsci Graci omne genus arboris *Ἀϋς* nomine intellexerint, à verbo *Ἀϋς* *ἔραμ* *πο*: sic Latini *Glandis* nomine, omnem fructū complexi sunt, ut Fabolinus ait, ex prælo Graci sermonis & *Ἀϋς*, apud quos omnes arborum species *Ἀϋς* *Ἀϋς* appellantur, ut *πᾶσι* & *Ἀϋς*, fiat dictio *Ἀϋς* *Ἀϋς*, quo verbo *Cajus* omnem fructum significari dixit. Quæ etiâ *glandis* appellatione apud scriptores intelliguntur, à Gracis *βᾶλα* *ἔραμ* *πο* vocantur: sed revera *Ἀϋς* tantum arborē glandiferam denotat. & præsertim *Quercum*. Glandem verò (ut habet Plin. l. 16. c. 6.) quæ propriè intelligitur, ferunt, *Robur*, *Quercus*, *Esculus*, *Cerrus*, *Ilex*, *Suber*: quâmvīs *Roboris* appellatione omnia genera contineri posse, *Gaza* censuerit: cum tamen *Robur* una solum species sit, quæ *Ἀϋς* generi subjecta sunt. Et Theop. 3. hist. 9. *Quercus* genera sunt, *ἰσχυρὴ*, *ἰσχυρὴ*, *πᾶσι* *ἔραμ* *πο*, *ἰσχυρὴ*, *ἰσχυρὴ*: *Gaza* sic vertit: *Roboris* genera habentur, placida, *cerrus*, latifolia, *fagus*, *salsicortex*, quam aliqui recte *corticē* vocant.

I. *Quercus latif. mas*, quæ brevi pediculo est. *πᾶσι* *ἔραμ* *πο* Idæorum & Maurorum, Theoph.

latifolia, Plinio.

Glandiferarum arborum species tertia, Ang.

*Platyphyllos mas*, Lugd.

Glande est mediocri, calice tantum pustulata scabritie asperato: sæpe ternis aut binis simul cohærentibus, raro unica, in summo ramorum prodeunte.

II. *Quercus latifolia fœmina*.

*Platyphyllos fœmina*, Lugd.

Hæc per omnia minor, folijs ob densas lacinias veluti crispis: glandib. interdū senis aut quinis, sæpe ternis aut quaternis, rarò binis, rarissimè singularibus, calici firmiter adnexis. Verum sæpe penè rotundæ imperfectæ calyci continuè reperiuntur, quemadmodū in historia Lugdunensi pingitur.

Ggg 2

III. Quer-

III. *Quercus latifolia perpetuo virens.*

*Quercus* ubi *Sybaris* perspicua, quæ nunquam folia demittit, Theoph. i. hist. 15.

*Quercus* in *Thurino* agro, ubi *Sybaris* fluit, Plin. l. 16. c. 21.

*Quercus* in *Apennino* & *Andium* *Gallicæ* gentis agro, Lugd.

IV. *Quercus cum longo pediculo.*

*Hemeris Idæorum*, *Etymodrys Macedonum*, *Hemeris*, Plinio; placida, *Gazæ*. (Theop.

*Quercus*, *Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Tur. Lon. Tabernæm*.

*Quercus vulgaris*, Lob. Ger.

*Quercus vulgaris*, *hemeris*, Cord. in Diosc.

*Hemeris etymodrys*, Lugd.

Huic peculiare, quod glans modo unica, modo gemina longo pediculo affixa dependeat.

*Quercus latifoliæ* amplissimæ circa *Viennam* *Clusius* meminit, cujus omnes glandes è longis pediculis dependentes, quasi viridi quadam excrecentia, multis inæqualibus angulis prædita, inclusæ erant, quæ reliccata gallarum modo firma & dura erat.

*Querc. Pannonica latifolia*, rectius *Cerrus*, Cæ.

Sic *Quercus præaltæ* & vastæ in insula *Virginiae*: & in *Guayaquil* singularis præstantiæ & longissimæ durationis: *Joseph Acosta* l. 4. c. 30.

V. *Quercus parva sive Phagus Græcorum & Esculus Plinij.*

φῦλς, ἀπο τῆς φάγῃν, Latinis ab esca vel esu, *Esculus*, quod fructus ejus dulcis sit, ac ceu *Castanea* edulis, cum cæterarum *Quercuum* fructus, suis tantum sapiat.

*Quercus*, sive glandiferarum arborum i. species, Ang.

*Phegus*, *Quercus* species, Cord. in Diosc.

*Esculus* veteribus Græcis πλάτφυλλος, Bellon.

*Phagus esculus* mas & fœmina, Lugd.

*Ilcis* genus, quod in *Hispania* *Enzinas* vocant, Cæsalp.

Folio præcedenti angustiore, infernè candicante, glande communiter unica, rarò gemina & aculeo magis pungente: quas *Hispani* sub cineribus coctas, secundis mensis apponunt.

*Quercus* genus à nostris diversum, quod veteribus ignotum arbitramur, cujus glandes minoribus fabis haud sunt majores: hæc Bellon.

VI. *Quercus calice echinato glande majore.* *Αἰγίλωψ* *Idæorum*, *Aspris Maurorum*, *Latinarum Cerrus*.

*Cerrus*, glandiferarum 2. species, Ang.

*Ægilops* sive *Cerris* majore glande, Dod.

*Quercus Ægilops*, sive præcella dicta *Cerris* Plinij, Adv.

*Cerris* Plinij majore glande, Lob.

*Quercus altera*, quæ *Cerrus*, Cæf.

*Cerris* sive *Quercus* 4. genus, Lugd.

*Cerris* Plinij i. Tab.

Hisce glandibus ad pannos atro colore inficiendos, gallarum vice utuntur.

VII. *Quercus calice hispidoglande minore.*

*Ægilops* minore glande, Dod.

*Cerris* Plinij minore glande, Lob.

*Cerrus Ægilops* Theoph. Clus. pan. & hist.

Glandifera folio sinuato deciduo tertia, vel *Quercus* 3. species quæ in *Etruria* *Farnia*, Cæsalp.

*Haliphleos*, *Cerrus fœmina*, sive *Quercus* 5. genus, Lugd.

Huc referatur,

*Quercus peregrina* sive *Mauritanica* grandissima glande, cujus ex *Scaligero*, Lugd. meminit.

VIII. *Quercus Burgundiaca calyce hispido.* *Quercus alia Bauhini*, sive *Haliphlaeos Sequanorum*, Lugd. nisi eadem cum priore.

IX. *Quercus pedem vix superans.*

*Robur* 5. Clus. hist. hisp. (at 7. in hist.) Tab.

*Quercus humilis*, Dod. Ger.

*Quercus pumila* fruticis specie, fronde *Ilcis* molliore, Lob.

## ROBUR SIVE QUERCUS GALLIFERA.

I. *Quercus* folijs molli lanugine pubescentib. *Robur primum*, Clus. hisp. & hist.

Hujus altera species, quæ folio est minus amplo, & minore glande. (ne ferens.

II. *Querc. gallam exiguæ nucis magnitudi-* *Robur* 2. Clus. hisp. at 3. Eid. hist.

*Galla*, an Theoph. *Fagus*, Adv.

*Galla major*, Lob. & Dod. *Galla*, Cast.

an *Gallæ magnæ*, quas *Poma de Coquo* nuncupant, Garziæ.

III. *Quereus* folijs muricatis, non lanuginosis, gallâ superiori simili.

*Robur tertium*, Clus. hisp. (at quartum in hist.)

*Galla major altera*, Lob. (Tab.

*Galla* sive *Robur majus*, Ger.

IV. *Quercus* folijs muricatis, minor.

*Robur quartum*, Clus. hisp. (at quintum in hist.) Tab.

*Galla minor*, Lob. Dod. Ger.

V. Quer-

V. *Quercus humilis* gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis.

Robur humile, Clus. pan. at sextum, Eid. hist.

*Quercus* etiam miræ magnitudinis & amplitudinis reperiuntur in Septentrionali plaga *Harcyniæ* sylvæ, Plin. lib. 16. cap. 2. *Quercus* quæ *Basileæ* in D. Petri nemore est, Cardanus lib. 6. var. rer. cap. 23. Bellon. Lugdun. & etiam *Gesnerus* meminere.

VI. *Glans Virginea*.

Fructus exotici 21. vel glandis calix ex *Wingau* decaovv allatus, Clus. exot. l. 2. c. 16.

an *Mangumna* nauck, *Virginie* historiæ, quæ in cibum cum piscibus & carnibus cedit.

VII. *Glandium* vel *baccarum* quinque genera, quæ in diversis arboribus nascuntur.

1. *Sagarémener*. 2. *Ofamener*. 3. *Pummuckoner*: ex his indigenæ oleū dulce eliciunt: 4. *Sapumener* dictum, coctum *Castaneæ* est sapore, ex hac interdū panem pinunt: 5. *Magūmenauck*, glans est *Querc.* illius provincie: omnibus decoctis in cibis utuntur in *Virginea*, par. 1 Ind. oc.

VIII. *Quercus lapidea*.

*Lithoxyla* sive ligna lapidea *Anglica*, Ad. Lob. Ligna lapidea, Lugd.

*Lithoxyla* ex *Cerro*, Clus. pan. & hist.

Verūm & *Abies*, *Alnus*, *Ulmus montana* & alia quoque ligna aliquando in lapidem mutantur, monente etiam *Gesnero* l. de lapidibus.

*Abietes* integræ cum cortice in *Elbogane* tractu, in lapidem versæ, *Agricola*.

*Fagus* altitudine 170. ulnarum cum trunco, ra-

mis, folijs, in saxo cinereo durissimo sub terra in valle *Joachimica* reperta: & ibidem ex *Alno* lapis, unde cotes fiant, arte conficere docet, *Jo. Kentmannus* lib. de fossilibus.

*Quercinum* lignum sub terra defossū, in cotem lapideam mutatum, manibus suis eruit *Langius*.

Arbores integræ petrificatæ, stantibus adhuc ramis, cortice, medulla ac radicibus, sæpissimè in *Bohemiâ* & vicinis locis subterraneis invenias, *Agricola* auctore.

Narrat *Porta* l. 2. *Magiæ* natur. alicubi succum abundantem petrificum ab arborib. per radices & trunci poros ex fugi: atq; radices ipsas, truncum, ramos, folia & flores in lapidē convertere.

*Amnes* & rivuli sunt in *Anglia*, ubi pali *li-gnei*, *ridicce*, aut conti, si immergantur, aliquot mensibus lapidescunt, imò ferè ferrescunt, &c. *Adversar.* quod in *Pannonia* quoque *Clusius* notavit. Sic in *Tercera* fons quoque, qui omnia vel illapsa, vel injecta, in solidissimum lapidem commutat, *Linscot.* 3. part. Ind. or. 6.

Similiter in *Java* majore affirmant incolæ, flumen præterlabi, in quod si ligna quæcunq; immergantur, ea in lapides mutari. 2. p. Ind. or. 22.

Et *Plinio* l. 2. c. 103. in *Ciconum* flumine & in *Piceno* lacu lignum dejectum, lapideo cortice obducitur: & in *Surio Colchidis* flumine, adeo ut lapidem plerunque durus adhuc integat cortex: Similiter in flumine *Silaro*, non virgulta modò immersa, verūm & folia lapidescunt, alias salubri potu ejus aquæ.

## QUERCUS EXCREMENTA.

**Q**uercus præter glandem plurima alia gignunt, *Theophr.* 3. hist. 8. & *Plinio* lib. 16. cap. 7. auctoribus.

*Galla* *Græcis* annis dicta, fortè à νύκx, id est fulgine: quod *Gallarum*, pannus nigro colore tingendis, magnus usus sit. Et licet *Plinius* l. 16. cap. 6. voluerit *Gallam* omnes ferre quæ & *Glandem*. *Quercubus* tamen magis peculiaris est, adeo ut *Dioscorides* lib. 1. cap. 146. *Gallam* *Quercus* fructum appellarit: quam *Græci* duplicem fecere: *Dioscoridi* altera οὐρανίτης, parva, tuberosa, gravis, nullo foramine pervia: altera plana, levis & perforata, quæ major est. *Theophr.* 3. hist. 6. altera candida & exigua, quarum aliqua non majores *sabis* evadunt: altera nigra, & magnitudinem mali nonnulla capeffunt: & cap. 8. *Quercus* præter fructum gignit *Gallam* parvulam, atque alteram resinofam & nigram: & *Plin.* lib. 24. cap. 4. *Galla* genera facimus, solidam, perforatam: Item albam, nigram: majorem & minorem. Hic notatu dignum, quod *Matthiolus* in comment. addit: majores *Gallas* illud peculiare sibi vendicasse, ut quot annis, aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem auram prænuncient: nam si integræ rumpantur quæ perforatæ non sunt, aut musca, aut araneus exit: si musca evolat, futuri belli: si repat vermiculus, annonæ penuria: si currat araneus, pestilentium morborum præsagium esse. *Gallarum* genera, *Tabern.* & *Gerard.* quatuordecim proposuere. *Tragus* scribit, *Quercus* peculiare genus esse, quod *Gallam* ferat, nec in *Germania* provenire.

I. *Gallæ* maximæ orbiculatæ.

*Gallarum* 1. & 2. genus, *Tab.*

*Gallæ* ex Oriente: & Provinciales, *Lugd.*

*Gallæ* orbiculatæ, *Gerard.*

Harum aliæ sunt Orientales, aliæ Provinciales, & Illyricæ.

II. Galla oblonga: & Ger.

Gallæ ex Istria, Lugd.

Gallarum 3. 4. & 5. genus, Tab.

III. Galla minor.

Gallarum 6. genus, Tab.

Galla viridis sive omphacis, Ger.

IV. Galla galericulata: & Ger.

Excrementa duo fungum quodammodo exprimentia, Lugd.

Gallarum genus 12. 13. & 14. Tab.

V. Galla angulosa.

Gallarum genus 7. 8. 9. 10. Tab.

Galla viridis sive omphacitis, Ger.

VI. Galla umbilicata.

Excrementum umbilicatum, Lugd.

VII. Galla Brasiliana quinquangula.

Fructus miscellaneus 10. Clus. exot. l. 2. c. 25.

*Alia Quercus Excrementa.*

I. Excrementum moro simile.

*Συκαμινώδης* Theoph. 3. hist. 8. specie mori, sed durum & fractu admodum difficile: quædam veluti mora fert, Plin. lib. 16. c. 7.

II. Excrementa pudendi virilis effigie.

*Αιδινώδης* sive colis effigie representans, Theoph. Veretrum, Lugd. (Lugd.

III. Excrementum tauri caput referens: &

*Ταυροκέφαλον* durum & perforatum & tauri caput quodammodo æmulans, quod præruptum nuclei oleæ speciem intrus ostendit, Theoph. Tauri caput imitantia, Plinio.

Gallarum genus undecimum, Tab.

Galla asinina, Ger.

IV. Pilulæ lanatæ: & Lugd.

*πυλον* pilum quidam appellant: pilulæ sunt lanuginosæ, molles, nucleum duriores amplexæ, quibus ad lucernas utuntur, Theoph. Pilulæ nucibus non absimiles, intus habentes floccos molles, &c. Plin.

V. Pilulæ capillatæ: & Lugd.

*Σφαίριον κόμην ἔχον*, pilula comam habens, quæ inutilis Theoph. pilula alia inutilis cum capillo, verno tamen tempore mellei succi, Plin.

Bedeguaris effigie excrementum spongiosum & muscosum, Lob.

VI. Pilulæ in alis ramorum.

*Σφαίριον μαχαλιγνές*, in ramorum alis pilulam aliam gignit, sine pediculo, concavoq; sessilem & versicolorem, &c. Theoph. gignunt & alia ramorum pilulas, corpore, non pediculo, ad hærentes, candicantes umbilicis, Plin.

Pilulæ sessiles, Lugd.

Capita multis squammis constantia, Clus. in Cerri historia: vide & *Thalium* in Quercu.

VII. Pilulæ è folijs convolutis.

*Σφαίριον φυλλικόν*, pilula è folijs compressa & convoluta, Theoph. è folijs convolutæ pilulæ, Plin. Pilulæ foliosæ, Lugd.

an idem cum *κάρυ* Theoph. 3. hist. 7. & Cachty Plinij lib. 16. cap. 8.

VIII. Pilulæ aquosæ: & Lugd.

*Σφαίριον ὑδατῶδες*: super folijs tergo ad hærentem pilulâ fert candidam, aquosam dum tenera est, in qua culices, & maturescens in modum parvæ Gallæ durescit, Theop. in folio rubente aquosi nuclei, candicantes & translucidi, &c. Plin.

*ὀνυμίδης*, Galeno.

Pilulæ asinina, Trago.

Quercus vulgaris cum suis excrementis fungosis, Lob.

IX. Pumex quercinus.

*Λιθάριον* pumiceum lapillum quoque gignit, quanquam raro: Theoph. aliquando & pumices gignit, Plin.

Pumex, Lugd.

X. Quercus excrementum villosum.

*Σπλάγχνον*, Diosc.

*Φάσηον*, Theoph. 3. hist. 9.

Panos arentes, muscoso villo canos è ramis dependentes, Plinius l. 16. c. 8. vocat.

Sphagnos & Bryon, Plin. l. 12. c. 23.

Splanchnon & Hypnum, Lugd.

Usnea, Arabum.

XI. Foliorum quercus gemmæ foraminulæ.

XII. Coccus Quercuum.

Coccus cochlearum exilium in similitudine in Ciliciæ Quercubus, Diosc. l. 4. c. 48.

XIII. Verruca seu nodi Quercus.

XIV. Quercus albumen.

XV. Uva Quercina.

Uva Quercina à me inventa, quâ nihil præstantius in dysentericis etiam deploratis, Encelius l. 3. de lapid. c. 51. vide & Schenck.

Uva Quercina in annosarum Quercuum truncis, Thal. in Quercu.

an Hypodrys fungus rubes, ad Quercus radices: eodem modo quo Hypocistis sub Cisto pululæ solet, Solinander consil. sect. 4. consil. 24. & 25.

XVI. Boleri Quercus, qui è radicibus & circa radices gignuntur, Plin. l. 16. c. 8.

XVII. Quer-



XVII. Quercinum Agaricum vel Fungus.  
de Boletis & Fungo inter Fungos actum est.)

XVIII. Quercus excrementum purgans: &  
Lob. obs.

## VISCUM ARBORUM.

**V**iscum licet multis arboribus adnascatur, quia tamen in Quercubus optimum provenit, unde Jon poeta sudorem Quercus vocavit, idcirco Quercus excrementis illud subungere lubet. Viscum: igitur Aristoteli 1. gen. an. 1. dicitur, unde Latine Viscus fluxit: igitur Theoph. 3. hist. 9. & 16. quod nomen commune, at Stelin Euboeisum, Hyphear Arcadium vocabulum esse scribit. Dioscor. l. 3. c. 103. igitur (sic glutinum quod ex eo fit appellat) est fructus quodam rotando fructus in Quercu nascentis, solus buxo similibus conficitur, igitur quidam derivari dixerunt ab ἐξω significante ἔξω, quasi ἔξω ἀπὸ futuro ἔξω.

Genera Visci: Plin. l. 16. c. 44. in abiete ac larice (pino Theophr.) Stelin dicit Euboea, Hyphear Arcadia nasci scribit: Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno sylv. Terebintho, nec alijs (& alijs Theophr.) arboribus adnasci plerique: vide Theoph. 2. caus. 23. & hist. 16. At Dioscor. l. c. gignitur quoque in malo, pyro & plerisque alijs arboribus. atque etiam apud fruticum quarundam radices reperitur. Quare recentiores observarunt in abiete, acere, betula, castanea, cerro, corylo, cotoneo, cynosbato, ilice, larice, mespilo, nuce, olea, oxycantha, oxycedro, pomo, populo nigra, pruno sylv. pyro domestica & sylv. quercu, robore, rosis, salice, subere, sorbo, terebintho & tilia. Veteres arbitrati sunt, Visci acinis à Turdo comestis, quod ad pulpa pertinet, concoqui: quod seminis est, incoctum ab alvo dejecti, sicutque in arboribus illis, in quibus isti quiescere consueverunt. Sed quasi cornua ex ossibus animalium: sic ex arboribus viscum educi cum Scaligero exerc. 168. credimus.

### I. Viscum baccis albis.

Viscus, Brunf.

Viscum, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Cord. in Diosc. Ang. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. (qui fruticem dicit) Clus. Cast. Tab. Ger.

Lignum Visci quercini & Lignum S. Crucis, Gentilis & Jacobus de partibus, vocant.

Quercinum omnes commendant: quidam & quod Castaneæ adnascitur, probant: quod verò malo ac pyro syl. ac domesticæ, penitus inutile scribunt: & ut Bellonius refert, nulla Quercus est inter montem Athon & urbes Ceres & Tricala, quæ Viscum non alat & à rusticis Oxonium nuncupatur: nam tenacissimum Viscum ex ejus baccis, quemadmodum Rhodienses ex fructu Sebesten conficiunt.

### II. Viscum baccis rubris.

Viscum baccis rubris in oleis circa Hierusalem, Bellon. Cast. Lugd.

Viscum baccis purpureis, in olea, Clus. hisp. & hist. qui & Visci oxycedri meminit.

### III. Viscum racemosum.

Viscum polycoccon, Cam. ep.

Hoc à vulgari solum baccarum racematim cohærentium copia differt.

IV. Viscum latifolium senis circulis utrinque in sculptis.

Viscum Indicum, Adv. Lobel. Lugdun. Taber. Gerard.

V. Visci modo arboribus Indicis adnascens. Peruviana alia Aloës facie, arboribus iuna nascens Visci ritu, Ad. Lob. Lugd.

Planta Peruviana Visco similis, Tab.

Viscum Peruvianum, Ger.

## PHELLLODRYS.

**Q**uam *Φελλόδρυς* Arcades nuncupant, natura est inter Ilicem & Quercum in media, atque adeo Ilicem feminam quam quidam esse putaverunt, Theoph. 3. hist. 18. auctore. Dicitur Phelloδρυς quasi Suberiquecus nomine ex Subere & Quercu facto, quod natura utriusque participem esse ostendit. Hæc, Theoph. l. c. Illice mollior & subtilior, Quercu durior ac spissior: colore ligni decorticati, candidior Illice, fulvior Quercu: folio similis ambobus, verum majori quam Ilex, minori quam Quercus: fructu Illice minore, at Quercu majore. Plinius l. 16. c. 8. eandem cum Subere existimasse videtur, ut qui Theophrasti de Phellodry verba ad Suber transferit.

I. Phelloδrys candicans latifolia molliter aculeata,

Phelloδrys alba latifolia, Lugd.

an Suberella, Cæsalp.

II. Phelloδrys candicans angustifolia ferrata,

Phelloδrys, Matth. Ad. (& Ilex femina), Cast. Lugd. Tab.

sub Subere latifolio ramus ferratis folijs apud Lobel. pingitur.

Phelloδrys alba angustifolia folio serrato, Lug. Cerro-



Cerrosugaro Matthioli, Clus. hist.

III. Phell. nigricans latif. incisuris spinosis.

Phellodrys nigra latissimis folijs, Lugd.

IV. Phellodrys nigricans angustifolia.

Phellodrys nigra mediocribus folijs, Lugd.

Q. Phellodrys folijs muricatis.

Phellodrys folijs muricatis calyce glandis echinato, Lugd.

## S U B E R.

**S**uber οὐκ ἔστι Gracis ἀ φανερῶν fluctuo, Suberis modo, quod aquis semper innatet: quæ ratione etiam tunc, quod semper altum perat dicitur. Theophr. 3. hist. 16. arbor est caudicosa, parumq; ramosa, proceram tamen, anteq; insignis, ligno robusto, cortice unico crasso, disrumpiq; solito: folio fraxini, crasso oblongiori & deciduo, fructu glandoso Agria simili: corticem detrahunt, inversumq; dividendum censent: alioqui arborem deterio-rem effici volunt: rursum verò intra triennium repletur. Plin. l. 16. c. 6. Suber inter glandiferas recenset: & c. 8. corticis usum in hyberno saminarum calceatu: quare non infacetè Gracos, corticis arborem appellasse scribit.

I. Suber latifolium folio deciduo, & Theop.

Suber, Matth. Lac. Bellon. Cæs.

Phellos five Suber Gazæ, Ang.

Suber Aquitanicum folio deciduo, Clus. hisp. & hist.

Phellos five Suber in Aquitania, Dod.

Suber folio brevior & latior, Lugd.

II. Suber latifolium perpetuò virens.

Suberifera latifolia Ilex glandæ echinato, Ad.

Suber Hispanicum latifolium perpetuò virens, Clus. hisp. & hist.

Phellos five Suber in Hispania, Dod.

Suber latifolia, Lob. Cast. latifolium, Tab. Ger.

Videntur hæc duæ species saltem in eo differre, quod altera, quæ circa Pyrrhenæos montes, folijs hyberno tempore exuatur, quod Theophr. de φανερῶν Pyrrheno scribit: altera verò perpetua fronde in Italia ac Hispania vireat.

III. Suber angustifolium non ferratum.

Suber 2. & angustifolium, Matt. Cast. Tab. Ger.

Suberifera angustifolia Ilex, Ad.

Suber folio longior & angustior, Lugd.

Suberis latifoliæ ramus dexter, apud Lob.

Suber alterū oblongis angustifq; folijs, Cl. hist.

IV. Suberi affine lignum fomitis vicem præbens.

Lignorum duo genera Brasiliæ habent, quorum alterum est mollissimum, alterum clarissimum, quibus ad ignem excitandum utuntur hoc modo: virgam ex præduri illius ligni, pedali longitudine ab altera parte ad fusi modum excavant, hujus cuspidem in mollis illius ligni frusto defigunt, virgam maxima celeritate volvunt, quasi ligni suppositi frustum perforaturi, sicq; non modò fumus quem Tataron vocant, sed etiam ignis qui illis Tata exciratur, & gossypio, vel folijs siccis admotis, ignis concipitur, Leri in hist. Brasiliæ c. 17.

an Lignum fomitis vicem præbens, Clus. exot. lib. 1. cap. 8.

Ligna in Brasilia quæ Urakuciba vocant, quæ exsiccant, dein invicem terunt, ex quo attritu pulvis derafus inflammatur. Stadius par. 3. Ind. Occid. c. 6.

V. Lignum leve fungosum è Java majore.

Lignum cotis vicem præbens, Clus. l. c.

At Gef. lib. de lapide, ubi adeo est lignum induratum, ut vel Cortes ex eo fiant, aut fieri possint.

## I L E X E T S M I L A X A R C A D U M.

**I**lex Diosc. l. 1. c. 1. 44. & Theophr. 3. hist. 16. πῆλιν, quia serra propter duritiem secanda sit. Est autem Theophr. l. c. folio Quercus, sed minore aculatoq;: cortice levior quam Quercus: arbor magna instar Quercus assurgit: materies spissa & robusta: radix alta admodum atq; multiplex: fructus glandosus, sed glans ipsa pusilla est: veterem novus occupat, nam sero maturescit, quamobrem bisera à nonnullis existimata: fert præter glandem granum quoddam pumiceum, & viscum atq; hyphear habet, &c. Σμῖλαξ Arcades vocant arborem Ilici similem, folio tamen non aculeato, sed molliori profundiorq;: nec materia ut illo solida spissaq;, sed soluta molliq;, &c. Theophr. l. c. At Plinio l. 16. c. 6. Ilicis duo genera: ex ijs in Italia folio non multum ab oleis distant, Smilaces à quibusdam Gracis dictæ: in provincijs Aquifolia, &c.

I. Ilex oblongo ferrato folio.

Ilex, Matth. Ang. Lac. Bellon. Cæs. Lugd.

Ilex arborea, Ad.

Ilex angustifolia, Taber.

Sanè Phellodryn, si faciem & folia perpendas, Ilicem quampiam dixeris: ipsum autem lignū, molli⁹ & laxius Ilice, & fruct⁹ major quam Ilicis

II. Ilex folio angusto non ferrato.

Smilax

*Smilax humilis angustifolia*, Lugd.

III. *Ilex folio rotundiore*, molli, modicèq; sinuato, sive *Smilax Theophrasti*.

*Ilex major*, Clus. hisp. & hist.

*Ilex major glandifera*, Dod.

*Ilex arbor*, Løb.

*Ilex*, Taber. glandifera, Ger.

*Ilex latifolia*, Camer. epist.

*Ilicis alterum genus*, Cæs.

*Ilex in Gallia Narbonensi*, Lugd.

*Smilax Arcadum glandifera*, Lugd.

Fructu est majore & longiore Hispanica: at Narbonensis minore & brevior.

Huc referri debet

*Ilex Londinensis duplex*, quas Clusius in sua historia descripsit: qui etiam in *Ilice Monspe-liaca*, aliquando granum ex puniceo nigricans, & interdum tenuem & capillaceum mulcum cinereum, è ramis dependentem, non verò *Viscum* aut *hyphear*, observavit.

IV. *Ilex aculeata cocciglandifera*.

*Ilex hæc* à Diof. l. 4. c. 48. *κίκκος βαρύν*, à Theophr. 3. hist. 16. communi nomine *κίκκος*: à Plin. l. 16. c. 6. *Ilex aquifolia*, & c. 6. *Ilex parva Aquifolia*: à quibusdam *Phellodrys coccifera* appellatur. Est autem Diof. l. c. frutex parvus è cremiorum genere, cui grana ceu lentes adhærent, quæ decerpta reponuntur: hæc ille. Etenim in foliorum supina parte, nonnunquam sed rarius, in furculorum quoq; nodis, granum quoddam rotundum, parvum rubens, sanguineo colore plenum innascitur, quod Diof. & Theophrast. *κίκκος φοινίκης*: Pausanias, Coccum: Plinius, granum, coccum, quisquiliam (cusculium aliqui legunt.) Arabes, Chermes: officinæ granum tinctorium, nam in ipso grano vermiculus nascitur, ex quo Chermesinum conficitur: aliqui Scarlatum vocant: ex hoc quoq; Monspeffuli confectio Alkermes conficitur.

Coccum insectorium, Matthiol. Lacun. Bellonio cult.

Coccus insectoria, Cord. in Dioscor. Ad. Lob. Cast. Tab.

Cocci insectorij arbuscula, Lugd.

Granum & coccus *Baphica*, Ang.

*Ilex in quo coccus baphica*, Bellon. & *Ilex pumila*.

Granum tinctorium, Lon. Cæs.

*Ilex minor coccigera*, Dod.

*Ilex coccifera*, Rauvvolf. Clus. hispan. & hist. Gerard.

*Ilex coccifera*, Bellon. Cam. ep. Tab.

*Ilex aquifolia*, Lugd.

*Ilicis species*, Fragofo.

*Ilicis alterum genus*, Quiquerano.

Huc referatur ex Anguillara

*Agria* quam Plinius *Aquifoliam* vocitat, quæ folijs est *Ilicis* aliquantulum spinosis, glande minima, & quæ in agro Patavino provenit. an *Milav* sive *Acylica*, *Ilicis species* Bellon.

V. *Ilex aculeata baccifera folio sinuato*.

Hæc Theoph. 3. hist. 4. *αγία* (*Aquifoliam Gaza* vertit) quam perpetuò virere & in montibus nasci scribit: & Plinio l. 16. c. 21. *Aquifolio*, folia non decidunt, & montes amat.

*Aquifolia*, Trag. Dod. gal. quibusdā *Ruscus syl.*

*Aquifolium*, Ruel. Matth. Bellon. Ges. hor. (quibusdam *Palma aculeata*) Lobel. Cast. Lugdun. Thal. Tab.

*Agrifolium*, Guilan. (fortè *Cratægus Theoph.*)

Dod. Cæs. Cam. Ger.

*Aquifolium* sive *Agrifolium Septentrionis*, Ad. Paliurus secundus, Lacun.

*Ilex aquifolia*, Lonic.

an sit *Hedera rigens* Plinij dubitat Cæs. at Plinij l. 16. c. 34. hæc sunt: est & rigens *Hedera*, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata cissos.

Hæc multis in locis tam pumila, ut ad frutices referenda sit: alijs in locis in justam arbo-rem attollitur: hinc apud Tragum *Aquifolia arbor*, & *Aquifolia frutex*.

Hæc per ætatem redditur folio nequaquam simbrato, nec pungente, sed solum extremitate acuminata, & hæc est

*Aquifolij alia species* levi folio, Ges. hor.

Rustici ex cortice radicibus detracto *Viscum* parant.



## S E C T I O Q U I N T A.

TILIA; ULMUS; OSTRYS SEU OSTRIA; BETULA; ALNUS;  
EVONYMUS; VIBURNUM; POPULUS; GOSSIPIUM SIVE  
Xylon; Acer; Platanus; Sassafras & Ricinus.

### T I L I A.

**T**ilia, Theoph. 3. hist. 10. φλυγὰς dicitur, quod in tenues assulas sive philyras discerpatur: & inter corticem & lignum, alia tenues interiores cortices sunt, & veluti membrana, a quib. aliarum quoq. arborum cortices interiores, Tilia & Philyra vocantur: quod ex Plin. l. 16. c. 14. & l. 24. c. 8. colligere est. Theophr. l. c. altera mas est, altera femina: differunt inter se cum tota forma, tum ligno: & quod mas sterilis est & sine flore: femina, florem & fructum gignit, & c. folium figura Hederæ folio simile, verum sensim magis rotundatur, & juxta pediculum, id quod velut in gibbum prominet, à folij medio, longiore tractu, in acutum magis cogitur: per ambitum crispæ & serrata folia sunt, & c. & Plin. l. 16. c. 14. Tilia mas & femina, quæ omni modo differunt, & c.

#### I. Tilia mas folijs Ulmi.

Tilia mas, Brunf. Dod. Lugd. quoad descriptionem, non iconem, quæ Ulmi est.

Hæc cum non semper fructum ferat, à quibusdam sterilis existimatur: interdum filiquas rotundas, compressas, coacervatas, cum fissura in summa parte edit, quarum singulæ & singulis petiolis dependent.

II. Tilia mont. maximo folio: an mas Theoph. Tilia sylvestris sive montana, Thal.

In monte nostro Muteto provenit, in quam nullum hætenus fructum observavimus.

#### III. Tilia femina folio majore.

Tilia femina, Brunf. Matt. Fuch. Ang. Dod. gal. Gesl. hort. Ad. Lob. Cæs. Lugd. Tab.

Tilia, Tur. Lac. Lon. Dod. sativa, Tr. g.

Philyra Græcis, Tilia Latinis, Guil.

Phillyrea, Cast. ico.

Ex tiliarum cortice funes, & ut Bellonius refert, in monte Athou etiam lagenæ fiunt.

Mirum profecto quod Plinius l. 17. c. 16. scribit Tiliam juxta Tiburtes conspici omni genere pomorum onustam, alio ramo nucib<sup>9</sup>, alio bacis, aliunde vite, ficis, pyris, punicis, malorumque generibus, sed cui vita brevis fuit.

At tiliarum antiquarum radices sæpenumero simile observatur ei, quod ad Quercus radices Uva est, Thallio monente.

#### IV. Tilia femina folio minore.

Tilia sylvestris, Trago.

Tilia minor, Gesl. hort.

Hæc per omnia minor est, & fronde nigriore.

### U L M U S.

**Q**uia Latinis Ulmus, φελῆα Diosc. l. 1. c. 111. & Theoph. 3. hist. 14. qui genera duo fecit: unum φρτοφελῆα (montiulmus Gaza, Ulmus montosa, Plinio) alterum φελῆα (Ulmus campestris Plinio) interest quod Ulmus fruticosior est, montiulmus ætior: folium individuum leviter circumferratum, oblongius quàm pyro, scabro neq. laevi: mæries flava, robusta, nervosa, deformis, quia tota cor est: sterilis putatur. At Plinio l. 16. c. 40. semen ferit: latiusculum, rotundum tenue: qui l. 16. c. 17. Ulmi quatuor genera fecit: Græci, inquit, duo Ulmi genera novere: montosam, quasit amplior: campestram, quæ fruticosa. Italia Atinia vocat excelsissimas, & ex his siccanæ præferuntur, quæ non sunt riguæ: alterum genus Gallicas: tertium nostrates, densiore folio & ab eodem surculo numerosiore: quartum sylvestre. Theop. 3. hist. 8. Ulmus mas, fert & folliculos quosdam: & 3. hist. 8. οὐκ ἀνεγνώστis (pæcus Dioscoridi) in folliculis gummi gignit & animalia quædam culicibus similia (& ut Dioscorides, humor dum exsiccat, in animalcula culicibus similia resolvitur.) Nam si Ulmus verno tempore pluvijs, subitoq. calore Solis infestetur, ipsius folia protinus corrugantur, & vesica seu folliculi seroti humani figurâ generantur, quibus humor initio lentus, mox in gummi concrevens includitur, qui dum siccat in vermiculos, qui cnipes, culices & muliones appellantur, avolant. Addit Theophr. Cachryn (amentum Gaza) etiam edere peculiarem, autumnino, multam minutam, nigram. Semen à Plinio Samora vocatur.

#### I. Ulmus campestris, & Theophr.

Ulmus nostras sive Italica, Plinij.

Ulmus vernacula, Columellæ.

Ulmus, Trago, Matt. Dod. ut: Bellon. Lac. Turn.

Cord. in Diosc. & hist. Gesl. hort. Lon. Ad. Lob.

Cæs. Lugd. Cam. Clus. hist.

Ulmus

Ulmus in planis proveniens, Ang.

Ulmus 1. Tab. qui & 2. habet, quæ Ulmus, Ger.

Huc referri debet ea, cujus folijs averſa parte folliculi adnaſcuntur, quæ dicitur

Tilia mas, Matth. Adv. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Carpinus nigra, Caſt.

Ulmus aut ei ſimilis cum folliculis, quam aliqui pro Tilia mare offerunt, Dod.

Notatu omnino dignum quod Cluſius obſervavit, nempe Ulmorum, juxta Thormim amnem in Hiſpania naſcentium, quaſdam radices in tenuiſſima ſtamina deſinere, quæ cum à præterlabentibus aquis perluuntur, rubefcentem colorem contrahere, in quibus exigua quædam animalcula, exiguis locuſtis ſimilia naſcuntur & laritant, quæ piſcatores in eſcam capiendis piſcibus colligunt: quæ verò adole-

ſcunt ex radiculis emergentia, inſtar terreſtrium locuſtarum avolare: poſtea certo tempore in aquas ad ſuum genus conſervandum remeare. Sic Bellonius ex Ulmi cortice lagenas confici ſcribit.

II. Ulmus montana.

Ulmus latifolia, Trag. Ger.

Ulmus montana, Matth. Ang. Caſt.

Ulmi alterum genus, Cord. in Dioſc. Cæſ.

Ulmus 2. Dod. tertia, Tab.

*Ulmo ſimiles arbores.*

I. Cortex arboris Ulmo ſimilis ad catarrhos.

Arboris cortex ad rheumatismos, Mon. Lugd.

Arbor vaſta Ulmo ſimilis cum amplitudine, tum forma.

II. Pacal Indis arbor jam deſcripta minor, Monard. Lugd.

## O S T R Y S S I V E O S T R Y A.

**O** *xyrus, quam nonnulli ἐξῆνυ vocant, inquit Theoph. 3. hiſt. 10. eſt unica ſpecies Oxyæ (id eſt Fago, Sciſſima Gaze) tum ſatu tum cortice ſimile, folio pyri non multo oblongiore, in acutum contraſtione & majore, fibris multis & craſſis, à medio dorſi in modum coſtarum rectâ ſecundum magnam fibrâ porrectis, in fibris iſſis rugato, & in ambitu leviter ſerrato: materia dura, decolore. albida: fruſtu puſillo, oblongo, ordeo ſimili, flavo: radices ſublimis habet. Et Plinio lib. 13. cap. 21. Oſtrys quæ & Oſtrya, arbor ſimilis Fraxino cortice & ramis, folijs pyri, paulo tamen longioribus, craſſioribusq; ac rugoſis, incuſuris, quæ per tota diſcurrunt: ſemine bordeo figura ſimili & colore.*

I. Oſtrya Ulmo ſimilis fruſtu in umbilicis foliaceis.

Ornus, Trag. Lon.

Carpinus, Matth. Dod. Adv. Lob. Tab. Cam.

Carpinus alba, Caſt.

Ulmi 3. ſpecies, fortè Ulmus ſyl. Plinij, Dod. gal.

Oſtrya Cordi, Geſn. de lapid. Bellon. Thal.

Oſtrys Theoph. Fagulus herbariorum, Cl. hiſt.

Fagulus ſepiaria, Geſn. hort.

Ulmus Atinia, Lugd.

Fago ſimilis altera, Cæſalp.

Betulus, Lob. in ico Ger.

(Cam.

Carpinus, Matth. quæ Oſtrya ſatis repræſentat,

II. Oſtrya Ulmo ſimilis fruſtu racemoso lupulo ſimili.

Fago ſimilis prima, Cæſ.

Hæc Italis, illa Germanis frequens, quam alij ad Ulmum, ad Fagum alij, alij vero ad Carpinum Plinij, quæ Aceris ſpecies eſt: alij ad Oſtryn Theophrasti referunt.

## B E T U L A.

**B** *etula vel Betulla, quæ quibuſdam ſic dicta videtur, quod bitumine ſcateat: Theophrasto 3. hiſt. 14. ἐμβόλα folio eſt Caryæ (forte Oxyæ) paulo anguſtiore. cortice verſicolore. materia lavi, nec niſi ad baculos utili: at Plinio l. 16. c. 18. Betula arbor eſt Gallica mirabili candore atque tenuitate terribiliſ magiſtratum virgû, (idcirco arborem ſapientie appellare conſuevimus,) &c. Hujus cortici liber albus ſub eſt (qui liber Betula) tenuis, candidus, charta noſtra modo, cui veteres opera ſua, ante charta noſtra uſum repertum, inſcribebant.*

• Betula, Trag. (qui papyri ſpeciem veterum cenſet) Matth. Dod. ut: Ang. Bellon. Lon. Adv. Lob. Lugd. Caſt. Tab. Ger.

Populo albæ ſimilis in alpiſ, Cæſ.

Hæc sæpè in arborem altam & craſſam aſſurgit: aliquando pumila reperitur: hinc

Betula arbor, &

Betula pumila, Thallio.

## A L N U S.

**A** *lnus, quod æmne alatur: αλῆς Theoph. 3. hiſt. 14. ſterilis eſt & unius generis, recta arbor natura, ligno molli, medulla tenera, folio pyri ſed ampliore nervoſioreq; cortice ſe abro, intus rubete, quo coria t: ngunt: radice*

radice est per summa terra sparsa, nec major quam *Laurus* : & 3. hist. 4. tum sterilis, tum fructifera florescit. Verum Theophrastus aliquando eas steriles vocat, quæ fructum non conspicuum, aut inutilem ferunt : quidam & cortice & fructu viridi, gallarum vice ad scriptorium atramentum utuntur. Plinius lib 16. cap. 24. Alno folia crassissima tribuit : & cap. 26. nullum semen aut fructum ferre scribit : forè Aristotelis auctoritate motus, qui inter naturæ miracula retulit, quod *Alni* in sola *Creta* non sint steriles : sed ne apud nos quidem infructifera sunt.

I. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis.*

Amedanus, Crescentio.

*Alnus*, Brunf. Trag. Matth. Ang. Dod. ut : Turn.

Lon. Adv. Lob. Cæs. Cast. Lugd. Thal. Tab.

*Alnus* vulgo Schlitro in *Creta*, Bellon.

*Alnus* vulgaris, Clus. hist.

Ad hujus radices quandoque excrescentiam ramosam, *Uvæ quercinæ* similem observavimus. Ex hujus ligno pali in aqua ædificiorum fundamentis subacti lapidescunt, cujus causam Vitruvius refert.

II. *Alnus folio oblongo viridi.*

III. *Alnus folio incano.*

*Alnus hirsuta*, in Matthiolo nostro picta & descripta.

an *Alnus altera*, Clus. hist. qui figuram ex Lobelij iconibus habet.

IV. *Alnus alpina minor.*

Hæc cum prima convenit quidem, sed per omnia minor & humilior est, nec folia ita lento

humore aspersa sunt : quæ in Alpibus Austriacis provenit.

*Alnus baccifera.*

I. *Alnus nigra baccifera.*

Avornus, Crescentio.

Gaulbaum/ Trag.

Frangula, Matth. Dod. Lugd.

*Alnas nigra*, Dod. gal. Adv. Lob. Cam. Thal.

*Jovis barbæ* species, Bellon. cult.

*Alnus nigra baccifera*, Lugd.

*Alnus baccifera*, Tab.

Arbor fœrida, Lon.

Siler Plinij quibusdam monente, Lugd.

Hæc dum pusilla est in locoque pingui folia oblonga & magna fert. Cortice interno multi pro Rhabbarbo utuntur.

Sunt qui & hirsutam notarunt.

II. *Alnus nigra pumila Thalij* quid?

III. *Alnus nigra polycarpus.*

Reuthbeer/ Lonic.

## E U O N Y M U S.

**E**ὐώνυμος (Theoph. 3. hist. ult.) arbor, nascitur magnitudine mali punici, atque folia ejusdem, majori quam *Vinea pervinca* : & molli ut *punica* : flos odore albæ violæ similis, odore infestus, fructus cum putamine siliquæ *Sesamæ* proximus, intus solidus, præterquam quod in versus quaternos dividitur.

I. *Euonymus vulgaris granis rubentibus.*

Fufanus, Crescentio.

*Carpinus*, Theoph. Trag. Lon.

*Euonymus*, Matth. Don. ut : Ang. Turn. Gesn.

hort. Adv. Lob. Thal. Cast. Tab.

*Anonymos* alijs *Euonymus*, Cord hist.

Siler Plinij, Cæs.

*Tetragonia* Theophrasti, Lugd.

Theophrasto 3. hist. 6. τετραγωνία (Quadratoria Gaza vertit) serotino germine constant, sicut *Thuya* & *Taxus* : hæc Theoph.

Fructu est communiter rubescēte : rarius albo.

II. *Euonymus granis nigris.*

*Euonymus alter*, Clus. pan. & hist.

*Euonymus pannonicus*, Tab. Cam.

III. *Euonymus latifolius.*

*Euonymus Pannonicus* prior, Clus. pan.

*Euonymus primus* sive *latifolius*, Eid. hist.

*Euonymus latifolius*, Tab.

IV. *Euonymo similis Ægyptiaca*, fructu baccis laurifolii.

Bon vel Ban, ex cujus semine Ægyptij potum Caova conficiunt, Alpin. & Palud. notis in Lin-scot. part. 2. Ind. or. c. 28. sed Choana vocat.

Buncho Avicennæ & Bunca Rhafis ex cujus fructibus Turcæ potionem Chaube. parant, Rauvvolf.

Buna ex qua in Alexandria potio fit, Clus. notis in Garz. Lugd. Tab. Belli ep. 4. ad Clus.

Elkane nonnullis, Pancio.

## VIBURNUM VULGO.

**E**tsi *Viburnum* alicujus singularis plantæ nomen non sit, sed cujusq; virgulti fruticisve proprium, Strabone & Nemesiano testibus, cum tamen vulgo huic, nomen hoc tribuatur, asservare placuit.

Kleiner Mehlbaum/Trag.Lon.

Viburnum, Matth. Gesn. horr. Cam. Cast. Lugd.

Spiræa Theophrasti Dalechampi, Lugd.

Viurna vulgi Gallorum & Ruellij, Lob. Cast.

Lantana, Gesn. hort. (quod lentū sint rami)

Guiland. Dod. Cæs.

Rhus coriariorum Theophrasti & Plinij Cæsalpino videtur.

Rhus (ait Theop. 3. h. 18. Fluidam Gaza vertit, nomen illi à *ῥέω* impositum fuisse existimans) alia mascula, alia foemina, quia alia sterilis, alia fructifera: nec virgas longas gerit, neq; crassas:

folium Ulmo simile, nisi quod parum oblongius densumque aliquantulum: ramulorum novellorum folia paribus internodijs conjugatim condita adhærent, & planè à lateribus ordo versus conspicitur: flos candidus racematim enascens: hic ubi defluxit cum labrusca rufescit fiuntque ceu lentes tenues congestæ: figura his quoque in modum uvæ, &c. Plinio l. 24. c. 11. Rhus frutex est coriarius, subrutilus, cubitalis, crassitudine digitali, cujus aridis folijs, ut Mallicorio coria perficiuntur, &c. & alibi inter Syriæ arbores, Theoph. describit.

## P O P U L U S.

**P**opulitria genera Plinius l. 16. c. 23. fecit, albam, nigram & Lybicam: Theoph. 3. hist. 4. λέων, αἶγας & ἡ κερνίς: Gaza sic reddidit: primam quidem simpliciter nomine populi, 4. hist. 9. al. quando populi albæ, 3. hist. 6. Alteram, populi nigræ, 2 hist. 3. at 3. hist. 1. voces λέων & αἶγας, reddidit populum tam albam quam nigram. Tertiam, alpina nomine: nam 3. hist. 14. ἡ κερνίς δὲ παρέμειον τῇ λέων, alpina. populo albæ non absimilis: quamvis Gaza 3. hist. 6. ubi habetur λέων, αἶγας, vocem posteriorem non reddiderit. Sic apud Dioscoridem l. 1. c. 109. & 113. λέων & αἶγας legitur: ubi interpretes nomen populi addidit.

I. Populus alba (quæ λέων ab albedine dicitur) majoribus folijs.

Populus alba, Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc.

(cui & Farfar antiquorum) Bellon. Lac. Adv.

Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Populi albæ alia species, Trag.

Populus alba latifolia, Lob. ico.

Populi prima species, Ang.

Populus alba Arabibus Haur, Rauvvolf.

Uvas lanosas quædam fert: quædam sterilis, ut etiam non floreat. Dioscorides σφαγίαν, id est pilularum, prima foliorum germinatione erumpentium meminit. Theoph. 2. caus. 21. τὸ λεόνιον ἐφαγας. Διὰ φασι, i. e. populum albam in nigram transire ferunt, tum fronde tum etiam tota specie: & 4. caus. 6. populus alba in rotum nigræ dissimilis, fronde formaque tota est, sed in senecta similima efficitur.

Musculus quandoque etiam adnascitur, quem Populneum muscum Dioscorides & Galenus, unguentis & oleis inferunt.

II. Populus alba folijs minoribus: & Lob. in ic.

III. Populus nigra.

Populus alba, Trag (cui & i. sive vulgaris) Lon.

Populus nigra, Matth. Dod ut: Cord. in Diosc.

Bellon. Lac. Ad. Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Populus secunda, Ang. Tur.

Quædam florēt, & fructum non fert: quædam fructum fert, & non floret: flos instar amenti, colore rubente, aut candicante: fructus,

racemulus oblongus ex plurimis granis viridibus compositus, in quibus lana candida continetur: nonnunquam etiam ramis nodi quidam duri adnascuntur. Ex gemmarum (oculorum) viscido & flavo humore, Unguentum populeum in Vere paratur. Resina ῥήτιν ex hac colligitur Dioscoridi, qui & δάκρυον, i. e. lachrymam destillatam concrescere & Electrum fieri ex aliorum sententia monet.

IV. Populus tremula.

Populus Lybica Plinio, alpina, Gazæ.

Populus nigra, Trag. Lon.

Populus Lybica, Matth. Dod. ut: Bellon. Adv.

Lob. Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.

Populus alpina, Bellon.

Populi 3. species, Ang. Cord. in Dioscor. cui &

Tremula Latinorum.

Populo nigræ similis in alpibus, Cæs.

Cercis Theophrasti sive Populus Lybica Plinij, Clus. hist.

Hanc κερνί Theophrasti volūt, de qua 3. hist. 14.

ἡ κερνίς παρέμειον τῇ λέων, sic Gaza, Alpina populo albæ non absimilis est, cum magnitudine, tum verò quod ramis albicantribus spargitur, folio hederæ, sed parte altera sine angulo, altera oblongo, inque angulum acutum exeunte, colore parte resupina, pronaque ferè simili: pediculo prolixo tenuique annexo, quare non erecto sed inflexo, cortice asperiori, quâ populus alba, &c.

Sunt qui κέρνιν à crepatu, non κερνί dicendum



confeant. Aliqui Cratægum Theophrasti volunt, Lobelio monente. Plinio l. 16. c. 23. populus quæ Lybica appellatur, minima folio, ac nigerrima, fungisque enascentibus laudatissima.

V. Populus rotundifolia Americana. Populus novi orbis, Adv. Lob. Cast. Populus America sive Peruana, Lugd. Populus Americana, Tab. Ger.

*Populo similes exotica.*

I. Arbor populo similis resinosa. Focot Guebit, i.e. lignum expetitur, Frag. Tocot Guebit, i.e. lignum desiderij, Cl. in Mon.

Arbor in India occid. ex qua Idola conficiunt: sub cujus cortice, gummi Thure candidius, cujus loco etiam utuntur.

II. Arbor populo similis resinosa altera. Tacamahaca colligitur in nova Hispania ex arbore odorata, magna ut Populus, cujus fructus coloratus ut Pæonia est, Monard. Frag. Lugd.

Tacamahaca 9. hist. Ind. occid. l. 4. c. 29. Gummi Taccamaca ex arbore quæ folijs longis angustis, fructu prunorum magnitudine, 4. par. Ind. orient. 7.

## GOSSIPIUM SIVE XYLON.

UT Græcè Ἐβλὼν & Γοσσίπιον, ita Latinis Xylon & Gossipium nominatur. At Theoph. 4. hist. 9. λέειν ἄνερ ἐξ ἑβλῶνος dicitur: in Tylo inquit, insula multa sunt arbores lanigerae, quæ folia vitis habent, verum minora, fructum fert in quolana continetur mali magnitudine, vere nascitur occlusum, quod cum maturum est, aperitur & lana excipitur, quæ telas texunt. Plinius l. 12. c. 10. de his arboribus paulò aliter egit: & fortè seq. c. 11. eadem sunt arbores, quas Gossampinos vocari tradit: qui aliàs inter lini genera, l. 19. c. 1. recensuit, his verbis: frutex quæ aliqui Gossipion vocant, plures Xylon & ideo lina inde facta Xylina: parvus est, similemque, barbata nuci desert fructum, cujus ex interiore bombyce lanugo netur: nec lina sunt eis candore mollitiè præferenda.

I. Gossipium frutescens semine albo. Coto & Bombax, Serapioni. Xylon sive Gossipium, Matth. Guil. Xylon, Fuch. Dod. gal. Gesn. hort. Lac. Lon. Gossypium, Turn. Dod. Rauvvolf. Adv. Lobel. Cast. Cæs. Lugd. Cam. Tab. Bombax Officinarum. Gossipium par. 4. Ind. occid. c. 15. & p. 8. Algodon, Catoen sive Gossypium in arbusculis tam magnis quàm minoribus nascitur: aliud densum & crassum, aliud molle & tractabile, part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 23. Gossipium in sylvarum humilibus arboribus copiosè, Linscot. Ind. or. part. 3. c. 9.

II. Gossipium arboreum caule lævi.

Gossipium perenne & arboreum, sive Asiaticum, Bellon. (tum, Alpin.

Gossipium arboreum, Gotne Mfegiar appellat.

III. Gossipium arboreum caule spinoso.

Gossipium Brasilianum, Bellon. & Belli.

Bombax Indica, Ponæ ital.

Xyloa, Stadio in Brasil. part. 3. Ind. occid. c. 38.

Xyliferæ arbores, Lerio, part. 3. Ind. occid. c. 12.

Hujus semina nigra sunt, in dena vel duodena grana uvæ modo congesta: cum Asiaticum singula grana separata habeat.

IV. Gossipium Javanense salicis folio.

Cylæ, Oviedo.

Lanifera arbor peregrina, Clus. exot. l. 1. c. 14. an Lanifera arbor, Bellon.

## A C E R.

ACER Græcis σπένδαμνος dicitur. Theophrasto 3. hist. 11. σπένδαμνος (Acer GAZA vertit) alij bina, alij tria genera faciunt: unum quod communi nomine σπένδαμνον (Acer) vocant: alterum συϊάκ (Carpinum) tertium verò κλινότροχον (Leclitotariam GAZA) At 3. hist. 4. σπένδαμνος quæ in monte συϊάκ, quæ in planis γαλέων (Gallicum GAZA) vocari tradit. Plinio lib. 16. cap. 16. Aceris plura genera: album, quod praci-pui candoris, vocatur Gallicum: alterum genus (Zygias Theoph.) crispo macularum discursu, qui cum excellentior fuerit, à similitudine caudæ pavonis nomen accepit: è viliori genere crassivenium (clinotrochon Theoph.) Graci situ discernunt: campestre candidum esse, nec crispum, quod glinon vocant: montanum verò, crispus duriusque: & tertium Zygiam. &c. quod alij generis proprij esse volunt & Latine carpinum appellant. Verum sic distinguere licet, quod Sphendamnus acer sit nervosum & album: Zygias verò, flavum & crispum: clinotrochos, flavum & non crispum: glinon, candidum, minus crispum.

I. Acer montanum candidum. Platanus, Trag. Lon. (Dod. gal. Aceris prima species, Ang. Aceris species folio majore, Carpinus videtur,

Sycomorus Ruellij, Gesn. hort. Acer, Cord. in Diosc. Cæs.

Aceris



Aceris species Platanus Gallorum, Bellon.  
Acer major, Cord. hist. Gefn. hort. Dod. Ad. Lob.  
Cam. ep. Thal.

Acer, *κλιότροχ* & antiquis, Ad.

Acer latifolia, Clus. pan.

Acer montanum, Gef. hor. sive Gallicum, Lugd.

Hujus turiones lacte scatent, ut Ficus: sic quædam floret, quædam non floret, nec fructum fert.

II. Acer montanum flavum sive crispum.

Acer crispa materia, Acer montana Asphendamnus rusticis Cretensibus, Bellon.

Aceris altera species, quæ fortè Zygia Theo. Ad. Opulus montanus, Lugd.

Acer montanum in marem & fœminam distinguunt: mas colore magis flavo, ligno duriore & venosiore, magisque crispo, citiusque floret: fœmina tardius, & ligno est pallidior, minusque crispo. Germani ob flexuosos venarum discursus ad opera lauriora utuntur, lignum nobile vocantes, ex hujus radicibus cochlearia, pulchra conficiuntur.

III. Acer montanum tenuissimis & acutis folijs.

Acer acutioribus folijs, Gef. hort.

Acer tenuifolia, Thal.

IV. Acer campestre & minus.

Acer, Trag. Lob. Tab. minus, Gef. hor.

Acer campestre, Dod. gal. & Lugd. cui & Carpinus & Opulum campestris veteribus,

Opulus, Tur. Gef. hort. Cæs.

Acer tenuifolia, Cord. hist.

Acer, Opio cognominatum Romanis, Bell. cult.

Aceris species quæ Sphendamnus Theoph. Ad.

Acer minor, Dod. Clus. pan. Cam.

Platanus, Lon. ico.

Opulus & Rhambolinus, Cordi Schol.

Acer latifolium, Clus. hist. ico.

Alibi frutex, alibi arbor est.

V. Acer trifolia.

Acer Monspeffulanum, Lugd.

an Aceris arboris genus à reliquis diversum ad sextum id genus à nobis observatum, Bellon.

## P L A T A N U S.

**P**latanus *πλάτανος* Græcis, à latè diffusis ramis nomen sortita est: *πλάτος* enim dilato & speciosum reddo significat: hujus apud Diosc. l. 1. c. 107. nulla descriptio: at Theoph. 1. hist. 16. platano folia ampla tribuit: & 3. b. 2. semen manifestum producit, coq. gignitur: quam (1. hist. 15.) in Creta insula apud fontem stare asseverant, quæ nunquam folia deperdat: & Plin. l. 2. c. 1. de Platano multa habet, ostendens quomodo mero affuso nutritur: sicque & arbores vino potare: Aelianus scribit (cum adeo patulus ramus diffundatur) Xerxen adeo ipsius umbra dalectatum, ut in Lydia diem integrum, cum maximo exercitu sub ea consumpsit.

I. Platanus, March. Ang. Dod. ut: Cord. in Diosc. Bell. Gef. hor. Tur. ico. Lac. Ad. Rauvvolf Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Clus. hist.

Fructus ipsius *πλάγια* Dioscorides, pilulas Plinius l. 2. c. 1. vocat.

Ex hujus truncis crassis montis Athon incolæ

naviculas conficiunt, Bellonio eas describente.

II. Arbor Platani folio fructu peponis magnitudine eduli.

Mamœra ipsa arbor: at fructus Mamaon ab uberum forte similitudine, Lusitanis in America

est mas sterilis, fœmina fructifera, Cl. cur. post.

## S A S S A F R A S.

Arbor ex Florida ficulneo folio.

Pavame Indorum, Monardi, Lugd. Frag.

Sassafras arbor, Monardi, Lugd.

Sassafr. Cast. Capevaccio, cui & Ind. Sassafragia.

Lignum ex India Occid. Sassafras vocant, Cæs.

Sassafras, ab indigenis in Virginea, Winauck

appellatum, par. 1. Ind. Occident.

Ex Florida, novi orbis provincia, adfertur: fructum oblongum, rugatum, longissimis pediculis donatum habet. Hujus folia fructumque

Doct. Doldius p. m. unâ cum infinitis alijs ad

me Norinberga misit.

## R I C I N U S.

**R**icinus, Dioscor. l. 4. c. 164. *κίον ἀγκύρων*, à similitudine Crotonis vel Ricini animalis, quod semen ejus refert: quod animal Plinius l. 11. c. 34. & l. 30. c. 10. descripsit. Alijs *Pentadactylus* & vulgo *Palma Christi*, à figura foliorum, quæ palmam digitis expansis emulantur, Mauritani Cerva. Dioscoridi arbuscula est ut parva ficus, habens folia Platani, at majora, laviora ac nigriora, ramis radicibusque, cavis harundinis modo: semen in uvis aspersis. At Plinio l. 15. c. 7. Cici arbor in Aegypto copiosa, & in Hispania repente provenit, altitudine oleæ, caule ferulaceo, folio vitium, semine uvarum gravidum, &c. meminit & l. 16. c. 22.

I. Rici-

## I. Ricinus vulgaris.

Gratum regium majus, Mesuæo.

Ricinus, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. (Gallis Palma Christi) Cæf. Cast. Lugd. Tab. Cici, Gesn. hort.

Kikaion S. Jonæ: Alkaroa & Kerua Arabibus:

Mira sole Italica, Guiland. epist.

Ricinus vulgaris, Cam.

Phaselus Romanus Thufcis, Mar. Virgilio.

Ricinus, Kerua Tripoli, Rauvvolf.

Cerva aut Cataputia major, Frag.

Ricinus major, Eyster.

Folijs ludit: quare Theop. i. hist. 16. Crotonis folia initio cum proveniunt, rotunda sunt, deinde in angulos formantur tamquam perfecte articulata. Ratione loci magnitudine variat: nam hominis crassitudine in Hispania Clus. & magnas arbores in Creta, Beilon. vidit, ut scalis ad motus conscendi debeant: ex quo apud Hispanos oleum conficiunt, quod oleum ficus infernalis nominant. Monar. & Fragoles monentib.

Fit etiam in horto Eysterensi mentio Ricini minoris, qui omni ex parte prædicto magnitudine cedit.

## II. Ricinus vulgaris minor.

Ricinus minor, Eyster.

## III. Ricinus Americ. major semine nigro.

Ricinus Americus, Curcas incolis, Clus. notis ad Monard. Lugd. Tab.

Ricinus Syriacus, Cam.

## IV. Ricinus Americanus minor.

Eravvay: Ricini pusillum genus, Clus. exot. l. 2. cap. 21. &

Ricini semina exigua l. 2. c. 25. sub fructu nono.

## V. Ricinus Americanus folio Staphysagriae.

Ricinus Americanus folio ficus Ponæ.

## VI. Ricinus Americanus falso creditus.

Dende Serapionis, & Abelmoluch Mauritiorum, Imperato.

Serapioni species tres sunt, Seni, Sahati & Indici: Imperatus legit, Chinesense, Indianum & Sahatense, quod minus probatur.

## VII. Ricino affinis fructus.

Exoticus fructus quartus, Clus. ex. l. 2. c. 24.

## VIII. Curcas Malavarensum: Carpata,

Cambayensium, Garzia: fructus est magnitudine Avellanæ cum suo putamine, candidus, gustu quali sunt tubera cocta: forte Habilcul Serapioni.



## S E C T I O S E X T A.

## Pomiferæ Arbores.

MALUS; MALUS CYDONIA; CITRIA; LIMONIA; ARANTIA; PUNICA; PYRUS; PERSICA; PERSEA; AMYGDALUS; ARMENIACA;

Prunus; Myrobalani; Sebesten; Jujubæ; Cornus; Lotus; Guajacum; Ebenus;

Cerasus; Chamæcerasus; Styrax; Aria & Hamomilis; Coto-

naster & Chamæmespilus.

## P O M U S S I V E M A L U M.

**E**tsi Pomi nomen apud Latinos latius pateat, quam μήλον apud Græcos: attamen usus obtinuit, ut Pomus pro Malo arbore, & Pomum pro Mali fructu capiatur: quamvis Plin. l. 15. c. 17. etiam ipsam arborem Pomum appellavit. At Græcis, si nullum Adjectivum addatur. Malus μήλεα, & Malum μήλον nominatur: derivatur autem μήλον, a verbo μέλω, quod idem atq; φρονίσω, sive curo sollicitusq; sum, denotat: quia de ipsis præci mortales multum solliciti fuerunt, cura, seduloq; studio digna judicarunt: & id forte propter insignem usum alimentarium cibariumq;. Pomum autem, cujus primus inventor Dionysius ab Athenæa statuitur, forte sic dictum quod eorum plurima etiam sitim tollant, ita ut simul sint cibo & potui.

Genera malorum Diosc. sunt l. 1. c. 159. & seq. vulgaris, cotonea, persica, armeniaca, medica sive citria, quæ Adjectivo addito distinguuntur. At vulgaris eidem sunt, verna, melimela, epirotica, sylvestria. Sic Theop. 6. caus. 24. sunt tam sylvestria quam urbana: & 4. hist. 16. sunt verna, ex omnibus infirmissima: 1. hist. 19. & 4. hist. 14. malus punica: & 4. hist. 4. malus persica & malus medica. Et Plin. l. 15. c. 14. multa genera enumerat, citria, Xiziphæ, tuberos, & quæ lanata vocantur: in summa genera 29. recenset. Mala, inquit, habent originem a Martio, Celsioq; & Manlio: item Claudio: quæ & Coroneo, insita ab Appio, Appiana cognominata, ideo his cotoneorum

neorum magnitudo qua Claudianis : sunt & Sceptiana ab inventore Libertino. Cato adjicit Quiriana, & que tradit in dolis condi, Scantiana : sunt parva gratissimi saporis, que Petisia nominantur : patrias nobilitavere Camerina & Gracula. Cetera è causis traxere nomen : germanitatis coherentia & Gemella, nunquam singula in fetu, coloris Serica, cognationis Melapia (quod malorum & pyrorum quandam speciem habeant.) Mustea à celeritate mitescendi : qua nunc Melimela dicuntur à sapore melleo. Orbiculata, à figura orbis in rotunditatem circumacti, qua Græci epirotica vocant : Mammarum effigie Orthomastica : à conditione castrati seminis, qua Spadonia appellant Belgæ. Melosolijs folium unum, aliquando & geminum erumpit è latere medio. Celerrimè in rugas marcescunt Pannucea : stolidè tument Pulmonea : Sunt quibus sanguineus est color, origine ex Mori insituta tracta. Sunt & parva gratia saporis atq; etiam acutiora odore, sylvestria. Datus sermè vilissimis nomen, quanquam primis adventu, decerpitq; properantibus : hac Plin. & Colum. l. 5. c. 10. de malorum generibus egit : sic & Ruell. l. 1. c. 96. & ex eo Lugd. hist. his Plinij diversas species Gallis familiares adjicit Nam singula regiones plurimas malorum differentias habent : sic Valerius Cordus in sua historia supra triginta genera recenset : Tabernamontanus viginti tres figuras habet : & Joh. Bauhinus frater, in suo de balneo Bollenensi l. 60. genera, cum suis figuris & descriptionibus exhibet. Nostri, in primis magnificiunt ea qua Brunicheri dicit. Trasomila (qua duplicia, nobiliora & vulgaria) nominantur, qua colore sunt in viridi pallido, figura oblonga. sapore ex dul. i & acido mixto, que serius cruda comeduntur, quare per totam hyemem durant, agris aservantur, in cibis & medicamentis commendantur, que sortè Malacria Ruellij & Lugd. Secundum locum tribuunt illis, que Curti pendule vulgò Gallis dicuntur, & apud ipsos principatum obtinent, (qua hodie prima commendationis, ad nobilem Alkermes confectionem, Ad.) Sic in Hetruria præstantissima qua Appiole & Mileroſe vulgò appellantur, Matthiæ notante. Et Scaligero, ut ex eo Gesn. lib. de hortis, Mala apiola Italis dicta, qua dulcia quidem, sed tam jucundè fragrant, ut universas Indias sua suavitate superent. Sed subsisto, quis enim posset in tanta Malorum varietate, nominumq; pro cujuslibet regionis & rustici placito, diversitate, & cum quotidie novo insitionis ingenio, velut nova prodeant, sine errore ea recensere? nec etiam opus est, cum arbores valde similes sint : licet fructus variet, siquidem poma magna sint & exigua : rotunda oblonga : candida, viridia, lutea : quadam : ubedinis aliquid, alia multum habeant, & quadam foris tantum, alia & intus, & quidem vel rubris tantum notis, vel lineis oblongis aspersis : sapore quoq; alijs acido, aquoso, austero : alijs dulci : alijs indolci subacido, vel vinoso : alijs inter dulcem & acescentem medio. Sunt deniq; præcocia, media, serotina. Sic malorum quadam genera, ramis & brachijs suis in latitudinem diduci solent, ita ut tecti cujusdam speciem, pedamentis in orbem digestis, sustentata, præ se ferant : peculiaria tamen videntur sequentia.

I Malus pumila, quæ potius frutex quàm arbor.

Mala præcocia, Trag. Tab.

Malus humilis, cujus fructus pomum Adami, Gesn. hort.

Hæc duplicia rubentia & candida.

II. Malus exigua pallidis floribus.

Malus arbor cujus fructus poma nana, Cam.

III. Malus sine semine interius in fructu, Camer.

IV. Malus non florens, fructificans tamen, Gesn. hor. ap.

V. Malus folio pyri.

VI. Malus flore pleno.

Poma flore multiplici seu pleniflora, Eyst.

VII. Mala sylvestria, quæ & alba & rubra : majora & minora.

Mala sylv. rubentia, Tab.

Malus sylv. rubens, Ger.

Malus sylv. major albus, Tab.

Malus sylv. alba, Ger.

Malus sylv. minor, Tab. Ger.

Arbores pomifera exotica.

I. Malus Maluccensis nonnihil spinosa.

Mala Indica, Acoſtæ, Lugd.

Ber, Bor, Garziæ, Frag.

In hujus ramis formicæ alatæ Laccam conficiunt.

II. Mala Goënsia fructu octanguli poma vulgaris magnitudine.

Carambolas, Garz. Frag. Acoſtæ, Lugd. Linc. 4. par. Ind. Or. 10.

Carambolas, Camarix, Carabelli, Chamaroch, Bolunbac, Palud. in Lincot.

III. Mala Guianensia.

Pinas, quæ totius mundi poma superat, nec ulli meliora, quàm in Gujana, par. 8 Ind. Occid.

IV. Mala Americana pyri specie.

Pomi peculiare genus in Micaragua, nulli alteri Indiæ parti concessa, par. 5. Ind. Occid. c. 16.

Pomum Nicaraguae Benzonii, Lugd. Clus. exot. lib. 2. cag. 28.

V. Pomo similis Brasiliiana.

Genipat Theveto, Lugd. Lerio.  
an Xagua, Ovied.

Juni Pappaeyma, Lerio 3. part. Ind. Occ. 37. Clus. ex. l. 1. c. 11.  
Duplex est, alia fructu majore & eduli; alia fructu minore non eduli; & hujus fructus succo totum corpus inficiunt, Theveto, Lerio.

V I. Fructus prædicto affinis,

Fructus Brasiliensis, & 2. Clus. exot. l. 2. c. 7.

V II. Pomo similis fructu Castaneæ asperiore.

Duriacón fructus tribus involucris donatus, in Java 4. part. Ind. Orient. c. 6.

V III. Arbor pomifera fructu aculeato melonis magnitudine.

Baran arbor, cujus fructus Duryacón, flos Buaa dicitur, Paul. in Linscor.

Darion, Costino, Scalig. Lugd.

Doriones, Garz. Frag.

Duriones, Acoftæ, Lugd.

Jaca major, Cast.

Guanabano, Ovied, Clus. in Garz. & Lugd. qui fructum pingit.

Guanabano Ovied, huic fructui valde similis Frag.

Duryacón ex Malacca, Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 13. fig. 12.

Fructus cui suavitate in toto orbe similis non reperitur, tantum in Malacca proveniens.

I X. Anon, Oviedo, Clus. in Garz. magnam cum Guanabano similitudinem habens.

X. Abavo arbor radice tuberosa.

Baobab, Alpino.

Abavo, Honor. Belli ep. 4. & 5. ad Clus.

Baobab sive Abavi, Clus. exot. l. 2. c. 1.

Fructus Æthiopicus melonis magnitudine, brevi lanugine obfusus: folijs nunc singularibus, nunc binis, vel ternis, serratis, uni petiolo adherentibus: modò non serratis, etiam binis aut ternis, aliquando quinis uno pediculo donatis: quæ ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

Anidem cum

Guanabano Scaligeri, Clus. in Garz. Lob. Lugd.

Fructus quidam ex Guinea, Guanabano forte Scaligeri, Gesn. hort.

X I. Arbor Chincensis fructu Angurix magnitudine.

Brusthaes, Scalig. Pigasertæ & Lugd.

X II. Arbor fructu melonis forma, pugni magnitudine.

Pepajos in India Hispanica, Linsc. 4. part. Ind. Or. 10.

Arbor folijs magnis latissq; quæ scilicet, nisi arbor arbori scilicet quali matrimonio jungatur.

X III. Arbor Indica fructu Cucurbitæ forma & sapore, Higuero Oviedo, Clus. in Garz. & ex. l. 1. c. 2. Lugd.

Fructus Higuero apud Clusium, Lob. Lugd. qui fructum & solum pinxit.

Higuero, forte, Taber.

Huius seminibus Cambales filum trajiciunt, cruribus alligati, & pro tintinabulis utuntur.

X I V. Arbor America folijs pomi, fructu triangulo.

Abovay Theveti, Clus. in Garz. Lob. Tab. Lugd. qui arborem & fructum separatim pinxit.

Abovay lignum teneri odoris, cujus nucleus præsentaneum venenum, ex quo crepitacula Brasiliensi faciunt, Lerio 3. part. Ind. Occid. c. 12.

X V. Fructus capitis magnitudine.

Iocos fructus in Insula Magader, in arbore, ramis & folijs carente, cacumine, putamine fibroso, nucleo amygdalino, part. 3. Ind. Occident.

X VI. Fructus Indicus unctoribus expetitus.

Bor dones, Garz. Frag.

Brindoy, Linscor. 4. part. Ind. Or. c. 10.

Ex cortice acetum conficiunt.

X VII. Arborecula mali similitudine, lacteam succum fundens.

Pipinichi, Monardi, Cast. Lugd. Frag.

Ex ramis incisis lacteus humor emanat, cujus tres vel quatuor guttæ potentissime purgant.

## MALUS CYDONIA.

**M**alus Cydonia, Græcis *μυδία* *μυδώνια*, à Cydone Cretæ oppido, unde primum advecta, Plinio l. 15. c. 11. dicitur. Cotoneum malum primum Cato, dein Plinius nominavit. Fructus *μυδώνιον*, Latinis malum cydonium & cotoneum: officinis citonium.

Duam generum Diosc. & Galeno: vera ac germana (ait Dioscorid.) qualia parva & rotunda sunt: alia *γρηβή* Struthia & magna, quæ minus utilia censentur: Theoph. 2. hist. 3. *ἐν γρηβή* *μυδώνιον*, ex Struthio cotonea degenerat: & Galen. 6. tuend. san. quadam dulciora, majora ac minus acerba, quæ in Asia Struthia vocantur: at 2. alim. Cydonia à Struthijs, quæ etiam Struthiomela nominat, aperre distinguit, Cydoniorumq; succum minus esse suavem, & maxime adstringentem. Columell. l. 5. c. 10. tria genera facit, Struthia, Chrysomela, Muslea, Plin. l. c. plura ejus genera Chrysomela incisuris distincta, colore ad aurum inclinata: quæ candidiora nostratitæ cognominata, odoris præstantissimi: est & Neapolitanis suis honor: minora (forte majora legendum) ex eodem genere Struthia, odoratius vibrant, serotino proventu, præcoci verò Muslea. Struthiis autem Cotonea insita, sicut genus fecere Mulvianum, quæ soli ex ijs vel cruda manduntur. Sunt præterea parva sylvestria è Struthiis odoratissima, in sepib. nascentia. Gallis quoq; & Italis tria genera sunt, & minora Mala, majora Pyra cotonea vocant. Sic Persica arbore in malum Cydoniam insita, Cydonium malum enasci, scribit ex Monardi Ges. hor.

1. Mala cotonea minora.

Malus cotonea, Brunf. Trag. Math. Ang. (cui & Matthiolo triplex fructus) Fuch. Tur. Cast.

Malus cydonia, Ges. hor. Lac. Lon. Ad. Tab. Cam. cui fructus varij generis.

Cotoneus, Cord. hist. & fructus Mala cotonea minora sive Struthia.

Cotonea & cydonia mala, Lob.

Mala rotunda minora, nonnullis *χρυσόμελα* ab exterioris cutis colore, Dod.

Poma cotonea in Insula Picco, Ind. Occid. par. 9. addit.

Ex his Genuenses suum delicatissimū Cydoniatum parant.

I I. Mala cotonea majora.

Mala cotonea majora, Cord. hist. *γρηβή* dici, in Dioscorid. monet, & majora malis similia, minora verò, pyri modo turbinata, asserit.

Coto-

Cotonea magna & Pyra cotonea, Gefn. hort.  
Mala cotonea oblongiora & majora, Dod.  
Pyra cotonea, Cæf. Pyrum cydonium, Ger.  
Cotonea majora five Struthia, Cam. ep.  
Struthia & Pyra cotonea, Caft.

### III. Mala cotonea media.

Mala cotonea milviana five notha, quia proveniunt ex  
Coroneis quæ Strutheis, vel è contra infita fuère, Matthiol.  
Caft. Lugd.

Cydonia milviana, Tab.

Majores sunt primis: at fecundis minores.

IV. Malus cotonea sylvestris: & Cord. in Diofc. & hift.

Hæc fativæ per omnia fimilis, ramis minoribus & fructu  
minore, quod fponge fua in Danubij petrofis ripis in

collibus proveniat.

V. Cydonia exotica.

Cydonia è Bengala, Garz.

Serifolia, Fragof.

Marmelos de Bengala, Caft.

Mala cotonea five Mermelafta ex quo fructus, quem Capotes five Chicocapotes nominant, par. 9. Ind. occ. l. 4. c. 25.

Chicocapores eadem ferè cum Capotes facie in nova  
Hifpania, Idem.

Fructu eft coroneo fimili, folijs verò perficæ.

VI. Arbor Indica cydonij facie fructu melonis effigie.

Melo corcopali, Scalhg.

Arbor cydoniæ magnitudine & folijs, cujus fructus Corcopal, Thevero & Lugd.

## M A L U S C I T R I A.

**M**alus Citria, Græcis *μῆλες μανδρῆς* malus Medica & Assyria dicitur, utroque nomine à regionibus ducto.  
ut habet Theoph. 4. hift. 4. Etenim Citrus apud Medos & Perfæ in primis frequens: dein Paladij diligentia in Italiam translata fuit: poftea in Hifpania in ufum devenit, ut nemora & campos occupavit: fructus *μῆλα μανδρῆς ἢ πικρῶς*, addit Diofcorides l. 1. c. 166. *μῆλες μανδρῆς*. Latinis citria, citrea & citromela. Folium habet (Theoph.) fimile & penè æquale Adrachne (Portulaca Gaza) aculeos quales pyrus, aut fpina acuta, fed tenues & vehementer acutos & validos, Et Plinio lib. 12. cap. 3. Malus affyria quam alij vocant Medicam, folium ejus eft Unedonis intercurrentibus fpinis: Pomum ifum (idem & Theoph.) alias non manditur, &c. Malum (Diofcoridi) oblongum eft, rugofum, aureo colore, cum gravitate odoratum: femen habet pyri. Sane his pomis olim non vefcebantur, fed propter odorem tantum & medicamenta erant in ufu, arbore nimirum adhuc inculta, per amaros & acetofos fructus ferente.

### I. Malus medica.

Citrum, Brunf. Citria, Trag.

Citrangula, Monardi.

Citrus, Ang. Tab. Cæf. Ind. orient. part. 9. lib. 4. cap. 31. arbor, Cord. hift.

Malus medica, Matth. Tur. Lac. Cord. hift. Dod. Lob. feu Citria, Eyft.

Malus citria, Dod. gal. Gef. hor. Lugd. Lon. Caft.

Cluf. hift. Cam. & Ind. occid. p. 3. & Ind. or. p. 3.

Citria & Mala Medica, Bellon.

Citrones, Rauvvolf.

Mala citrina & poma citria, Ind. occid. p. 8.

Cedrus Theophr. at Diofc. Medica malus, five  
Cidromela, Adv.

Fructus magnitudine variant: quædam in  
molem excrescunt Melopeponibus parem, ita  
ut ad pondus librarum decem quandoq; perve-  
niant, ut Cardanus & Gesnerus notant, quæ  
nullo ferè fucco sunt, & ex Liguria & Adriatici  
maris infulis adferuntur: alia minora: alia Li-  
monum magnitudine, aut paulo majora, & a  
lacu Benaco afportantur, quæ potiffimum in ci-  
bis expetuntur, & Pomceires, quafi Poma citri  
vocari, Lugd. afferit: fic alia prælonga, alia ro-  
tundiora. Etenim hominum indultia, transla-  
tione, infirione, omni deniq; cultus mangonio,  
Citria in plures formas digefsit, ut remiffiore

fapore & vehementiore: item diluciore, fatura-  
tiorè; colore differant, non multum tamen na-  
turâ & viribus, veluti Limonia, Arantia, atq; ea  
quæ Poma Adami vulgo nominantur. Quare  
Monardes lib. de Arantijs fcribit, Citriorum  
genera multiplicia fuiffe infirione: ita ut repe-  
riantur tot genera Limonum & alia, quæ nec  
Citro, nec Limonibus conveniant: quemad-  
modum Zamboas Torongas, Limas, Limones,  
quæ omnia nec præfci cognoverunt.

Sic citrum monftrofum maximum, calceum  
Turcicum referentem, in horto Stutgardiano  
natum, J. Bauhinus in fuo l. de thermis pingit.

### II. Malus medica maxima pulpa plurima.

Ponziæ, Cæf. qui à citrijs melopeponis ma-  
gnitudine diftinguit, & Ponziæ inter Limonem  
& Arantium ambigere fcribit.

Hæc gustui non ita placent, fed quia pulpæ  
multò plus habent, officinis expetuntur, fa-  
charo vel melle affervanda.

### III. Malus medica fructu ingenti tuberofo.

Melangula quæ alijs Citrangula, Cæf.

Citrij mali genus quoddam in Provincia, hu-  
mani capitis magnitudine, Cam.

Citranguli nomine voluit Monachi in Mefuen  
c. de oleo è pomis Citranguli, non folum Citria,  
fed etiam Arantia & Limonia intelligenda effe.

IV. *Malus medica* ab Imperatore Carolo V. ex Ungaria in Hispaniam delata, quæ omnium mali Medici generum acidorum suavissimum, ut Clusius in sua hist. refert.

V. *Malo Medicæ affinis Javanensis folio* rotundiore.

*Samaca fructus citri magnitudine, acidus, succulentus, granis nigricantibus, Linscot. part. 4. Ind. or. & fig. 14.*

*Malus Limonia.*

I. *Malus Limonia acida.*

*Malus limonia*, Matth. Dod. Lon. Lugd. Cast. Tab. & Ind. occid. par. 3. & orient par. 3.

*Limones*, Dod. gal. Cord. in Diosc. Bellon. Rauvvolff. Tur. Adv. Lob. Cæf. Clus. hist. & Ind. occ. par. 9. l. 4. c. 31.

*Limon arborex citrij genere*, Cord. hist.

Tum facie, tum facultate Citria referunt: cujus plures differentiæ, quædam oblongiores, asperiores, cortice crassiore, Cucumeris aut Melonis effigie, & Limæ Adversar. dicuntur: alij cortice læviore tenuiore, succo acidior. Cordo quadruplex genus, 1. anserini ovi forma & magnitudine: 2. minus, globosum, utroque capite veluti umbilico insigne: 3. ovi gallinarum figu-

ra & quantitate: 4. tertio æquale, globosum superficie æquale.

II. *Malus Limonia major dulcis.*

*Limones dulces*, Cæf.

*Limones dulces oblongis Limis similes*, Clus. hist.

III. *Malus Limonia minor dulcis.*

*Limones pusilli dulcissimi in Zeilan*, Scaliger, Lugd.

an *Limonis genus in Hispania*, vix nucis amplitudine, Cæf.

IV. *Malus Limonia folio serrato, fructu oblongo cortice tenuissimo.*

*Limas primum genus*, Clus. hist.

V. *Malus Limonia fructu rotundo orbiculato.* *Limas alterum genus*, Clus. hist.

VI. *Limones prægnantes alium fructum minorem in se continentes*, Clus. hist.

VII. *Limones variarum figurarum toti ferè carnei*, Clus. hist.

VIII. *Limones citrij mali grandioris magnitudinem æquantes*, Clus. hist.

IX. *Limonum syl. in Syria provenientium*, Scalig. & Lugd. meminere.

*Limones sylvestres non majores ovo columbino, circa Cairum*, Bellon.

M A L U S A R A N T I A.

**A** *Urantia, fortè à corticis colore, qui colore auri relucet, ut Aurea mala verè nominari possint: sive ab Arantia oppido dicta: veteribus ignota, insitione ad nos devenerunt. Citrus enim arbor, in Aurantio inserta, ad magnam proceritatem pervenit: Arantius verò in Citro, tam humilis, ut Aurantius unius cubiti magnitudinem non excedat.*

I. *Malus Arantia major.*

*Pomum Arantium*, Trag. Eyst. sive *Nerantium*, Rauvvolff.

*Aurantia mala*, Matth. Lac. Cæf. Lon. Castor. Lugd. Tab. Cam.

*Aurea & Arantia mala*, Bellon. & Ind. or. par. 1.

*Aureum malum*, Gesl. h. Dod. gal. (cui & *malum hespericum*) Clus. hist. & Ind. occid. p. 3. & p. 8.

*Arangia*, Cord. in Diosc.

*Arangius sive Citrius arbor*, Cord. hist.

*Arantia*, Tur. Lob.

*Malus anarantia*, Dod.

*Aurantia: nonnullis in locis Indiæ integræ sylvæ sunt arborum aurantia ferentium: in part 9. Ind. or. l. 4. c. 31.*

Genera plura sunt ab insitione prodeuntia: hinc pleraque cortice amaro, crasso, aureo: alia

subvirente: alia cortice tenuissimo, subrubentre, medulla dulci: aliqua & cortice dulci: aliqua in uno pomo duo genera botrorum habent: alia absque semine sunt. Sic & pulpæ sapore differunt, cum alijs acida, alijs dulcis, alijs vinosa, sive media sit.

Sic in regno Congiano habentur, quæ nec dulcia, nec nimis acra: & in insula Fayel, suavissima & sapidissima: par. 3. Ind. orient c. 7. & in China poma aurea, quæ dulcedine saccharum vincunt, par. 2. Ind. or. c. 25.

Ex floribus aqua elicitor, quam Lanfam vocant.

II. *Malus Arantia humilis.*

*Aurea malus pumilio*, Clus. hist.

*Poma Aurantia Nana dicta*, Eyst.

III. *Malus Arantia cortice dulci eduli.*

*Arantia*



Arantia in Indiæ insula Zeilan, cortice dulci & suavi, Scalig. & Lugd.

Aurea malus eduli cortice, Clus. hist.

IV. Malus Arantia unico grano.

Aurea malus *μονοσπερμική*, Clus. hist.

*Malo Arantio similes exotica.*

I. Malo Arantio parvis fructibus similis. Aracinappil Indorum.

II. Arbor peregrina Aurantio simili fructu, Clus. exot. l. i. c. 13.

E Nigritarum regione delata, pulpa fungosa, nonnullis granis ut in ficulneis permixtis.

III. Coru folijs mali aureæ, flore luteo, Acoftæ: at Garzias & Fragofus, & Castor. folia mali persicæ, flores candidos tribuunt, uterque radicis cortices ad ventris profluvia commendat: Lusitanis Herba Malauarna, Castori.

IV. Carcapuli, Acoftæ, Lugd. append. Cast. fructu malo aureo æmulo.

Carcapuli, Linsc. 4. part. Ind. orient. cui fructus cerasi magnitudine: & fig. 17. iconem exhibet.

V. Guyabo pomifera Indica.

Guyabo arbor, at fructus Guyaba dicitur Oviedo.

Guajava, Scalig. Lugd. Clus. hist. app. 1.

Guayavas, Monardi, Lugd. app. Frag.

Guayavos, Gomaræ, & part. 4. Ind. occid. c. 28.

Alia sativa, alia sylvestris: ficalia pomis longiusculis aut rotundis, luteis aut viridibus: pulpa alijs rubra alijs candida.

*Malus Adami.*

Adami pomum vulgo dicitur, quia cortex rimis quibusdam exasperatur, ac si dentibus demorsus esset, quare pomum, quod Adamus in Paradiso degustavit, esse existimant.

Pomum Adami, Matth. Cord. in Diosc. Bellon. (qui à Citrijs sive Poncires distinguit) Rauv. Cast. Lugd.

Citrius altera, Cord. hist.

Malus Assyria, Dod. Tab.

Pomum Assyrium, Adv. Lob.

Poma Adami quæ Gallis Poncires, Clus. hist.

A Limonibus natura & viribus non multum differt, folijs Limonij, floribus Citrij fructu Arantij, sed duplo triplôve majore.

## MALUS PUNICA.

**M**alus punica, Græcis *φοῖν*, Dioscoridi l. i. c. 151. & Theoph. *φοῖν*, quo nomine & fructus donatur. Hippocrates l. de nat. mulieb. *eldas* appellat. Plinio l. 13. c. 19. Africa circa Carthaginem punicam malum cognomine sibi vendicat, aliqui Granatum appellant. Communiter malum granatum, ab interiorum granorum multitudine: alijs à Granata Hispania regione, quod in ea copiose proveniat. Hanc Theoph. l. 1. hist. 3. sic descripsit: radicem habet brevem & per summa terra adhaerentem: l. 1. hist. 5. caudices multos: l. 1. hist. 8. sed contortiores & breves: l. 1. hist. 14. verum in ramos spargitur & molem superiorem, grandioremq; gestat: l. 1. hist. 6. folia angusta sunt: l. 1. hist. 17. fructus ex humore & cute constat: l. 1. hist. 18. & acinos habet: l. 1. hist. 22. verum super fructum ipsum florem insidentem emittit: l. 1. hist. 23. & ex annorum fructum gignit, &c.

Genera: Dioscorides dulcia, acida & vinosa recenset: & Theoph. l. 1. hist. 19. succus acidus est: & l. 1. hist. 3. & 4 in Aegypto acidam in dulcem quodammodo, aut vinolentam converri: in Cilicia omnes sine nucleo surgunt, neglecta vero in sylvestrem transit: l. 1. caus. 15. nonnunquam etiam fructum secundum ostendit: 5. caus. 16. & puniceæ dulces magis putrescunt quam acida, &c. Plinius l. c. divisit in genera, Apyrinon vocando, cui lignosus nucleus adest: sed candidior ei natura & blandiores sunt acini, minusq; amaris distincti membranis: alia structura eorum, ut in favis. Communium & nucleos habentium quinque species, dulcia, acida, mista, acida, vinosa. Samia & Aegyptia distinguuntur erythrococcis & leucococcis: vide & l. 23. c. 6. Verum cum plures partes hujus in usum medicum veniant, nominibus distincta, de his paucis.

Flores sativa punica *κότιν* dicuntur Diosc. l. i. c. 152. & Gal. 6. simpl. at Gal. 6. *κατὰ τέπης*. Cytinus fructus rudimentum est quod deciduo flore primum apparet & formatur: qua Celsus, mali punici capitula vocat: & Plinio l. 23. c. 6. primus pomi hujus partus florere incipientis Cytinus vocatur Græcis: & in hoc ipso Cytino siosculi sunt, antequam scilicet mali ipsum prodeat, erumpentes, quos Balaustia vocari diximus. Verum *βαλάντιον*, sylvestris punica flos est Dioscoridi l. i. c. 154. cujus complura sint genera, candidum, rutium & colore roseo: & ex Cytino ac Balaustijs, velut ex Hypocistide succus ad eadem efficax elicitur. At officina citra distinctionem Balaustia nominant, quibus Cytinorum appellatio de sativis ignota est.

Mali punici putamen, quod tanquam corium sit, cortice durius, nucis involucri tenerius. Malicorium nunc vocant, quod Græcis, nunc *σίδιον* Diosc. lib. 1. cap. 153. monente, nunc *τὸ τῆς φοῖνός λέμμα ἀπὸ τῆς λέπης* dicitur.



*Marcellus medicus, caliculos punici vocat. Plinio l. c. vulgus ex punicis acerbis coria perficere novit, ob id Malicorum appellant Medici: Officinis, Psidium.*

### I. Malus punica sativa.

Malus punica, Trag. Matth. Dod. ut: Cord. hist.

Geshor. Tur. Lon. Lugd. Cam. fl. simplici, Eyst.

Mala punica seu granata, Cord. in Dios. Bellon.

Malum punicum, Adv. Lac. Lob. Cast.

Malus granata, Rauvolf. Tab.

Punica quæ malum granatum fert, Cæs.

Poma sive malus punica, Ind. occid. par. 8.

Differunt potissimū in succo, alijs acidus, alijs dulcis, alijs mixtus, medio quasi sapore, quem vinosum vocant: & quæ medijs saporis, Arabes Muza, voce *μύζα* corrupta, appellant. Mala punica majora in regno Congiano habentur.

### II. Malus punica sylvestris.

Punica sylvestris, Cord. hist. Rauvolf.

Pomum granatum sylv. cujus flores Balauſtia, Anguil.

Sativæ per omnia similis, sed spinis horri-

dior in Syria circa Alepum, Africa & Hispaniæ regno Granatæ.

### III. Balauſtia flore pleno majore.

Malus granata sylv. flore pleno, Rauvolf.

Balauſtium, Lob. belg. Tab. Eyst.

Balauſtium orientale, Cast.

Punica flore adeo multiplici folio, ut Rosæ videantur centifoliæ, colore saturato.

### IV. Balauſtia flore pleno minore.

Balauſtium flore minore Romanum, Eyst.

Folijs atrovirentibus, calice crassiore, flore minore, tristiore, saturata purpura punicante à priore differt.

V. Malus punica fructu maximo, granis aurcis. Malus aurea, Dod. qui Palam Arienam Plinij suspicatur, quæ tamen potius Musa est, quæ nullo est intus nucleo vel semine. Illa verò grana Mali punici majora obtinet. Quid sit ignoro.

## P Y R U S.

**P**yrus, Græcis *ἄπυρ*, & de arbore & de fructu, sed propriè de sativa dicitur: nam *ἄπυρ* pyrus agrestis est (Pyrastrum Gaza reddit) Diosc. l. i. c. 167. & 168. & Theoph. pluribus locis: quæ tamen differentia non semper observatur. *Ἀπύρ* autem dicitur Eustachio, quasi non habens *πίρ* & pinguedinem: alij ab Apia regione deducunt, quod ex ea primum hæc arbor allata fuerit. Sic Pyra multis à fructus figura, quod ad pyramidis similitudinem à lato in acutum spectet, & in mucronem turbinetur: & quemadmodum Mala, brevi pediculo annectuntur: sic Pyra longo pediculo pendent. Est autem Pyrus Theoph. i. hist. 5. natura fructificosa: i. hist. 16. folijs orbiculatis: i. hist. 21. floribus foliatis: i. hist. 18. seminibus congestis, quæ aliquo putamine & tunica continentur: i. c. 15. 23. quæ omnia serè pulpis plenioribus includuntur, quo plus temporis perdurare valeant, &c.

Genera pyrorum multa sunt, Diosc. l. i. c. 177. addit Theoph. 4 h. 6. majorem in modum, bonæq; frugis, præterquam si quæ serotina. Plinio l. c. 15. sunt Superba, parva sed ocysima: cunctis autem Crustumina gratissima: proxima ijs Falerna à potu quoniam tanta vis succi abundat: lactea, a candore vocantur: alia colore nigro donavit Syria: reliquarū nomina aliter in alijs atq; alijs locis appellantur. Sed consensu urbis vocabulis auctores suos nobilitare Decimiana: Dolabelliana longissimi pediculi: Pompejana cognomine mammosa: Liceriana: Severiana & quæ ex his nata sunt Tyranniana. longitudine pediculi distantia, Favoniana rubra paulo superbis majora: Lateriana, Antiana post Antiniana acidulo sapore jucunda. Tiberiana, quæ maximè Tiberio principi placere, Patrie nomina habent serenissima omnium Amerina, Picentina, Numantina, Alexandrina, Numidiana. Græca & Achæade spinosa arbore: & in ijs Tarentina, Signina, quæ alij à colore Testacea appellant: sicut Onychina à colore gemmæ onychis, purpura. Ab odore Myraptia, Laureana, Nardina: à tempore Hordearia, quæ cū hordeo matureſcunt: à collo Ampullacea & Coriolana &c. Multo plura sunt hodie, imò infinita in tota Europa Pyrorum genera, quæ magnitudine, figura, oblonga, rotunda, orbiculata: odore: sapore, dulcia & succulenta, acida: sic alia sicca, alia pingua: colore, & tempore quo matureſcunt, alia tempeſtiva, alia serò matura, alia subito pereunt, alia servari possunt, differunt: & à primis inventoribus, regionibus, alijsq; notis nomina invenere, quæ sigillatim explicari nō possunt, cū qualibet regio sua habeat, & qualibet urbs peculiaria nomina ijs tribuat. Apud Germanos enim quamplurimæ differentie occurrunt, ut videre est apud Tragū. Sic Val. Cordus quinquaginta, J. Bauhinus l. de balneo Bollenſi, supra quadraginta. Tabernamont. septendecim differentias proposuit. Nostri in primis magnificiunt ea quæ ab odore & sapore Moschatellina, quæ Superba Plinij videntur: dein quæ à forma ovi Ovata dicuntur: tum quæ Spectebiren/ id est, Lardina nominantur: tandem Regelsbiren/ sive Regalia (Regia & Regulana, Ges.) ex quorum succo Electuarium suavisimum paratur. Sic Galli sua habent, in primis Bonchristiana cognominata Carol. Stephano & Lug. ut videre est apud Car. Stephanum, Ruellium, & in historia Jagdunensi, Itali sua, de quibus Matthiolus & Casalpinus.

I. Pyrus

I. *Pyrus sativa*.

*Pyrus*, Brunf. Dod. ut: Cord. hist. Gef. hor. Lon. Cæs. Lugd.

*Pyrum*, Turn.

*Pyra*, Mat. Ang. Cord. in Diosc. Lac. Ad. Lob. Cast.

II. *Pyrophylla*, ad imitationem Plinij l. 15. c. 14. Malorum genera recensens, *Melofolia* nominat quibus folium unum aliquando geminum erumpit è latere medio.

*Pyra* è quorum medio corpore folium exoritur, Dalech. in Plinium, Cam.

III. *Pyra*, quæ comesta ventrem subducunt, Camerar.

IV. *Pyrus sylvestris*.

*Ἀγρία* & *ἄγρη* dicitur: *ἄγρη* quidem à verbo *ἀγρεῖν* strangulare, quod acerbitate sua propemodum strangulet: attamen inter *ἄγρια* & *ἄγρη* sunt qui differentiam faciunt: *Achradem* pyri speciem quandam facientes ex *Dioscoride* (ut Cæsalp. & Lugd.) quæ spinis quidem agrestis modo, horrida sit, sed fructu pulcherrimo & optimo: *ἄγρη* verò, spinis armata, omnino *sylv.* fructu pusillo, nec eduli, aliquando mediocris altitudinis, sæpius humilis arbuscula. Quamvis *Ἀγρία* Aristoteli 8. hist. 6. de *pyro sylv.* & *ἄγρη*, Homero etiam de *pyro* horrensi dicatur. Deducitur autem *ἄγρια*, ab *α* privativo & *γρία*, id est, usu: eò quòd ejus fructus usus nondum esse ceperit inter alimenta humani corporis, nisi forte extrema fame urgente.

*Pyra*ster *Gaza*, *ἄγρια*, Theophr. 1. hist. 3.

*Pyra sylvestris*, Ang.

*Pyra sylvestris major*, Tab.

*Pyra sylv.* & *pyra sylv. minima*, Tab. Ger.

V. *Pyra sylv. Cretica*.

*Pyra exigua* à *Cretensibus Achlades* nominata, à nostris diversa: apud quos alias *pyra sylv. Agafuga* appellantur, Bellonio.

*Pyro similes exoticae*.

I. *Pyro similis ex Guinea*.

*Lata*, fructus exoticus Clus. ex. l. 2. c. 22.

II. *Pyro similis fructus in nova Hispania nucleo magno*.

*Palto* arbor cujus fructus benè maturus *pyrum majusculum* refert, qui maturus butyrum emulatur. in *Insula S. Dominici*: at in *Peru* grandiores sunt, cute duriuscula: in *Mexico* minores cute teneriore, par. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 24.

*Melocotones* seu *Pyra Indica* sunt *Mameyen*, *Guayanen*, & *Platen*, Idem.

III. *Pyro similis fructus alter in nova Hisp.* *Annona* sive *Guanavano* pyri magnitudine, pulpa butyri modo, cui grana plurima nigricantia includuntur: *Joseph. Acosta* l. 4. c. 25.

*Mangier blanco* est *Annona* sive *Guanavana*, p. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 25.

IV. *Pyro similis fructus in Virginea*.

*Metaguesnaux*, fructus pyri forma & magnitudine, impensè foris & intus rubens: par. 1. Ind. Occid.

V. Fructus in *Insula S. Mariæ*, *pyra* majora referens, intus mucculentum: par. 3. Ind. Or. 10.

## M A L U S P E R S I G A.

**M**alus *Persica*: *Græcis* *πέρση* *μυδία*: & *Persicus*, *Palladio*: & fructus *Persicum malum*, *πέρση* *μυδία*, *Diosc.* l. 1. c. 16. 4. At *Theoph.* 2. hist. 3. *πέρση* (*Persicum Gaza* reddu) *Aegypti* sterile sit: 3. hist. 5. sed aliquando illi & locis proximis fructificat: quanquā in *Rhodo* usq; florem duntaxat devenit: sed distinguere oportet à *Persica*, quemadmodum ex *Theoph.* 4. b. 2. colligere est: & *Plin.* l. 15. c. 13. aperitissime distinguit: falsum est (quod *Nicander* & *Sofrates* prodidisse) venenatam cum cruciatu in *Persis* gigni: id enim de *Persica* diligentiores tradunt, quæ in totum alba est, mixtus rubentibus similis, nec extra orientem nasci volunt. & semper autem folia habet & poma sabnascensibus alijs. Et *Rauwolfius* commemorat, *Persas* etiam hodierna die *Persicam* à *Persico* arbore distinguere, quamvis etiam à *Persicorum* esu abstineant. *Nimrod* i veneficio insecta & noxia essetia opimantes. *Plin.* l. 15. c. 13. in totum quidem *Persica* peregrina etiam *Asia* *Græciæq;* esse ex nomine ipso apparet, atq; ex *Perside* advecta: & mox: *Persica* arbores serò & cum difficultate transcunt, ut quæ in *Rhodo* nihil ferant, quod primum ab *Aegypto* earum fuerit hospitium: & l. 16. c. 28. *Persica* arbores in *Rhodo* florent tantum.

Genera: *Plinio* l. 15. c. 12. *persicorum palma duracinis*: nationum habent cognomen, *Gallica* & *Asiatica*. At *Persicorum* differentia plures sunt, quæ magnitudine (siquidem alia majora, alia minora sint) figura, quadam orbiculata, rimula quadam à latere, quadam in rotunditate oblonga, *Cariæ* cognominata: colores: sapore, dulcia, acida, vinosa, austera, amariuscula: maturationis tempore & ratione usus differunt. Sunt enim alia *præcocia*, alia *serotina*: *præcocia*, alia sapore mali *Armeniæ*, alia admodum dulci & suavi. *Serotina* alia majora, etiam pugni magnitudine, ut *ungarica*: alia minora: majora vel alba, vel flava, vel modico rubore aspersa

*asperfa sunt, qua Sole spectant, & intus in ossis contactu, vel buxea, & quidem pulpa candida, lutea rubea. Sic minora, vel rubra sunt, vel flava. Ratione ossis: sic in alijs integer & facile à carne recedit: in alijs à carne separari nequit, & quidem in aliquibus nucleus disrumpitur, in quibusdam per medium divisus reperitur. Persica Persiani Hel dici, Rauvolfius monet.*

I. Persica molli carna & vulgaris, vitidis & alba. Persica cydoniaria, Tab.  
Persicus, Brunf. (ba. Persica lutea, Ger.

Persica arbor & ejus primum genus, Trag.

Persica, Fuch. Ang. Lac.

Persica malus, Gesl. hor. Ad. Lob. Lug. Tab. quæ Persicæ quartum genus, Trag.

alba, & Ger.

Malus Persica, Dod. ut: Turn.

Persica viridia & alba, Matth. Cast.

Persicus alba & popularis, Lon.

Persicæ primum genus, Cæs. & vulgare, Lugd.

II. Persica succo quasi sanguineo.

Persicæ tertium genus, Trag.

Persica sanguineo succo madentia, Matth.

Persica Ungarica sanguineo succo, Gesl. hort.

Persica in totum saturato colore rubentes, Dod.

Persica Carota, Cast.

Persica rubra, Lon. Tab. seu sanguinea, Cam. ep.

Persica præcocia, Ger. ico.

Hæ duæ species lanatæ sunt, carnem succosam & flaccidam habent, quæ communiter à nucleo tota recedit: & alia sunt magna, alia parva: quædam prorsus viridia, quædam alba: quædā maculis rubris picta: alia carne alba flavescente: alia rubra, ut sanguinolenta videatur: & hæc nucleo est alias foris rubente, alias nigro.

III. Persica dura, carne candida, aliquando ex albo subrubente.

Rhodacina, Ægin. Aëtio.

Persica duracina, Matth. Ang. Bellon. Gesl. hort.

Lon. Cast. Cæs.

Persicorum tertium genus sive duracina, Lugd.

Duracina alba, Tab.

Duracina ob carnem duriorē sic nominata, quæ Rhodacina dicta, aut ob odoris suavitatem, aut quod plerumq; rubro colore alterna sui parte niteant: aliquando pugni magnitudine, & fructu anguloso, circa os rubente, quod aliquando per medium divisum, aliquando in partes disrumpitur, & à nostris Persica moschata dicuntur: Horum ut frequentium caro dura & nucleo tenacissimè adhæret: quæ aliquando etiam intus saturatè rubet.

IV. Persica dura carne buxea.

Persica cotonea, Matth. Cast. Lugd.

Persica Ungarica colore aureo, Gesl. hor.

Persica buxea à Cotoneis denominata, Cæs.

V. Persica æstiva Armeniacis similia, sive Persica S. Johannis.

Persicæ quartum genus, Trag.

Persica pumila, Cam.

Persica præcocia, Tab. Persica rubra, Ger.

an Persica minima, Cord. hist.

Saporem pene similem cum Armeniacis habent, sed ex eo genere non esse, nucleus scabert & striatus ostendit, &c.

VI. Nucipersica, quod nucum juglandium faciem repræsentet,

Nucipersica, Matth. Lugd. Cast.

Persica nux, quæ Antipersica Averrois, Ang.

Persica præcocia, nucipersica, Cæs.

Hæc etiam nulla lanugine pubescunt, & colore & sapore Persica coronea referunt.

VII. Persica Amygdaloides.

Persica amygdala, Matth. Lugd. Cast.

Amygdalus persico insitus, Gesl. hor.

Amygdalopersicus, Cam.

Pulpa Persicum, nucleus Amygd. dulcem sapit.

*Persicæ similes exotica.*

I. Persicæ affinis in Taprobana.

Arbor Gehuph Indis Cobban, Thev. Lugd.

Fructu est rotundo, in quo nux Avellanæ par, nucleo amaro: gummi ex arbore utiliss. manat.

II. Persicæ similis putamine villosa.

Mangas, Garz. Cast. Frag. Acoftæ, Linsc. par. 4.

Ind. Orien. c. 7. fig. 14. item 5. & 8. par. Ind. Orien.

Rauvvolf. Manga, Scalig.

Manges, par. 7. Ind. Orient.

Exoticus fructus 4. Mangas, Clus. ex. l. 2. c. 16.

an Mangenas fructus: par. 5. Ind. Orient.

Fructus verò Ambo & Amba vocatur.

Genera ejus plura, aliquando ab una arbore colore diverso prodeunt, subvirides, flavi, ex viridi rubentes: sine nucleo ejus generis reperiri Acofta scribit: biferæ meminit Garzias.

III. Mangus aliud genus.

Mangas Recheadas sive Mangas in Achar, Linsc. 4. par. Ind. Orient. 7.

IV. Mangas fructu venenato.

Mangas sylv. aliud genus, Acoftæ, Lugd.

Mangas bravos, Palud. in Linsc.

V. Persici

## V. Persici ofsiculo fructus Malacensis.

Jambos, Garz. Frag. Acoftæ, Lugd. Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 9. fig. 13.

Jambeir arbor, fructus Jambos, Lusitanis; Jambali, Malabarensibus, Acoftæ.

Jambos, Arabibus: Tupha, Indis: Persis, Tuphat: Turris, Almat, Palud. in Linsc.

Duûm generum: unus obscure rubet; alter ex candido rubescit, ofsiculo ut in Persico, Garziæ: at Paludano, alterius fructus complere rubet & nucleo caret: alter levius purpurefcit, & rosam spirat.

## VI. Goan arbor &amp; fructus, ex cujus cineri-

bus Tuthia Alexandrina conficitur, Garziæ.

VII. Guajanos in Hispania nova, fructus granis duris, minora poma æquantibus, prægnans: ac in Peru hujus arboris facies diversa, par. 9. Ind. Occid. c. 24.

Persicorum genera omnia in nova Hispania & Peru, ut Melocotones, Albercokia & similes: exceptis Ducasinos, qui è Persicorum genere sunt, par. 9. Ind. Occid. c. 31. Sic in Angra persica copiosissima esse, scribit Linsc. par. 3. Ind. Or. c. 6.

VIII. Matos ex classe Guayano um & parvi albicantes Guaynavilli, naturæ frigidiusculæ: Joseph. Acofta l. 4. c. 24.

## P E R S E A.

**A**rbor Persea περσέα Græcis, quæ à Persica diversa est, licet Theophrastus utramq; περσέα nominet: at Gaza loco priori Persicam, altero Perseam transtulit. Dioscoridi l. 1. c. 187. περσέα arbor est in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, quem aliqui prodiderunt in Perside exitiosum esse, translatam rei id in Aegyptum naturam mutata edulem fieri. Et Theophr. 4. hist. 2. est in Aegypto alia arbor Persea vocata, asscctu magna & pulchra, sed maxime similis pyro, & folijs, & floribus, & ramis, sed folio perpetuo, &c. fructus pyri magnitudine, figura oblongus, Amygdali specie, colore herbicus, intus nucem habet quemadmodum prunum, sed multo minorem & molliorem, carnem valde dulcem, &c. Galenus 2. κατὰ τόπον, fructus est pyri aut mali magnitudine, noxia in Perside, vesca in Aegypto.

Persea, Matth. Lonic. Rauvvolf. cui Sephora Persianis.

Persea America Matthioli, Lugd.

an eadem cum Persea Plinij & Plutarchi?

Persea, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast.

Persea America Clusij, Lug. hic fructum Cucio-

phoræ adpingit, quod Clus. in hist. non probat. Persea Plinij, Cæs. qui dubitat an Anacardium ejus fructus sit.

Hujus folia à Doct. Jo. Anatolio Privæo, insigni apud Vesuntinos Medico & Botanico, unâ cum quibusdam bulbis anno 1622. accepimus.

## A M Y G D A L U S.

**A**mygdalus, Græcis ἀμυγδαλέα, & per contractionem ἀμυγδαλή vocatur: fructus ἀμυγδαλήνιον ἀμυγδαλήνιον: Latinis amygdala & amygdalum. Amygdalam ideo Græcis nominari Herodianus ait. παρὰ τὸ ἐν τῷ μίστῳ τὸ χλωρόν ὡς περὶ ἀμυγδαλῆς ἔχει πολλὰς, quod post viride putamen, nucleos scarificatos ostendat & in rimulas dehiscat, quas τὰς ἀμυγδαλῆς vocant, Athenæo lib. 2. teste. Antiqui, nucibus (ob ossium corticem) adnumerant, quas Cato Nucces Græcis vocavit, & Plinius l. 15. c. 22. tertio loco recensuit. Amygdalus Theophr. 7. hist. 12. inter arbores potissimum, vel sola ante folia flores emittit, vel unâ cum folijs: 1. hist. 21. flores solati sunt: 1. hist. 23. & fructum ex surculis annotinus habet: 1. hist. 18. & ei semen protinus post regmen ambiens subest: sed non nudum, verum ligno obductum. Idem ostendit, quomodo diminutione ex amaris dulces efficiantur: 2. hist. 8. 1. caus. 21. 3. caus. 23. 5. caus. 24. & Plinius l. 17. c. 17. sic etiam neglecta, ex dulci amara redditur, 2. caus. 20. Et Plinio l. 10. c. 25. floret prima omnium amygdala, mense Januario: Martio verò pomum maturat. Sunt autem duplices, dules & amara, ut ex Dioscor. l. 1. c. 176. Theophr. & Plinio locis citatis colligitur: hæc salubriores, illæ suavioris creduntur. Naxia amygdala, à Naxo Insula veteribus Græcis maxime commendabatur: secundas partes Cypria sibi vendicabat, quæ præter cæterorum morem repando cacumine prodit.

## I. Amygdalus sativa.

Amygdalus, Brunf. Trag. Dod. ut: Cord. in Diof. (cui & Nux Græca) Gesn. hort. Lon. Ad. Lugd. Cam. Tab.

Amygdala, Matth. Ang. Tur. Lac. Bellon. Lob. Cæs. Cast. Eyster.

Amygdala sativa, Rauvvolf.

Sunt majores & minores: laudatur majores, quæ lanugine carent, idcirco Pruno inferuntur. Amygdalas minores, tam amaras quàm dulces, & quidem alijs triplo minores, adhuc putaminibus suis inclusas, ex Asia afferri, testatur Cord.

in sua historia. Sic Gesner. meminit Amygdali nuces rotundas ferentis. Nunc dulces habemus duplices, vel duro, vel molliore putamine.

II. Amygdalus sylvestris.

Amygdalus syl. in sepib. Tripolitanis, Rauvv.

III. Amygdalus Peruana.

Fructus exotici Hispanensis 2. Clus. ex. l. 2. c. 18.

IV. Amygdalæ Guyanenses, Clus. ex. l. 2. c. 6.

V. Amygdalo similis fructus Peruanus fuscus vel spadiceus, linea candida.

Fructus peregrinus 9. sive Pepitas del Peru, id est, acini Peruijani, Clus. ex. l. 2. c. 30.

Fructus peregrinus 9. in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VI. Amygdalis similis Guatimalensis.

Avellana Mexiocana, cujus fructum indigena

Cacao appellant, quæ Palmarum naturam obtinet, Guiland. pap.

Cacavate Benzoni, Lug. In. oc. p. 5. vel l. 2. c. 16. 17.

Cacao, Jos. Acofte, vel Ind. Occid. par. 9. l. 4. c. 22.

Clus. ex. Lugd. Tab.

Fructus siliquis inclusus Amygdalarum speciem refert, cujus integræ naves plenæ ex Guatimala afferuntur: cum hac in nova Hispania mercatores negotiantur, cum ipsis monetæ usum præbeat & eleemosynæ loco pauperibus distribuunt: quare per universam Americam multi usus: imò ex eo potum conficiunt quem quem Chocolate nuncupant: Benzoni, Lugd.

VII. Amzgdalis similis cortice spinoso.

Amygdalæ ex Andes: par. 4. Ind. Occ. l. 4. c. 26.

## M A L U S A R M E N I A C A.

**M**alus Armeniaca, *μᾶλὲς ἀρμενιάκῃ*, & fructus *μῦλᾱ ἀρμενιάκᾱ*. Dioscor. l. 1. c. 156. Perseis subjungit: *minorā quæ ἀρμενιάκᾱ*, Romanis *πρᾶκοκκία* dicuntur: Latinis *præcocia*, quod ante alios fugaces fructus maturefcat: nominantur & *Præcoqua*: Galenus inter Persica reposuit, ut & Pl. l. 15. c. 12. inquit: post autumni (scil. Persica) maturefcent, æstate præcocia, intra triginta annos reperta, & primo denarijs singula venduntur. Supernatica è Sabinis veniunt: popularia undiq; pomum innocuum expetitur agris. His verbis Plin. duo Præcocium genera indicare, Dalechamp. voluit: alterum supernas. amplum & magnum, quod è Sabinorum locis adhibebatur, vulgo Armenium majus: alterum vulgare. parvum & strigosum, etiam Armenium dictum.

I. Mala Armeniaca majora.

Armeniaca, Ang. malus, Matth. Lac. Bellonio ab Armenijs dicta.

Armeniaca majora, Cam. Tab. Eyf.

Armeniaca major Baracocca vulgo, Cæs.

Malus Armeniaca major, Matth. ep. Ad. Lugd.

Mala Armeniaca maxima, Ges. hor.

Hæc mole corporis & suavitate præcellunt, & sapore differunt à minoribus, quæ sapore austerioribus sunt, quæ line cultura & insitione exigua sunt.

II. Mala Armeniaca majora, nucleo dulci.

Malus Armeniaca candicante nucleo oblongo

dulci ut in Amygdalis, Gesnero.

III. Malus Armeniaca minor.

Præcocia, Brunf. Ang.

Persica minora, Brunf.

Persicus præcox vel Armenia, Ges. ap.

Persici quartum genus, Lon.

Armeniaca minora, Matth. Cam. Tab.

Malus Armeniaca, Dod. ut: Tur. Cord. in Dioscor. Lob.

Malum Armenium vel præcoquum commune, Gesn. hort.

Malus Armeniaca minor, Ad. Lug.

Armeniaca, Cæs. alp.

## P R U N U S.

**P**runus *προυνιά* Diosc. l. 1. c. 174. nota arbor est, cujus fructus esculentus est. Fructus *προυνιά* pruna dicuntur. Theoph. 3. h. 16. folia similia habet Arbuto & Andrachne, arbor parva: 1. h. 18. semen habet carne & nucleo interjacente: 1. h. 29. succum dilutum: 1. h. 22. super fructum ipsum florem insidentem emittit: 3. h. 7. radice numerosa. At 4 h. 3. est & alia quædam arbor *προυνιά* magna, fructum ferens similem mespilo, majorem, nucleum habens rotundum, &c. Eidem 9. hist. 1. *προυνός* (pruno Gaza) humor in lachryma modo gignitur.

Genera: Dioscorides Syriacorum, & eorum quæ Damasci nascuntur, meminit. At Plinio l. 15. c. 13. Prunorum ingens turba versicolor, nigra, candicans: hordeacea appellata: alia eodem colore majora asimina cognominata: sunt & nigra, ac laudatiora cerina atq; purpurea: nec non Armeniaca, &c. sic nucibus insita, ab utroq; nucipruna appellata, &c. nuper in Bætica malina appellari cæperunt, malis insita, & alia amygdalina, amygdalis: his intus in ligno nucleus amygdala est: in peregrinis arboribus dicta sunt Damascena, &c. & pruna omnia post Catonem cæpisse manifestum est.

Recentio-

*Recentioribus pro diversitate regionum plures sunt differentia, & quidem inexplicabiles, vario cultu & studio inferendi (cùm & nuci, & malo, & amygdalo inferantur, quæ faciem parentis, succum adoptionis, ut Plinius dicit, exhibet) inventa: nam variant magnitudine, figura, colore, sapore: magnitudine, sunt magna, media, parva. Figura, longa, rotunda, acuminata. Colore, alba, viridia, lutea, ceræ coloris, rubra, ex punice rubentia, castaneæ arm coloris, cærulea, ex cæruleo nigricantia. Sapore acida, dulcia, mediæ saporis, austeriora: sic caro in quibusdam sicciior, facile ab osse separabilis, alijs humidior & pertinacius adharens. Ita alia alvum solvunt, quæ dulcia: alia eam cohibent, quæ austera & acerba. Sunt carne Pruni & cute subviridi Pruni, sed nucleo Persici quæ Prunopersica, Adv.*

I. Prunus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Tur. Massiniana, ijs grandiora.  
Lon. Cast. Lugd.

Prunus sativa, Fuch. domestica, Lob. Ger.

II. Pruna magna dulcia atrocærulea.

Brabylla, Theocrito.

Pruna Damascena, Trag. Matthiol. Dodon. gal. Cord. in Diosc. Lugd. Ger. desc.

Palma datur Damascenis, quæ ex Syria Venetias sicca adferuntur, quæ nucleo sunt longo & plano potius quàm rotundo, Bellonio monente: secunda quæ ex Pannonia (Ungarica quæ etiam Damascena, Cord. in Diosc.) & Transylvania adferuntur, ex Matthiolo Lugd. at Dodonæus ex Thoma Jordano, Moravica magis ad alvum leniendam commendat. Pruna Ungarica & Moravica, Cam. quæ

Pruna Brunensia, Clus. hist.

Pruna Ungarica duplicia, majora & oblongiora, alia minora, rotundiora & dulciora, Matth. Gesn. hort. Lugd.

III. Pruna parva dulcia atrocærulea: hæc nucleum parvum, non multo Ceraso majorem habent, & à nostris Damascenula vocantur.

Pruna Damascena nostratia, Bellon.

IV. Pruna magna crassa subacida.

Pruna Ungarica præstantissima, Damascena fortè, Gesn. hort.

Huc referri possunt Pruna acida in insula S. Claræ, Ind. occid. p. 9. additam.

V. Pruna oblonga cærulea.

Prunidaetyla, Trag.

Prunidaetyla purpurea & ovata, Lugdun. qui Noberdiana & Juliana addit.

Hæc oblonga sunt, nucleo oblongo, aliquantum incurvo, quæ etiam condita Vesuntio, ubi Dætyli vocantur, adferuntur.

VI. Pruna nigra carne dura.

Pruna Iberica & Pertigona vocata, Trag.

Pruna Hispanica, Dod. gal.

Pruna Perdigona, Lugd.

Pruna perniconia vulgo, Cæsalp. quibus addit

VII. Pruna coloris ceræ ex candido in luteum pallescente.

Pruna cerea & Ceriola, Trag. Dod. gal. Lug. Tab.

Pruna cerea, Cord. in Diosc. Gesn. hort.

Pruna amygdalina, Ger. ico.

Hæc duplicia; præcocia, quæ majora, & ferotina, quæ minora, Camer. epit. Reperiuntur quoque magnitudine ovi gallinacei, aut etiam anserini, Gesn. hort. sic quæ juxta pediculum in longitudinem extenuantur, ut Damascena & Cætelana colore subviridi, Cæf.

VIII. Pruna magna rubra rotunda.

Pruna asinina, Trag. (& Pedicularia) Dod. gal. Lugd.

Pruna asinaria, Cæsalp. quibus addit Cubia ingustabilia.

IX. Pruna rotunda, flava, dulcia, mali amplitudine.

Pruna à malis cognominata, Cæf.

X. Pruna Augusto maturefcentia minora & austeriora.

Pruna Augustana & Albanula, Cæf.

XI. Pruna parva præcocia.

Pruna præcociora, à tempore avenacea dicta, Gesn. hort.

Prunus avenaria, Tab.

XII. Pruna parva ex viridi flavescencia.

Pruna parva ferotina, cereola, Gesn. hort.

an Pruna viridacia, Gesn. & Verdacea, Cam.

XIII. Pruna amygdalina Plinij.

an Coccimelea, Theoph.

Amygdalina pruna, Lob. belg.

XIV. Pruneoli albi, oblongiusculi, acidi.

Pruna Galarensia, sive Perani pruneoli, Clus. pan. & hist.

XV. Pruna ex flavo rufescencia mixti saporis gratissima.

Pruneola quæ Brignolæ in scatulis reposita copiosè reperiuntur, Rauvvolff.

Pruna de Brignioles dicuntur à loco natali in



Gallijs, unde enucleata (nucleo parvo sunt) & exsiccata adferuntur, & in officinis nostris habentur, & tam cruda, quàm cocta comeduntur. Verùm & in hortis nostris habentur.

XVI. Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci.

Prunus cognominata Myrobalanus, Clus.pan. & hist. Cam. Tab. Ger.

Prunus Myrobalanus rotundus, Eyst.

Est majore & minore fructu, hincque pulpam dulciorem habet.

*Pruno similes exotica.*

I. Pruna Congiana lutea.

Ogegha arbor fructu luteis prunis simili, Pigafetta desc. reg. Congiani: vel Ind. or. par. 1. l. 2. c. 1. an Lanca fructus in Gilolo prunis cereis similis: part. 8. Ind. orient.

II. Prunus Brasiliana.

Hyuourae Theveto, Clus. in Monardem. Hiuourae Brasilianis, Guajacæ species, Lerio part. 3. Ind. occid. c. 12.

III. Pruno similis fructus Chinenfis.

Lechyas fructus prunis similis, 2. part. Ind. or. cap. 25.

IV. Pruno similis ovalis, cortice & nucleo cinereo.

Guayavenfis fructus 2. Clus. exot. l. 2. c. 6.

V. Pruno similis oblongus spadiceus pulpâ albâ.

Guayavenfis fructus 3. Clus. l. c.

VI. Pruno similis fructus subfuscus ex Guinea.

Fructus exotici 1. à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 23.

VII. Pruni figura fructus Guinenfis.

Fructus exotici 2. à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 24.

VIII. Pruno cerco similis fructus Africanus.

Ergen arbor folijs myrti, fructu pruni cerei, offe amygdali magnitudine lineis binis distincto: in Præfat. par. 1. Ind. or.

IX. Prunus Hiericonthica folio angusto spinoso.

Zaccon, quia in planitie Hierichontis non longè ab ædibus Zacchæi crescit, Cast.

X. Pruna insana spinosa.

Nux insana, ab effectu Prunula insana nautis Belgis, Clus. exot. l. 2. c. 26.

Fructus prunis nostratibus minoribus similis, mentem capiens, 4. part. Ind. orient.

XI. Pruno similis spinosa.

Jangomas, Garz. Frag. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. orient. 10.

Jangomi, Acostæ.

Fructus pruni facie, sed loco nuclei granulis turget.

XII. Pruno similis folijs, Laccam ferens: alij ex Sorbi vel Mespili vel Myrti ramis colligi volunt, Garz. Vide inter gummata.

*Prunus sylvestris.*

Prunus sylvestris, Græcis *πικνουμυλλέα ἀγρία*, sive *ἀγροπικνουμυλλέα* dicitur, quod rotunditate & magnitudine Cocci, mala ferat; Virgilio 4. Georgic. Spinum dicitur: fructus Dioscorid. libr. 1. cap. 174. *ἀγροπικνουμυλλον*: & Galenus 2. aliment. testatur in Asia *πριμνον* appellari, Latine Prunum sylvestre Prunellum & Prunulum vocant. At Theophrastum 3. histor. 7. *πριμνίδα*, vel ut apud Athenæum libr. 2. legitur, *πριμνίδα* vocari volunt. Spodias, inquit, velut sylvestris prunus habetur. Et Plinio libr. 15. cap. 13. pruna sylvest. ubique nasci certum est.

I. Prunus sylvestris.

Prunus sylvestris, Brünf. Matth. Fuch. Dod. ut: Turn. Cord. in Dioscor. Bellon. (cui & Spino) Gefn. hort. Lonic. Adv. Lobel. Cæsalp. Castor. Lugd. Tab.

Prunus sylvestris vulgaris, Trag.

Huic peculiare, quod deflorescens, simul ac imbres contigerint, fructus in oblongum & inane corpus convertitur, quos Itali Turcas vocant, Cæsalpino & Camerario monentibus.

Fructus alij sunt magni, alij exigui, nonnulli rotundi, quidam oblongi: cujus succus pro Acacia usurpatur, unde stirpi Acaciæ Germanicæ nomen factum.

II. Pruna sylv. præcocia.

Pruni sylv. altera species, Trag.

Hæc majora sunt & Augusto maturantur, quare Germanis *Haberschlehen*/ reliqua *Schlehen* simpliciter nominantur.

In sylvestri sativaque pruno reperitur limus arborum, quem Græci *Lichena* appellant, Plinius lib. 23. cap. 7. at Dioscorides *Gummi* vocat. Muscum qui innascitur, Chirurgi nostri magnificiunt.



**M**yröbalani; qui veteribus Gracis incogniti fuere (quāvis Bellonius Chrysobalanos Galeni velit) ab Arabibus verò inventi, & ex recentioribus Gracis, Actuārio cogniti: hos Avicenna, generis nomine Dilegi, & Serapio Hartileg donavit: quorum interpretes, cū viderent quodammodo ad glandis formam accedere, improprie Myrobalanos verterunt. Officinis Myrabolani & Myrabulani.

Genera quinque sunt, quæ Actuārio *μυροβάλανος* *ξάρβα*: *κεβυλά*: *ινδία* & *αμαζόνια*: *εμπιλιτινά*: *βελιρικά* dicuntur: & arborum genera quinq; diversa, quæ in regionibus sexaginta aut centum leucis à se distantibus nascuntur, Garzia monente, quæ Pruni magnitudine sunt & omnes sponte nascuntur. Myrobalanos ex Palmarum genere esse, Cæsalpinus censet. At Cordus scribit Arabibus recentioribus tres tantum cognitās fuisse, Indas, Chebulas & Citrinās, quæ ab una eademq; arbore desumantur: Belliricas ex peculiari arbore esse: & Emblicas peculiare genus dicit. Arabes fructibus Saccharo conditis utuntur, & Chebulatorum major est gloria: & ad nos duo potissimum genera condita adferuntur, Chepula sive Kébula & Bellerica. At Clus. in Garziam, Chepula rarius ad nos adferuntur, & non nisi dura & malè condita: Emblica verò copiosè recentissima & optimè condita. Sed de Myrobalanis inter Indicos scriptores consule Garziam, Acoſtam, Fragosum.

**I.** Myrobalani maximi oblongi angulosi pituitam purgantes.

Arabibus Quebolia & Quebulgi.

Myrob. Cepula, Mefu. Clus. in cor. Chepulæ, Actuārio, Matth. Garz. Adv. Lob. Lugd.

Myrobalani Chebuli, Lac. Cord. histor. Gesn. Lon. Cæs. Cast.

Myrobalani Chebulæ, Tab. Ger.

Myrobalani Chebuli vel Quebuli, Indis Aretan: Linsc. 4. part. Ind. or. 38. qui tab. 16. sub Mirambolan majore, quæ alias Aretca vocetur, figuram exhibet.

Arboris folia Persicæ similia.

**II.** Myrobalani teretes citrini bilem purgantes.

Myrob. lutei, Actuārio. flavæ, Garz. Lob. Lugd. flava, Matth. & lutea, Clus. in cor.

Myrob. citrea, Mefu. citrini, Cord. histor. Lac. Lon. Adv. Cæs. Ger.

Arabibus Azafar.

Myrobalani flavæ, citrinæ, luteæ, Tab.

Myrobalani citrini, Bellon. Cæs. an Chrysobalanum Asclepiadis.

Myrobalani citrini, Indis Arare, Linsc. 4. part. Ind. orient. 38.

Arbor Sorbi folio.

**III.** Myrobalani rotundæ belliricæ.

Arabibus Belleregi: bellileg: bellegu.

Myrobalani belliricæ, Matth. Cord. hist. Clus. in cor. Garz. Adv. Lob. Lugd. Tab. Ger. bellirici, Lon. Cæs. belerici, Lac.

Myrob. bellerici Gallæ modo rotundi, Cæs.

Myrobalanus belliricus, Cord. in Diosc. qui an Acacalis sit bellericus, vel emblicus dubitat.

Myrobalani Bellirici, Indis Guti, Linsc. 4. part. Ind. orient. 38.

Arbor est folijs laurinis subcinericeis.

**IV.** Myrobalani nigra octangulares.

Arabibus Asuar.

Myrob. nigra, Actuārio, Mefuæo, nigri, Adv.

Myrobal. Inda & Damafonia & nigra, Clus. in cor.

Myrobalani Indicæ, Lob. Tab. Ger. seu nigra, Matth. Lon. Garz. Lugd.

Myrobalani Indi, Cord. hist. Lac. Cæs. Cæs. qui addit: nullo intus nucleo (quemadmodum & sequentes) manifesto.

Myrobalani Indici, Indis Refonualle, Linsc. 3. part. Ind. orient. c. 38.

Arbor folijs est Salici similibus, fructus octogono.

**V.** Myrobalani Emblicæ.

Arabibus Embelgi: Embleg: Ambegi.

Myrob. de Seni, Scapioni: Seniticæ Avicennæ.

Myrob. Empelica, Matth. empelica sive emblica, Clus. in cor.

Myrobalani emblici, Lac. Cord. hist. Lon. Adv. Cæs. Cæs. qui addit, figura parvi mali, sed in parva fragmenta dissecti.

Myrobalani emblicæ, Lob. Lugd. (qui inquit potius fragmenta esse, quam integra pruna, quadantenus triangula,) Tab. Ger.

Myrobalani Emblici Indis Amuate, Linsc. 4. part. Ind. orient. 37.

Arbor est palmæ magnitudine, folijs minutim incisus & nonnulli fructu minimo nascitur.

Duo posteriora genera Phœnicobalanos dici posse Cæsalpinus existimat: siquidem nullo intus ligno spectentur, & cum maturi sunt, nigrescant, ut Plinius l. 12. c. 22. testatur. Qui autem os intus habeant, ad Thebaicos & Arabicos Myrobalanos reducendos: de ijs enim Plinius, in

totum arentes Thebaides & Arabicæ macro corpore, exiles & assiduo vapore torrentes, crustam veriùs quam cutem obducunt.

V I. Myrobalanis flavis similis fructus.

Hovos fructus in nova Hispania, Gomara, & Clusius in Garz. Fragofo.

Hobus sive Hovus, Benzoni part. 4. Ind. occid. c. 28. & Oviedo.

*Fructus Myrobalano similes.*

I. Fructus Myrob. ossiculo similis niger acerb.

Fructus minor 10. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

II. Fructus fuscus ferratus Myrobalani forma.

Fructus 11. Gareri, Clus. exot. l. 2. c. 16.

III. Fructus Myrobalani nigri ossiculo similis, nucleo subfusco.

Fructus 10. è navigat. Batav. Clus. exot. l. 2. c. 15.

## PRUNUS SEBESTEN.

**P**runus Sebesten à Dioscoride & Galeno prateritur: at Aegineta, Aëtius & Actuarius frequenter meminere. Dicitur *μύσος*: fructus verò *μύσα*, *μύσα*, *μύσα* à pomi mucoso lentore: Græci enim mucum *μύσος* vocant. Arabibus & officinis Sebesten. Plinius lib. 15. cap. 13. simul dici possunt populares eorum Myxa, quæ & ipsa nunc capere Romæ nasci insit & Sorbis. & lib. 13. c. 5. pruna in Damasco monte nata, & Myxa: utrumque jam familiare Italia: ex Myxis in Ægypto & vina facta.

I. Sebestena domestica: an *ἀμαμαγίς* Arthenæo.

Sebesten, Trag. Lac. Bellon. Rauvvolf. domestica, Alpino.

Prunus Sebestena, Matth. Lugd.

Myxæ vel Sebastæ, Cord. hist.

Sebestena, Gefn. hort. Cast.

Myxa, Dod. Adv. Lob. Cæs. alp.

Sebesten, Myxæ sive Myxaria, Tab. Ger.

Myxos arbor, sive Sebestena nostra, Lugd.

Differt à sequenti folijs latioribus & crassioribus: fructu majore, perfectiore & meliore.

II. Sebestena sylvestris.

Sebesten sylvestris, Alpino.

## ZIZIPHUS SEU JUJUBE.

**A**rbor, Ziziphus Columella l. 9. c. 4. dicitur: fructus verò Græcis recentioribus, ut Actuario & Simeoni Sethi *ζίζυφα*, *ζίζυφα*, & *ζίζυφα*, Latinis Zizypha: officinis Jujube. Sunt qui *οξυμύρα* Galeni 2. alim. esse velint, & quidem primus Serapio: at Guiland. in suo Theone, Zizypha & Serica distinguit. aliqui Tuberum genus, à colore Sericum, cognominatum, Plinij l. 15. c. 14. cum tamen Plinius à Zizyphis distinxerit: inquit enim, æque peregrina esse Zizypha & Tuberes, quæ & ipsa non pridem venerint in Italiam: hac ex Africa, illa ex Syria: & l. 17. c. 10. & Zizypha grano feruntur mense Aprili: Alijs Paliurus Africanus & Lotus secundus Polyb., Lobelio: Paliurus Theoph. sed non Africanus, forte Paliurus Dioscoridus & Plinij, Cæs. alpino.

I. Jujubæ majores oblongæ.

Jujubæ, Trag. Cord. hist. Lon. Adv. Cæs. Tab.

Jujubæ domesticæ, quas Lotum Athenæi, Lotum in Pharide Theoph. & Lotum osseum Plinij Anguillara suspicatur.

Jujuba Paliurus Africanum Theophrast. esse propemodum certus sum: Lotus Homeri 9. Odyss. Guil. l. c.

Jujubæ Arabum, Lob.

Zizypha, Matth. Lac. Cast.

Zizyphus, Dod. ut: Gefn. hort. rutila, Bellon. (Græcis vulgo Ziziphia) Clus. hist. & hisp.

Zizyphus punicea, Lugd. rubra, Cam. Rauvvolf.

Jujubæ, Zinziphia Cretensis, Bellon.

II. Jujuba sylvestris.

Jujubæ & Paliurus 2. Theoph. Ang. Adv.

Zizyphus sylvestris, Cam.

Zizypha, Cast. ap.

III. Jujubæ minores rotundæ.

Jujubæ minores, Tuberes Plinio, Cord. hist.

IV. Jujuba Indica: folia hujus subrotunda, ut vulgaris venosa, sesquiunciam lata, duas longa, per marginem crenis exasperata, parte averfa molli rufescente lanugine recta: hæc Boræ nomine, cum ejusdem ramulo, cui Lacca adnata erat, ex India Reverend. D. Terentius misit.

## CORNUS.

**Q**uæ Latinis Cornus, Dioscoridi l. 1. c. 172. *κράνις* arbor fortis, fructum ferens olivæ modo oblongum, primo viridem, maturum verò flavum, aut œereum, esculentum. Theop. 3. hist. 12. & 5. b. 5. *κράνις*, quadam, mas, quadam

quedam fœmina, quam *θαλασσεύειαν* vocant: folium habet Amygdala (aliq̃ Mali legunt) nisi quod pinguius crassiusq̃: corticem nervosum, & tenuem, candicem non nimis crassum: fœmina virgas parvas, &c. Macedones ambas fructificare asserunt, sed fœmina fructum ingustabilem esse, &c. Plinio lib. 16. cap. 26. Cornus circa Solstitia, reddit primo candidum, postea sanguineum: ex eo genere fœmina post Autumnum fert baccas acerbæ & ingustabiles cunctis animantibus: ligno quoq̃, fungosa, inutilis, cum mas è fortissimis quoq̃ sit: tanta differentia ab eodem genere sit: vide & l. 15. c. 24. & 24.

## I. Cornus hortensis mas.

Cornus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Lac. Lon. Dod. Ad. Lob. Cæs.

Cornus mas, Dod. gal. Bell. Ges. hor. Tur. Lugd. Tabern.

Cornus sativa & mas, Cord. in Diosc.

Cornus vulgaris mas, Clus. hist.

Fructus maturus colore variat; nam communiter rubet, & officulo longiore est: aliquando ceræ colore: rarius albet: saturatius etiam rubet officulumq̃; habet crassius & brevius, & hoc est Corni maris aliud genus, Clus. hist.

## II. Cornus sylvestris mas.

an Cornus fœmina, Cord. hist.

Cornus sylvestris, Cam.

Cornus mas pumilio, Clus. hist.

Hic in sylvestribus Thuringiæ & Austriæ inferiores provenit, solum frutescit, sed cultura in arborem pulchram exsurgit: fructus dulciores

sunt, quàm urbanæ, Hermolao, & plerumq̃ etiam majores, Camerario monente.

## III. Cornus fœmina.

*θαλασσεύεια* Theophr. quibusdam *θαλασσεύειαν*, id est, falsa Cornus: Cornus fœmina, Plinio: quibusdam Virga sanguinea ejusdem, l. 24. c. 10. at nullas notas addidit.

Ligustrum, Brunf. ico.

Hartriegel/ Trag.

Virga sanguinea, Matt. Ruel. Ges. hor. Dod. Cæs.

Cornus fœmina, Dod. gal. & (Opulus Columellæ) Tur. Ges. hor. Ad. Lob. Thal. Lugd. Tab.

Cornus fœmina veteribus Macedonibus, Sanguineus frutex Gallis, Bellon.

Pseudocrania, Cord. hist. ico.

Sanguen vulgo, Cæs.

Sanguis & lingua sanguinea, Cast.

Oslea, Lon. Cast.

Cornus sylvestris, Lon.

## L O T U S.

**L**otus arbor triplex est Dalechampio in Plinium: prima quæ *λωτός ἀνὰ ἄγρον* Dioscoridi l. 1. c. 171. quam dicit stirpem bene magnam fructum ferre pipere majorem, dulcem, edulem, stomacho aptum. Et Theoph. 4. hist. 4. *λωτός* (Celtis Gaza) magnitudine quantæ pyrus, aut paulò minore, folium incisuras habet, ut Ilex: cujus genera plura fructibus inter se discreta traduntur, &c. Plinio l. 13. c. 17. arbori Loto quam Celtim vocant, magnitudo quæ pyri, folio ilicis, fructu dulci nunc exisse, nunc durum nucleum ambiente, colorem uræ modo mutante. cum maturescit, e quo vinum exprimitur. Arbor Syrtica eidem l. 24. c. 2. Altera *διόσπερος* Theophr. l. 3. c. 13. (Jovis flamma Gaza) quam improprie Loto vocant, ob fructus dulcedinem Ceraso similem, nucleo duro, & Plinio l. 16. c. 30. lotos sive faba Græca, &c. & l. 24. c. 2. Tertia, quæ Theophrasto secunda quæ *Laurocerasus* quibusdam: quæ sententia Clusio non placet. Addi potest quarta, ipsius Polybi apud Arbenæum l. 14. Sunt qui Guajacanam, Tuberum alterum genus Plinij, quorum inter Mala meminit, velint.

## I. Lotus fructu Cerasi.

(Dod. Cast. Lob. (& Lotus vera Theophrasti) Ger.

Lotus, Mar. Ang. (& arbor del perlaro) Lac. Lon. Guajacum, Cord. hist. icon. Lon. ico.

Lotus arbor, Bell. (Cacavia Cretensibus) Ges. Guaicana, Bellon. cult. Eyf. vulgo, Cam.

hort. Ad. Lob. Cæs. Cam.

Lotus arbor sive Celtis, Tur.

Lotus Celtis arbor, Lugd.

Lotus domestica, Cast. app.

Bogolarus Tridentinis, Guil.

Ermellinus, Cæs. qui Tuberum alterum gentis Plinij suspicatur.

Diospyros sive Faba Græca latifolia, Lugd.

Pseudolotus Matthioli, Tab.

Variat: nam in fructu Patavij, semina bina aut terna plana & spadicei coloris observavimus: at quæ Viennæ & Bononiæ coluntur, etiam ex semine Italico natæ, fructus semine expertes, sola pulpa constare, Clus. in sua hist. notavit.

## II. Lotus Africana latifolia.

Diospyros, Theophrasti.

Lotus sive Faba Græca, Plinio.

Lotus Africana altera, Matth.

Guajacum Patavinum Fallopio, Ges. hort. Ad.

III. Lotus Africana angustifolia sive fœmina.

Pseu-

Pseudolotus, Matth. Cam. Tab.

Diospyros sive Faba Græca angustifolia, Lugd.

Lotus Africana, Tab.

Ziziphus Cappadocica, Ger. ico.

IV. Loti Africanæ similis Indica.

Indiæ Occid. palmarum sanctæ similis arbor, Ad. Lob. ico.

Palmarum sanctæ similis arbor, Lugd.

## LIGNUM GUAJACUM.

**G**uajacan nomen est Indicum, quod nunc Guayaci sive Gajaci nomine, per universum orbem cognitum est, quod alij Ebenum esse dicunt, à quo sola summa nigredine disfidere videtur: quæ in Ebena summo splendore nigricat: in illo verò albescit: alij Buxi speciem: Sed novum est arboris genus, quod ex America, sive India occidentalis affertur. Duplex est, magna matrice & propemodum sine matrice: non tamen diversarum arborum lignum esse censemus.

### I. Guajacum magna matrice.

Guayacan lignum Indicum ex Insula S. Dominici, Monardi, Lugd. & par. 4. Ind. Occid. 29. sive lignum sanctum, par. 9. Ind. Occid. 13. c. 22.

Guajaci primum genus, Manardo & Matth.

Guajacum, Bellon. Ad. Cæf.

Gayco & Gayacan, palus Indiæ Hispanis, Frag.

### II. Guajacum propemodum sine matrice.

Guayacan genus alterum, quod lignum sanctum, illo præstantius, & ex Insula S. Johannis de portu divite affertur, quo maximè utuntur, Monard. Lugd.

Guajacum, Lac. Cord. in Diosc. & hist.

Palma aut palus sanctus Indiæ Occid. Penæ.

Guajaci 3. genus, Monardo & Matth.

Guajaci alterum genus, Cæf.

Hoc in plura genera ab aliquibus dividitur, eò quod non unum colorem habeat: quoddam enim nigricat: quoddam etiam spadiceo colore flavescit: quoddam præterea omnes istos colores discretos habet: Quare Manardus & ex eo Matthiol. tria genera notarunt, quæ licet colore, magnitudine & pondere inter se discrepent, unius

tamen esse arboris, contra quàm Fallopius credidit, Matthiol. statuit, & causam refert in ligni maturitatem, quò enim maturius, eò nigrius, & quantò minus adoleverit, tantò magis albicare asserit: probatur maximè, quod rufum, spadiceum flavum, lividumque colores simul mixtos habet.

### III. Guajacum folijs lentisci.

Guajacum cujus ramulum cum floribus & fructu pingit Clus. notis ad Monardem.

Lignum Ebenum sive Guajacum in Insula S. Helenæ, par. 1. Ind. Or. c. 1.

Fructus (quos copiosè cum suo gummi, Amstelrodano à D. Hofst. accepimus) variant, nonnulli loculamentis sunt geminis, quorum alterum plenum, alterum inane: alij tribus, in quibus ossicula dura, longiuscula.

### IV. Guajacum Orientale.

Palma aut Palum sanctum, Ad.

Guajacum folijs plantaginis, Cæf. Frag.

Lignum sanctum, Cast.

### V. Guajaco viribus similis Indica.

Maggai, Indi morbum Gallicum curant, ejus suffimigio sudores movendo, Fragosus.

## E B E N U S.

**E**benus, Græcis ἔβενος, duplex Diosc. l. 1. c. 129. Aethiopica nigra, venarum pectinūmve expers, corvum elaboratolavore similis, &c. Altera Indica, lineis candidis & fulvis intercurrentibus, idemque maculis prædita. Theoph. 4. h. 5. Ebenus Indiæ peculiaris est: cujus duo sunt genera, unum laudat a materie puriorumque, alterum ignobile, &c. Pl. l. 12. c. 4. Hebenus rara arbor, Neroni principi allata, quam nullam aliam nisi palmarum generis esse docuerint, cujus duo genera esse scribit: & l. 16. c. 40. spississima ex omni materie, ideo & gravissima judicatur: quæ neque cariem neque vetustatem sentit: quæ ut id. l. 6. c. 30. Aethiopia sylvæ meridiano cardine maximè virent.

I. Ebenus Theveto in Indiæ Insula Palmbotere præstantissima & nigra, & in 9. par. Ind. Occid. 13. c. 22. in Hispaniola.

Ebenus, Matth. Cord. in Diosc. Cæf.

Hebenum sive Xyloaloes officin. Ad.

Ebenus, Lugd. qui vult officinas pro Xyloaloe habere.

Valer. Cordus in Diosc. scribit, quosdam Guajacum lignum, Ebenum esse contendere: & Pena censet officin. Ebenum speciem Guayaci esse. Ebenus, Castori, qui eandem figuram habet, quam pro Ligno sancto posuit.

Ex hac in Italia sphaerulæ precatoriæ conficiuntur.

II. Lignum pice ferè nigrius & polito ebore lævius: arbor crasso cortice vestita, in cuius intimis Ebenus clauditur: ejusdem generis ligna rubentia, & alia ceræ modo flaventia reperiuntur: in Insula Mauritiana, 5. par. Ind. Or. Ebum picis modo nigrum, 4. par. Ind. Or.

## LIGNA DURISSIMA FERRI DURITIEM æmulantia.

### I. Ebenus Indica.

Lignum de Mangles, ex quo navium malos & antennas, ferri duritiem æmulantes, condunt: part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 30.

an Lignum de Cochi, quod ejusdem cum ferro ponderis, ex quo anchoras conficiunt, & à Lusitanis Paio di ferro, hoc est, lignum ferreum vocatur: par. 7. Ind. Or. c. 44.

II. Lignum Teixo dictum, adeo durum ut ferrum æquet, in Pico Insula, quod valde pretiosum & utile, interius coccinum undulatum expressissimè referens, ex quo instrumenta fi-

unt, Liscot. part. 3. Ind. Orient. cap. 6.

III. Angelina arbor apud Cachinum, ex cuius continuo trunco naves Tonas vocatas extruunt tam grandes, ut unâ viginti vel 30. dolia aquatica vehi possint, cujus lignum adeo durum ut ferrum atterat, Liscot. par. 4. Ind. Orient. c. 14. & par. 7. c. 27.

An arbor cujus pars ima crassitie 24. orgyrum in Guineæ Insula Formosa: part. 6. Ind. Oriental. cap. 4.

an Angelina arbor, cujus solum nomen apud Acoftam, cap. de ligno colubrino.

## C E R A S U S.

**C**erasus negax & Theophr. 3. hist. 13. fructus negax, Dioscoridi l. 1. c. 157. Cerasia & Cerasa. Dicta autem à Cerasunte Pontico municipio: unde Lucullus Romanorum Imperator, Mithridate debellato, primum in Italiam arborem detulit, & fructum gentilitio nomine Cerasium appellavit, Athenæo l. 2. & Plinio l. 15. c. 25. arboribus. Est autem Theophr. l. c. natura peculiaris arbor, magnitudine excellens, & c. flore candido, pyro & mespilo proximo, & c. fructu rubente, saxeæ magnitudine, & c.

Genera: Plinio l. c. Cerasorum, Aproniana maximè rubent: nigerrima sunt Actia, ut & Caciliana rotunda. Julianis gratius sapor: principatus duracinis, quæ Pliniana Campania appellat: in ripis etiam Rheni: tertius ijs color è nigro ac rubenti viridij, similis maturescens semper. Minus quinquennio est, quod prodicere quæ vocant Laureæ, non ingratae amaritudinis, insitæ in Lauro. Sunt & Macedonum parva arboris, raroq; tria cubita excedentis: & minore etiamnum frutice Chamæcerasi: hæc Plinius. Verùm non solum apud Gallos & Italos, sed etiam nunc apud nos magna Cerasorum varietas, quæ quotidie insitione & cultura augetur: nam alia sunt sativa, alia sylvestria. Sativa fructus forma, colore & sapore variant. Sunt enim poma figuræ: binariæ, longiore, rotundiore, majore, minore, cordis etiam figura: & alia pediculo longiore, alia breviori: singulis, vel pluribus unâ cœntribus, ita ut ex uno petiolo vel singula, & quidem communiter, vel terna quaternæ, quina dependeant: vel in racemi modum coacerventur. Colore albo sed rarius partim rubro, partim candicante, & quædam in maturitate parum ex candido rubent, quædam magis: quædam planè cerea, quæ pruno infra sunt: rubrorufescente, nonnunquam in atrum vergente, nigro etiam quædam nigerrimo & succo sanguineo, labia & manus inficiente. Sapore dulci, acido, austero, ex dulci & acido admixto: alia amaritudinis quid retinent, non tamen ingrata, Amarina dicta: sic alia nimia sua dulcedine fastidium pariunt: alia ob nimium acorem respuuntur: alia ob aquei succi redundantiæ insipida sunt. Similiter quædam carne sunt prædura, alia carne molliore, sive teneriore & aquosa constant: & quibusdam caro pertinacius nucleo hæret, qui in alijs fragilior, & nucleo non insuavi est. Sylvestria etiam variant, quorum quædam, licet in hortis à nostris colantur, sylvestria tamen dicantur, quia in nemoribus & sylvis, nonnunquam in dumetis reperiuntur: & quidem in sylvis altissimis, fructu parvo & exigua carne, avium potius quam hominum cibis, ob acerbam simul & amarum gustum. Sed aliquas tantum differentias subjiciemus.

I. Cerasa sativa, rotunda, rubra & acida, quæ nostris, Cerasa sativa.

Cerasa Aproniana, Plinij.

Cerasus acida, Brunf. Matth. Lugd. Tab. & alijs vulgaris, Ger.

Cerasia acida & vulgaris, Trag.

Cerasa quæ Gallis Griottes, cujus arborem Chamæcerasum dici, putat Ruellius.

Cerasa austera & majora, Cord. in Diosc.

Cerasia, Cord. Gefhor. Lob. Cast.

**Cerasus, Ad. tertia, Dod.**

**Cerasa Agriotta appellata, Cæs. qui Macedonica Plinij suspicatur.**

Hæc in mediocri arbore crescunt, brevique pediculo & carne satis dura donantur: colore communiter rubro, aliquando nigricante, quoddam & quasi albidum quod rarius est: at quæ in alia ejusdem generis arbore insita, magna admodum Cerasa, ex brevibus pediculis dependentia, gignunt.

**II. Cerasa sativa majora.**

**Cerasia Hispanica, Lob. Tab. Ger.**

**III. Cerasa acidissima sanguineo succo.**

**Cerasorum primum genus, Trag.**

**Cerasa austera, Matth. (cui & acidorum tertium genus) Cast. Lugd.**

Hæc in altiore arbore proveniunt, & longissimum pediculum habent, ex quibus communiter nostrates (qui Bieschstein vocant) Vinum cerasorum faciunt.

**IV. Cerasa crassa carne dura.**

**Cerasa duracina, Plinio.**

**Cerasa quæ primo maturitatem sentiunt, Ruel.**

**Cerasor. 4. genus, quæ forte Juliana Plin. Trag.**

**Cerasa maroba & duracina, Matth.**

**Cerasus altera Dod.**

**Cerasa pulpa duriore, Duracina vocata, Cæs.**

**Cerasia Pliniana, Tab. præcox, Ger.**

Nostræ Graffion vocant, quæ vel rubent, una tamen parte albidior, vel nigricant.

**V. Cerasa carne tenera & aquosa.**

**Cerasa Juliana, Plinio.**

**Cerasa aquea, Matth. Tab. Gasconia, Ger. ico.**

**Cerasa pulpa aquosa, Cæs.**

**VI. Cerasa alba dulcia.**

**Cerasia dulcia, Trag.**

**VII. Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore iniciente.**

**Cerasa Aëtiana, Plinio.**

**Cerasia nigra, Trag. Tab. Ger.**

**Cerasa Corbine, quod Corvorum modo nigricent, an Cæciliana Plinij, Matth.**

**Cerasus prior, Dod.**

Hæc nostris sylvestria, & à Cordo in Diofco. Cerasa dulcia dicuntur, & duplicia habentur, rubra & nigra, ex quibus tam viridibus, quam exsiccatis, osses conficiunt. Et in Florida Cerasa sylvestria reperiuntur, an his similia?

**VIII. Cerasus paucissimis folijs donatus.**

**Cerasa sine folijs, Lob. ico.**

**IX. Cerasus hortensis flore roseo.**

**Cerasi species major pauciores fructus edens, Lob. icon.**

**Cerasus multiflora secunda, Tab.**

**Cerasus flore plenissimo instar parvarum rosarum, Cam.**

**Cerasus multiflora pauciores fructus edens, Ger.**

**X. Cerasus hortensis pleno flore.**

**Cerasus vulgaris duplici flore, Lob.**

**Cerasus multiflora prima, Tab.**

**Cerasus multiflora fructum edens, Ger.**

**Cerasus flore pleno, Eyst.**

**XI. Cerasus folio laurino.**

**Cerasus Trapezuntina, Bellon. Gef. hort.**

**Laurocerasus, Eid. cul. Gef. hort. Clus. pan. & hist. Camer.**

**Lorus secundus Theophrasti, Lugd.**

Variat: nam communiter sub pulpa ossiculum durum continet: at in eo quem Clusius Byzantio, Tarbison curmasi, id est, Trapezuntiae dactyli nomine accepit, non nucleus, sed semina bina aut terna, plana, spadicei coloris, nullo putamine includuntur.

**XII. Cerasus pumila.**

**an Cerasus Macedonica, Plinij.**

**Chamæcerasus, Matth. Lob. Dod. cui & Cerasus 4. Lugd. Clus. pan. & hist. Cast. Tab. Ger.**

**Chamæcerasus sylv. Cord. in Diofco.**

**Cerasus humilis, Gef. hort. cui & Chamæcerasus, vel Macedonica Cerasus Plinij.**

**Chamæcerasus urbana, Gef. ad Cordi histor.**

In horto Stutgardiano, Cerasum pumilam, sesquicubitali, fructu acidissimo, folijs quam in Austriaca à Clusio picta, majoribus & longioribus, observavimus, an hæc Cerasus Macedonica, Clus. hist.

**XIII. Cerasus racemosa hortensis.**

**Cerasus racemosa, Matth. Lugd.**

**Cerasi genus quintum, Dod.**

**Cerasa uno pediculo plura, Lob. Lugd. Ger.**

**Cerasa uno pediculo binos aut ternos fructus ferens, Cam.**

**Cerasiæ species 1. pediculo plura producens, Cast.**

**Cerasia uno pediculo plura, Tab.**

Aliquibus ab uno pediculo terna, quaterna, quinave poma dependent: quædam racematum utæ modo propendent: hinc duæ figuræ in Lugdunensi historia proponuntur, sub

**Ceraso ex uno pediculo plura, &**

**Ceraso racemosa.**

XIV. *Cerāsus racemosa* sylv. fructu non eduli.

*Cerasi* folijs arbuscula sylv. Gefn. hort.

*Pseudoligustrum*, à quibusdam *Pseudoagnos*, (id est *Virex falsa*) Dod.

*Cerāsus racemosa*, Adv. Lob.

*Cerāsus avium racemosa*, Lob. ico.

*Cerasia racemosa rubra & nigra*, Tab. Ger.

*Padus* Theoph. Lugd.

*Cerāsus avium*, Clus. hist.

*Cerāsus racemosa* sylv. Eyf.

an *Cerāsus* sylv. Cæs.

*πάδω* (*padus*) gaudet vehementer umbrosis. Theoph. 4. hist. 1. nec plura habet.

XV. *Ceraso* affinis.

an *Cerāsus sylvestris*, Trag.

*Mahaleb*, Matth. Cast. Lugd. Tab. Clus. hist. & append. 2. lib. 1. Cam. qui addit *Chamæcerasum petraeam*, aut *Petrocerasum* Gesnerum vocare.

*Macalep Arabicum*, *Cerasi* sylv. genus, Bellon. cult.

*Macholebum*, Cord. hist.

*Chamæcerāsus Dalechampi*, Gefn. ad *Cordum* & hort. cui & *Chamæcerāsus Syriaca*.

*Macaleb*, Ang. Lob.

*Vaccinium* Plinij, Lugd.

Aliquibus Theophrasti *λακάρω* (*Lacara Ga-* zæ, aliqui *Lacatham* legunt) quam 3. hist. 4. in Macedonia plana etiam descendere: & 3. ejusdem 7. auctu facillimam esse scribit. Sic & Plinij lib. 16. cap. 18. *Vaccinia*, quæ scribit in aquosis provenire, Italiae in aucupijs satam: Galliae verò etiam purpurea, tingendi caula, ad servitiorum vestes. Verum & Theophr. & Plinius brevior est, quam ut aliquid statui possit.

Fructus ex Syria advehitur, quàmvis in Gallia, Bellonius: in Italia Anguillara: in Helvetia Gesnerus (apud nos rarius) observarit.

## CHAMÆCERASUS SPURIA.

I. *Chamæcerāsus alpina* fructu rubro gemino, duobus punctis notato.

*Chamæcerāsus montana*, Gefn. ad Cord. hist. & hort.

*Periclymenum rectum* vel mas, Eid.

*Chamæcerāsus alpigena*, Adv. Lob. Lugd.

*Xylosteum alterum*, Dod. Eyf.

*Periclymenum rectum* 3. Clusij hisp. (at 4. in hist.) Lugd. Tab.

*Chamæcerāsus*, Cast.

*Idæa ficus nostra*, vulgo *Frangula*, Lugd.

an *Corno similis* frutex in alpebus, quæ *Cornus* foemina Theoph. etiam dici posset, Cæs.

Fructus aliquando geminus in uno longo pediculo rubens, aliquando ex toto coeuntibus seminibus in bipartito conceptaculo, in quolibet duo aut tria sine osse.

*Ficum Idæam*, *συλὴν περὶ τὴν ἰδέαν* Theoph. hist. 17. & Plinij lib. 15. cap. 18. historia Lugd. censet.

*Xylostium* alijs, quasi lignum osseum, ob ligni duritiem dicitur.

II. *Chamæcerāsus alpina* fructu nigro gemino.

*Periclymenum rectum* 2. Clus. pan. & hist. Lug.

*Periclymenum nostrum* 2. Sabaudicum, Tab.

III. *Chamæcerāsus montana*, fructu singulari caeruleo.

*Periclymenon primum*, Clus. pan. rectum 3. Eid. hist.

*Periclymenum rectum* 4. Tab.

IV. *Chamæcerāsus dumetorum* fructu gemino rubro.

*Halimus*, Trag. Lon.

*Caprifolij* tertia species, Dod. gal.

*Periclymeno cognatus* frutex, Gefn. hort.

*Xylosteum*, Dod. Thal. Cam.

*Periclymenum alterum Allobrogum*, *Cornus foeminae* effigie, Adv.

*Periclymenon Allobrogum*, Lob.

*Peryclimenum rectum* fructu rubro, Clus. pan. rectum primum, Eid. hist.

*Periclymenum rectum*, Tab.

*Periclymenum tertium*, Lugd.

*Xylostium* floribus albis vulgatus, Eyf.

Fructus gemelli instar exiguorum *Cerasorum*, plerunque æqualis magnitudinis; sæpe altero eorum minore, eo tamen pleno remanente.

V. *Chamæcerāsus folio aceris*.

*Chamæcerāsus montis Generosi*, Gef. hor. Lug.

## STYRAX ET NARCAPHTHON.

Σ *Τίραξ* Diosc. l. 1. c. 79. *lacryma* est arboris malo cotoneo similis: & Theop. h. g. hist. 7. *Styrax* ad unguenta utilis est: plura non habet: & Plin. l. 12. c. 25 proxima *Judea Syriæ* supra *Phaniceem* *Styracem*: gignit: arbor est eodem nomine cotoneo malo similis, *lacryma* &c. sed de *lacryma* inter resinas.



I. *Styrax folio mali cotonei.*

*Styrax*, Matth. Ang. Lac. Bellon. Lon. Adv. Lob.  
 Cast. Lugd. Tab. Rauv. Volf. Cam.  
*Styrax* arbor, Gesn. hort.  
*Styrax* liquida, Cast. ico.

Serapio fructum tribuit candidum avellanae  
 majorem, & ex interno nucleo oleum exprimi.

II. *Styrax folio aceris* : in Prodomo de-  
 scribitur.

III. *Styrax rubra officinarum.*

*Styrax* rubra, Græcis hodie Maurocapno,  
 Bellon.

Nascapthum, Cord. hist.

Tegname, Italis: Bufuri, Siculis, Guil.

Cortex est arboris, quem Thus Judæorum &

*Thymiamia* vocant, quo Judæi in suffimigijs  
 frequenter utuntur.

an *Νάρκαρθον* sive *νάρκαρθον* Dioscoridis libr. 1.  
 cap. 22. quod ex India deferretur corricosum,  
 mori libro simile, quod jucundi odoris gratia  
 suffitur.

*Narcaphthon* Dioscoridis, Lignum aquilæ  
 Lusitanis dici, Amatus scribit.

Nucis moschatae extrinum corticem, *Narca-*  
*phthum* Diosc. censet, Cæf.

IV. *Frutex rotundo argenteo folio Cyani*  
 flore.

Pulcherrimus frutex, Honor. Belli ep. 2. ad Cluf.  
 à quo ex Creta accepimus.

*Cyanus* fruticosus Candia, Ponæ Ital.

## A R I A E T H A M A M E L I S.

**A**ria Theoph. 4. hist. 8. similis ex toto est Lauro: 5. hist. 4. materies durissima est, ut Roboris: 5. hist. 5. &  
 natura perpetua est: 5. hist. 10. carbonis optimos ejus spississima materies facit.

I. *Alni effigie lanato folio major.*

*Aria* & Metallum Italorum, Ang. Lugd.

*Sorbus torminalis* Gallorum *Alisier*, Bellon.

*Sorbus alpina* vel pilosa, Gesn. hort.

*Aria* Theoph. effigie *Alni*, Adv. Lob.

*Aria* Theophrasti, Tabern. Cam. qui lanatam  
 Cordi vocat.

*Sorbus Aria* cognominata, Cluf. pan. & hist.

*Sorbi torminalis* alterum genus, Cæf.

II. *Alni effigie lanato folio minor.*

*Αμamelις* & *ιμομυλις*, Athenæo.

*Diospyros* quæ *Sorbis* cognata videtur, Gesn. h.

*Pyrafter* Idæus vel *petræus*, Eid. append.

*Myrtomelis*, Eid. in epist.

*Codomalo* Cretensium, Bellonio.

*Amelanchier* Galloprovinciæ montanæ, Adv.

*Amelanchier*, Lob.

*Vitis* Idæa 3. Cluf. pan. & hist. 4. Tab.

*Hamamelis* Athenæi, Lugd.

*Bagolæ* quasi *bacculæ* alterum genus, Cæf.

Duplex est, alia folijs obtusis & latioribus:  
 altera acuminatis & angustioribus.

## C O T O N A S T E R E T C H A M Æ M E S P I L U S.

I. *Cotonafter folio oblongo serrato.*

an *Agriomelea*, Bellonij.

*Cotonafter* forte Gesneri, Cluf. pan. & hist.

II. *Cotonafter folio rotundo non serrato.*

*Cotonafter* & *Cydonago*, Gesn. in epist.

*Epimelis* altera, Lugd.

III. *Chamæespilus Cordi*, Thal. Cam.

*Chamæespilum*, Gesn. ad histor. Cordi, Adv.  
 Lob. ico.

*Chamæespilus* Gesneri, Cluf. pan. & hist.

*Epimelis*, Lugd. qui Dioscoridis vult, & *Me-*  
*spilum* Anthedon, Theoph. 3. hist. 12.

Forte eadem cum priore: quamvis illa folijs  
 sit majoribus, nec baccis adeo rotundis.



# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER DVODECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

MESPILUS; BERBERIS; GROSSULARIA ET RIBES; SAMBUCUS ET EBULUS; FICUS; SYCOMORUS; MORUS; ARBUTUS; Laurus; Tinnus; Laureola; Chamelæa; Thymelæa; Cneoron & Nerion.

### MESPILUS.

**M**espilus arbor, Græcis μέσπιλον & μεσπίλη: fructus μέσπιδον dicitur. Cujus Dioscorides l. i. c. 169. & 170. duo genera facit, alterum quod à nonnullis Αἰώνια vocatur, spinosa est, folys similibus ποφάνων: fructum fert ex quo malo similem, suavem, continentem tria oscula, à quibus nonnulli τριγεννα appellat. Alterum genus in Italia nascitur, quod nonnulli Σετανία, alij Setanium nominant: arbor est malo similis & folys, nisi quod minoribus: habet verò fructum rotundum, esculentum, latiore umbilico. At Theoph. 3. hist. 12. Mespili tria genera, αἰθαλὼν, σατανία, & ἀνθηδονίς (anthedon, satanea, gallica) ut idæi dividere consueverunt. Fert Satanea fructum grandiozem, candidiorem, laxiorem & qui nucleos habet molliores: reliquis minor est fructus, odoratiore, &c. flos omnibus Amygdala, sed utcunque pallidus. Anthedon haud procera est arbor, in orbem comosa, folio valde fissio, Apio in extrema parte simili, majoribus incisuris rigido, &c. fructu ex longo ac tenui pediculo pendulo, qui antequam folia decidant vehementer rubet, &c. Plinio l. 15. c. 20. Mespilus tria genera, Anthedon, Setania: tertium degenerat, tamen si Anthedoni similis est, quod Gallicam vocant, &c.

I. Mespilus Germanica folio laurino non ferrato: sive Mespilus sylvestris.

Mespilus Setania sive Satania, Theoph. & Plin.

Mespilus altera quæ Epimelis Dioscoridi, sic dicta, quod ubi sponte provenit semper malum agrestem vicinam habeat.

Mespilus, Brunf. Trag. (qui Cratægum Theop. cenfer) Tur. Gef. hort. Lon. Ad. Lob. Dod. Cæf.

Mespilus altera, Matth. in edit. cum magnis figuris, Dod. gal.

Mespili altera species sponte proveniens, Cord. in Diosc.

Mespilus vulgaris, Clus. hist. Cam. ep.

II. Mespilus folio laurino major.

Mespilus fructu præstantiore, Trag.

Mespilus altera sativa, Cord. in Diosc.

Mespilus oxyacantho insita, Dod.

Mespilus domestica, Lob. ico.

Mespilus setanea, majoribus vulgari fructibus, Camer.

Mespilus setanea insitione mitior facta, Lugd.

Hæc insitione in Pyrum sylvestrem, maxime Cynosbatum, sive Oxyacanthum, miscetur,

pomum majus edit, nec spinis horret: & singula mala, ut & prioris quinos nucleos completuntur, nisi fortè interdum præter naturam, aut plures aut pauciores contineat.

III. Mespilus Italica folio laurino ferrato.

Mespilus altera, Matth. edit. 2. & ico. Lac.

Mespilus setania, Ang. Lugd.

Mespilus altera, Cast.

IV. Mespilus Virginiana colore rutilo.

Mespilus, qui colore est rutilo ut cerasa & valde dulcis, part. 1. Ind. occid.

V. Mespilus fructu albo.

Mespilus colore albo mali magnitudine, Scab. Lugd.

VI. Mespilus Apij folio laciniato.

Mespilus Aronia, Dioscoridis.

Anthedon Theoph. & Plinij.

Paliurus Africana, Ruellio.

Mespilus prima, Matth. Lac. Cast.

Mespilus Aronia, Dod. ut: Ang. Bellon. Gef. hort. Adv. Lob. Lugd. Tab.

Mespilus propriè dicta, quæ tricocco, Cord. in Dioscorid.

Paliurus Africana vinosa, Gesn. hort.

Azarolus, Cæs. Cast.

an Mespilus Gallica, Cam.

Hæc spinosa est, sed ubi magis domestica, spinis caret, etiam Theophrasto monente.

VII. Mespilus Apij folio sylv. non spinosa, sive Sorbus Torminalis.

Sorbi quartum genus, Trag. Cord. in Diosc.

Sorbus torminalis, Matth. Cord. hist. Gesn. hort.

Turn. Dod. Lon. Adv. Thal. Cæs. Tab. Cam.

Sorbus torminalis Plinij, Lob. Clus. hist.

Cratægus Theophrasti, Ang. Lugd. qui duplicem figuram habet, sub eodem titulo.

Mespili Aroniæ sylv. species, Gesn. hort.

Sorbi sylv. aliter species, Cast.

Hypomelides Palladij, quibusdam.

Κράταιρος ἢ κράταυρον, Theophrasto 3. hist. 15. folium habet Mespili (scilicet Aroniæ) rigidum, sed majus, latius, longius, ejus modo laciniatum: arbor est non admodum procera, nec crassa: lignum varium, solidum, flavum, &c. fructus ejus est magna ex parte rotundus, qui maturescens flavescit & utrumque nigrescit, succo & gustu mespili: quare sylv. Mespilus videri potest. Plinio l. 15. c. 21. Sorborum 4. genus torminale appellant, remedio tantum probabili, assiduum proventu, minimumque pomo, arbore dissimili, folijs pene Platani: & l. 27. c. 8. Theophrastus arboris genus intelligi voluit Cratægonon sive Cratægona, quam Itali Aquifoliam vocant.

VIII. Mespilus apij folio sylv. spinosa sive Oxyacantha.

Ὠξυάνθη arbor est similis Pyraastro, minor

verò & spinosa valde: fructum fert Myrto similem, plenum, rubrum, fragilem, intus nucleum habentem, radicem multifidam & profundam, Dioscoridi, l. r. c. 122.

Mespili 3. genus Plinij videtur: interdum ait, degenerat, tamen si Anthedoni similis est, quod Gallicum vocant. Theophrastus Anthenoidem nominat, quasi speciem Anthedonis.

Cynosbates Theophrasti, Trag. Lon.

Oxyacantha, Matth. Lac. Tur. Bellon. Ad Lob.

Rauvvolff. Cæs. Lugd. Tab. Cam. Thal.

Oxyacantha Dioscoridis, Dodon. gal. Cord. in Diosc. (& Latinis veteribus simpliciter Spina) Gesn. hort.

Sorbus aculeata, Cord. hist.

Spina acuta quorundam, spina alba vulgo, Ang.

Spina appendix Plinij (& ejusdem Spina simpliciter) Gesn. hort. Clus. hist. cui & Oxyacantha vulgaris.

Mespilus sylvestris, Cast.

In hanc Mespilus optimè inseritur.

IX. Oxyacantha Dioscoridis, sive Spina acuta pyri folio.

Oxyacantha legitima, Ang.

Pyracantha, Adv. Lob. Clus. hist.

Rhamnus tertius Diosc. Lob. ico.

Acuta spina, Cast.

Uva ursi Galeni, Lugd.

X. Mespilo similis fructus venenatus.

Arbusculæ in littore, quarum poma mespilis nostratibus similia, Lerio part. 3. Ind. occid. c. 12.

XI. Mespilo similis fructus fuscus.

Fructus octavus ex navigat. Batav. Clus. exot. lib. 2. cap. 15.

## B E R B E R I S.

**A**N apud Theoph. 3. hist. 17. arbor circa Idam preveniens, quam Colyteam vocant, genus aliud fruticosum, ramosum, alosum, invenu rarum, folio laurino, ulmeo simili, oblongius tamen: colore parte altera herbido, tergo autem albido, nervosoq, cortice non levi, sed quasi vitis vestitur: ligno duro spissoq, radices majorem in modum flavæ, &c. Spina appendix est appellata, quoniam bacca puniceo colore in ea appendices vocantur. Plin. lib. 24. cap. 13.

I. Berberis dumetorum.

Berberis, Brunf. Dod. gal. Turn. Gesn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. Cast. Lugd. Rauvvolff. Cam. cui & Amirbaris Avicennæ.

Berberis vulgaris, Bellon. cult. Clus. hist.

Spina acida, Brunf. 4. Dod.

Oxyacantha, Hermolao, Ruel. (cui & Spini vintera) Trag. Fuch. Eyft.

Oxyacantha Galeni, non Dioscoridis, Cord. in

Dioscorid. Tabernæm.

Crespinus, Marthiol. Cæsalp. cui & Ribes Serapionis fortè.

Oxyacanthus Galeni, Cam.

II. Berberis sine nucleo.

Berberis ~~καρπο~~, Clus. hist.

III. Berberis alpina Cretica.

Lycium Creticum, Hon. Belli epist. 1. ad Clus. & Ponæ: hoc ab utroque accepi.

## GROSSULARIA ET RIBES OFFICINARUM.

**T**heophrastus 3. hist. 17. post Rhamnos, lo<sup>o</sup> (aquum Gaza veris) vel ut alij *afos* memorat, his verbis: *Aequorum alia candida, alia nigra: & flos fructusq; utriq; pro ratione discriminis, alius candidus, alius niger: nonnulli etiam mediū quodammodo sunt, quibus flos in purpura candicans: nec enim fulvus, nec exalbidus est, &c.* Ison candidum, nonnulli *Uvam crispam* existimant: hac ille. *Uvam crispam ab intortis & veluti crispis folijs & acinis quos producit, vocant.*

I. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris.

Uva crispa. Trag. Dod. ut: Fuch. Ges. hort. Lon.

Ad. Lob. (cui Vitis precia Plinij) Tab.

Uva spina, Matth. Lac. Cæs. Cast.

Grossularia, Ruellio, Bellon. Thal. alba, Lugd.

Crispina uva, Cord. in Diosc.

Rocella Cardano l. 6. de var. rerum.

Ceanothus spina, Theoph. 4. hist. 11. vel Ceanothus asper, Ges. horr.

Grossularia vulgaris, Clus. hist.

Fructus maturus flavescit, nonnunquam subrubet.

II. Grossularia spinosa fativa.

Uva crispa fructu Cerasi magnitudine, Ges. hor.

Grossularia majore fructu, Clus. hist.

III. Grossularia spinosa fativa altera folijs latioribus.

Grossul. fructu obscurè purpurascens, Clus. hist.

Est & fructu ex atrocaeruleo, frutice leviusculis spinis armato; alia fructu hirsuto.

IV. Grossularia simplici acino caeruleo non spinosa, nunc in hortis habetur.

V. Grossularia multiplici acino sive non spinosa hortenlis nubra, sive Ribes officinarum.

Ribes hortenle, Trag. vulgaris fructu rubr. Eyf.

Ribes vulgaris domestica, Matth. Cast.

Ribes, Fuch. Lon. Lac. Tab. rubra, Ad.

Ribes vulgo, Ang. Bellon. Cæs.

Uva urli, Dod. gal.

Cernothus levis, Ges. hort.

Ribesiam fructu rubro, Dod.

Ribes Arabum, Lob.

Grossularia rubra, Lugd.

VI. Grossularia hort. majore fructu rubro.

Ribes rubro flore, folijs & fructu majoribus, Clus. pan. & hist.

Ribes baccis majoribus, Camer.

Ribes major fructu rubro, Eyf. ter.

Cultura aliquando in arbusculam abit, & acinis avellana majoribus acidissimi saporis Florentiæ visam, Gesnerts lib. de hortis refert.

VII. Grossularia distinctis baccis.

Ribes monocarpus, Clus. hist.

VIII. Grossularia hortenlis fructu margaritis simili.

Ribes vulgaris fructu albo, Clus. hist.

Ribes fructu albo, Eyf.

IX. Grossularia vulgaris fructu dulci.

Ribes candidioribus folijs, Lob. obs.

Ribes vulgaris fructu dulci, Clus. pan. & hist.

Ribes minor fructu rubro, Eyf. ter.

X. Grossularia sylv. rubra.

Ribes sylv. Matth. Ges. app. Lon. Cast. Cam.

Ceanothi levis genus sylv. Ges. hort.

Grossulariæ rubræ genus sylv. Lugd.

XI. Grossularia non spinosa fructu nigro.

Ribes sylvestre, Trag. Thal.

Ribes nigrum, Dod. gal. nigra, Ad. Lob. icon. Tabern.

Amomum falsum & Pseudoamomum, Ges. hor.

Ribesium fructu nigro, Dod.

Ribes vulgaris nigro fructu, Clus. hist.

Ribes baccis nigris, Cam. fructu nigro, Eyf.

Frutex Ribi similis fructu nigro, an arbor Piperis in Italia Plinij. myrto similis, Cæs.

Grossularia nigra alijs P. pirella, Lugd.

Variat baccis minoribus & majoribus.

XII. Ribes Arabum folijs petasitidis.

Ribes Arabum cum suis capteolis, Rauvolf. & Lugd. app.

Ribes legitima Arabum. Clus. hist.

Ribes Serapionis, Cam. hort.

An idem cum hac,

Ribes Serapionis folijs oxylapathi, Bellonio de coniferis, Dodon. & Lugd.

XIII. Ribes Rauvolfij congener planta, Clus. ex. l. 4. c. 21.

## S A M B U C U S.

**S**ambucus, qua Græci *σάνιβος*, sic videtur Hermolao, à Sambuca, musico instrumento, quod, aly pestida, alij magadin vocant: & hoc ab auctore cui nomen Sambyx fuerit: Sabucus Q. Sereo.

Genera

Genera duo Dioscoridi l. 4. c. 174. & 175. unum quod in arborem assurgit, &c. alterum genus χαμαίαντι vocatur, idq. humile atq. longè brevius, & ad genus herbaceum accedens, &c. Theoph. 3. hist. 13. Sambucum arborem pluribus verbis descripsit: verum utriusq. descriptiones, tanquam arboris notissima præterire lubet. Plin. l. 24. c. 8. utriusq. meminit, adiens Sambucum habere alterum genus magis sylv. quod Græci Chamæacten, alij helion (id est, palustrem) vocant multo brevius, &c.

I. Sambucus fructu in umbella nigro.  
Sambucus, Brunf. Matth. Fuch. Dod. ut: Cord. in Diofc. Bellon. Gef. hort. Tur. Lac. Lon. Lob. ico. Cæf. Tab.

Sambucus vulgaris, Trag. Thal.  
Sambucus fructu in umbella, Ang.  
Sambucus domestica, Cast.  
Sambucus campestris sive vulgaris, Cam.

Arbor aliquando, aliquando frutex est.

II. Sambucus fructu in umbella viridi.  
Sambuci aliud genus, Trag.  
Sambuci altera species, Dod. ut:  
Sambucus fructu albo, Lob. ico.

Variat baccis viridibus, in alijs albis, vel ex albo florecentibus.

III. Sambucus racemosa rubra.  
Sambucus sylv. Trag. Lon.  
Sambucus montana, Matth. Gef. hor. Cast. Cam.  
Sambucus racemosa, Ang.  
Sambucus tertia, Tur. 4. Dodon.  
Sambucus montana racemosa, Ad. Lob. ico.  
Sambucus montana seu ἐγυβροσάφυλλοι, Thal.  
Sambucus sylv. sive montana, Lugd.  
Sambucus cervina (quod hujus folia cervus maximè experat) Tab.  
Sambuci genus aliud minus, Cord. in Diofc.  
Sambuci alterum genus, Cæf.  
an μυγόν, Theoph. l. 3. c. 4. montibus autem propria, quæ in planis nasci nequeunt, abies, pinus, picea, aquifolia, tilia, carpinus, pygus &c. quam postremam arborem Gaza in sua transl. omisit.  
an Sambucus montana Plinij, quam in montibus nasci tradit.

IV. Sambucus laciniato folio.  
Sambus folijs laciniatis, Lob. Lugd.  
Sambus laciniato folio, Dod.  
Sambucus laciniata, Tab.

V. Sambucus humilis sive Ebulus.  
Chamæacte, Dioscoridi.

Ebulus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Bellon. Ad. Lob. Cast. Cæf. Lugd. Tab.  
Ebulus sive humilis Sambucus, Dod. ut:  
Ebulus sive parva Sambucus, Cord. in Diofc.  
Ebuli & Sambuci alterum genus, Lon.

VI. Sambucus humilis, sive Ebul. fol. laciniato.  
Ebulus laciniata, Ponæ Ital. qui ex horto Nobiliss. Contareni ad me misit.

VII. Sambucus aquatica flore simplici.  
an ἐρώπαλλοι, Theoph. 3. hist. 7. inter sylvestria radicibus multis constat: & 4. hist. 1. & umbrosis locis vehementer gaudet, veluti Taxus.  
Opulus, Ruellio.

Aceris species tertia, quæ Platanus aquat. Ang.  
Sambucus aquatica, Trag. Matth. Lob. ico. Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.  
Sambucus palustris, Dod. ut: Cæf. fœmina, Cam.  
Lycostaphylon (id est, uva lupina) fœmina, Cord. hist.

Sambucus palustris, vel aquatica sylv. quibusdam Chamæplatanus, Gef. hor.

VIII. Sambucus aquat. flore globoso pleno.  
Lycostaphylus mascula, Cord. hist. Gef. hor.  
Sambucus palustr. vel aquatica hortensis, Gef. h.  
Sambucus rosea, Ad. Lob. ico.  
Sambucus palustris 2. Dod. mas, Cam.  
Sambucus aquatica cultu densissima, Lugd.  
Sambucus aquatica polyanthos, Tab.  
Sambucus rosea, Ger. Eyfster.

Floribus est pilæ in modum conglobatis, & communiter albis: rarius purpurei coloris, quæ Sambucus palustris hortens. flor. purpurei coloris, Gef. hort.

Sambucus rosea fl. purpureo multiplici, Tab.  
Sambucus rosea flore purpurante, Ger.

## F I C U S

**F**icus arbor, οὐνὴ Græcis, & fructus οὐνὴ appellantur. Genera, Dioscoridi lib. 1. c. 183. & 184. & Galeno 8. simpl. duo sunt: alia ficus est sativa, οὐνὴ ἡμερῶν: alia sylvestris, οὐνὴ ἀγρία ἡ ἰερὴς, Plinio lib. 15. cap. 19. Caprificus. Theophrastus de Ficu, in libris de historia & causis plantarum, plurima habet: qui & Agyptia & Indica & Cypria (ut & Dioscorid.) & Caprifici meminit. Plinius, qui lib. 15. cap. 18. Ficum genera viginti novem proposuit: vel à figura, vel à gente, vel authore derivata. ficus inter pômorum genera referens: & quadam pyris magnitudine amula esse scribens: quæ omnia, cum brevitate studeamus, præterire lubet. Verum primitiæ fructus,

fructus, tam sativa, quam sylvestris *δρυός*, Latinis *Grossus* nominatur: ut *ficus sicca* in furno, aut sole exsiccata, quæ quibusdam passa dicuntur, *ἰχάδus*, Latinè *Carica*, *καρπία* *Aegmetæ*: quam vis *Carica ficus* peculiaris species sit in Syria provenientis, ut ex Plinio colligere est. Sic ipsa grana in fructu, *Græci* *καρπιδας* *frumenta* Plinius l. 15. c. 19. alij *ficaria* vocant. Hujus & *Mori solijs* *Antiocha Bombyces* ali, & *alba mori arbores* & *ficus pumilio* ejus nomine coli, Bellonius scribit.

I. *Ficus communis.*

*Ficus*, Brunf. Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Cord. hist. Bellon. Gefn. hort. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Rauvvolf. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger.

*Ficus sativa*, Fuch.

Fructus forma & colore differunt, nonnulli longiores, alij breviores: alij pyri forma, alij sessiles sunt, alij inter hos medij. Colore, albæ, pallidæ, virides, luteæ, purpureæ, subrusæ, ex cæruleo saturatæ purpureæ, nigrae, aliæ deniq; vario colore spectantur. Sunt & albæ, quoad pulpam interiorem. Siccarum sive passiarum, triplex differentia adfertur, prima in sportheis, magnisq; corbibus: secunda, in cistis & similibus sportis lauri folijs immixtis: tertia, in parvis & turbinatis corbibus è sparto contextis. *Malsilien*ium cognomento, cæteris magnitudine quidem inferiores, saporis verò generositate superiores. Sic in regno Congiano, eximiae magnitudinis, magnaq; copia: maximæ verò in Insula S. Helenæ. Tria *Ficum* genera (ut rectè Scaliger in Theoph. 5. caus. plant. 1.) fert *Ficus*: unum, valde tempore præcoem: quem idcirco *Græci* *πρόδρομον* quasi præcursores vocarunt, atque is edendo est, *Bolas Veneti* vocant, *Galli Florones*: *Columella*, communi voce, priorem fructum: *Plinius*, præcoces. Aliud genus eorum est, quod postea prodit, cujus duæ species sunt: una quæ maturatur, *Ficum* dicimus, *Græci* *εὐκων*: altera semper cruda est, & prius cadit quam absolvetur: eos *Plinius* abortus vocat: alio nomine *Grossi* dicuntur, *Græci* *δρυόδες* vocant.

Variant etiam *Ficus* in India pro regionum diversitate: nam in Provincia bonæ spei, fructus perpetuò ferunt (part. 8. Ind. Occid.) & in Peru summa earum ubertas (par. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 31.) Addit *Josephus Acoſta* l. c. in India Occidentali diversas esse valles, quæ integro anno fructus promant: sed admiratione dignius esse quod in Peru arbores reperiantur, quæ uno semestri ex uno latere, altero ex alio fructus protrudant. Sic in Mala 13. miliariorum intervallo à civitate de Los Reyes, *Ficus* est, quæ parte dimidia, quæ Austrum spectat, fronses & fructus fert, quando in montanis æstas viget:

altera verò pars, contrario anni tempore, cum in planis æstas est, idem cap. 32.

*Ficus arbores* Monarde referente, ex Hispania in Peruanas Provincias delatæ, plurimos & optimos fructus gestant: & ut folia isthuc non deponant, Deus singulariter voluit, quo semper præfens remedium adesset contra insecta, quæ *Aranæ* appellantur, quorum ictibus virulentis, lac ex folijs *Ficus* manans, bis tæve in vulnus instillatum, remedio est.

II. *Ficus humilis.*

*Ficus pumila*, Matth. Dod.

*Chamaeficus* sive humilis *ficus*, Lob.

*Chamaſyce arbor*, Lugd.

III. *Ficus sylvestris* Dioscoridi.

*Caprificus* vocatur è sylvestri genere *Ficus*, inquit *Plinius* libr. 15. cap. 19. nunquam matureſcens, sed quod ipsa non habet alijs tribuens, &c.

*Caprificus*. Ang. Cord. in Diosc. & hist.

IV. *Ficum specie fructus Peruanus.*

*Papaie* fructuum genus *ficum* specie, 6. part. Ind. Occid. 18. qui & *Ficum* exiguorum *Tunne* nominatarum meminit.

V. *Ficui similis arbor fructu oblongo.*

*Ficus Nigritarum*, Thevet. Lugd.

Est folio *Ficus*, fructu pedes duos instar *Cucurbitæ* longo, quem tanquam *Melones* esunt.

VI. *Ficus prædictæ similis fructu magno Meloni par.*

*Chivef*, quod Syriacè *Ficum* significat, in Insula *Zipangu*, Thevet. Lugd.

VII. *Arbor Malacensis multis radicibus prædita.*

*Arbor* contrarijs prorsus facultatibus donata: nam quæ solem orientem spectat, adversus omnia venena valet: quæ verò occidentem, venenum præsentaneum sunt. *Ignatio Franciscano* in itin. novi orbis: ex quo Clus. in Acoſtam cap. 41.

VIII. *Ficus Indica* folijs Mali cotonei similibus, fructu ficubus simili in Goa.

*Ficus Indica* Theophr. 4. hist. 5. *Indica*, ait, regio arborem *Ficum* vocatam sortitur, quæ è ramis

lis, sed ex anniculis, atq; etiam verustioribus: illæ se terræ conjungentes, ceu sepem circa arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiam morari homines solent, &c. Plinio l. 12. c. 5. Ficus Indica exilia poma habet: ipsa se semper ferens, vastis diffunditur ramis, quorum imi in terram curvantur, &c. & l. 7. c. 2. sub una Ficu turmæ conduntur equitum.

Arbor Indica admirabilis, Straboni.

Ficus Indica, Clus. ex. Lugd. Tab.

Mangle forte, Oviedo.

an Mangen, Ferd. Lopez.

Arbor de rayz, id est, radicoſa, Linsc. part. 4. Ind. Orient. 14. & fig. 12.

Enzada, Pigafettæ, part. 1. Ind. Or. c. 4.

Arbor Goa sive Indica, Ger.

Ex cortice vestes conficiunt.

IX. Ficus Indica folio spinoso fructu majore.

Ficus Indica, Matth. Dod. ut: Cardano, Lac. Gesl. Lob. Cast. Cæs. Eyf.

Carduus Indicus & Ficus Indiæ, Cl. cor. ad Dod.

Pala sive Ficus Indica, Bellonio.

Tuni ficifera Indorum, Ad.

Ficus Indicæ species, Tune Indorum, Frag.

Anapallus Bellonij, Cam.

Tunes, Oviedo, Card.

Tune, Opuntia, Lon.

Ficus Indica spinosa, Tab.

Tune & Tunas Indorum, Lugd.

Opuntia vulgo habita, Cam.

Tunal in nova Hispania, nonnullis locis Cardii: part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 23.

Tunales qui fructus bonos promunt; & magni qui in India æstimantur, Tunas vocari solent, Idem.

Arbor Nepal: fructus, Nuccti in Insula Cuba, Ferdi, Cortesio, Cardan.

Opuntiam nonnulli credunt, de qua Theoph. 1. hist. 12. sic: huic (Ficui Indicæ) similis est, vel potius quodammodo mirabilis, si qua ex folij radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse ajunt, quæ & esu suavis est. Plinio l. 21. cap. 17. item circa Opuntem, Opuntia est herba etiam homini dulcis, mirumq; è folio ejus radicem fieri, ac sic eam nasci: Alijs Pala Plinij, & Tala Arriano, Guil.

Colore fructus variat, virides internæ purpurei, cerei, albi variegati.

X. Ficus Indicæ grana.

Cochinillia sive Grayn vermiculus sub folio Tunal: part. 8. Ind. Occid. l. 4. c. 13.

Quidam Tunas (id est, fructus) nullos gignunt, sed sub folijs fructum alium Greyn dictum edunt, vermiculum scilicet folijs adhærescentem & tenui pellicula obductum, & hæc celebratissima Indiæ Cochinillia, qua Grayne colorantur, Idem.

Arbor Cochenille, Claud. Dureto.

XI. Ficus Indica spinosa sylvestris.

Cardis seu Tunades sylv. fructum nullum protrudentes: si verò proferant, meris spinis horrent, part. 9. Ind. Occid. l. 4.

XII. Ficus Indica folio spinoso fructu minore. Indorum ferruminatrix, Advers.

Opuntia ostocollos, quos artuum fracturis & luxationibus proſic: de qua & Author hist. generalis Indiarum.

Arbor rupturas consolidans, Ovied. qui suspicatur Carduum Tunes in hanc arborem transmutari.

XIII. Mippi nonnullis Indis Caiahaba, quæ ossium fracturis alligata ea ferruminare solet, Clus. ex. l. 4. c. 14.

XIV. Cereus Peruanus spinosus fructu rubro nucis magnitudine.

Cardui species, quem Christiani Cereum appellant, Oviedo.

Euphorbij arbor Cerei effigie, Ad. Lob. ico.

Euphorbium, Cast. ico.

Cereus spinosus, Lugd. Ger.

Cereus Peruvianus, Tab.

Sripites spinosi hastæ altitudine, Linsc. 4. part. Ind. Orient. fig. 21.

XV. Ficus Indica lævis pilosa: hæc ex Creta missa: eaq; duplex, altera folio rotundo, altera folio oblongo.

XVI. Ficus Indica humilis: hanc ex horto Doctoris Saltzmanni Poliatri & Profess. Argentinensis habeo, quæ pedem vix superat, ramis est reflexis & veluti repentibus, flore magno, luteo: de qua in historia.

Ficus Indica minima, alijs Lichen marinus, vel Opuntia marina, de Bry.



## S Y C O M O R U S.

**Σ**υκόμορον, aliqui etiam συνάμινον vocant, est arbor magna, fico similis, largo succo abundans, folijs Mori: fructum ter quaterve anno proferens, non è summis ramis, sed è caudice ipso ἐκ τῆς ῥίζης id est, caprifico similem, grossius dulciorem, sine granis interioribus, Diosc. l. 1. c. 181. At Theoph. 1. hist. 1. c. 23: συνάμινον ὅτι αἰὶν ἔχει: peculiaris vel maxime ortus, si quis fructus caudici prosiliat, ut Moro Aegyptiae: hanc enim ex caudice ferre nonnulli affirmant: alij grandibus ex ramis eam fructificare: & 4. hist. 2. c. & similis quodammodo moro nostrati est, quippe folio magnitudine aspectuq; proxima: pomum est magnitudine ficus granis internis carens, &c. Plinio l. 23. c. 8. Mora in Aegypto & Cypro sui generis, largo succo abundant, summo cortice desquamato &c. & l. 13. c. 7. eadem fere qua Theoph. habet, Ficum Aegyptiam vocans.

I. Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens.

Sycomorus, Matth. Dod. ut: Lac. Lon. Ad. (sive Moroficus) Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Sycomorus, Ficus Pharaonis, vocant, Bellon. Gesn. hort.

Sycomorus Giumetz appellata, Alpino.

Porthel Theveti. Lugd.

Sycamine Theoph. Cæs.

Ficus Aegyptia, Rauvvolf.

II. Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens.

Συμὴ ὀνύκω γιγνίται, arbor specie differens, quippe quæ Ulmus cum sit, folia Sycamini refert: fructum verò gerit prunorum magnitudine, & quàm pruna ipsa dulciorem, Dioscorides, lib. 1. cap. 182.

Ficui Aegyptiae similis quadantenus, quæ vocatur Cypria ficus in Creta: nam & illa in caudice ipso fert pomum, & ramis cum in crassitudinem adolevere: sed hæc germina emitrit sine ullis folijs radices similia, &c. Plin. l. 13. c. 7.

Ficus Cypria in Sycomori genere, Matth.

Sycomorus in Cypro, Cord. in Diosc.

Ficus cypria, Dioscoridis, Sycomorus Græcorum, Mumeitz Arabum, Rauvvolf. Lugdun. append.

III. Sycomorus folijs minoribus.

Sycomoro similis fructu flavescente sine granis in Mayo insula: 4. part. Ind. or. fig. 19.

IV. Ambulon, Scalig. Lugd. Aruchit insula fert arborem, cujus è cortice fructus exit candidus, saccharite specie, & magnitudine coriandri, Ambulon ei nomen est.

## M O R U S.

**Q**ua arbor Μορέα ἢ συναμύνεα Latinis Morus, fructus μίγρον ἢ συνάμινον Morum dicitur. Diosc. l. 1. c. 180. arbor est nota: at Theoph. 1. hist. 15. Sycaminos (Morus Gaza) serotina germine esse solet, sed nihilo tardius quam alia folia deperdit: 1. hist. 19. succus vinosus est: 1. hist. 21. flores sunt lanuginosi, &c. Plinio l. 15. c. 24. nec alio modo quam pomi magnitudine differunt mora Ostiensia & Tusculana: & l. 16. c. 22. arborum dicta sapientissima, quia novissima urbanarum germinat, nec nisi exacto frigore: quare l. 18. c. 27. cum germinare videris Morum, injuriam postea frigoris timere noli.

I. Morus fructu nigro.

Morus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Turn. Lon. Rauvvolf. Adv. Cæs. Lugd. Tabern. Ger. vulgaris, Cam.

Morus arbor fructu nigro, Gesn. hort.

Morus nigra, Cord. in Diosc. Bellon. Cast.

Morus rubra, Ang.

Morus celsa officinis, Lob.

Celsa quasi excelsa dicitur, ad differentiâ Rubi, cujus fructus etiam Mora, sed bati, dicuntur.

II. Morus fructu albo.

Morus alba, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. Adv.

Cast. Lugd. Cam. Tab. Ger. Rauvvolf. cui Tut Tripolitanis.

Morus alba, Gallis perperam Sicomorus Bell.

Morus candida, Cord. in Diosc. Dod. Lob.

Morus primum ex Hispania in Indiam propter bombyces illata: part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 32.

Hæc non solum colore & magnitudine, sed etiam sapore à nigris differunt. Folia in hac quando adhuc humilis est, laciniata & altius infecta habet, & non secus in nigra, quæ

Chamæmorus augmenti tarditate tantum à vulgari discrepans, Cam.

## A R B U T U S.

**A**rbutus Dioscoridi l. i. c. 175. *ἀρβυτὸς*, arbor est cydonia a similis, tenui cortice, fructum habens pruni magnitudine, nuclei expertem, quem *μυέκλον* vocant, qui ubi maturuit subfulvus, aut rubicundus est. Theoph. 3. hist. 16. Comarus, quæ nemecylum cibo idoneum ferat, magnitudine non nimium præstat: corticem tenuem amarici similem habet: folium inter ilicem & laurum: flores singulari appendice parte postrema racemati coherent specie quisque myrto oblongo similis, non foliatus, concavus, tanquam orum exsculptum ore aperto. &c. Plinio l. 15. c. 24. pomum duobus nominibus appellant Græci, Comarum & Memecylon, & apud nos alio nomine Arbutus, &c. & l. 23. c. 8. Arbutus sive Unedo, fructum fert difficilis concoctionis.

## I. Arbutus folio serrato.

Arbutus, Matth. Dod. ut: Bellon. Cord. in Dioscorid. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon. Rauvvolff. Clus. hisp. & hist. Cæsalp. Castor. Lugd. Tabern. Camer. Gerard.

Arbutus Theophrasti, non Dioscoridis, Ang. Oinarum & Conarum sive Arbutus & Unedo Theoph. Guil. pap.

Arbutus sive Unedo, Adv. (Galeno perperam Epimelis) Lob.

Arbor vastæ magnitudinis in Creta, cum alibi fruticet, Bellonio monente: & in fructu differentia, quidam parvi mali magnitudine, rubore magis nigricante, mollior & suavior in mediterraneis: quidam avellanæ magnitudine, flavior & asperior, in maritimis tractibus, Cæf.

## II. Arbutus folio non serrato.

Andrachnes, Bellonio.

*Ἀδράχνης* Cretensium, Hon. Belli apud Clusium.

Adrachne Theophrasti, Clus. hist.

*Ἀδράχνης* (Portulaca aliquando, potulaca

Gazæ) folio Arbutu similis est, magnitudine non nimium præstans, cortice albo circumrumpi solito, fructum arbutu similem parit, Theophrast. 3. hist. 16. Adrachne sylv. arbor est, similis Unedoni, folio tantum minore, & nunquam decidente, cortice non scabro quidem, sed qui circumgelatus videri possit. Plin. l. 13. c. 22.

*Arbuti folio exotica.*

## I. Jambolones, Garziæ.

Jambolains, Acoftæ, Frag. Lugd.

Jambolyn, Palud. in Linc. 4. part. Ind. or. 10.

Arbutum simile Myrto, Garz. Frag. folijs Arbuti (folijs oxyacanthæ Paludano) fructu olivæ Cordubensi simili, qui muria conditur.

## II. Carandas, Garziæ.

Caranda, Frag.

Auzuba, Oviedo, Frag. at Clusius, Carandæ ferè similem Oviedum describere, ait.

Fructu est exiguo malo persimili, gratissimo uvarum sapore, qui muriâ, etiam aceto, tum in continente, tum in Balagate conditur.

## L A U R U S.

**L**aphnem, Ladonû filiam formosissimam fuisse, Poëta fabulantur, quam cum Apollo deperiret, & ut potiretur celeri cursu fugienti instaret, ab eo tandem capta, matrem tellurem precatur, ut in sinum se suum reciperet. Voris ac precibus tellus excitata, confestim arborem edidit. Re conspecta deterritus Apollo, arborem gentili nomine donavit, & vulso ramo sese coronavit. *Λάφνη* ipsa arbor, & bacca, *λαφνίδες* Dioscoridi lib. 1. cap. 106. dicuntur, qui aliam folio tenuiore, alteram latiore scribit: & Theoph. (qui hinc inde multa de Lauro habet) 3. hist. 12. alia est tenuifolia, figura similis Sorbi: & 3. hist. 13. latifolia, folium molle atque oblongum habet, sicut Sambucus: & 3. hist. 8. Laurus uvam producit & fructifera est, quanquam non omnis sed genus quoddam, verum sterilis copiosius, quam masculam nonnulli appellant. Plinius lib. 15. cap. 13. Lauri genera tradens, meminit ejus quam Mustacen vocat, folio maximo, flaccidoq; & albicante. Delphica, quæ aquali colore, viridior, maximis baccis è viridi rubentibus. Cypria, quæ folio brevi, nigro, per margines imbricato, crispa. Tini, quæ aliquibus sylvestris Laurus, carulea bacca. Regia, quæ amplissima & arbore & folio. Baccalia, quæ vulgarissima est, baccarumq; fertilissima. Sterilis, quæ triumphalis sit. Affert & alia genera, nomine potius, quam generis societate communicantia.

I. Laurus latifolia *μαυρίτσα* Diosc.

Laurus regia amplissima, Plinio.

Laurus latiore folio, Matth. Cast. Lugd.

Laurus latifolia, Cord. in Diosc. Bellon.

Laurus regia folijs ad Malum Medicam accedentibus, Cæsalp.

Laurus latifolia mas (quæ sterilis & fœmina)

## II. Laurus vulgaris.

(Tab.

Laurus, Brunf. Trag. Dod. gal. Gesn. hort. Lac.

Lon. Lob. Eyft.

Laurus tenuifol. Matth. Cord. in Diosc. Lugd.

Cast. Cam.

**Laurus**

*Laurus altera species, Dod.*

*Laurus vulgarior baccifera, Adv.*

*Laur. mas (quæ sterilis & fœmina) Tab. & Ger.*

*Præterhas Tabernæmontanus pingit*

*Laurum tenuifoliam marem.*

*Laurum tenuifoliam bacciferam, quæ Laurus mas, Gerard.*

*Laurum angustifoliam marem.*

*Laurus quædam floret tantum flore copioso racemoso, uvam Theoph. vocat, & fructum non fert: alia fructum fert, in quo etiam differentia: alterius, in rotundo modicè oblongus est: alterius oblongus, gracilis & utrinq; ovato mucrone turbinatus. Lauros alibi frutescentes, in Achon monte ingentes arbores fieri Bellonius scribit, qui in Græcia quinque genera notavit. Et in Indiæ occidentalis insulis Nicaragua, & nova Hispania Lauri venustæ & editæ exurgunt.*

*Laurus sylvestris.*

*Laurus sylvestris* *αἰπὺν ἄγριον* Theoph. i. hist. 15. inter perpetuò virentes è sylvestribus: Plinius l. 15. c. 30. hujus inter Lauri genera meminit, inquit: Tinus, hanc sylvestrem Laurum aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem, cui cærulea est bacca: & M. Cato lib. de re rust. 8. Lauri sylvatici nomine intelligere videtur.

*I. Laurus syl. Corni fœminæ folijs subhirsutis.*

*Tinus primus, Ang. Cl. hisp. & hist. Cam. Tab.*

*Laurus sylv. five Tinus, Gesn. hort. Cam.*

*Laurus tinus cærulea bacca, Adv. Lob. ico.*

*Tinus, laurus sylv. Cam. ep.*

*Laurus tinus Dalechampi, Lugd. (Lob.*

*Tini aliud genus Corni fœminæ proceritate, Lentago, Cæsalp.*

*II. Laurus sylv. folijs venosis.*

*Tinus secundus Clus. hisp. hist. Lugd.*

*Tinus, Laurus sylv. Dod.*

*Tinus Lusitanica Clusij, Lob. Tab.*

*Thinnus, Cast. append.*

*Laurus tinus Lusitanica, Ger.*

*III. Laurus sylv. folio minore.*

*Laurus sylvatica, Ang.*

*Tinus five Laurus inodora & Italorum Lentago, Bellon.*

*Tinus tertius, Clus. hisp. & hist. Lugd.*

*Laurus regia, Cast.*

*Tinus alter, Tab.*

*Laurus tinus, Ger.*

*Lauri folio exotica.*

*I. Laurifolia Magellanica cortice acri.*

*Cortex Winteranus, Clus. Lugd. Tab.*

*Lauro similis arbor, cortice piperis modo acri in Pinguinum insula: 9. part. Ind. occid.*

*Cortices acerrimi: in 9. part. Ind. occid. addit.*

*Magellanica aromatica arbor, Clus. exot.*

*II. Laurifolia Americana, pomis capitis magnitudine.*

*Cohyne in America Theveto, Lugd.*

*Maraka & Tamaraka fructus, Cl. notis in Garz.*

*Arbor fructu Struthiocameli ovum adæquant, Lerio par. 3. Ind. occid. c. 7. & 12. arbor Choyne.*

*Fructus instat Cucurbitæ, per quæ baculû figunt,*

*& Tamaraka instrumentû fit, Stad in des. Brasil.*

*Ex fructu non eduli pocula conficiunt: Brasiliiani perforato, lapillis aut milio inditis, pro crepitaculo utuntur, quod instrumentum Maraca nominare, Leri cap. 15. refert.*

*III. Laurifolia Javanensis.*

*Mangestans folijs laurinis fructu exigui mali aurei suavissimi, Garzie & Clus. qui addit folia mali formam magis referre.*

*Mangostans prunorum sylv. modo crescit: 4. part. Ind. or. 6. sed figura, quæ tab. 15. habetur est Ligustri Aegyptiaci.*

*IV. Laurifolia Guinenfis.*

*Arbor peregrina ex Guinea, Clus. exot. l. 1. c. 9.*

*Fructus instat mali magni ex flavo spadiceus, nigro polline plenus.*

*V. Laurifolia Guinenfis altera.*

*Arbor peregrina Laurocerasi folio, an Bravas, Clus. exot. l. 1. c. 12.*

*VI. Laurifolia Terenatenfis.*

*Beretinus fructus, Clus. exot. l. 2. c. 17. Tab.*

*Beretinus arbor, Lugd.*

## L A U R E O L A.

**L** Aureola à similitudine cum Lauri folijs dicitur, quæ mas est & fœmina, & à Dioscoride l. 4 c. 148. & 149. sub Chamædaphne & Daphnoide proponi à multis creditur. *Χαυχιδάφνη* virgas promit singulari ramulo constantes, cubitales, rectas, tennes, ac leves: & hinc folia similia Lauro, at leviora multo & tenuiora. & viridiora: fructus verò rotundus rubeus folijs annexus. *Δαφνοειδὲς* fruticulus est cubitalis, ramos multos habens à medio sursum modo flexiles & foliosos: cortex verò circa virgas viscosus valde: folia Lauro similia, at molliora, validiora & fractu contumacia, mordentia & accendentia os & fauces: flores candidi: fructus verò nigri

ubi ematurus: radix superracua. Plinio l. 15. c. 30. est & Chamadaphne sylv. frutex: & l. 24. c. 15. Chamadaphne unico ramulo est, cubitali fere folio tenui, lauri similitudine: semen rubens. At Daphnoidem Lauri genus fecit: sic enim l. 15. c. 30. Daphnoides frutex est ramosus, crassiore ac molliore quam Laurus folio, cujus gustatu accenditur os atque guttur: baccis è nigro ruffis: & l. 23. c. 8. Daphnoides sylvestris Laurus est.

I. Laureola semper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas.

Thymelæa folijs viridibus, Mesuæo.

Laureola, Brunf. Gefn. hort. Dod.

Thymelæa, Trag.

an Chamadaphne, Matth. Lac. Lon. Cast. cui & Laureola minor.

Daphnoides, Dod. gal. Ang. Gef. hor. Tab. cui & Daphnoides alterum genus.

Daphnoides sive Laureola, Adv. Lob. Lugd.

Daphnoides Dioscoridis, Cæs. cui & Mezereon, Arabum.

Baccis rubris dicit Matthiolus: nigris in Silesia Camerarius.

II. Laureola folio deciduo flore purpureo: officinis Laureola fœmina.

Chamælea sive Mezereon, Trag.

Chamælea Germanica, Dod. ut: Cam. Thal.

Daphnoides, Fuch. Turn. Cam. ep. flore purpureo, Tab.

an Daphnoides, Matth.

Rellerfraut Germanorum, Bellon.

Daphnoides nostrum vulgare, Gefn. hort.

Piper montanum, Ang. Gefn. hort.

Laureola major, Cast.

Thymelæa, Cord. in Diosc.

Daphnis alterum, Lon.

Chamadaphne sive pusilla Laurus, Adv.

Mesereum Germanicum, Lob.

Laurus pusilla, Eid. icon.

Laureola fœmina & Daphnoides crocea, Lugd.

Alijs Cneorum album Theoph. alijs ejusdem Daphnoides fructu croci colore: alijs Chamadaphne, id est humilis pumilave Laurus Dioscoridis videtur: licet Dalechampius Dioscoridi ignotum fuisse censet.

Flore est subpurpureo, rarius albo: habetur major & minor, hæcque Piper alpinum minus Gef. lib. de hortis dicitur, ab hoc Cordus voluit granum Cnidium, quod Coccognidium appellatur, colligi: quæ cum maturuerint rubent, resiccata nigricant.

## C H A M E L Æ A

**X**αμelaία, qua Latinis etiam Chamelæa, quasi humilis olea, à similitudine cum Olea, & Oleago, & Oleastella: Mauritanis & hæc Thymelæa, & precedens Laureola, Mezereon dicitur. Dioscoridi l. 4. c. 17. 2. ramos habet dodrantes, frutex est è cremiorum genere, folia habet olea similia ac tenuiora & densa & amara, qua gustum mordent, & arteriam abradunt. At Plinio l. 15. c. 7. Chamelæa frutex surculosus, non altior palmo, folijs Oleastri baccisq;: & l. 24. c. 15.

I. Chamelæa tricoccus.

Thymelæa folijs magnis & tenuibus, Mesuæo.

Chamelæa latifolia vel alba, Serapioni.

Chamelæa, Matth. Dod. ut: Lac. Cord. in Diosc.

Bellon. Gefn. hort. & app. Lon. Clus. hisp. tricoccus, in hist. Lob. Cæs. Cast. Lug. qui figuram

Matthioli & Dodonæi exhibet.

Thymelæa, Ang.

Mezereon Arabum, Ad. Lob. ico. tricoccus, Tab.

Chamelæa vera, Cam.

Flores pallidi, aut lutei: Hispanica candidior & brevior ipsa Gallica.

II. Chamelæa alpina folio infernè incano.

Chamelæa, Cneorō Galeni, Alypias Aëtij, Ang.

Chamelæa alpina incana, Ad. Lob. ico. Lugd.

Chamelæa incana Bononiensium, Lob.

Chamelæa altera, Clus. hisp. & hist.

an Chamelæa altera folio duro, Cæs.

## T H Y M E L Æ A

**Θ**υμαία, qua & Latinis Thymelæa, quasi Tithymelæa, ex Tithymalo & olea mixta facie, quam aliqui Diosc. lib. 4. cap. 173. scribente, Chamelæam aut Cneoron vocant, ex quo Gnidium granum, quod ipsius semen est colligitur: hæc, ut idem, virgas edit speciosas, numerosas, tenues, bicubitales: folijs Chamelæa sed angustioribus & pinguioribus: floribus candidis, ac inter ipsos fructu ceu myrti parvorotundo, &c. Plinio lib. 13. cap. 21. & in quo nascitur granum Gnidium, quod aliqui linum vocant: fruticem verò Thymelæam, alijs Chamelæam: est similis oleastro, folijs angustioribus, gummosi si mordeantur, myrti magnitudine, semine, colore & specie faris, ad medicina tantum usum.

I. *Thymelæa folijs lini.**Thymelæa folijs parvis, Mesuæ.**Chamelæa tenuifolia & nigra, Serapioni.**Thymelæa, Matth. Dod. ut: Lac. Bellon (cui & coccum gnidium) Lon. Clus. hisp. & hist. Lob. Cæs. Cast. Lugd. qui tres figuras apposuit.**Thymelæa, Matth. ep. quoad folia, non fructum qui Chamelææ est.**Thymelæa vera, Gesn. hort.**Thymelæa grani Gnidij, Ad. Lob. ico.**Thymelæa 1. & 2. Tab. nam Matthioli & Clusij figuram exhibet.**an Thymelæa folijs lini, Cam.**Kislap (Casiæ Gaza vertit) Theophr. 6. hist. 2. esse, cujus duo genera proposuit, Guilandinus voluit, alterum Chamelæam, alterum Thymelæam.*II. *Thymelæa folijs acutis capitulo Succisæ, sive Alypum Monspelienfium.**Alypum montis Ceti, sive herba terribilis Narbonensium, Adv. Lob.**Alypum Penæ, Lugd. Tab.**Empetron phacoides, Lugd.**Hippoglossum Valentinum, Clus. hisp. & hist. Tabernæm.**an Alypum, Matth. Lac. Cam. Lugd. & Alipia, Lon. quia Pena dicit apud Matthiolum picturam corruptam esse.*III. *Thymelæa folijs polygalæ glabris.**Sanamunda viridis vel glabra, in Prodomo.**Thymelææ species Myconi, Lugd.*IV. *Thymelæa folijs Chamelææ minoribus subhirsutis.**Sanamunda prima, Clus. hisp. & hist. Rauvvolff. Lob. Cast. Tab.*V. *Thymelæa folijs Kali lanuginosis falsis.**Empetron, Ang.**Sanamunda 2. Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Tab.**Cneoron, Cæs. alp.**Cneoron nigrum Myconi, Lugd.**Sesamoides minus Dalechamp. Lugd.**Phacoides Oribasij quibusdam, Eid.*VI. *Thymelæa folijs candicantibus serici instar mollibus.**Tartonnairæ Galloprovinciæ Massiliensium, Adv. Lob. ico.**Sesamoides majus multorum Dalechampij, Lugd. Sesamoides majus Scaligeri, Tab.**Sunt qui cum sequenti eandem velint.*VII. *Thymelæa tomentosa folijs Sedi minoris.**Sanamunda 3. Clus. hisp. & hist. Cast.**Cneoron Pantij.**Erica Alexandrina, Lob. Tab.**Sanamundas vocat Clusius, Granatenfes Mauritanos imitatus, quia his ad corpus purgandum frequenter utuntur: & quia Thymelææ facultatibus pollent, huc retulimus.*

## C N E O R O N.

**C**neorum de multis plantis dici, non modo Plinius lib. 13. c. 21. testis est, qui *Thymelæam Cneoron* à quibusdam appellari scripsit: & lib. 21. c. 9. *Casiæ* ab Hygino vocari: & mox, *Cneori* duo genera sunt nigri atq; candidi, hoc & odoratum, ramosa ambo, florent post æquinoctium Autumni: quæ ex Theophr. translata. Sed recentiores alij ad *Laureolam*, alij ad *Chamelæam* & *Thymelæam*: alij ad *Rosmarinum*, alij ad alios referunt. Theophr. 6. hist. 2. *Cneoron (Casiæ vertit Gaza)* inquit genera duo, unum album, alterum nigrum: albo solum est cutaneum, oblongum, figura oleæ quod immo simile: nigro, quale tamarici, carnosum. Album supra terram minus se attollit, & parum quid olet: nigrum valde odoratum est: radix utriusq; in profundum descendit magna: rami multi, breves & lignosi, qui à terra, vel paulo supra dividuntur, lenti admodum, &c. Et Guiland. *Cneorum* utrumq; *Chamelæam* & *Thymelæam* esse, ex Aretæ, Dioscoridis, Galem, Aetij & Plinij traditione statuit.

I. *Thymelææ affinis facie externa.**Cneoron, Matthiolo cap. de Cinam.**Cneoron alterum Matthioli } Lugd.**Oleander sylv. Avicen. Myconi }**Cneorum Matthioli, Clus. pan. & hist. Cam.**Casia Matthioli, Chamelææ species, Tab.**Thymelæa minor, Cord. hist.*II. *Cneoron album folio oleæ argenteo molli.**Cneoron album Dalechampij, Lugd.**Dorycnium, Imperati.**Dorychnium ex Sicilia, Cæs.**Dorycnium verum Plateau, Clus. hist. ap. 1.**Dorycnium quorundam seu potius Convolvulus rectus Creticus, Ponæ Ital.*III. *Cneoro albo affinis.**Dorycnium forte Dioscoridis, Ponæ Ital.*

## N E R I O N.

**N** *Ἠριον* ἢ *ῥοδὸδένδρον* Græci vocant: alij *ῥοδὸδάφνην*, à flore rosa simili & folijs laurinis: quare Apuleio, Rosa laurea. Rhododendros, inquit Plinius l. 24. c. 11. quia ne nomen quidem apud nos Latinum invenit, Rhododaphnen vocant, aut Nerium. Dioscor. l. 4. c. 82. frutex est folijs amygdalinis longioribus & crassioribus, flore roseo & siliqua fructui amygdalino proxima, quæ dehiscens lanosa natura, acanthij pappos representante plena reperitur, &c. Plinio l. 16. c. 20. Nerion sempiterna fronde, rosæ similitudine, caulibus fruticosum.

I. Nerion floribus subescentibus.

Nerion, Trag. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Tab. flore rubro, Eyst.

Nerium, Matth. Fuch. Dod. gal. Turn. (qui 1. & 2. habet) Gefn. hort. Lac. Lon. Cast. Lugd.

Oleander flore rubro, Ang.

Oleander, Desse circa Tripolim, Rauvvolf.

Rhododendron, Bellon. Gef. hor. Dod.

Oleander, Laurus rosea, Lob. ico.

Rhododaphne, Gef. hort. Cæs.

Nerion sive Rhododaphne, Cam.

In nonnullis Cretæ Insulis ad ædicularum

trabes conficiendas aptum est, cum alibi parvum sit, Bellon.

II. Nerion florib. albis: & Lob. Lug. Tab. Cam. Nerion candidis floribus in montis Idæ convallibus, Bellon.

Oleander flore albo, Ang.

Nerium sive Rhododendron flore albo, Eyst.

III. Nerio similis arbor: & Tab.

Nerij facie arbor, Ad. Lob. Lugd. apud quem titulus transpositus est.

IV. Fructus Nerij siliquæ figura.

Kaye Baka, Clus. exot. l. 3. c. 19.



## S E C T I O S E C U N D A.

CISTUS; CHAMÆCISTUS; LEDUM; LEDUM

A L P I N U M.

## C I S T U S.

**K** *Ἠριον*, ἢ *ῥοδὸδένδρον*, Latinis similiter Cistus & Cisthus dicitur, fortasse quod ejus species aliqua nigræ, id est, Hedera, folijs rotundis sit.

Genera duo: Cistus non ladanifer, & Cistus ladanifer, qui Ledum dicitur. Cistus Dioscoridi lib. 1. cap. 126. frutex est ramosus, foliosus, non altus: folia habens rotunda, nigra, hirsuta: flores masculo, veluti mali puniceæ, femina verò albi. Plinius l. 24. c. 10. sic ait, Græci vicino hedera vocabulo, Cisthon appellant fruticem majorem. Thymo, folijs ocimi. Duo ejus genera, flos masculo rosaceus, femina albus. Verum Plinius Cisthum cum Cisso, id est, Hedera, confundit, Theophrasti 6. hist. 1. lectione immendata, ubi nigræ pro nigæ habetur, deceptus: & Gaza, Hederam pro Cisso reddidit.

Cistus mas.

I. Cistus mas folio rotundo hirsutissimo.

Cistus mas, Matth. ep. Ang. Tur. Lac. Lon.

Cistus, Cæs. mas 4. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus mas folio rotundiore Matthioli, Lugd.

II. Cistus mas folio oblongo incano.

Cistus mas, Gef. hor. Ad. Lob. Cam.

Cistus, Dod. mas 1. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cisti alterum genus, Cæs.

Cistus mas latifolius, Tab.

Flos colore rubro est, eoq; nunc saturatiore, nunc dilutiore.

III. Cistus mas angustifolius.

Cistus mas 2. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus mas angustifolius 2. Clusij, Lob.

Cistus mas angustifolius, Tab.

IV. Cistus mas folio breviori.

Cistus mas 3. Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

V. Cistus mas folijs Chamædrys.

Cistus mas 5. Clus. hisp. & hist. Lob. ico. Lugd.

Cistus mas supinus sinuatis & fimbriatis folijs, Lobel.

Cistus mas tertius, Tab.

Cistus femina.

I. Cistus femina folio Salviæ.

Cistus, Cord. in Diosc. Cæs.

Cistus



Cistus foemina, Matth. Dod. ut: Ang. Gef. hort. Lacun. Turn. Lonc. Adv. Lob. Clus. hisp. & hist. Castor. Camer. & Lugdun. qui & Matthioli & Clusij figuram exhibet, ut & Tabernæmontanus.

Cistus flore albo, Rauvvolf.

Variat: est enim clavior & rectis virgis: est & supinus humi sparsus: in utroq; flos candidus, quandoq; luteus oehræ colore.

II. Cistus folioplantaginis.

Tuberaria major Myconi, Lugd.

Majorem & minorem Lugdunensis pingit.

III. Cistus foemina portulacæ marinæ folio, latiore obtuso.

Cistus folio halimi primus, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Cistus foemina folio portulacæ marinæ, sive Crithmi, Lob.

IV. Cistus foemina portulacæ marinæ folio angustiore mucronato.

Cistus folio halimi secundus, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab.

V. Cistus folio spicæ.

Cistus folio lavendulæ, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugdun.

Cistus, Tabern.

VI. Cistus folio Sampfuchi incano.

Cistus folio Sampfuci, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugdun.

VII. Cistus folio Stechadis citrinæ.

VIII. Cistus folio Majoranæ.

Cistus folio majoranæ defluxis floribus, Adv. Lob. icon.

Helianthes species Penæ, Lugd.

IX. Cistus folio Thymi: & Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab.

X. Cistus folio Salicis.

Cistus annuus primus, Clus. hisp. & hist. Lugd.

an Hydrophyllon herba Athenæi, Clus.

Cistus annuus folio Salicis, Lob.

Cistus annuus, Tab.

Variat: primò folijs amplioribus, floribus majoribus: secundò folijs angustioribus, floribus minoribus.

XI. Cistus flore pallido punicante macula insignito.

Cistus annuus secundus, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus annuus guttrato flore, Penæ.

Helianthemum flore maculoso, Colum.

Variat: est enim flore maculoso, macula ex nigro rufescente, sive puniceo: vel non maculoso.

XII. Cistus Ledi folio.

Cistus annuus folio Ledi, Lob. Tab.

Cistus annuus alter Lobelij, Lugd.

Alyssum trigonum, Eidem.

XIII. Cisti folio arborexotica.

Arborexotica Cisti folio, Ad. Lob. ico.

Cisti vel Ledi arbor peregrina Penæ, Lugd.

Arborexotica folio, Lob.

Cisti folio exotica arbor, Tab.

Cistus exotica, Ger.

H Y P O C I S T I S.

**C**um è Cisti radicibus, veluti germen quoddam expulsetur, id quod Hypocistus dicitur, de eo paucis. Cisti, inquit Diosc. l. c. 127. radicibus adnascitur, quod *ὑποκίστις* dicitur, nonnullis *πέδιλον*, ἢ *νέριον*, & mali punicea cyrino simile est: quædam rufa: altera herbacea, tertia candida cernitur.

Hypocistis sub Cisto.

Hypocistis, Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Diosc.

Lon. Cast. Cæs. Clus. hisp. & hist. Ad. Lob. Lugd. Tab. Gerard.

Limodori genus, quod Hypocistis, Dod.

Succus qui extrahitur, etiam Hypocistis & officinis Hypocistidos, dicitur.

Sub Cisto Hispanico, rubram: sub Cisto folio halimi, luteam: & sub Ledo quem octavo loco recensuimus, varij coloris, pallefcente, lineis purpurascensibus & nonnihil virescentibus distincto Clusius notavit: & hanc posteriolem *αἰμοδακτύλη* sive Cynomori genus nuncupat.

C H A M A E C I S T U S.

I. Chamæcistus vulgaris flore luteo.

Hyssopus campestris, Trag.

Panax Chironium, sive flos solis, Matth. Cast. Lugdun.

Panax Chironium quorundam, Ang.

Gratia Dei, Dod. gal. Gefn. hort. cui & Hyssopoides.

Helianthemum, Cord. hist. Lob. Thal. flore luteo, Eyfster.

Consolida aurea Chirurgis, Cordi schol.

N n n

Hyssop-



*Hyssopus montanus* sive *sylv.* Lon.

*Flos solis*, Dod. (cui & *Cisti* & *Ledi* quædam species) Cast. Cam.

*Helianthemum* vulgo dictum, Clus. hisp.

*Helianthemum* Plinij, Clus. pan.

*Chamæcistus primus*, Clus. hist. qui ad *Cisti* feminae tertiam classem reducit.

*Helianthemum Germanicum* secundum, Tab.

*Helianthemum* sive *flos solis*, Lugd.

*Chironia*, Cæs.

Hoc quibusdam *Panax Chironium* Dioscor. creditur. *πάναξ χερώνιον* folia habet amaraco similia, flores aureos, radicem tenuem, neq; altam, gustu acrem: sic Dioscorid. lib. 3. cap. 37. Ab alijs *Helianthe* Plinij lib. 24. cap. 17. censetur: *Helianthen* scribit vocari in Themiscyra regione, & Ciliciæ montibus maritimis folio myrti, sed quid in hac brevitate pronunciarer licet?

II. *Chamæcistus* vulgaris flore albo majore.

*Helianthemum* albis floribus, Lob. ico. Eyf.

*Chironia* flore candido, Cæs.

*Helenium* minus Dioscoridis, Lugd.

A priore differt floris colore albo, ejusq; magnitudine, *Ladani* specie.

III. *Chamæcistus* Friscus folijs Nardi Celticæ.

*Hirculus* Friscus Dortmanni, qui *Chamæcisti* genus, Clus. cur. post.

Hunc à Dortmanno quoq; accepimus.

IV. *Chamæcistus* folijs minoribus & incanis.

*Flos solis*, Lob. Dod. utriq; quoad iconem.

*Cistus humilis* primus, Clus. hisp.

*Helianthos* sive *Flos solis*, Ad.

*Cistus parvus* Clusij, Lob.

*Chironiæ* aliud genus, Cæs.

*Chamæcistus* quintus, Clus. hist. ico. at 4. descr.

*Helianthemum* secundum sativum, Tab.

*Helianthemum* Anglicum luteum, Ger.

V. *Chamæcistus* folijs Thymi incanis.

*Panax chironium* minus, Cam. ep.

*Chrysanthemis*, *Erica minima*, Ad.

*Cistus humilis angustifolius*, } Lob.

*Erica chrysanthemis* minor, }

*Cistus humilis secundus*, Clus. hisp. Lob. ico.

*Chamæcistus quintus*, Clus. hist. desc. at quart. icone.

*Helianthemum peregrinū angustifolium*, Tabern. Ger.

Huc referatur

*Helianthemum Germanicum* 3. Tab.

*Helianthemum album Germanicum*, Ger.

VI. *Chamæcistus* quadrifolia.

*Helianthemum Sabaudicum*, Tab. Ger.

VII. *Chamæcistus* folijs myrti minoris incanis.

*Chamæcistus secundus*, Clus. pan. 3. Eid. hist.

*Cistus humilis latifolius*, Tab. Ger.

VIII. *Chamæcistus* angustifolia.

*Chamæcistus primus angustifolius*, Clus. pan.

*Chamæcistus sextus*, Eid. hist.

*Cistus humilis angustifolia*, Tab. Ger.

IX. *Chamæcistus* serpillifolia floribus carneis.

an *Rosa alpina* altera folijs minimis, Ges. hor.

*Alpina* altera, Ad.

*Anonymus* altera, Clus. pan.

*Chamæcistus septimus*, Clus. hist.

X. *Chamæcistus* hirsuta.

*Chamæcistus quartus*, Clus. pan. 8. Eid. hist.

*Cistus humilis Austriaca*, Tab. Ger.

XI. *Chamæcistus* repens serpillifolia lutea.

*Chamæcistus tertius*, Clus. pan. 2. in hist.

*Cistus humilis serpillifolia*, Tab. Ger.

XII. *Chamæcistus* ericæ folio luteus.

*Cori similimus frutex* in maritimis, Cæs.

*Erica chrysanthemis*, Lugd.

*Coris* Dioscoridis *Guilandino* dicebatur.

Hujus duæ species altera brevioribus folijs & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior.

## CISTUS LEDUM.

**C**isti alterum genus, inquit Dioscorides l. 1. c. 128. à nonnullis *λῆδον* appellatum, frutex eodem quo *Cistus* modo nascens, sed folijs longioribus ac nigrioribus, quæ pingue quidpiam verno tempore contrahunt, ex quo *λῆδαρον* conficitur. Plinio l. 12. c. 17. sunt qui herbam in Cypro ex qua *Ladanum* fiat, *Ledon* appellent: etenim illi *Ledanum* vocant, huic pingue insidere, &c. *Ladanum* esse æspum hircorum barbis genibusq; villosis inherens, &c. *Ladani* colligendi rationem Dioscorides & Plinius l. c. referunt: quomodo verò in Creta colligatur, Bellonius l. 1. observ. c. 7. & ex eo Clusius descripsit.

I. *Cistus ladanifera* Monspeliensium.

Ledum, Matth. ep. Lac. Cast. Lugd. Tab.

Ladanum, Matth. Ang. Cæs. Tab.

Cisti species secunda, Dod. gal.

Cistus ladanifera, Turn.

Lada &amp; Ladon cisto similis frutex, Cord. in Diosc. &amp; hist.

Ledon alterum cisti genus, Gefn. hort.

Laudanum, Lon.

Ladanum latifolium, Rauvvolf.

Cistus ledon, latifolium, Adv. desc.

Ledum latiore folio Italicum, Cam.

Cistus ledum Matthioli, Ger.

II. *Cistus ladanifera* Hispanica incana.

Cistus ledon, Dod.

Cistus ledon primum, Clus. hisp. Lob. Lugdun.

Gerard.

Ledi species Bauhini, Lugd.

Ledon Clusij, Tab.

Cistus ledon primum angustifolium, Clus. hist.

III. *Cistus ledon* folijs laurinis.

Cisti ledi 1. altera species, Clus. hisp. &amp; histor. Lobel.

Ladanum alterum, Cæs.

an Cistus maritimus, Lugd.

IV. *Cistus ledon* folijs populi nigrae major.

Ledon 2. Clus. hisp. Lugd. Tab.

Ledon latifolium 2. majus, Clus. hist.

Cistus ledon 2. Clusij, Lob. Ger.

V. *Cistus ledon* folijs populi nigrae minor.

Cisti ledi 2. altera species, Clus. hisp. Lugd.

Ledon 2. latifolium minus, Clus. hist.

Cistus ledon populnea fronde alter, Lob.

Cistus ledon 3. populnea fronde, Lugd.

Cistus ledon populnea fronde, Tab. Ger.

VI. *Cistus ledon* Cretense.

an Cistus mas, Matthiol. in magnis figur. &amp; Lugdun.

Cistus è qua Ladanum in Creta colligitur, Bellon.

Ledon 3. Clus. hisp. Lob. Lugd.

Ledon 3. Cyprium, Clus. hist.

Plantæ ex qua Ladanum Cretenses colligunt folijs &amp; floribus cisti fœminæ, Alp.

Ledon à Græco diversum &amp; longè majus in monte Olympo, Bellonius notavit.

VII. *Cistus ledon* folio myrti.

Cistus ledon latifolium, Adv. ico.

Cistus ledon Rusci aut Myrti folium, Lobel. icon.

Cistus ledon aliud latifolium Penæ, Lugd.

Cistus ledon myrtifolium, Tab. Ger.

VIII. *Cistus ledon* hirsutum.

Ledon 4. Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd. Tabern. Gerard.

Ledon alterum angustiore folio, Cam.

IX. *Cistus ledon* folijs oleæ sed angustioribus.

Ledon 5. Clus. hisp. &amp; hist.

Cistus ledon, Adv.

Ledon Narbonense, Lob.

Cistus ledon Narbonense, Tab.

Cistus ledon Lobelij, Ger.

Cistus flore albo, Eyft.

Huic similem sub

Cisto adulterino pingunt, Tab. &amp; Ger.

X. *Cistus ledon* angustis folijs.

Ledon 6. Clus. hisp. &amp; histor. Lob. (qui in iconibus hunc cum priore junxit) Lugd.

Ledum quintum, Clusij, Lugd. Ger.

Ledon Clusij nonum, Tab.

XI. *Cistus ledon* folijs rorismarini hispidis.

Ledon 7. Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd. Tabern. Gerard.

XII. *Cistus ledon* folijs rorismarini subtus incanis.

Ledon octavum, Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd.

Ladani species folijs Rosmarini, Rauvvolf.

Ledum Clusij quintum, Tab.

Cistus ledon sextum, Clusij, Ger.

XIII. *Cistus ledon* folijs rorismarini sed non incanis.

Ledon nonum, Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd.

Ledum Clusij sextum, Tab.

XIV. *Cistus ledon* folijs Thymi.

Ledon decimum, Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd. Gerard.

Ledum Clusij octavum, Tab.

XV. *Cistus ledon* folijs rorismarini ferrugineis.

Rosmarinum sylv. Matth. Cast.

Chamæpeuce, Cord. in Dioscor. &amp; histor. desc. Lugdun.

Ledum folijs rosmarini alterum, Lob.

Ledum Silefiacum, Clus. pan. &amp; hist. Tab. Ger.

Ledum rorismarini folio, Tab. Ger.

Rosmarinum sylv. sive Bohemicum Matthioli, Lugdun.

Rosmarinus sylv. Dod. belg.

XVI. Cistus ledon folijs salicis angustifoliae.

Chamaerhododendros montana Allobrogum lentiscifolia, Adv. Lob. ico.

Rosmarinum sylv. minus, Cam. ep.

Rosmarinum sylv. *ἀρωμα* } Clus. pan. & hist.

Cistus Silefiacus }  
Chamaerhododendros alpina angustifolia, Tabernæm.

Chamaerhododendros montana, Ger.

XVII. Myrtocistus Pennæi, Clus. pan. & hist. Gerard.

Myrtocistus Clusij, Tab.

*Ledum alpinum.*

I. *Ledum alpinum hirsutum.*

Alpigenæ Chamaerhododendri varietas, Lob.  
Balsamum alpinum Gesneri, Lob. ico. Tabern. Camer.

*Ledum alpinum*, Clus. pan. & hist. Tab.

Cistus ledon alpinum, Ger.

II. *Ledum alpinum folijs ferrea rubigine nigricantibus.*

Frutex in alpibus roseo flore, Gesn. ad Cordum cap. de Chamaererio.

Rosa alpina, Gesn. hort. & Frasco, potius *Ledum alpinum*.

*Nereum alpinum*, Gesn. de lunar.

Chamaerhododendros alpigena odora, Ad. Lob.

Ledi alpini genus alterum, Clus. pan. & hist.

Rhododendron alpina quibusdam, Cæs.

Evonymus Theophrasti, hist. 18. Lugd.

Chamaerhododendros alpina latifolia, Tab.

Chamaerhododendros alpigena, Ger.

Hujus ramis tubercula gallarum instar adnascuntur: & floris colore variat, communiter dilute rubentis: at in Pyrenæis, flore tantum albo reperitur.



## SECTIO TERTIA.

MYRTUS; RUSCUS; VITIS ET RADIX IDÆA; BUXUS;  
OLEA; SALIX; AGNUS CASTUS; SPIRÆA;  
Ligustrum & Phillyrea.

### M Y R T U S.

**M**yrus & Murtus Latinis: Græcis *μύρτις* & *μυρτίνα* nominatur, à Myrsine Atheniensi puella, pulchritudine & robore insigni, amica Paliadi, quam juvenis ab ea cursu & palestra superatus interemit, invidia ductus, quod elegantia, ceterisque naturæ dotibus, reliquis virginibus præstaret: arbuscula in demortua locum successit, semper Minervæ, ut olea chara. Græcum et nomen romanet, ut Plinius lib. 15. cap. 29. scribit, quo peregrinam esse appareat. At quibusdam sic dicta, propter amulam Myrrhæ quandam odoris gratiam, qua in ejus laccis recentioribus, observatur. Et Theoph. Myrti pluribus in locis meminit, nulla tamen descriptione addita.

Genera Myrti multa sunt: est sativa & sylvestris: sativa aut nigra aut candida: sylvestris alia levis alia spinosa: illa, que sativa opponitur, itidem vel nigra, vel candida. Dio. Toridi hanc dubie cognita, ut cui lib. 1. cap. 155. *μυρτίνα* sativa nigra, medicina utilior candida: qua & Plinius lib. 23. cap. 9. habet. Theophrastus non videtur differentiam agnovisse, siquidem lib. 6. caus. 27. scribat, Myrcum Aegypti odoratam esse, quanquam cetera inodorata sint: verum hoc propter loca servida evenire. Elmo lib. cit. alia patricia alia blebeia: addens: Catoni tria genera, nigra, candida, conjugalis: nunc & alia distinctio, sativæ aut sylvestris & in utraque latifolia: in sylvestri propria oxymyrsine: sativarum genera copiarum faciunt. Tarentinam folio minuto, nostratem paulo, exoticam densissimo, senis foliorum versibus: ramosa utraque alia: conjugalem existimo nunc nostratem dici: hac ille. Bacca *μύρτα* Græcis, Latine Myrta & Murtæ, officinæ Myrtilli dicuntur.

I. Myrtus communis Italica.

Myrtus, Marth. Ang. Cord. in Diosc. Gesn. hort. append. Lon. Cæs. Lugd. an Myrtus alba, Adv.

Myrtus communis Italica, Cam.

Alia est nigra, colore tantum fructus differens.

II. Myrtus latifolia Romana.

Myrtus nostras cum conjugali eadem, Plinio.

Myrtus

Myrtus Romana, Matth.

Myrtus major, Dod. gal. Adv.

Myrtus altera, Dod.

Myrtus fativa, Cast.

Myrtus laurea maxima, Lob.

Myrtus latifolia, Bellon. Clus. hisp. & hist.

an Myrtus exotica Plinij, Cæs.

Hanc & sterilem & fructiferâ Bellonius notat.

III. Myrtus latifolia Bœtica 1. vel folijs laurinis.

Myrtus Bœtica latifolia domestica 2. Clus. hisp. & hist.

Myrtus Bœtica latifolia domestica, sive laurea secunda, Lob.

Variat: hæc enim folijs est minoribus & paulò densioribus: alia majoribus & paulò tenuiorib.

IV. Myrtus latifolia Bœtica 2. vel folijs latius confertim nascentibus.

Myrtus Bœtica latifolia exotica, Clus. hisp. & hist.

V. Myrtus latifolia Belgica.

Myrti classis altera sive latifolia triplex, & Myrtus media, Clus. hist.

Varietates hujus sex Lobelius proponit.

VI. Myrtus angustifolia Bœtica.

Myrtus exotica, Matth. Cast. Lugd.

Myrtus tertia, Dod.

Myrtus Bœtica angustifolia exotica, Clus. hisp. & hist.

Myrtus exotica Plinij pluribus foliorum versibus, Lob. (volf.)

an Myrt. baccis magnis cinereo cæruleis, Rau.

VII. Myrtus sylvestris folijs acutissimis.

Myrtus sylv. Matth.

Myrti majoris quinta species, Lob.

Myrtus Bœtica sylv. Clus. hisp. & hist.

Myrtus latifolia, Eyft.

sub Myrti ramulo cum flore ac semine pingitur apud Dodonæum.

VIII. Myrtus folijs minimis & mucronatis.

Myrtus albis baccis in Asia, Bellon.

Myrtus domestica fructu albo, Clus. hisp. & hist.

Myrtus prior, Dod. ico.

Myrtus nona angustifolia, Lob.

Myrtus Hispanica angustissimi folij, Cæs.

Myrtus minima angustifolia, Lugd.

Hujus & altera species, folio per omnia tene-riore, exiliore & angustiore.

IX. Myrtus minor vulgaris.

Myrtus Tarentina (à Tarento Apuliæ urbe) Matth. Cast. Lugd. Cam. Clus. hist. Eyft.

Myrtus minor, Dod. gal. Adv.

Myrtus minor & Tarentina, Clus. hisp.

Myrtus minor vulgaris, Lobel. qui differentias quatuor facit.

Myrtus, Tab.

Myrtidanum *μυρτιδανον* Dioscoridi l. 1. c. 156. est quod Myrto adnascitur, inæquabile, verrucosum & concolor: & perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Sed Plinio l. 14. c. 16. & l. 23. c. ult. Myrtidanum est vinum, ex sylvestris Myrti baccis factum.

Myrti coccus.

Myrti excrementum sive granum kermesinum, ejusdem ferè cum Cocco baphica naturæ, Myrti minoribus ramis adnascens, unico animali vivo vesiculæ incluso, Bellon.

X. Pseudomyrtus, frutex myrto admodum similis Bellon. quid?

XI. Myrtus Indica.

Avacari, Garz. Frag. Cast.

In India orientali, in montibus Malavar.

*Myrto similes exotica.*

I. Myrto similis Indica fructu racemoso.

Coca, Ciecæ, Monard. Lugd. Clus. in Garz.

Coca herba, Benzoni part. 6. Ind. occid. l. 3. c. 10. & part. 9. l. 3. c. 20. & l. 4. c. 22. ubi habetur, Indis hujus folia pro pecunia esse.

Coca occidentalis, Fragoso.

Arbor pumila folijs Myrti, vel ut alij Rhodiariorum, cujus in tota Peruvia usus est, folio ore detento, famem & sitim aliquandiu inter peregrinandum levantes.

II. Arbor tristis myrto similis.

Arbor tristis, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. ad Garz. Lugdun. (qui & Acoftæ & Clusij figuram licet diversimodè exhibet) Tab.

Arbor tristis, in Malacca Singady alijs parifatio pul, quart: Turcis, gul: Linscot. part. 4. Ind. orient. 15.

Arbor tristis de Dia, part. 8. Ind. orient.

Arbor folijs Myrti Clusio: pruni alijs: cujus flores singulis noctibus renascuntur, qui albi, pediculo luteo aut rubeo firmati, quo Indi Croci loco utuntur, & ex floribus aquam extillant, quam Aquam de Mogli appellant.

De arbore tristi Garzias & Fragosus agentes, cum ejus flores gratissimi odoris sint, duorum adhuc florum meminere, & Linscottus peculiare genus exhibet.

I. Mogori priores dicti, mali aureæ floribus odoratiores, quarum stillaticius liquor eundem apud istos usum obtinuit, quem apud Hispanos aqua florum mali aureæ.

II. Champe dicuntur alij flores, quorum etiam magnus apud illos usus est, odore graviore, quam Lilium album, Garz. Frag.

III. Fulle, flosculorum genus apud Indos ex arbore quadam toto anno durans, suavissimi odoris, Lincot. 4. part. Ind. or. 10.

IV. Flos Indicus arboreus liliorum specie. Floribundio, ex arbore quæ solum flores, fructus nequaquam gignit, Joseph. Acoftæ lib. 4. cap. 27.

## R U S C U S.

**R**uscus Dioscoridi l. 4. c. 146. *ῥυσκία*, myrtus sylvestris dicitur: alijs *ῥυσκία*, acuta myrtus & Myrtacantha. Plinius l. 23. c. 9. inquit, Castor Oxymyrfinen myrti folijs acutis, ex qua sunt rursi scopæ, Rustum vocavit. Theophrasto 3. hist. 17. *ῥυσκία*. Hujus fructum Arabes Cubebas vocant, existimantes Carpesium apud Galenum 7. simpl. & 1. de Antidot. esse, quia nihil de Carpesio apud Dioscoridem, ut nec de Rusco apud Galenum inveniatur: sed revera Rusci fructus à Cubebis differt, ut rectè Leoniceus notavit.

Ruscus, Trag. Matth. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Bellon. Lac. Adv. Lob. Cæs. Lugd. Castor. Cam. Fab. Eyf. Ger. sive Bruscus. Ruscus verus, Lon.

Ruscum, Dod. ut. Centromyrini Theoph. & Oxymyr sine, Ang. Myrtus sylv. Turn. Myrtacantha, murina spina, Lob. ico.

VITIS IDÆA SIVE MYRTILLUS,  
& Idæa Radix.

**A** *ῥαῖς* & *ῥαῖς* Idæus, sive Vitis ea parte Idæ, quam vocant Phalacras, nascitur: est fruticosa, virgis parvulis & ramulis cubitalibus penè exporrigitur, quibus acini ad latera adherent, nigri, sabbæ magnitudine, dulces, vinaceorum instar aliquid continentes: folium rotundum, individuum, parvum. Idem pene Plinius l. 14. c. 3. Myrtilli autem dicuntur à forma baccarum, quæ Myrti baccis similes sunt.

I. Vitis Idæa folijs oblongis crenatis, fructu nigricante. Myrtillus, Matth. Lon. Cast. Vaccinia nigra, Dod. ut: Adv. Lob. Ger. Radix Idæa fructu nigro, Ang. Vitis Idæa nigris acinis, Gesn. Fracto. Myrtillus Germanica, Lugd. Vitis Idæa vulgaris baccis nigris, Clus. pan. & hist. Theophrasti, Eid. hist. Vitis Idæa nigra, Cam. Vitis Idæa 1. Tabern. & Vitis Idæa 2. major, Eid. Bagolæ r. genus, Cæs. Fructus exigui, Gallis Bleuete: part. 2. Amer.

II. Vitis Idæa folijs oblongis albicantibus. Myrtillus grandis, Trag. Vitis Idæa nigra major, Thal. Vitis Idæa 2. Clus. pan. & hist. Vitis Idæa 3. Tab. Vaccinia Pannonica, Ger.

III. Vitis Idæa folijs oblongis acuminatis baccis rubris insipidis. Vitis Idæa rubra Bavarica, Cam.

IV. Vitis Idæa folijs subrotundis non crenatis baccis rubris. Myrtillus exiguus, Trag. Vaccinia rubra, Dod. gal. Adv. Lob. Radix Idæa fructu rubro, Ang. Vitis Idæa species altera acinis rubris, Gesn. hor. Vitis Idæa rubra sive Vaccinia rubra, Dod. Rhus Plinij minor, Æmilij, Thal. Idæa vitis, Lugd. Vitis Idæa rubra, nonnullis Rhus minor Plinij, Cam. ep. Vitis Idæa buxeis folijs, Clus. hist. Folij est buxi interdum levissimè ceu ferratis marginibus.

V. Vitis Idæa folijs subrotundis exalbidis. Vitis Idæa altera, Clus. pan. & hist. Vitis Idæa Gesneri major, Cam. VI. Vitis Idæa folijs carnosiss & veluti punctatis, sive Idæa radix Dioscoridi. Uva ursi Galeni, Clus. hisp. & hist. Lob. Tab. Vaccinia ursi, Ger.

Diosc. l. 4. c. 44. *ῥαῖς* *ῥαῖς*, oxymyr sine (id est Rusco) folia similia habet: juxta ipsa verò capreoli

capreoli exigui sunt, ex quibus etiam flos erumpit: radix præclare adstringit.

*Ἀρσινόη* & Galeno 6. de comp. med. κατὰ τόπον 4. in Ponto nascitur planta humilis & fruticosa, folio Memecyli (five Arbuti) fructum ferens rubrum, rotundum gustu austerum.

Hanc ex Hispania folijs longioribus quidem accepi, apud nos tamen ad montem Crentzancensem provenit.

VII. Vitis Idæa palustris.

Vaccinia palustria, Dod. ut: Ad. Lob.

Oxycoccum, Cord. hist. Cl. pan. Cam. Th. Eyf.

Acinaria palustris, Gef. hor. in Rosa alpina.

Serpillum acinarium, Gef. col.

Erica sexta baccifera, Lugd.

Vitis Idæa tertia in palustribus, Clus. hist.

An Samolus Plinij l. 24. c. 11. sit, Dodon. edit. gal. dubitat, Samolum, inquit Plinius, herbam nominavere, nascentem in humidis: nullas alias notas addit.

VIII. Frutilla in Chile.

Ceraforum ferè sapore, fructus est non arboris sed plantæ, coloris mori non satis maturi: par. 8. Ind. Occid.

## B U X U S.

**B**uxus & Buxum, Græcis βύξ & βύξ, à densitate ligni dicitur, Theoph. 3. hist. 15. Buxus, magnitudine est haud procera, folium ei Myrto simile: locis frigidis & asperis nascitur.

Genera tria Pl. l. 1. & c. 16. Gallicum, quod in metas emittitur, amplitudineq; procior, Oleastrum in omni usu damnatū, gravem præfert odorem. Tertium genus nostrates vocant sylvestre, ut credo mitigatū satū: diffusius & densitate parietum virens semper ac tonsile. Sic apud nos quadam frutex tantum est, quædam in arborem magnam assurgit: & ex ejus radice ob varias maculas, & intortos linearum discursus, cochlearia, cultellorum manubria, & imaguncula in monte Jura ad S. Claudium conficiuntur: Sunt qui florere negent, sed male.

I. Buxus arborefcens.

Buxus, Brunf. Matth. Dod. ut: Fuch. Bellon. Gef. hort. Tur. Lon. Ad. Lob. Cæs. Cast. Lugd. Cam. Tab. Eyf. et.

Buxus vulgaris, Trag.

II. Buxus folijs rotundioribus.

Chamæpyxos, Trag. Taber.

Buxus humilis, Dod.

Hoc ad areolas hortorum muniendas frequenter utuntur.

III. Chamæbuxus flore Coluteæ.

Fruticulus exiguus folijs myrtinis, floribus papilionaceis ferè, diversi coloris, Cord. obs. syl.

Rhus myrtifolius Plinij Gesneri, Cam.

Chamæbuxus, Gef. col.

Anonymos flore Coluteæ, Clus. pan. & hist.

Anonymos Pervinæ folio, Cam.

Pseudochamæbuxus, Eyf.

an Myrtus tenuifolia, Thal.

Variat floris colore & odore: colore, quia flavescunt, vel ex purpura rubescunt: odore, quia in odori majori ex parte, nonnulli odori sunt.

## O L E A.

**O**lea, Græcis ἐλαία dicitur, quod à τὸ λῆν h. e. lave vel lubricum deducitur: aut à λῆω, id est, lavigo, lubrico, quod producat id quod lavigat, lubricatq; videlicet oleum, cujus quævis lubricandi vis est. Sic & baccæ, arboris nomine ἐλαία, Latine oliva vocantur: quas cum nigrescere incipiunt Drupas, Græcos Drypetas vocare, Plin. l. 15. c. 1. scribit: & Druppa l. 12. c. 27. Arborem Dioscor. non descripsit: at Theoph. multa hinc inde habet, inter quæ hæc placent: Olea arbor est multifida, i. hist. 5. medullam parvam & incertam gerit ut buxus, i. hist. 9. nodosa est, gangros (γῶγγρος) à quibusdam vocatos habet, i. hist. 13. vivet perpetuè, sed non semper eadem durant folia, sed alia proveniunt, alia exarescunt, i. hist. 15 & angusta sunt, i. hist. 16. semen carnosum & nucleus interjacet, caro enim in nucleo est, i. hist. 8. succus pinguis, i. hist. 19. flores foliati, sed pusilli, i. hist. 21. & circa fructum ipsum producuntur, & prostrati perforati spectantur, i. hist. 2. Olive alia fructum nulla carne, sed oleo refertum producunt: alia carnosum sine olco præstant, 2. c. 4. Genus alterum, quod Aegyptium appellamus, ubertate ac magnitudine fructus excellit. Tandem 4. h. 8. Olea maritima meminit, quæ folia similima Aria habeat, fructum proximum his olivis, & lachrymam emittere, ex qua Medici medicamentū sistendi sanguinis componant.

Genera: Dioscorid. Olea sativa & olivarum colymbadum: Olea sylvestris & Olea Aegyptiaca l. 1. c. 137. & seq. meminit, At Virgilio, etiam Plin. l. 15. c. 1. referente, Olivarum tria genera, Orchites, Rhadios & Pausias: nec plura genera Herruriam agnoscere, inquit Matthioli. Plin. l. 15. c. 3. prima colligitur Pausia, cui plurimum carnis: mox Orchites, cui olij, post Rhadios: subjungit Liciniam, Cominiam, Contiam, Sergiam, quam Sabini regiam



regiam vocant: & mox: regia ab alijs majorina, ab alijs phaulia, grandissima, alioquin minimo, succo, & in Aegypto carnosissima, olei exiguum: Decapoli verò Syria per quam parva, nec Cappari majores, carne tamen commendantur. Colymbades franguntur, eademq; herbarum viridium succo conduntur (ut in Gallia Narbonensi, feniculo.) Sunt & prædulces per se tamen siccata, utiq; passu dulciores, admodum rare in Africa & circa Emeritam Lusitania. Sic Columella decem genera, Pausia, Licinia, Sergia, Radius, Nevia, Culminia, Orchites, Algiana, Murtea, Circires. Sanè Olearum differentia ex fructu magis quam arbore spectantur, scilicet magnitudine, pinguedine, probitate & colore. Et Bellonius de cult. notat, in vallibus Insulae Corcyrae in Græcia, Oleas esse semper virentes, quæ in Quercus altitudinem excrescant.

### I. Olea sativa, ὀλεὰν ἡμῶν.

Olea, Brunf. Trag. Tur. Cord. hist. Ang. Bellon. Ges. hor. Lon. Dod. Ad. Lob. Ruvvol. Cæs. Cam. & Ind. Occid. par. 9. l. 4. c. 32.

Olea sativa, Matth. Dod. gal. Cord. in Dioscor. Lacun. Cast. Tabern. (cui & domestica) Lugd. Clus. hist. Ger.

Nodos qui in caudice sunt, Theoph. 1. hist. 13. γῆρας vocat: rustici in Hetruria (Cæsalpino auctore) ova olearum vocant, eò quod sata numerosa sobole germinant. Ad nos adferuntur Hispanicæ, Genuenses, Narbonenses sive Massilienses & Comenses.

In Virginia tria baccharum genera inter se differentia habentur, quarum forma glandibus similis, à quibus bonum oleum elicitur, Thomas Hariot in def. Virgin. Ind. Oc. p. 1. sed quid sunt?

#### I. Olivæ maximæ Hispanicæ.

Olivæ Sergianæ regiæ, phauliæ, Plin.

Olivæ magnæ & carnosæ, Clus. hist.

Olivæ superbæ nucis ferè magnitudine, Cæs.

#### 2. Olivæ minor. & Genuens. & ex Provincia.

Olivæ Lusitanicæ, Narbonenses, Bæticæ, Clus. hist. ex quibus plus olei exprimitur.

3. Olivæ oblongæ atrovirentes ad lacum Comensem natæ adferuntur, quæ carne dura nec succulenta ossi firmiter hærent.

#### 4. Olivæ albæ.

Pl. l. 23. c. 3. olivarum albar. & nigrarū meminit. Oliva alba circa Hisp. & Ulyssiponam, Cl. hist.

In Hetruria habentur:

1. Minores rotundiores, plurimum olei habentes, quæ Olivellæ vocantur, Cæs. quas Matt. secundo loco recenset, & eas prægrandes arbores Juglandium modo ferre, quas Olivastræ rura Senensis vocitent.

2. Majusculæ & oblongæ oleum parcius sed dulcissimum reddentes, quæ nomine à radijs desumpto, Raggiariæ dicuntur. Cæs. hæ primæ sunt Matth. quas oleæ minores proferunt, quibus in cibis utuntur.

3. Majores & pulposiores ad condituras tan-

tum quæritæ, quas Regias Cæsalp. vocat.

4. Sunt quædam, quarum caro ab osserecedit cum franguntur, virides, quæ conditæ gratissimæ sunt, quas Colimbades Cæsalp. censuit.

Colymbades quas κολυβάδες Diosc. l. 1. c. 139. nominat, aliqui volunt esse olivas muria conditas, ab innatando sic dictas: quamvis Plinio l. 15. c. 3. (quem Cæs. imitatur) distinctum genus fecisse videatur; quarum etiam l. 23. c. 3. meminit. Condiuntur autem plerumq; immaturæ per Hispaniam & Galliam Narbonensem: interdum etiam maturæ & nigræ, præsertim in Lusitania. Olivarum feraces arbores, sed in suavi odore & sapore pejore, in Brasilia, reperiri, Benzo libr. 1. cap. 28. scribit.

II. Olea sylvestris folio duro subtruncato. Ἀγριελία ἢ νότιν, ἢ αἰθιοπική ἐλαια Diosc. l. 1. c. 137. & cap. 141. scribit Æthiopica olea lacrymam Scammonio similem fulvam esse, &c. quod Gummi elemi esse Cæsalp. suspicatur.

Olea sylvestris, Matth. Lac. Tab. Ger.

Olea sylvestris sive oleaster, Ad. Lob. ico.

Oleaster vel sylv. olea, Cast.

Oleaster, Lon. Cæs. Clus. in hisp. & hist.

Hanc aliqui cum aculeis, alij sine ijs, pingunt: alij in descriptione aculeorum meminere, ut Matth. Dod. alij præteriére: sane fructu est multo minore & à sativa cultura differt: hinc & sativa si negligatur, in sylvestr. abit: & ut Theoph.

2. hist. 3. ex nucleo oleæ, ἀγριελία nascitur.

### III. Olea sylvestris folio mollī incano.

Olea Bohemica, Matth.

Elæagnus, Matth. ep. Cam. ep.

Salix Amerina, Amato.

Chalef, Bellunensi.

Ziziphus Cappadocica Plinij, Bell. Dod. Lugd.

Ziziphus alba, Ges. hor. Clus. hisp. & hist.

Ziziphus alba Columellæ, Bellon. (cui & Oleaster perperam,) Cam.

Oleastri species quibusdam, Ges. hort.

Olea sylvest. Septentrionalium; sive Eleagnos

Theophr. folio Viticis, Lob.



Oliva Bohemica, Lugdun.

Seisefyn, Rauvvolf.

Alij Elæagnum Theoph. alij Ziziphum Cappadocicam Plinij, alij ejusdem lib. 6. c. 18. Jovis barbam esse volunt.

Plinius lib. 21. cap. 9. de Coronis agens, duo

earum inquit genera, quando aliæ flore constant, aliæ folio: florem dixerim esse Genistas, namque & ijs decerpitur luteus, item Rhododendron, item Zizipha quæ & Cappadocica vocatur, his odoratus, similisque olearum floribus.

## S A L I X.

**S**alix, *ιτέξ* Græcis, παρὰ τὸ ἰέναι, quod citò in altum excreseat, inter primas etiam germinans: & Latinis, quod celeritate crescat ut salire videatur, dicitur. *ιτέξ* arbor est vulgo cognita, Diosc. l. 1. c. 136.

Genera: Theoph. 3. hist. 13. *Salix multigena* est: nam alia nigra dicta, quod cortice nigro, aut puniceo tegatur: alia candida, quod candido: virgas pulchriores & ad texendum commodiores nigra profert: candida spissiores. Est tam nigra, quam candida genus quoddam parvum: hanc Arcades non *ιτέξ*, sed *ἐμλέν* vocant, existimantq; fructum secundum eam parere. At Plinio l. 16. c. 37. *Salicu* plura genera: nam quædam & in proceritatem magnam emittunt, jugis vincrum perticas præbent, pariuntq; baltheo corticis vincula: & alia virgas sequacis ad vincituras lenticiæ. Alia prætenues viminibus texendus spectabili subtilitate. Rursus alia firmiores corbibus, ac plurima agricolarum suppellectili: candidiores ablato cortice leves tractatu, molliorib. vasis quam si è corio fiant, atq; etiam supinarum in delicias cathedarum aptissima. Finditur Græca rubens Amerina, ut & candida, haud paulò flexilior, ideo solido ligans nexu. In Asia tria genera observant, nigram utiliorem viminibus: candidam, agricolarum usibus: tertiam quæ tenuissima est *Helicem* vocant. Apud nos quoq; multi totidem generibus nomina imponunt: vimineam vocant, eandem purpuream: alteram nitelinam à colore, quæ sit tenuior: tertiam Gallicam, quæ tenuissima. Et l. 17. c. 20. *perticalis* & *viminalis* meminit: hæc Plinius. Quære veteres *Salices* distinguere colore primum, dein usu: colore, albo, nigro seu purpureo, sive phæniceo, sive rubente & vitellino, qui in cortice spectatur. Usu, quod alia sit *perticalis*, alia *viminalis*: alia fistilis, alia ex qua vincula fiunt: alia ex qua virgæ fiunt, vel tenues & myalida, vel firmiores & crassiores, ad varia opera.

I. *Salix vulgaris alba arborefcens.*

*Salix alba* Theophr. & Plinio.

*Salix* ex qua perticæ fiunt, Matth.

*Salix perticalis*, Cord. in Diosc.

*Salix prima vel major* Dod.

*Salicis* quartum genus, Lon.

*Salix*, Ad. Dioscoridis, Lob.

*Salix alba perticalis*, Lugd.

Ex hac pali ad virium pedamenta, & stipites ad sepes firmandas fiunt.

II *Salix vulgaris nigricans folio non serrato.*

*Salicis* primum genus, Trag. Fuch. Tur.

*Salix Gallica*, Cord. in Diosc.

*Salix nigra seu punicea*, Lon.

*Salix nigra seu rubens*, Thal.

*Salix phœnicophlæos sive phœnicea*, Lugd.

III. *Salix vulgaris rubens.*

Τὸ αἶος nomine (*Salicem Amerinam* Gaza vertit) Theophr. l. 6. c. 2. designasse aliqui volunt: verum hæc *Salix* fructus non habet: cum in Oeso fructus sit, vel niger, vel candidus.

*Salix Amerina nigra & rubens*, Plinio.

*Salix colore rufescente*, quæ Græca vocatur, Matthiol.

*Salicis* tertium genus, Fuch. Tur. 1. genus, Lon.

*Salix viminalis*, Amerina & Sabina Columellæ, Dod. gal.

*Salix minor, viminalis & Gallica*, Dod.

*Salix Amerina*, Lugd.

*Salix Sabina sive Amerina*, Thal.

Ex hac vincula quibus in aqua maceratis vires & doliorum circuli vinciuntur: & alteri cortex magis ruber, alteri nigricat.

IV. *Salix sativa lutea folio crenato.*

*Salix tertia*, Trag. Cæs.

*Salix vitellina*, Dod. gal. Cord. in Diosc.

*Salicis* alterum genus, Fuch. Lon.

*Salix angustifolia* sylv. Tab.

*Salix aquatica*, Ger.

V. *Salix folio amygdal. utrinq; virente aurito.*

*Salix μυλωνόφλοιος*, id est, cortice nigro, Theoph. 3. hist. 13.

*Salix purpurea*, Plinio.

*Salix*, Matth. in fig. major, Ger.

*Salix sylv. latifolia*, Tab.

*Salix purpurea nigra viminalis*, Lugd.

Hæc virgas tenues præbet, ad corbes, sportas, fiscinas, & similia conficienda: huic peculiare, quod singulorum foliorum exortibus alæ duæ adpositæ sint.

VI. *Salix folio longissimo, angustiff. utrinque albedo.*

*Elæagnus* (Zenigole Patavinorum) Ang. Cast. *Elæagnus* Dalechampi, & *Salicis* 6. genus, Lug.

*Ελαγιον* nomen, ex *ελαία* nōi ἄγρον, ex olea & vitice compositum est: nam ut Theop. 4. hist. II. *Elæagnus* fruticosa planta est Agno similis, folio, figura eidē simili, molli, lanuginoso, ut *Mali cydoniæ*, fl. albæ populi minore, fructu nullo.

VII. *Salix humilis angustifolia.*

*Salix humilis*, Dod. ico.

*Salix humilis repens angustifolia*, Lob. Lugd. an *Chamæitea*, Tab. & Ger.

VIII. *Salix oblongo incano, acuto folio: quæ 2. loco in Prodomo describitur.*

IX. *Salix fragilis.*

*Salix* 2. candido cortice, Trag.

*Salix candida* vel *Græca*, Dod. gal.

*Salicis* tertium genus, & *Salix alba*, Lon.

Hæc ad ligamenta planè inutilis est: communiter cortice albo, rarius rubro, de qua sub *Salice* 1. in Prodomo.

*Salicis* 4. genus, quam vulgo *Vitricem* vocitant, quòd vitri modo frangatur, Cæs. proponit, sed folia lata subrotunda & hirsuta tribuit.

X. *Salix* folijs glaucis & per ambitū hirsutis.

XI. *Salix humilis capitulo squammoso.*

*Salix Helice* Theoph. 3. hist. 13. Lugd.

*Salix angustifolia*, Cl. pan. Pannonica, Eid. hist.

Sæpè folijs vesicæ subrubentes, & furculis, pilulæ quædam scabræ insident.

*Salix latifolia.*

I. *Salix latifolia rotunda.*

*Siler arbor*, Ang.

*Salix lato folio*, Gesn. hort.

*Chaleb Syrorum*, Gesn. quia fl. est odoratiss. Cam.

*Salix platyphyllos*, Adv. alia, Thal.

*Salix larifolia*, Cam. Clus. hist.

*Salix platyphyllos* sive *leucophlæos* & *Elæagnos* quibusdam, Lugd.

*Salix caprea rotundifolia*, Tab. Ger.

De *Silere* Plinius l. 16. c. 18. hæc habet: non nisi in aquis proveniunt *Salices*, alni, populi, *siler*, *ligustra* tessaris utilissima: & c. 21. *Siler* folia non decidere scribit, nulla alia nota addita: de quæ ejus viribus l. 24. c. 10. egit.

Hujus carbo citissimè ignem concipit, quare ex ejus cinere, sulphure & aphronitro pulvis tormentarius conficitur: hujus carbonibus pictores ad delineanda opera utuntur.

II. *Salix folio ex rotunditate acuminato.*

*Salicis* quartum genus, Trag. Lon.

*Salix aquatica*, Lob. ico.

*Salix platyphyllos*, Thal.

*Salix caprea latifolia*, Tab. Ger.

III. *Salix latifolia minor.*

*Salicis platyphylæ* species alia, Thal.

IV. *Salix subrotundo argenteo folio, quæ 3. in Prodomo.*

V. *Salix maritima ostrearum testis innascens.*

*Salix marina*, Lugd.

*Salix pumila latifolia.*

I. *Salix humilis latifolia erecta: quæ 4. in Prodomo.*

II. *Salix latifolia repens.* (ep.

*Salix pusilla humilis*, seu *Salicula repens*, Cam.

*Salicis pumilæ* genus 2. Clus. pan. & hist.

*Salix pumila*, Tab. humilis, Ger.

*Salix pumila*, folio latiore, Dod. belg.

*Salix leucophlæos palmum alta*, Lugd.

III. *Salix alpina pumila rotundifolia repens, infernè subcinerea.*

*Salix pumila latifolia prior*, Clus. pan. & hist.

IV. *Salix pumila folijs utrinque candicantibus & lanuginosis.*

*Salix abortiva*, Lugd.

V. *Salix saxatilis minima, quæ 7. in Prodr.*

*Salix pumila angustifolia.*

I. *Salix pumila linifolia incana.*

*Salix pumila angustifolia prior*, Cl. pan. & hist.

*Salix pumila folio angustiore*, Dod. belg.

II. *Salix pumila brevi angustoque folio incano.*

an *Salix humilis repens*, Adv. Lob. ico.

*Salix pumila angustifolia altera*, Cl. pan. & hist.

Hæc variat: nam paulo latioribus folijs quæ in sabulosis Hollandiæ aggeribus Oceano obiectis nascitur, Clusio monente.

III. *Salix alpina Pyrenaica: quæ 6. in Prod.*

IV. *Salix alpina angustifolia repens, non incana, quæ 5. in Prodomo:*

*Salix exotica.*

V. *Salix Syriaca folio oleagineo argenteo.*

*Zarneb* vel *Zarnabum*, Rhafi cap. 353. & *Avicennæ* cap. 749.

*Zurumbeth Serapioni*, cap. 26.

*Elæagnus Theophrasti.*

*Saffas Syrorum*, Rauvv. & Lugd. app.

*Calaf seu Ban*, Alpino.

Verum *Rauvv.* folijs angustioribus, at *Alpinus*

nus latioribus pingit : hanc sub nomine arboris magnæ virtutis, ab insigni Pharmacopæo D. Jo. Pona Verona hoc anno accepimus.

Ex floribus incolas aquam cordialem elicer, re, Rauvvolfius scribit : & quidem in Ægypto, quam Macahalef vocitent, Alpino monente.

II. Salix Arabica folijs Atriplicis.

Garb Arabum, Avicen. cap. 326. & 686.

Salix exotica, Garb incolis, Rauvv.

Garb Maurorum, Lugd. app.

Ex hac apud ipsos Aphronitrû optimum fit, ad ignariû pulverem conficiendû, Rauvv. monete.

## AGNUS CASTUS SIVE VITEX.

**V**itex, Græcis ἀγνός, ἡ λύγος Dioscoridi lib. 1. cap. 135. ἀγνός, id est Castus, quod ab ijs à quibus estur, aut bibitur, aut subternitur, castitatem conservet, Gal. 6. simplicium auctore : quare matrone in Thesmo-phorijs Atheniensium ἀγνόςσσαι, id est, castitatem custodientes, folia hujus arboris sibi sternebant, Dioscoride & Plinio referentibus. Cui & λύγος (quasi vimen) propter invictam serè virgarum flexibilitatem : officinis, Agnus castus : cujus semen quibusdam à Piperis similitudine, Piper vocatur. Est Diosc. frutex in arborem assurgens : virgulta gerit fractu contumacia & longa : folia verò olivæ, sed teneriora atque majora. Theoph. ἀγνός (Amerinam Gaza vertit) cultura arbor efficitur, cum frutex sit, 1. hist. 5. verum super fructum ipsum florem insidentem emittit : virgas parvas sicut cornus semina suo latere profert & fructuosior est, nodos tamen geminatos, tum invicem congruos habet, 1. hist. 21. Plin. lib. 24. cap. 9. non multum, inquit, à Salice vitilium usu distat Vitex, foliorum quoque aspectu, nisi odore gravior esset.

Genera ejus duo : est quæ album florem, cum aliquatenus purpureo mittat, altera purpureum profert, Diosc. ac Plinio l. c. major, in arborem Salicis modo assurgit : minor, ramosa, folijs candidioribus, lanuginosis : prima album florem mittit in purpureo, quæ & candida vocatur : nigra, quæ tantum purpureum.

I. Vitex folijs angustioribus cannabis modo dispositis.

Vitex, Trag. Dod. ut : Ang. Cord. in Dioscor.

Gefn. hort. Lac. Tur. Lon. Cæs. Lugd. Cam.

Vitex sive Salix Amerina, Matth.

Agnus sive Vitex, Bellon.

Agnus castus, Gefn. hort. Cast.

Elæagnon Theophrasti, Adv. Lob.

II. Vitex latiore folio.

Vitex latiore serrato folio, Lob. Lugd.

III. Vitex trifolia minor.

Agni casti species multo minor cæteris, tribus tantum firmis folijs donata, Rauvvolf. Sed quid?

## S P I R Æ A.

**D**E Spirea hæc habet Theophrastus 1. hist. 25. plura ex alijs fructum cacumine ferunt, quam ex arboribus. ut frumentorum quæ spicam parunt. & fruticum ἰσπύριος καὶ ἀσπράγια (aliqui ἀσπράγια legunt) ἢ ἀγνός, ἢ ἀνδρίλα : erica spirea, amerina, ut Gaza vertit qui omittit ἢ ἀνδρίλα, id est, & alia quadam.

Frutex spicatus folijs salignis ferratis.

| Spirea Theophrasti forte, Clus. hist.

## L I G U S T R U M.

**L**igustrum Græcis λυγός. Cyprus Diosc. lib. 1. cap. 124. arbor est folijs circum virgulta olivæ similibus, sed latioribus, mollioribus & viridioribus : floribus candidis muscosis, odoratis : semine nigro. sambuci fructui simili : & Plinio lib. 12. cap. 24. Cyprus in Ægypto est arbor Ziziphi folijs, semine coriandri, flore candido odorato : & mox, quidam hanc esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur : & lib. 24. cap. 10. Ligustrum eadem arbor est, quæ in Oriente Cyprus.

I. Ligustrum Germanicum.

Ligustrum, Brunf. Matth. Tacun. Fuch. Cord. in

Diosc. Bellon. Gefn. hort. Tur. Lob. Rauvvolf.

Cæs. Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger. Eyft.

Ligustrum vulgare, Trag.

Ligustrum majus, Lon.

Phyllirea, Dod. ut : Ang. Gefn. hort.

Halimus, Lac.

Ligustrum Diosc. nostras, Adv.

Ligustrum Italicum, Alpino.

Sunt qui Cyprum Dioscoridis volunt, ut Tragus, Matth. Cord. in Diosc. Cæs. & alij : negant alij, ut Anguillara, qui Ligustrum Latinorum facit : alij Phylliream volunt, ut Dod. & Ang.

Flore est albo, Tragus & subluteo notavit, & Ligustri aliam speciem nominat : & Lonicerus majus & minus facit.

II. Ligustrum myrtifolium Italicum quod 1. in Prodomo : quod etiam nomine Myrti ligustri folio, accepimus.

III. Ligustrum folijs laciniatis, quod 2. in Prodomo, & Ligustri nigri nomine ex Italia primum, dein pro Syringa laciniatis folijs ex horto Nobil. Contareni habemus.

IV. Ligustrum Ægyptiacum latifolium. Cyprus Græcorum, Alcanna vel Henne Arabum, nunc Græcis Schenna, Rauvvolf. & Lug. append.

Cyprus Plinij sive Alcanna, Belli ep. 4. ad Clus.

Henne in Ægypto aliàs Alcanna, Bellonio. Alcanna Arabum, Clus. ad Bellon. Alkana, Adv.

Flore est pallide subflavo.

V. Ligustrum Ægyptiacum angustifolium. Ligustrum Ægyptium, Elhanne seu Tamahatendi, vel Alcanna Avicennæ, Alpino.

Figura enim ab Alpino proposita diversa, à Rauvvolfij figura, quod & Clusius in cur. posterioribus monet : & Alpinus florem subcinerum Sambuci floribus minorem tribuit : quare an diversæ considerandum : ramum solum baccis minutis seminibus refertis onustum, sed sine folijs, ex Creta ab Honorio Belli habemus. In hist. orient. part. 4. figura tab. 15. sub Mangostans proponitur.

## P H I L L Y R E A.

**Φ**ιλλύρα Dioscor. lib. 1. cap. 125. arbor est Cypri magnitudinem aquans, folijs oleaceis, sed latioribus & nigrioribus, fructu lentisci nigro, subdulci, & quasi racemato.

I. Phillyrea latifolia levis.

Phylerea arbor Galloprovinciæ, verior Macaleb Serapionis, Adv. Lob. ico.

Phillyrea, Cam. ep. \* notata.

Phillyra, Mahaleb Serapionis, Lugd.

Philyca Dalechampij, Eid.

Mahalepum Serapionis, Tab.

II. Phillyrea latifolia spinosa.

Phillyrea prima, Clus. hisp. & hist.

Phillyrea prior Clusij, Lugd.

III. Phillyrea folio leviter ferrato.

Phillyrea 2. Clus. hisp. & hisp. Lugd.

Phyllirea ferrata, Ger.

IV. Phillyrea folio Ligustri.

Phillyrea, Matth. Lac. Rauvv. Lugd.

Phillyrea Bellonij, Gesn. hort.

Cyprus latiore folio, Dod.

Phillyrea major, Adv. Narbonensis, Lob.

Phillyrea tertia, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Phillyrea media, Cam. ep.

Alaternus major Dalechampij } Lugd.

Phillyrea Penæ major, }

Ilattrum, Cæs. & Phillyra, Theoph.

Phyllirea latiore folio, Ger.

V. Phillyrea angustifolia prima.

Cyprus, Dod.

Phillyrea quarta, Clus. hisp. & hist. Tab.

Phillyrea angustifolia, Lob. Cam. ep. Ger.

Phillyrea minor, Adv. Penæ, } Lugd.

Alaternus minor Dalech. }

VI. Phillyrea angustifolia secunda.

Phillyrea quinta, Clus. hisp. & hist.



## S E C T I O Q U A R T A.

PHILYCA; CELASTRUS; OENOPLIA; RHAMNUS; LYCIUM; RUBUS; CHAMA RUBUS; CAPPARIS; ROSA

Sativa, sylvestris, & Hiericuntica.

## P H I L L Y C A.

**Φ**ιλλύρα Theophrasto 1. hist. 15. ex sylvestribus perpetuo viret : 3. hist. 6. ineunte Vere germinat : 5. hist. 7. candor ei Celastri modo, semper fronde abundat. Plinios 16. c. 26. Alaternus dicitur, qui inter arbores fructum nullum ferentes, hoc est, ne semen quidem, refert, cui folia inter Ilicem & Olivam.

I. Philyca elatior.

Alaternus, Ang. Portæ, Cam.

Philyca Theophr. Alaternus Plinij, Elæprinos Cretensium, Bellonio.

Alaternus Plinij (& Spina cervina quorun-

dam) Lobel. icon. Gerard.

Alaternus prima, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Celastrus mas Theophrasti, Cæs.

Bourgespine Monspeliensium, Adv. Lob. ob.

Apharca Theophrasti, Lugd.

Phillyra

Phillyra mas Theophrasti, Cæs.

Alaternus Turneri, Tabern. qui duas figuras adposuit.

*Ἀλάρνυς* Theophrasto 1. hist. 15. ex sylvestribus arboribus perpetuò viret: 3. hist. 6. fructum primum cum uva nigrescit & varia fit, maturant: alterum cum vitis floret: bis enim ambæ

fructum ferre videntur.

II. Philyca humilior.

Alaternus alter, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Alaternus alter humilior, lato folio, Lob.

Ilattrum folio ad llicem accedente, Cæs.

Celastrus fœmina Theophrasti, Lugd.

Alaternus humilior, Ger.

## C E L A S T R U S.

**K** *Ἠλάστρε* Theophrasto 1. hist. 6. cultum nullum patitur: 1. hist. 15. folia nunquam demittit: 3. hist. 6. & tardissimè fructum perficit: 5. hist. 8. ad baculos idonea est.

Celastrus Theophrasti, Clus. in cur. post. | hanc ex horto Leideni accepiamus.

## O E N O P L I A.

I. Oenoplia non spinosa.

Sudar Serapioni.

Oenoplia seu Napeca Bellonij, Connarus Alexandrinorum forte apud Athenæum, Clus. hist.

Hanc una cum fructu & floribus, ex Creta ab

Honor. Belli accepiamus.

II. Oenoplia spinosa.

Nabca, Paliurus Athenæi credita, Alpin.

Oenoplia spinosa, Honor. Belli, Clus. histor.

& ep. 5.

## R H A M N U S.

**R** *Ῥάμνος* Dioscoridi lib. 1. cap. 119. frutex est circa sepes nascent: virgas rectas & spinas aculeatas, ut *Oxyacantha* habens: folia verò parva, oblonga, subpingua, mollia: est & altera candidior. De tertia, vide sub *Paliuro*. Et Theoph. 1. hist. 15. *Ῥάμνος* frutex est perpetuò virens: 3. hist. 17. & alia candida, alia nigra, fructusq; diversus, ambæ verò aculeigera: 3. hist. 18. peculiare racemis, quod per latera caulium septunt: postremoq; caulis racemus omnium maximus propendet. Plinio lib. 24. cap. 14. inter genera Ruborum. *Rhamnus* appellatur a Græcis, candidior & fruticosior: is floret ramos spargens rectis aculeis, non ut ceteri aduncis, folijs maioribus. Alterum genus est sylv. nigris & quadantenus rubens: fert veluti folliculos.

I. *Rhamnus* spinis oblongis, flore candicante.

*Rhamnus* candida, Theophrasti.

*Rhamnus* primus, Matth. Ang. Lac. Lon. Clus.

hisp. & hist. Dod. Rauvvolf. Lugd. Cast.

*Rhamnus* candida, Cord. in Diosc.

*Rhamnus* alter Dioscoridis Monsp. Adv. Lob.

Lugd.

*Rhamnus*, Bellon. Cæs.

an *Rhamnus* circa Tripolim ipsis Hauser, Arabibus.

Huifegi five *Rhamnus* primus, Rauvvolf.

II. *Rhamnus* alter folijs salis flore purpureo.

an *Rhamno* altero similis, Bellon.

*Rhamni* prioris altera species, Clus. hisp. & hist.

Lob.

*Rhamnus* primus alter, Dod.

*Rhamnus* alter Clusij, Lugd.

*Rhamni* species quæ Spina sancta, Colum.

III. *Rhamnus* tertius flore herbaceo baccis nigris.

*Rhamnus* niger Theophrasti.

an *Rhamni* genus baccis nigris in Græcia, Bellon.

*Rhamnus* tertius, Clus. hisp. & hist. Dod. Taber.

Ger. yd.

*Rhamnus* primæ speciei tertius, Lob.

IV. *Rhamnus* Salicis folio angusto fructu flavescente.

*Rhamnus* secundus, Matth. Dod. ur: Lac. Lon.

Clus. hisp. & hist. Lugd. cum figura Matchioli &

Dodonæi.

an *Rhamni* genus baccis rubentibus, Bellon.

*Oleaster* Germanicus, Cord. in Diosc. & hist.

*Oleatri* peculiare genus, Cord. ob.

*Rhamni* species, Cam. ep. & horr.

*Rhamnus* primus Diosc. Adv. creditus, Lob.

*Rhamni* alterum genus, Cæs.

*Hippophaë* Dioscoridis fortè, Colum.

V. *Rhamnus* folio subrotundo fructu compresso.

*Rhamnus* tertius Diosc. quem scribit nigrioribus, latioribusq; folijs & quadantenus ruben-

tibus : virgultis oblongis, quinque ferè cubitorum & spinosioribus quidem, ar minus firmos, & rigidos aculeos habens : fructus verò latus, albus, tenuis, folliculi figura, fructu verticilli. Sunt qui Rhamni 3. Dioscoridis descriptionem ad Paliuri ejus historiam revocandam velint : de quo lib. 1. cap. 121. sic : *παλιν* & frutex est vulgo notus, aculeatus, solidus, cujus semen pingue, & lini seminis æmulum reperitur. De quo Theoph. 1. hist. 5. frutex est : 1. hist. 8. spinosus : 1. hist. 6. folia cum extremorum lateribus sinuata concidunt : 3. hist. 6. & post Occasum Vergiliarum fructum reddit : 3. histor. 17. habet quoque nonnullas differentias : omnes autem fructiferæ, &c. & 4. hist. 4. in Africa plurima est & fruticosior, folio nostrati (id est Jujubis) simili, fructu diverso, fructum ferens latum instar folij, &c.

Spina Judaica, Crescentio.

Rhamnus tertius, Matth. Aug. Lac. Gesn. hort. Lon. Cast. Cam. Colum.

Rhamni tertia species, Dod. gal.

Rhamnus niger, Cord. in Diosc.

Paliurus & Apaliura Græcis vulgo, Bellon.

Paliurus frutex, Gesn. app.

Paliurus, Dod. Adv. Lob. Rauvvolf. Lugd. Cast. Cam. Eyst.

Jujuba sylvestris & Spina Marruca, & Paliurus Africanus Theoph. Cæs.

VI. Rhamnus catharticus.

Rhamni alia species, Trag.

Spina infectoria, Matth. Bellon. Adv. Lob. Cast. Clus. hist. Tab.

Spin merlo, Cast. ap.

Rhamnus solutivus, Dod. ut : Thal. Ger.

Cervispinga, Cord. hist.

Spina cervina vulgo, Gesn. hort.

Spina alba, Lon.

Spina cervalis vulgo, Cæs.

Rhamnus catharticus, Lugd.

Communiter frutex est : aliquando arboream altitudinem adipiscitur.

VII. Rhamnus catharticus folio oleæ.

Hippophaes, Ang.

an Hippophæstum quorundam, Lugd.

VIII. Rhamnus catharticus minor.

Spina infectoria pumila prior, Clus. pan. & hist.

Rhamni solutivi minor species, Cam.

IX. Rhamnus folijs oblongis serratis.

Rhamnus Bavaricus, Lugd.

## L Y C I U M.

**L**ycium, à Lycia in qua magnus hujus proventus fuit : & *νοξέουρα*, id est Buxus aculeatus, à similitudine quadam cum Buxo dicitur. Est Dioscoridi l. 1. c. 132. arbor spinosa, virgis trium cubitorum, aut etiam longioribus, circa quas folia sunt buxo similia, densa : fructum habet instar piperis nigrum amarum. densum, lavem : corticem verò pallidum Lycio densato similem, & radices numerosas, obliquas, lignosas : & mox fertur & Lycium Indicum fieri ex frutice Lonchitide appellato : est is spinarum genere, virgas habens rectas tricubitales, aut etiam majores, à fundo transversas & Rubo crassiores : ruptis cortex rubescit, folia verò oleæ similia. Et Plinius l. 12. c. 7. fert & spina piperis similitudinem, præcipua amaritudine, folijs parvis densisq., Cypri modo, ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice lata, lignosaq., buxei coloris : & l. 24. c. 14. Modum conficiendi docet : addens spinam ex qua Lycium fiat, in Græcia pyxacanthem chironium vocari.

I. Lycium buxi folio.

Lycium, Matth. Tab. Ger.

Lycij nomine ostenditur, quæ tamen verum non est, Ang.

Pyxacantha, Dod. ut : Lon.

an Lycium seu Pyxacantha Narbonensium, Ad.

Lycium alpinum, Lugd.

II. Lycium facie pruni, sylv. five Italicum.

Lycium Italicum, Matth. Lugd. Tab.

Spina infectoria pumila altera, Clus. pan. & hist. Ponæ.

Lycium Hispanicum, Ger.

III. Lycium Hispanicum folio oblongo.

Lycium Hispanicum, Lob. Lugd.

IV. Lycium Hispanicum folio buxi.

Lycium quorundam, Clus. hisp. & hist.

an Tamaio, Lycium verum, Frag.

V. Lycium latifolium.

Paliurus alter peregrinus, Adv. Lobelius in iconibus titulum habet, sed figura subiecta non convenit, quæ sub Rhamno 3. repetitur, & est Oxyacanthæ Dioscoridis.

VI. Lycium Gallicum.

Lycium Dalechampij, Lugd.

Grana luteo colore tingunt.

VII. Lycium Indicum folijs pruni.

Frutex spinosus peregrinus, Arabibus Hadhadh, incolis Zaroa, Rauvva

Lycium

Lycium legitimum Rauvvolfij, Cluf. hift.  
Lycium in Libano proveniens, Belli epistola prima.

VIII. Lycium Indicum alterum.

Uzeg, Lycium Indicum creditum, Alpina.

IX. Lycium folijs ericæ.

Cate five Lycium, Garz. Acoft.

Lycium cujus succus Cate dicitur, Frag.

X. Lycio affinis Ægyptiaca.

Agiahahid, Alpino.

XI. Frutex exiguis foliolis confectus.

Tamaxo, Cluf. hifp. & hift.

## R U B U S.

**R**ubus βάρῃ Græcis: notitiæ vulgaris est Dioscor. l. 4. c. 37. At Theoph. 1. hift. 5. frutex est: 2. hift. 16. cujus folia cum extremo, tum lateribus sinuata concidunt & spinosa cuncta redduntur: 6. bi. 1. imò etiam caulibus & rami: 1. cauf. 21. fructum racematim gerit, & non solum serò, sed etiam particulatim maturefcit.

Genera: Theoph. 3. hift. 18. plura esse scribit: & trium meminit: quadam erecta quæ βάρῃ: quadam deorsum vergens, quæ χαμαίβαλῃ: tertia αὐωὶσβαλῃ dicitur. Et à Dioscor. l. c. βάρῃ: & cap. seq. βάρῃ ἰδαία: & l. 1. c. 123. αὐωὶσβαλῃ proponitur. Plin. l. 16. c. 37. Rubi mora ferunt: & alio genere similitudinem rosæ, qui vocatur Cynosbates: tertium genus Idæum vocant Græci à loco. Sic l. 24. c. 13. duorum priorum meminit: & cap. seq. Cynosbati, rubi Idæi, & Rhamnum inter Rubi genera recensuit.

I. Rubus vulgaris, five rubus fructu nigro. βάρῃ Græcis: Senticis, Latinis dicitur: & fructus mora rubi, βάρῃ Galeno: quibusdam Vacinia: officinis, mora bati.

Rubus Dioscoridi & Plinio.

Rubus excelsa, Theophrasto.

Rubus, Brunf. Matthiol. Fuch. Dod. ut: Cord. in Dioscorid. Lac. Turn. Lon. Lob. Cæsal. Cast. Lugdun.

Rubus grandis & secundus, Trag.

Morus five Rubus, Ang.

Rubus vulgaris, Gesl. hor. Thal.

Rubus Batis, Adv.

Rubus arvensis, Taber.

Rubus Idæus, Ger. icon.

II. Rubus repens fructu cæfio.

Chamæbatus Theophrasto, humirubus Gazæ.

Rubus humilis & primus.

Rubus minor, Dod. ut:

Rubus reptans, Ad.

Rubus humilis Belgicus, Cluf. pan. & hift.

Rubi alterum genus, Cæf. Lugd.

Fructu est communiter cæfio, modo cæruleo, modo nigro & minore.

III. Rubus Idæus spinosus.

βάρῃ ἰδαία appellatur, quoniam copiosius in Ida nascatur: est autem longè tenerior priore, exiguis spinis præditus: quanquam & sine spinis inveniatur: hæc Dioscorid. l. 4. c. 38. Et Plinius l. 16. cap. 37. Tertium genus Idæum vocant Græci à loco: tenuius quam cætera, minoribusque spinis & minus aduncis.

Rubus Idæus Dioscoridis & Plinij.

Rubus Idæus, Trag. Matthiol. Ang. Dodon. tu:

Bellon. (qui in Ida monte invenire non potuit) Gesl. hort. Turn. Lon. Adv. Lobel. Cast. Thal. Ger. desc. & part. 3. Ind. Orient. & 2. part. Ind Occid.

Rubus Idæus major, Lac. desc.

Rubus Idæus exilibus spinis, Cord. in Diosc.

Rubus tertius montibus proprius, Cæf.

Rubus Idæus spinosus, Lugd.

Rubus Idæus vulgaris, Cluf. hift.

IV. Rubus Idæus lævis.

Chamæbatus, seu Rubus Idæus alter, Trag.

Rubus tertius, Cord. in Diosc.

Rubi alia species, Gesl. hort.

Βοκσβέρε/ id est, baccæ hircinæ, Lon.

Rubus hircinus, Tab.

Rubus Idæus non spinosus, Lugd.

Rubus Idæus Placæ, Cluf. hift. desc.

Rubus, Ger. ico.

V. Rubus Idæus fructu albo.

Rubus Idæus leucocarpos, Cam.

Rubus Idæus fructu candido, Thal. Cluf. hift.

VI. Rubus exoticus.

Rubi facie senticoſa planta, Ad. Lob. ico.

Arboris truncus spinosus, Lugdunens. descr. at figura sub titulo Nerei facie secundo loco habetur.

Chamærubus spinis carens.

I. Chamærubus saxatilis.

Rubus alpinus humilis, Gesl. hor.

Rubus Idæus, Eid. Fraſto.

Rubus saxatilis, five petreus, five alpinus, Cluf. pan. & hift.

Rubus parvus saxatilis alpinus, Cam.

Rubus minimus, Thal.



Acini huic bini, terni, quaterni, ad summum quini sunt.

II. Chamærubus folijs Ribes.  
Chamæmorum Norvvegica, Clus. hist.  
Fructus rubeus aut pallidus.

III. Chamærubus folijs Ribes Anglica.  
Chamæmorus, Clus. pan. & hist.

IV. Chamærubus folijs Vitis.  
Chamæmorus altera Norvvegica, Clusio in historiis rariorem.

## C A P P A R I S.

**K** *Ἀπώρις* Dioscorid. l. 2. c. 204. frutex est aculeatus per terram in orbem stratus, spinas aduncas ut *Rubus* habet, folia rotunda, malo cydonio similia: fructum ut *Olea*, quæ cum dehiscit album strem promit, quo delapso quiddam glandis oblongæ figuræ reperitur, quod apertum grana tanquam punicæ habet exigua, rubentia: radices lignosæ, magnæ ac numerosæ. Theoph. 6. hist. 10. ramis aculeatis constat: 6. hist. 3. & non solum caule aculeato, sed etiam folio hispido: 1. hist. 6. & 3. hist. 13. quæ cultura deterior redditur, ut natura sylv. dixeris: sic 3. caus. 1. ubi *Gaza* vocem *Ἀπώρις* Inturim vertit, ut & 6. hist. 5. & 7. hist. 8. alibi verò Capparim reddidit. Plin. l. 13. c. 23. Capparis, quidam & *Cynosbatum* vocant: alij *Ophiosaphylon*: vide & l. 19. c. 8.

Genera: Dioscorid. habet Africam, Marmaritam, Apulam, & quæ è rubro mari & Arabia desertur: quæ qualitatibus variant: idem & Plinius lib. 13. cap. 23. refert:

I. Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo.  
Capparis, Trag. Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Dioscor. Gefn. hort. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd. Rauvvolf. (qui & sylvestrium meminit) secunda, Tabern.

Capparis spinosa, Bellon.  
Capparis retuso folio, Lob.  
Capparis Italica, Cæs.  
Capparis rotundiore folio, Ger.

II. Capparis folio acuto.  
Capparis, Dod. prima, Tab.  
Capparis folio acuto, Lob. Lugd. Ger. Eyf.  
Capparis aliud genus, Cæs.

Plinio l. 19. c. 8. laudatiss. in Caria, proximum Phrygia. Verum Alexandria Ægypti Venetias præstantiss. adferri, Lugdun. scribit. De cultura Capparum Quiqueranus de laudibus Provinciæ legendus.

III. Capparis non spinosa fructu majore.  
Capparis non spinosa, Bellon.

In Arabia arborefcit & hyeme folia retinet.  
Cappares Alexandriæ majores esse, quàm alibi, quas Cappar appellant, Alpinus auctor est.

IV. Capparis arborefcens fructu Juglandis magnitudine.

Capparis Arabica fructu ovi magnitudine, semine piperis instar acris, Bellon.

Capparum arbor, Rauvvolf. qui fructus magnitudinem non exprefsit.

Cappares plurimum ab his quæ in arborescunt & quæ in Græcia proveniunt, differentes in Tauri montis saxorum fissuris, Bellonius notavit.

V. Capparis portulacæ folio.

Capparis leguminosa, Lob. Tab.

Capparis Fabago, Dod. Ger.

Capparis sylv. sive fabaginea, Cam. ep.

Morgani, Syrorum: Andirian, Rhafis: Ardirig, Avicennæ, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Fabago Belgarum, Lugd.

Telephium Dioscoridis & Plinij, Colum.

Peplios Petri Quith pharmacopæi Lutetiani in cujus orto anno 1579. collegimus.

VI. Capparibus similes baccae in Virginea. Sacquennumener baccae plantæ, quæ in stagnantibus aquis reperitur, part. prim. Ind. Occident.

## R O S A.

**R**osam vetustas ex sanguine Veneris: & Turca ex sudore Mahometis, ortam sibi persuadent, cujus nomine folia Rosarum humi jacere non patiuntur: hac Græcis *ῥόδον* dicitur, quasi *ῥόδον* pro *ῥόδον* Etymologico: At Plutarcho 3. simpl. qui *ῥόδον* πολὺ τῆς ὀσμῆς ἀφίησι, quod largum odoris effluviū emittat. Theophrasto 1. hist. 15. Rosa inter suffrutices est, & perpetuo cacumine viret: 1. hist. 21. flores bicolores sunt, quod in his aliterum florem insidentem medium gerit: 1. hist. 22. verum flos ipse super fructum est: 6. hist. 2. ramis aculeati sunt. Et Plinio libr. 21. cap. 4. Rosa nascitur spina verius quàm frutice, in Rubo quoq. proveniens, illis etiam jucundi odoris, quàmvis angustis. Germinat omnis primo inclusa granoso cortice: quo mox intumescit &

in virides alabaſtros ſaſtigiato, paulatim rubefcens dehifcit ac ſeſe pandit, in calicis medio ſui ſtantis complexu, luteos apices.

Differentia Theophraſto 6. hiſt. 6. permulta ſunt, ſoliorum multitudine, paucitate, aſperitate, levitate, colore, odore: cum plurimis quina folia ſunt, quibuſdam duodena, vicienaq̃, alijs longè plura: ſunt enim quas Centifolias vocant, ſed folia interna parva admodum ſunt: ita enim oriuntur, ut alia intus alia extra emicent, non tamen jucundi odoris, odoratiores inter amplas quibus pars ima ſcabra: & 6. cauſ. 29. urbana roſa odoratiores ſylveſtri. At Plinius genera noſtri fecere celeberrima, Præneſtinam & Campanam: addidere alijs Mileſiam, cui ſit ardentiffimus color, non excedentis duodena folia: proximam ei Trachiniam, minus rubentem: mox Alabandicam vilioſam albicantibus folijs: viliffimam verò plurimis ſed minutiffimis Spineolam, &c. & mox: inter has media quam Coroneolam vocant: omnes ſine odore, præter Coroneolam, & in rubro natam: addit adhuc alias, quæ æquivoce potiùs Roſa appellata ſunt: addit & ea quæ ex Theophraſto adſcriptiffimus Sane Roſa variant ſloris colore, qui varius eſt, albus, candidus, pallidus, carneus, rubens: ſic differentia eſt in ſoliorum numero, magnitudine & odore: fruticis quoq̃, aliqua differentia pro magnitudine & parvitate, aſperitate & levitate. Sic in India Occiden. roſis omnia plena paſſim: & præter roſas ex Hiſpania importatas, ſpecies earum plurimæ alia naſcuntur, quarum alia rubra, alia crocea, nonnulla cerulea, quadam candida viſuntur: quas criſtarum ſpecie capitibus ſuis geſtant: part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 27.

#### Roſa ſativa.

##### I. Roſa rubra.

Roſa Mileſia, Plinij.

Roſa ſativa rubra multiplex, Brunf.

Roſa domeſtica punicea, Matth.

Roſa hortenſis rubra multiplex, Trag.

Roſa hortenſis, Fuch.

Roſa, Tur. Lac. Lon. rubra, Cord. in Dioſ. Lugd.

Ad. Tab. Ger.

Roſa rubra urbana, Gef. hort.

Roſa ſativa rubra, Ang. Caſt.

Roſa ſativa 3. quæ Provincialis Gallis, Dod.

Roſa Damascena, Lob.

Roſa rubens multifolia, Cæſ.

Roſa intenſè rubens, Cam.

Eſt ſimplex & multiplex, colore magis minusque rubro: huc referre oportet, ex Eſtett. horto,

1. Roſam Mileſiam flore rubro pleno: vulgo

Roſa ſina.

2. Roſam Mileſiam flore ſimplici rubro, &

3. Roſam ex rubro nigricante flore pleno, &

4. Roſam rubicundam Saccharinam dictam,

Græcula Plinij, Camer.

##### II. Roſa rubra pallidior.

Roſa ſativa quarta quæ francha Gallis, Dod.

Roſa hoſofericea, Lob. ico.

Roſa rubicunda, Cam.

Roſa tertia, Cæſ.

Roſa Damascena rubra, Lugd.

Hijs Trachinia, Præneſtina alijs, alijs Græcula Plinij: hæc priore minus rubet & flore ſimplici plerunq; eſt, & folijs latiffimis, cujus frutex ſpinis communiter caret.

##### III. Roſa ſaturatius rubens.

Roſa prima Præneſtinæ ſimiles, Cluſ. hiſt.

Roſa purpurea, ſive in rubro nigricans, Cam.

Folijs eſt quadragenis amplioribus, ſaturatius rubentibus, ad nigredinem vergentibus & alabaſtro craſſiore.

##### IV. Roſa purpurea.

Roſa trachynia, Plinio.

Roſa hortenſis ex purpura albicans, Trag. Gef. ner. hort.

Roſa domeſtica carnis colorem referens, Matt.

Roſa incarnata, Ang. Cam.

Roſa ſativa ſecunda ſive incarnata, Dod.

Roſa rubra ſive carnei coloris, Bellon.

Roſa pallida, Ad.

Roſa roſeo colore, Cæſ.

Roſa ſativa purpurea, Caſt.

Roſa minus rubens, Lugd.

Roſa provincialis major, Tab. Ger.

Roſa provincialis fl. incarnato pleno, Eſt.

Rosæ purpureas ſive rubeas, colore carni ſimiles Pharmacopœis Zebedenas dici, Joanniſ in tractatu de pilulis Aloës ſcribit.

Quibuſdam Alabandicæ ſimilis, alijs Præneſtina, alijs Campana Plinij.

##### V. Roſa verſicolor.

Roſa præneſtina verſicolor, Cluſ. hiſt.

Variat: nam ſlos media ex parte candicantibus, altera purpurafcentibus folijs, vel venis ſimilis coloris aſperſis conſtat. Vel folia quædam integra alba, quædam integra rubra, inter ſe commixta ſunt.

##### VI. Roſa maxima multiplex.

Roſa centifolia Batavica rubra, Cluſ. hiſt. Eſt.

an Centifolia veterum, quam in odora dicunt, cum hæc odora sit.

Variat: communiter flos ex albo rubet: habetur & alba, quæ

Rosa alba major Provincialis, } Clus. hist.

Rosa centifolia Batavica alba, }

Rosa provincialis flore albo, Eyft.

VII. Rosa multiplex media.

Rosa centifolia Batavica secunda, Clus. hist.

VIII. Rosa major Prænestina, Clus. hist.

Rosa prænestina variegata, Eyft.

IX. Rosa alba vulgaris major.

Rosa Campana Plinij.

Rosa sativa alba, Brunf. vel I. Dod.

Rosa hortensis candida, Trag. alba, Gef. hort.

Rosa domestica alba, Matth.

Rosa alba, Ang. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Rosa candida, Ad.

Rosa quarta candida, Cæf.

Hæc quibusdam spineola, alijs Alabandica Plinij censetur: foliorum numero flores variant: hinc

Rosa flore albo pleno; & Rosa alba flore simplici, Eyfster.

X. Rosa alba minor.

Rosa lacteola quæ centifolia Plinij videtur, Camer. Eyfster.

XI. Rosa moschata simplici flore.

Rosa moschata & Damascena, Matth.

Nesrim (vel Nesrim) Serapionis, Ang.

Rosa sativa quinta, Dod.

Rosa muscata simplex, Gef. hort. flore simplici, Lob. Gerard.

Rosa muscatula, Cæf.

Rosa alba Damascena flore simplici, Cast.

Rosa Damascena (quasi de Sceni apud Arabes) simplici flore, Cam. Eyft.

Rosa coroneola, quam Damascen. vocant, Lugd.

Rosa muscata alba, Tab.

Hæc minor est & major, quæ

Rosa moscata major, Lob. ico.

Hæc alba est, nonnunquam ex albo ad puniceum non nihil vergit.

Rosæ moschatæ cum syl. tum domesticæ, rubræ, albæ & virides, Bellon. l. de cult. meminit.

XII. Rosa moschata flore pleno.

Rosa coroneola, Plinio.

Rosa muscata multiplex, Gef. hort. Ger.

Rosa moscata, Damascena, Alexandrinæ, Eid. append.

Rosa sativa quinta multiplex, Dod.

Rosa moscata, Adv. Lob. icon. alba multiplex, Tabern.

Rosa muscatula multifolia, Cæf.

Rosa alba Damascena flore pleno, Cast. Eyft.

Rosa coroneola altera, Lugd.

Rosa Damascena sive moscata pleno flore, Cam.

Alijs Prænestina Plinij.

XIII. Rosa moschata semper virens.

Rosa sempervirens flore albo, Clus. hist. appen. alt. auct.

XIV. Rosa spinis carens flore majore.

Rosa sine spinis prima, Clus. pan. at secunda in hist.

Rosa sine spinis, Cam. Tab. Ger.

Colore est inter Prænestinas & rubras media: sunt qui & albo observarint.

XV. Rosa sine spinis flore minore.

Rosa sine spinis altera, Clus. pan. & hist.

Colore fœcem vini ferè refert.

XVI. Rosa subviridis.

Si in teneras Agrifolij arbusculas Rosæ inferantur, flores subvirides producantur, Cameraarius. Quamvis interdum anni constitutione frigidior & humidior, herbacei coloris rosæ, sine calyce proveniant, cujus causam Costæus de natur. stirp. explicat.

Si Brassicæ antiquo stipiti aut Quercui germen tenellum Rosæ inferas, virides sed in odore Rosæ nascuntur, Carolus Stephanus.

In hortis Italiæ, cæruleas reperiri, in historia Lugdunensi habetur, ex Adverf.

XVII. Rosam folio subrotundo & crispo, in horto Montembelgardico ante plures annos, sed absque flore observavi, cujus ramulum exsiccatum afferro.

Rosa sylvestris

Rosam sylvestrem Dioscorides l. i. c. 123. *ῥοδαῖον* vocat, quam aliqui Oxyacantham appellant: frutex est (inquit) rubro longè major, arborefcens: folia fert multò latiora quam Myrtus, aculeos verò circa virgas robustos: florem candidum, fructum oblongum, olivæ nucleo similem, qui dum maturefcit, fulvus, intus verò lanuginosus conspicitur. At Theoph. 3. hist. 18. Cynosbaros (cani rubus Gazæ) fructum subrotundum parit, malo puniceo similem: est inter fruticem & arborem, puniceæ non absimilis folio amerinæ. Plinio l. 8. c. 41. radix sylv. rosæ, quæ Cynorhodos appellatur: & l. 25. c. 2. Cynorhodo

rhodo una medicina erat, spongiolæ quæ in medijs spinis ejus nascitur.

I. Rosa fyl. vulgaris flore odorato incarnato. Cynosbatos Dioscoridi, Lon. Adv. Cynorrhodos Plinij: & Barbaro. Sentis canis & Cynosbatos, Brunf. Rosæ fyl. primum genus, Trag. Rosa fyl. Matth. Ang. Gefn. hort. Dodon. Tab. odora, Ger.

Cynosbatos procerior & Cynorrhodos, Cord. in Diosc.

Cynorrhodos seu Rosa canina, Thal.

Rosæ fyl. vulgaris, Lugd. Cam. ep.

Rosa canina odorata & fyl. Lob.

Rosa fyl. altior, Cæs.

Rosa canina, Cam.

Cynosbatos & Rubi tertium genus, Lugd.

Rosa fyl. odorata incarnato flore, Eyft.

Flores ex purpura dilutè albicant.

Huic, ut & tertiæ, Spongiola adnascitur, quam Plinius in Cynosbato, pilulam Castaneæ similem: in Cynorrhodo, spongiolam vocat.

Rosæ fyl. spongia dicitur Cynorrhodon, Ang.

Spongiola fyl. rosæ, Dod.

Spongia Bedeguaris, Adv.

Bedeguar officinis perperam.

II. Rosa fyl. flore majore & rubente.

Rosa fyl. flore rubro, Eyft. colore & majoribus folijs à priore differt.

III. Rosa fyl. flore pleno.

an Rosa Alabandica, Plinij.

Rosa fyl. odorata flore multiplici, Lob. ico.

Rosa canina duplicato flore, Cam.

IV. Rosa fyl. folijs odoratis.

Englanteria, Ruellio.

Rosa fyl. altera, Trag. Gefn. hort.

Rubus canis, Esglanterium, Turn.

Cynosbatos & Cynorrhodos altera, Cord. in Diosc.

Cynosbatos, Lac.

Rosa io. Cynorrhodi vel caninæ rosæ odorata species, Dod.

Rosæ fyl. species altera, Lugd.

Rosa eglanteria, Adv. Tab. Eyft.

Rosa canina, Ger.

Flos ex purpura satura candicat.

V. Rosa fyl. odoratissimo rubro flore.

Rosæ fyl. tertium genus, Trag.

an Cynosbatos quarta, Cord. in Diosc.

Rosa fyl. Gefn. hort.

VI. Rosa fyl. odorata albo flore.

Rosa fyl. humilior, Cæs.

Rosa quarta an Græcula Plinij, Clus. hist.

VII. Rosa odore Cinamomi simplex.

Rosa cinamomina & 7. vel fyl. 2. Dod.

Rose de canelle, Lob. ico.

Rosa cinamomea, Adv. Lugd. simplex, Cam.

an Cynorrhodos seu Rosa sylvestris, Thal.

Pro Lychnide Plinij Gesnerus habet: & in Albio monte, majorem & minorem nasci tradit: illam fœminam, hanc marem faciens.

VIII. Rosa odore Cinamomi flore pleno.

Rosa cinamomea pleno flore, Clus. pan. & hist. Eyft. ttt.

Rosa cinamomea altera, Cam.

Spermoniam Plinij, sic enim, non Spineolam aut spinosam legendum, Barbarus vult: quàmvis alij Sycibicum legendum putant, Cam.

Flos dilutè purpurascit & in medio suave rutilat.

IX. Rosa rubra præcox flore simplici: exiguo odore & folijs latioribus à prædicta discernenda, Eyft.

X. Rosa minor rubello flore, quæ vulgo à mense Majo, Majalis dicitur.

Rosa cinamomea altera, Cam.

Rosa provincialis minor, Tab. Ger.

XI. Rosa lutea simplex.

Rosa lutea, Ang. Adv. Lob. Cæs. Cast. Lugdun. Cam. Tab. Ger. flore simplici, Eyft.

Rosæ citrinæ, Gefn. hort.

Rosa fyl. tertia, vel Rosa octava, Dod.

Meminit Gesnerus Rosarum, quæ moschum fragrent & luteæ sint: tales non vidimus, sed fruticis folia odorata observavimus.

XII. Rosa lutea multiplex.

Rosa flava plena, Clus. hist. & app. 2. & cur. post.

Rosa lutea maxima flore pleno, Eyft.

Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet.

XIII. Rosa campestris spinosissima flore albo odore.

Rosa campestris odora, & quinta, Cl. pan. & hist. Cynorrhodon polyacanthos, Lugd.

Rosa campestris odorata Clusij, Cam.

Rosa Dunensis, vel species nona, Dod.

Rosa præcox spinosa fl. albo, Eyft. (rubeat.

Flos albus, fructus maturus niger, cum aliorum

XIV. Rosa fyl. pumila rubens.

Rosa quarta, Cl. pan. ar in hist. sexta & pumila.

Fructus maximus & pyri in modum turbidatus.

XV. Rosa sylv. pomifera major : hæc sequente altior, ramosior, paucissimis aculeis, folijs majoribus, pallidè virentibus, & apud nos locis humidis in Alnetis provenit.

XVI. Rosa sylv. pomifera minor.

Rosa sylv. pomifera. Adv. Lob. Lugd.

Cynorrhodi species, Thal.

Rosa arvina, Tab.

Rosa pimpinella, Ger.

Hanc Lobelius spinis carentem, at Tabernæmontanus spinosam pingit: utramq; habemus.

XVII. Rosa arvensis candida.

Rosæ sylv. quarta species, Trag.

XVIII. Rosa campestris repens alba.

Cynosbatos sive Cynorrhodos 3. Cord. in Diosc.

XIX. Rosa campestris spinis carens biflora.

Rosa Græca & Cynorrhodon læve, Lugd.

Flore est languidè rubro, vere & autumno prodiens, quæ duplex, alia odoris expers, alia folijs exiguis suavissimi odoris, in monte Pilati Lugdunensium.

*Rosa Hierichuntica dicta.*

Nominis hujus authorem fuisse Monachum,

Bellonius refert, cum tamen circa Hierichon nunquam reperitur, sed in Arabia deserta, ad littora maris in sabulo: & Rauvolfius, in Syriæ testis & rudibus, ejus sylvestrem speciem invenit: hanc à pluribus nunc annis in hortulo meo colo, cum faciliè & crescat & floreat: de qua Joh. Sturmius Lovaniensis professor, libellum superstitionibus plenum, scripsit.

I. Rosa Hierichuntea vulgo dicta.

Amomum, Cord. in Diosc. & hist.

Amomis Diosc. & Plinij, Cæs.

Rosa Hiericontea, Turn. Lon. Lob. Garz. Cast. aperta & conclusa, Eysf.

Rosa de Hiericho & Rosa Mariæ monachis, Lugdun.

Rosa Hiericonthina 1. & 2. Tab. major, Ger.

Duplicem fecit Cordus, alteram inspidam inodoram, quæ Amomis: alteram aromaticam odoratam, quæ Amomum sit. Sed de Amomo vide suo loco.

II. Rosa Hiericonthea sylvestris.

Rosæ Hiericonthis sylv. species, Rauvv. Cam.

III. Rosa Hiericonthicæ exsiccatae similis.

Blatterlos Holandis, fruticulus ad Scorbutum, Indiæ orient. part. 4. fig. 21.



## SECTIO QUINTA.

MYRICA SIVE TAMARISCUS; ERICA; SABINA;  
CEDRUS BACCIFERA; CUPRESSUS; JUNIPERUS;  
Asparagus & Corruda.

### MYRICA SIVE TAMARISCUS.

**M**yriceus (Gaza modo Myricam, modo Tamariscum vertit) arbor nota est, fructum veluti florem ferens compage muscosum: in Aegypto & Syria quadam nascitur sativa, cetera sylvestri similis, fructum ferens Galla proximum &c. Sunt qui è candice calices consciunt, quibus splenetici poculorum vice utuntur: Diosc. l. 1. c. 116. Et Theoph. 1. hist. 16. Myrica folia carnosae sunt ut Cupressi, & inter frutices numeratur: 5. hist. 6. in Tylo Arabia insula ferunt Myrica lignum, non ut apud nos imbecillum esse, sed validum sicuti Ili-gneum, &c. Plinio l. 13. c. 21. Myricen & Italia, quam alij Tamaricen vocant, Achaia autem Bryan sylvestrem: insigne in ea, quod sativa tantum ferat Galle similem fructum: & l. 24. c. 9. Myricen quam & Tamaricen vocat Lenæus, similem scopis Amerinis dicit, &c. & l. 16. c. 24. Tamarici folia carnosae sunt: & l. 16. c. 21. quæ non decidunt: & c. 26. fructum nullum fert, ne semen quidem, scopis tantum nascent.

Genera duo sunt Dioscoridi, sativa & sylvestris: & Plinio l. 24. c. 9. sylvestris plane sterilis, altera mitior: hæc fert in Aegypto Syriaq; etiam abundanter lignosum fructum, majorem galla, asperum gustu, quo Medici utuntur vice Galla. Et Cordo rectè monente, etiam in Germania duplex invenitur, alterum solidiore ligno, medulla exili, folijs tenuibus, ad Rhenum: alterum ligno non adeo solido, medulla ampliore & folijs latiusculis ad Danubium. Et procerior Tamarix, & humilior, quæ diminutiva forma Tamariscus dicitur.

I. Tama-

I. *Tamarix fruticosa folio crassiore* : sive *Germanica*.

*Tamariscus*, Brunf. Lon. *fœmina*, Cord. hist.

*Myrica*, Trag. Turn. Gesn. hort. Lac.

*Myrica* sylv. sive *Tamarix*, Matth. Cast.

*Myrica humilis*, Dod. gal.

*Tamarix* sylv. *fœmina*, Fuch.

*Tamarix humilis*, Cord. in Diosc.

*Myrica*, Gesn. hort. *pannonica*, Clus. pan.

*Myrica* sylv. *altera*, Clus. hist.

*Myrica altera* in Germania, Cam.

*Tamarix*, Dod. Tab. *Germanica*, Lugd.

*Tamariscus Germanica*, Adv. Lob. Ger.

Ex hac ad Rhenum nata, doliola sextarium dimidium capacia, confecta, Francofurtum deferuntur.

II. *Tamarix altera folio tenuiore* sive *Gallica*.

*Tamariscus*, Ang. Narbonensis, Adv. Lob. Ger.

*Tamarisci* aliud genus, Rauvv.

*Myrica* circa Monspelium, Gesn. hort.

*Tamarix Narbonensis*, Lugd.

*Tamarix Gallica* aut *Hispanica*, Clus. pan.

*Myrica*, Cæs. sylv. *prima*, Clus. hist.

*Myrica* sive *Tamariscus Gallica*, Cam.

*Tamarisci* sylv. genus, Alpino.

Hæc in arbores quoque in Hispania excre-  
scit, ut hominis ulna vix amplecti possit.

III. *Tamarix Ægyptia arbor*.

*Myrica ingentis magnitudinis* in Alexandria,  
Bellon.

*Tamarix gallis onusta* ad Nilum, Eid.

*Tamarix sativa & procera* in Ægypto, Cord.  
in Diosc.

*Tamariscus* Rauvv. & 1. part. Ind. or. 1. 2. c. 1.

*Tamariscus Atle* vocata, Alpino.

*Myrica domestica* in Ægypto, Cast.

*Myrica sativa* Diosc. cum gallis mihi non visa,  
Clus. hisp. & hist.

Galla *myricæ*.

*Chermasel Arabibus*, Bellon.

*Myricæ Ægyptiacæ* galla, Clus. hisp. & hist.

Fructus nucum magnitudine, figuræ inter se  
diversæ longi, breves, rotundi, lati, crassi, gra-  
ciles, Alpino.

In Ægypto tā in humidis quàm siccis nascitur,  
ita ut utrobique sylvulę reperiantur, Bellonius.

## E R I C A.

*Erica* arbor est fruticosa similis *Myricæ*, ut multò minor, Diosc. lib. 1. cap. 117. & lib. 3. cap. 174. *Coris frutex* est folio *Ericæ*, sed minore, pinguiore & rubente. *Erica* cacumine fructum fert sicut *Pyræa* & *Amerina*, Theoph. 1. hist. 23. *Ericam* Græci vocant fruticem. non multum à *Myricæ* differentem, colore roris marini & penè folio, Plin. lib. 24. cap. 9. qui lib. 11. cap. 16. mellis sylvestris *Erica* meminit.

*Erica folio Myricæ*.

I. *Erica vulgaris glabra*.

*Erica* vulgaris, Trag. Thal.

*Ericæ*, Fuch. Dod. gal.

*Erica prima*, Matth. Lac. Dod. Lugd.

*Erica*, Cord. in Diosc. Bellon. Lon. Cast. def. Tab.

*Erica*, Turn.

*Erica Myricæ folio*, Ad. Lob. Clus. pan. & hist.

*Erica vulgaris* sive *pumila*, Ger.

Flos communiter colore dilutioris purpuræ:  
& aliquando & autumnno & vere floret : ali-  
quando etiam flore albo est, hinc

*Erica alba*, Tab.

*Erica pumila alba*, Ger.

*Erica flore albo minor*, Eyf.

II. *Erica Myricæ folio hirsuta*.

*Ericæ Myricæ folio* similis, Clus. hisp. & hist.

Selago Plinij quibusdam, lib. 24. cap. 11. similis  
herbæ huic *Sabinæ* est Selago appellata.

III. *Ericæ* genus, quod rota Græcia vulgo  
Phana dicitur, Bellon. sed quid?

*Erica folio Coridis*.

I. *Erica maxima alba*.

*Erica prima*, Clus. hisp. Lugd. Tab.

*Erica coris folio prima*, Clus. hist.

*Erica major floribus purpurantibus*, Lob. Ger.  
descr.

III. *Erica maxima purpurascens longiori-*  
*bus folijs*.

*Erica secunda*, Matth. Dod. gal. Cast. Lug. Tab.

*Erica Coridis folio altera*, Clus. hisp. & hist.

*Erica Juniperifolia* densè fruticans Narb. Lob.

IV. *Erica frutescens peregrina*.

*Erica peregrina Brancionis*, Lob.

V. *Erica major floribus ex herbaceo purpureis*.

*Erica tertia*, Clus. hisp. Lugd. Tab.

*Erica coris folio tertia*, Clus. hist.

*Erica major floribus herbaceis purpurantibus*, Lob.

*Erica cruciata*, Ger.

Hujus altera species, cujus flosculi herbacei  
racematim & spicatum coherent.

VI. *Erica major scoparia folijs deciduis*.

Erica quarta, Clus. hisp. Lugd. Tab.  
 Erica scoparia flosculis herbaceis, Lob.  
 Erica quarta Monspelienfium, Lugd.  
 Erica coris folio quarta, Clus. hist.  
 Erica pyramidalis, Ger.  
 Selago Plinij, Piræa Theophrasti, Guilandino dicebatur.

Hæc biflora est, & ex hac scopæ apud Monspelienfes conficiuntur.

VII. Erica ex rubro nigricans scoparia.

Erica tertia, Dod. gal. Lugd.  
 Erica nona, Clus. hisp. Lugd.  
 Erica pumila altera Belgarum, Lob.  
 an Erica tertia, Dod.  
 Erica decima tertia, Clus. hist.

Ex hac scopæ ad vestes purgandas conficiuntur.

VIII. Erica humilis cortice cinericeo arbuti flore.

Erica sexta, Clus. hisp. Lugd. Tab.  
 Erica pumila calyculato unedonis flore, Adv. Lobel.  
 Erica coris folio sexta, Clus. hist.  
 Erica tenuifolia, Ger.

IX. Erica hirsuta Anglica.

Erica octava, Clus. hisp. Lugd. & Tabern. sub septima pinxit.  
 Erica Juniperifolia altera, Lob.  
 Erica coris folio duodecima, Clus. hist.  
 Scopæ, Cæs.  
 Erica tenuifolia caliculata, Ger.

X. Erica ternis per intervalla ramulis.  
 Erica quinta, Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab.  
 Erica coris folio quinta, Clus. hist.

*Erica procumbens.*

I. Erica procumbens ternis foliolis carnea.  
 Erica quarta, Clus. pan.  
 Erica coris folio nona, Clus. hist.

Huic sæpe capitula viridia è foliolis compacta, capitulorum Thymi modo adnascuntur.

II. Erica procumbens herbacea.  
 Erica quarta altera, Clus. hisp.  
 Erica tertia, Clus. pan.

Erica coris folio octava, Clus. hist.  
 III. Erica procumbens dilute pupurea.  
 Erica altera, Clus. pan.

Erica coris folio septima, Clus. hist.

*Erica baccifera.*

I. Erica erecta baccis candidis.  
 Acacalis Dioscoridis, Amato.  
 Erica septima, Clus. hisp. Lugd.  
 Erica baccifera, Lob. Cast. ico.  
 Erica coris folio decima, Clus. hist.  
 Erica baccifera tenuifolia, Tab. Ger.  
 Frutex Lusitanis Camarinnas dictus, Linscot.  
 Indiæ orient. part. 4. fig. 21. lit. C.

II. Erica baccifera procumbens nigra.  
 Erica baccifera, Matth. Cast.  
 Erica baccifera Marthioli, Lob. Lugd. Thal.  
 Erica prima, Clus. pan.  
 Erica coris folio undecima, Clus. hist.  
 an Coris, Cord. in Diosc.

C A M P H O R A T A.

**C**amphorata dicitur, quod herba digitis friata, odorem camphoræ nonnihil referat: quam aliqui Selaginem Plinij l. 24. c. 11. quam Sabina similem dicit: alij ejusdem l. 24. c. 15. Chamæpeucen, quam Laricis folijs similem scribit: quidam Cneorum nigrum esse volunt.

I. Camphorata hirsuta.

Chamæpeuce, Ang.  
 Camphorata Monspelienfium, Adv. Lob. Camer. Taber.  
 Selago Plinij five camphorata, Lugd.

II. Camphorata glabra.

Camæpeuce & Camphorata minor, Lugd.

III. Camphoratæ congener.  
 an Anthyllis altera, Ang.  
 Anthyllis altera Italarum, Lob. Lugd.  
 Camphorata altera, Tab.  
 Anthyllis lentifolia, Ger. ico.

S A B I N A.

**S**abina βεῖδος, nonnullis βέγαθος Dioscoridi lib. 1. cap. 104.

Genera duo Dioscoridi l. c. unum folijs simile Cupresso, at spinosius & graveolens, acre ac servens: curta vero est arbor, & in latum magis se fundens. Alterum genus est folio Myrica simili. Plinio l. 24. c. 11. herba Sabina brathy appellata à Græcis, duum generum est: altera Tamarici similis folio, altera Cupresso: quam quidam Creticam Cupressum dixerunt: & l. 17. c. 13. Sabina herba propagine seritur & avulsione.

I. Sabina



## I. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis.

Sabina, Brunf. Trag. Fuch. Dod. ut: Bellon. Gef.

hor. Tur. Lob. Cæf. Portæ: vulgaris, Cam.

Sabina sine baccis, sive sterilis, Matth. Cast.

Sabina miti folio, Cord. in Diosc.

Sabina altera, Ang.

Sabina vulgatio, Ad.

Savina, Lon. mas, Tab.

Sabina Tamarisci similis, Lugd.

Sabina sterilis, Ger.

## II. Sabina folio Cupressi.

Sabina baccifera, Matth. Rauvvolf. Cam. Ger.

Sabina altera, Dod. ut:

Sabina, Lac. prima, Ang. qui Thyam Theophr. censet.

Sabina major, Gef. ap.

Genuina sabina baccifera atrorubra, Lob.

Sabina Cupressifolius, Cord. in Diosc. Lugd.

Sabina vera, Cæf.

Sabina fructifera, Cast.

Cum in arborem excrescit, quotannis baccas juniperinis similes producit,

Sabina fœmina minor, Tab.

## III. Sabina folijs Cupressi altera.

Sabina baccata altera, Lob. Lugd.

Sabina alterius altera icon. Dod.

Savina fœmina major, Tab.

Ramulorum exilitate &amp; foliorum lenitate tantum à priore differt.

Differt autem à Cedro, quod Sabinae gravis odor sit, &amp; Sabinae extremi rami in acuta folia desinant, &amp; baccæ minores sint &amp; nigrescant: cum Cedrus Junipero odoratior sit, folio obtuso, &amp; baccæ majores phœnicei coloris sint.

## C E D R U S.

**C**edrus alia est conifera, alia baccifera: de baccifera sic Dioscor. l. 1. c. 105. dicitur & altera Cedrus parva, spinosa Juniperi modo, fructum ferens magnitudine myrti rotundum. Kéle & Theophr. 1. hist. 15. perpetuo viret: 1. hist. 16. folia habet rara extremitate pungente: 3. hist. 12. quidam binam affirmant, alteram, λυλάου, alteram ποικύλιν (puniceam Gaza) alij simplicem dicunt, scilicet qui Idam incolunt, est Junipero non dissimilis, sed folio maxime distat: quippe Cedro durum, acutum spinosumq;, Junipero mollius: excelsior quoq; Juniperis nasci videtur: alij nominibus non dividunt, sed ambas Cedros appellant: Cedrum cum additioe ἐξόνδεσιν nuncupant, &c. Plinius l. 13. c. 5. Junipero similem habent. Phœnices & Cedrum minorem: duo ejus genera, Lycia & Phœnicia: differunt folio: nam quæ durum, acutum, spinosum habet, Oxycedrus vocatur, ramosa & nodis infesta. Altera odore præstat: fructum ferunt Myrti magnitudine, dulcem sapore.

## Cedrus baccifera.

I. Cedrus fol. cupressi major fructu flavescere.

Juniperus major seu Cupressus syl. Dioscoridis, in Codice Hermolai.

Cedrus Phœnicia, Plinij.

Cedrus Lycia, Matth. Gef. hor. Cast.

Cedrus pumila folijs obtusis &amp; Phœnicia, Bell.

Cedrus minor, Cord. in Diosc. Portæ.

Oxycedrus Lycia, Dod. Ger.

Juniperus major, Clus. hisp. &amp; hist.

Cedrus phœnicia, Ad. media vel secunda, sive

Oxycedrus folio cupressi, aut Sabina major Monspel. Lob.

Thuiæ genus quartum, Lugd.

Cedrus phœnicia secunda, Tab.

II. Cedrus folio Cupressi media majoribus baccis.

Cedrus Lycia, Bellon.

Cedrus minor altera, Diosc.

Cedrus phœnicia altera, Plinij &amp; Theophr. vel prima, Lob.

Thuia Mafsiliensium, Lugd.

## III. Cedrus folio cupressi minor.

Cedrus phœnicia minor vel tertia, Lob.

Hæ tres sola magnitudine differunt: verum & duæ priores ratione ætatis variare censemus, ita ut Matthiolus adolescentem, at Lugdunensis historia adultam exprimere videatur. Sic & ratione ætatis in folijs differentia: primò enim prodeuntia, Juniperi vulgaris folia emulantur, quæ paulo breviora & acuta: at adultæ, instar foliorum Cupressi rotundantur, ita ut rami inferiores folijs pungentibus & acutis, summi vero, obtusis & rotundis vestiantur: hoc exprimit figur.

Sabina baccifera, Advers. &amp; Lob. ico.

## T H U Y A E T B R U T A.

**Θ**ύον sive θυά Theophrasto 5. hist. 5. forma Cupressifolius, cum ramis tum folijs, caudice fructuq;, vel potius seu Cupressus sylvestris: & 1. hist. 15. ex sylvestribus perpetuo viret. Plinius l. 13. c. 16. Thya ex Theophrasto memi-

meminuit, quam aliqui volunt eandem cum Cedro Atlantica ejusdem. Brutam sic descripsit Plinius l. 12. c. 17. petunt in Helimaos arborem Brutam, Cupresso fusa similem, ex albidis ramis, jucundi odoris, accensam & cum miraculo historijs Claudij Caesaris predicatam, odorem etiam proximum Cedro, &c.

Thuya Theophrasti.

Arbor vitæ, Bellonio, Gef. hort. Dod. Clus. hisp.

& hist. Cast. Tab. Ger. Eyf.

Arbor filici similis, Oviedo.

Cedrus Lycia, Lob. an. & Ad.

Thuyæ tertium genus, Lugd.

Arbor paradisaæ Lutetian. Lugd.

Thuia sive Thya vulgo, Cam.

Hæc è Canada Francisco I. Galliarum regi, Arboris vitæ nomine oblata, forrasse ab odoris vehementia, vel ob immortalem ejus comam, sic dicta.

## C U P R E S S U S.

**C**upressus νῦπαριος & Dioscoridi l. 1. c. 102. ἀπὸ τῶν νέων τῶν παλίων ἀνέμωνας. Theophr. l. 1. hist. 8. procero & longo caudice constat, tamen macilentio: l. 1. hist. 13. mas nodosior est fœmina: l. 1. hist. 14. simplici assurgit caudice ad longitudinem, sed non multis radicibus, nec ramis frequentibus patet: l. 1. hist. 15. viret perpetuo: 2. hist. 3. plerumq. ex fœmina marem provenire affirmant: l. 1. caus. 5. hujus fructus non id totum est, quod pila speciem gerit, sed quod cono innascitur prætenue, exile & quasi laricis semini proximum, quod pilula sua debiscere delabitur. At Plinio l. 16. c. 33. Cupressus natu morosa. fructu supervacua, baccis torva, folio amara: odore violento, ac ne umbra quidem gratiosa, materie rara, ut penè fruticosi generis, diti sacra, & ideo funebri signo ad domos posita: fœmina sterilis diu. Duo genera earum: meta in fastigium convoluta, qua & fœmina appellatur. mas spargit extra se ramos, deputaturq. & accipit vitem, &c.

I. Cupressus, Matth. Ang. Dod. ut: Cord. in Diof. Gef. hor. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Portæ, Lugd. Cam. Tab. Eyf.

Cyparissus, Cast.

Cupressus altera sive sylvestris, Ger.

Hujus fructus sive conos, nuces vel pilulas Cupressi, Officinæ Cypressi nominant: aliquibus Gabulæ dicuntur.

II. Cupresso similis arbor in Syria: an Cedrus major Dioscoridis.

Thya forte Theoph. cujus fructus pilularum Cupressi magnitudine in Oriente notissimi.

Abhel dicitur, Guilandino in problem.

Cedrus major Dioscoridis, Thyia Theophr. & Abhel, Guiland. in papyro.

Tac arbor Cupresso similis ex qua gummi Taxa, Rauvvolf.

Arbor cujus fructus Abhel Guilandino, Clus. hispan.

Habel fructus, Clus. hist.

## J U N I P E R U S.

**A**ρυσβίς ἢ Ἀρυσβίς: παρὰ τὸ τὴν ἀρὴν νέεσθαι, quod ejus odorem omnia reptilia adversentur: vel διὰ τὸ ἔχειν τὰς ἀρυσβας νινγυμύδας: Latinis Juniperus dicitur, quod juniores & novos fructus pariat, antiquis maturefcentibus: solam ferè arborum fœtus suos in biennium prorogare ajunt: cujus bacca ἀρυσβίς, in officinis Grana Juniperi nominantur. Ejus verò lacryma, Vernix dicitur.

Genera: Diosc. l. 1. c. 103. ἀρυσβίς quædam major est, altera minor: unius fructus, nucis pontica magnitudine reperitur: alterius verò fabam æquat, at rotundus est odoratus, dulcis in mandendo ac subamarus Arcenthis dictus. Plin. verò l. 16. c. 25. nec Juniperi florent: quidam duo genera tradunt: alteram florere nec ferre: qua verò non floreant ferre, protinus baccis subnascantibus qua biennio hereant: sed id falsum: & l. 24. c. 8. Juniperus Cedro asimilis: & ejus duo genera: altera major, altera minor: hæc Plin. Verum bacca in quibusdā grandes, in alijs exigua: in his dulces, in alijs prorsus amara: alijs planè rotunda, quædam oblonga & acuminata.

I. Juniperus vulgaris fruticosa.

Juniperus, Brunf. Matth. Dod. ut: Lac. Tur. Lon. Lob. Portæ, Ger. nostras, Cam.

Juniperus vulgaris, Trag. Clus. hist.

Juniperus minor, Fuch. Cord. in Dioscor. Lugd. sylv. Cast.

Juniperus humilis, Gesn. hort.

Juniperi altera species, Ang.

Juniperus vulgatiior, Ad.

Juniperi primum genus, Cæf.

Juniperus & Juniperus baccifera, Tab.

Hic describit etiam Juniperum majorem Germanicam, & fructum magnum verrucosum adpingit.

II. Jnniperus vulgaris arbor.

Juniperus nata in Hispania, Plinio l. 6. c. 39.

Junipe-

Juniperus vulgaris celsior & arborefcens, Cluf. hisp. & hist.

Juniperus major fativa, Cast.

Juniperus urbana in arborem affurgens, Lugd.

Tales Thuscia alit, frequenter in agro Senenfi, ut Matthiolus & Lugdunensis monent: & in Hispania, ita ut ex ea trabes & ædium contignationes, multi fabricent, Clusio referente.

III. Juniperus minor montana folio latiore fructuque longiore.

Juniperus minima, Gefn. hort.

Juniperus alpina, Cluf. pan. & hist.

IV. Juniperus major baccâ cæruleâ.

Junip. maximus Illyricus cærulea baccâ, Lob.

an Juniperus alter, Cæs.

Juniperus major, Lugd.

Juniperus major Illyrica, Tab.

Juniperus maximus, Ger.

V. Juniperus major baccâ rufefcente.

Oxycedrus Theoph. & Galeni.

Cedrus phœnicea, Matth. Tab.

Oxycedrus, Dod. gal. Bellon cui & Juniperus, ruber, Cluf. hisp. & hist. Lugd.

Cedrus, Lac. Lon. minor & Cedrula, Gefn. hort.

Cedrus magna sive Juniperus peregrina, Cord. in Diosc.

Cedrus minor, vel phœnicea, Cast.

Oxycedrus phœnicea, Dod. Ger.

Juniperi prima species, sive Diosc. Juniperus, Ang.

Juniperus major Monspeliensium, Lob.

Oxyarceutis sive Juniperus acuta, Adv.

an Juniperus montanus fructu flavo, Cæs.

Ettalch Scalig. grandior Juniperus, Lugd.

an Juniperus major Italica baccis rubris, Cam.

Alijs Cedrus Lycia Theophrasti.

VI. Junip. major fructu nucis magnitudine.

Juniperus major in Cupressi altitudinem affurgens, fructu dulci, Gallæ quodammodo simili eduli, nucleo olivæ nucleis simili, Bellon. quid?

VII. Arbor Americana oxyacanthæ similis. Lignum exoticum, Cluf. exot. l. r. c. 6.

an affinis arbori Ettalch in Africa nascentis, cuius Joh. Leo in des. Africæ meminit, dubitat Cl.

Incolæ igne resinam eliciunt, qua picis loco utuntur.

## ASPARAGUS ET CORRUDA.

**E**tsi Ἀσπάραγος vel ἀσπάραγος Galenus 2. alim. omnes propemodum teneros caules & tenera germina, seu ex oleribus & herbis, seu ex suffruticibus, seu ex fruticibus, arboribusque vocat, attamen peculiari generi plantæ etiam tribuitur, quæ sic dicta, quod cauliculos hos, qui prima germinatione è terra prodeunt, præcipuos habeat.

Genera duo Dioscoridi lib. 1. cap. 152. petraa & sativa: & Galeno βασιλικὸν regium & ἑλαεινὸν palustre, sic enim Dioscorides, ἀσπάραγος περιτὰς, quem μυρανόλας (id est murinam spinam) vocant, vulgaris est nota: & paulo inferius: Asparagus altilis, frutex est ramosus, folia habens multa, longa, fasciculo similia, radice rotunda, grandi, tuberculum habente. Et Theophrastus 6. hist. 1. ἀσπάραγος (hanc solam vocem per geminam Asparagum corrudam Gaza vertit) ex toto aculeata est, & nullum juxta aculeum solum gerit: & 6. hist. 3. juxta aculeos pusillum quiddam clava simile producit, ex quo flosculus tandem ipse erumpit: radice larga, alta, numerosa, eademque tam crebra innititur, ut pars superna radicum tota connexa & continua reddatur, ex qua vel ipsorum caulium proventus facitatur, &c. Plinius lib. 19. cap. 8. omnium horum tenuissimum laurissimum cura Asparagis, &c. Est & aliud genus incultius asparago, mitius corruda. passim etiam in montibus nascentis, refertis superioris Germaniæ campis non infaceto Tibery Cæsaris dicto, herbam ibi quandam nasci similitudinem asparago, &c. & paulo infra: indicavimus & Corrudam: hunc enim intelligo sylv. asparagum, quem Græci orminium aut myacanthon vocant: & lib. 19. cap. 4. sylvestres fecerat natura corrudas, ut quisque demeteret passim &c. altiles spectantur asparagi: & lib. 20. cap. 10. Asparagi vires ubi recensuit, subjungit: sylv. asparagum, aliqui Corrudam, aliqui Libycam vocant: Attici orminium hujus efficaciore vis & candidiore major: & lib. 21. cap. 16. in totum spina est Asparagus.

Asparagus folio molli.

### I. Asparagus sativa.

Asparagus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hort. (qui majoris & minoris meminit) Turn. Lon.

Asparagus altilis, Fuch. Tab. domestica, Bellon.

Asparag. Diosc. idè cum sativo & hortensi, Ang.

Asparagus sativus, Lac. Cast. Lugd. Ger.

Asparagus hortensis, Dod. Adv. Cam.

Asparagus domesticus, Eyst. vulgaris, Lob.

Asparagi alterum genus, Cæs.

Hic cum in pratis Alsatiæ nobis vicinæ, & in pratis ad Danubium sitis, & in Burgundia circa Vesuntium spontè proveniat, hunc Plinium

intelligere censemus, cum in superioris Germaniæ campis provenire scribit, & hic dicitur Asparagus mirior sponte nascens, Cl. hisp. & hist.

II. Asparagus sylvestris tenuissimo folio. Asparagus sylvestris, Marth. Ang. Tab.

Asparagi tertium genus sativo simile, qui Palatium leporis, Cæs.

Sola transplantatione & cultura à sativo differt.

III. Asparagus maritimis crassiore folio. Asparagus *maritimus* sive palustris, Galeno.

Asparagus palustris, Marth. Ang. Tab.

Asparagus marinus, Clus. hisp. & hist. Cam.

Asparagus maritimus Dioscoridis, Ad. Lob.

Asparagi alterum genus, Cæs.

Asparagus sylvestris, Ger.

*Asparagus Corrua dictus.*

Corrudam nonnulli dictam volunt, teste Ruellio, quod ubi adolevit, facile corruat decidat: sic & Horminium, *καρπὸς ὁρμινίου*, quod est ruo.

I. Asparagus folijs acutis.

Asparagus petraea Dioscoridi & Galeno.

Corrua & sylv. Asparagus, Plinio.

Aspar. petraeus & Corrua. Marth. Tab. in ic. Ger.

Corrua, Dod. gal. Cord. hist. Rauvv. Bello. Ad.

Lob. ico. Lugd. cui & Corrua Penæ.

Asparagi prima species, Ang. Cæs.

Asparagus sylvestris, Ges. ap. Lac. Dod. Cam. ep. sive Corrua, Bellonio.

Corrua prior, Clus. hisp. & hist. Tab.

II. Asparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum.

Asparagus sylv. alter, Dod. Ger.

Corrua altera, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab. at in ico. Corrua Hispanica.

Corrua Hispanica altera, quæ Lusitanica, Lob. at in icon. Corrudæ varietas.

Asparagi quartum genus, Cæs.

III. Asparagus aculeatus spinis horridus. Polyticha Bellonio.

Asparagus sylv. tertius, Dod.

Corrua tertia, Clus. hisp. & hist. Lob. Lug. Tab.

Corrua Hispanica altera, Tab. in icon.

Asparagus sylv. spinosus, Ger.

Asparagi Theophrasti nomine, cui spina pro folio, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

IV. Asparago acul. affinis triplici semper spina. Echinopoda Cretica, Hon. Belli ep. 2. ad Clusium, & Ponæ Ital.

Chenopoda Plinij suspicatur Hon. Belli.

Sic autem Plin. l. 11. c. 8. ceras ex omnium arborum satorumq; floribus confingunt, excepta Tumice & Chenopode: plura non habet. Verum aliqui Echinopode legunt, quam quidam Tribulum, alij Echion, alij spinæ genus interpretantur. Sic Dalech. ad Athenæum per Echinopoda, Cardui Chij genus intelligit.



## SECTIO SEXTA

CEDRUS CONIFERA; PEUCE SEU PINUS; PINASTER; LARIX;  
PIIYS SEU PICÆA; SUCCI SIVE HUMORES PLANTARUM; GUMMATA;

Resinæ; Abies; Taxus; Draco arbor; Palma Dactylifera; Palma squamoso-fructu; Palma nucifera; Nuces exoticæ &  
Arbores admirandæ.

### CEDRUS CONIFERA.

**K** *Ε' Αρ* & Diosc. l. 1. c. 105. arbor magna est, ex qua Cedria dicta colligitur: fructum verò habet uti Cupressus, at grandiore multo: At Serapio, minorem legit. Et Guilandinus com. de Papyro vult eum esse arborem, quam sub Cupresso altera proposuimus. Theophr. 4. hist. 6. & 5. caus. 3. Cedrum Syria gignit, eaq; ad trivemes utuntur: 5. b. 5. ex Cedro simulacrum sculpere solent. Plin. l. 13. c. 5. Et majoris Cedri duo genera, quæ floret fructum non fert: frugifera non floret, & in ea antecedenti fructum occupat novus: semen ejus Cupresso simile: quidam Cedrelaten vocant: & l. 24. c. 5. Cedrus magna quam Cedrelaten vocant, dat picem quæ Cedria vocatur.

Cedrus conifera folijs laricis.

Cedrus major, Marth. Dod. gal.

Cedrus arbor conifera, Ges. hort.

Cedrus Hebræorum non Græcorum, forte Ce-

drus Syriæ Theophrasti, Ang.

Cedrus Diosc. & Sacrarum literarum idem, Ang.

Cedrus, Bell. (cui & Libani & Syriæ & in Ama-

no) Rauvv. Cæs. Tab. Libani, Ger.

Cedrus

Cedrus Libani quæ neque Dioscoridis neque Græcorum Cedrus est, Guil.

Cedrus magna, Dod. Portæ.

Cedrus Libani & Palæstinæ præcelsa, Ad. Lob.

Cedrus phœnicia Matthioli, Lugd.

Cedrus phœnicia nostra, Lugd.

Coni non dependent, sed sursum spectant, ut rectè Bellonius, Dodonæus & Dalechampi-  
us in hist. Lugdunensi, pingunt.

In regno Congiano tanta copia, tantæque magnitudinis, ut inde naves conficiant: part. 1. Ind. or. 1.2. c. 1. & in insula Tercera scaphæ, cur-  
rus, rhedæ, & hujus generis alia opera extru-  
unt: part. 3. Ind. or. c. 6.

Sic in Andes nova Hispania, summa copia, ubi alia alba, alia rosea & fragrans: Joseph. A-  
cost. 1.4. c. 3. ubi de Cedro admiranda, verba fa-  
cit. Provenit etiam in Virginea & Florida.

## DE PEUCE SEU PINU.

**E**tsi πένυς πίνυς, à Gaza Pinus & Picea vertatur, ab alijs tamen contrario modo fit, & πένυς Picea, fortè ob nominis similitudinem redditur: nec mirum, cum ut Dioscorides lib. 1. cap. 86. habet, πίνυς, vulgo nota arbor est, ejusdemq; generis est quæ πένυς dicitur, siquidem hæc ab illa specie tantum differat: ita ut tam piceæ quàm pini fructus, qui in conis reperitur πένυδας, eodem cap. 87. monente, appelletur.

Genera: πένυς Theophrasto 3. hist. 10. alia urbana, alia sylvestris: sylvestris duplex est, alteram Idaam, alteram maritimam vocant: harum rectior, celsior, materieq; crassior Idæa: folio teneriori, imbecillioriq; maritima, & cortice leviori, utiliq; ad coria. Quod altera minus. Nux maritima rotunda, breviorq; dehiscens, & Idæa oblongior, viridis, minusq; hiscens, tanquam sylvestrior, &c. Idæa ramosior crassiorq; & picem copiosius præbet, &c. Macedones genus quoddam πένυς simile dicunt, & marem brevioris folioq; durioris: sæminam verò proceriorem, folijs pinguem, mollem, procliviorisq;. Mari lignum circumcincta medulla durum & operi fabrilis versuale: sæmina tractu omnino facile atq; molliùs, quod quidem omnium ferè marium sæminarumq; publica differentia est, ut casores materie asseverant, &c. (& Plinius lib. 16. cap. 10. lignum maribus durum, & in fabrilis opere contortum: sæmina molliùs, publico discrimine in securibus) Igitur πένυς genera, urbanum atque sylvestre: sylvestris mas & sæmina, ac tertia sterilis. At Arcadiæ incolæ, nec sterilem nec urbanam πένυς appellant, sed πίνυς, &c. Plinius l. c. in Europa sex genera cognatarum arborum ferunt (pinus, pinafter, picea, larix, abies, teda, taxus) ex ijs pinus atq; pinafter, folium habent capillamenti modò prætenue, longumq; & mucrone aculeatum, &c. Pinafter nil aliud est, quam Pinus sylv. mira altitudine & à medio ramosa, sicuti pinus in vertice: copiosiorisq; pino dat resinam. Sic lib. 15. cap. 10. nucum pinearum genera quatuor recenset, 1. grandissimas, 2. Tarentinas, 3. Sapineas, è picea sativa, 4. pityidas, è pinastris.

### I. Pinus sativa.

Pinus urbana folio perpetuo, Theophrasto.

Pinus, Brunf. Trag. Dodon. ut: Bellon. Cord. in Diofc. Lac. Turn. Lon. Cæf. Cast. Portæ: arbor, Gesn. hort.

Pinus domestica, Matth. Tab.

Pinus sativa, Ang. Lugd. Ger.

Pinus vulgarissima, Adv. Lob.

Pinus Italica, Cam.

Nucem πένυδας Theophrastus, alij πένυς πινυς & πινυδας & πινυδας vocant: & in hoc genere marem nucem rotundioris, sæminam longioris ferre volunt.

### II. Pinus sylvestris.

Pinus sylv. montana Theophrasti.

Pinafter, Brunf. Trag. Tur. Gesn. horr. Lob. Cæf. Thal. Portæ.

Pinus sylvestris, Matth. Cast. seu Pinafter, Dod.

Picea πένυδας, Ang.

Pinus sponte proveniens, Cord. in Diofc.

Pinus sylv. fructifera, Lugd.

Pinus sylv. montana, Tab.

Pinus sylv. mugo, Ger. ico.

an Pinafter i. vel Austriacus major, Clus. hist. qui duplicem facit album & nigrum.

### III. Pinus sylv. montana altera.

Pinus tubulus, Plinio l. 16. c. 10. easdem, inquit, arbores (scilicet Pinum & Pinastrum) alio nomine esse per ora Italiæ, quas Tibulos (strubulos Hermolaus legit) vocant, pleriq; arbitran-  
tur, sed graciles succinioresq; & enodes, li-  
burnicarum ad usus, penè sine resina.

Pinus sylv. Mugo, Matth. Adv. Lob. Tab.

Pinus sylv. altera, Dod. ut: sed edit. lat. tertia descriptione.

Picea altera sive sylvestris, Ang.

Pinus tubulus, Lugd.

Pinus montana minor, Ger.

### IV. Pinus sylv. montana tertia.

Teda, Brunf. arbor, Lugd.

Pinus sylv. cembro, Matth. Adv. Tab.

Pinus sylv. tertia, Dod. gal.

Pinaster, Bellonio.

Pinus sylv. altera species, Dod.

Pinus sylvestris, Ger.

Plin. l. 6. c. 10. sextum genus est Teda propriè dicta, abundantior succo, quàm reliqua, parciore liquidiorque quàm Picea, flammis ac lumini sacrorum etiam gratia.

V. Pinus maritima major.

Pinus maritima prima, Matth. Tab.

an Pinus marina, Ang.

Pinus sylv. quinta, Dod. gal.

Pinus maritima, Lugd. major, Dod.

Pinus maritima Theophrasti, Lob.

Pinus sylv. montana, Ger.

Huc refer sequentem, modo eadem non sit,

Pinus sylv. altera, Lob.

Pinaster 2. & Pinus marina Theoph. Clus. hisp.

Pinaster alter Hispanicus, vel minor Hispanicus, Eid. hist.

Pini maritimæ majoris ramulus, Dod.

Pinus sylv. sive sterilis, quia nucleis edules non sunt, Lugd.

Pinus montana Theophrasti, Tab.

Pinus maritima major, Ger.

VI. Pinus maritima altera, Matth. Tab. Lug.

Pinus Idæa Theophrasti, Lob.

Pinus sylv. quarta, Dod. gal.

Pinus sylv. minor, Ger.

an Pinaster primus, Clus. hisp. & hist.

Hæc ab Austriaco majore, fortè tantum ratione soli distat, Clusio monente.

VII. Pinus maritima minor.

an Picea genus alterum, Bellon.

Pinus maritima minor, Dod.

Pinaster tertius, Clus. hisp. Lob. Lugd.

Pinaster tertius Hisp. vel pumilo alter, Cl. hist.

an Pinastri alterum genus parvum in maritimis, Cæf.

VIII. Pinaster conis erectis.

Pinaster pumilio, Clus. pan. Cam.

Pinaster quartus Austriacus, Clus. hist.

IX. Pinaster. latifolius julis virefcentibus aut pallescentibus, Clus. pan.

Pinaster secundus Austriacus, Eid. hist.

X. Pinaster tenuifolius julo purpurascente, Clus. pan.

Pinaster tertius Austriacus, Eid. hist.

Thæda, Tab.

Tæda sive Pseudopinus, Ger.

Hujus arboris ramos solent nostrates Oenopolæ ante ædes suas proponere, ut Viennenses Abietis teneriores ramos, & aliarum regionum incolæ Hederam.

XI. Pinus Indica nucleo purgante.

Pinci nucleis Molucani, Acoftæ, Monardi.

Pinei nucleis cathartici, Lugd.

Pinea purgativa, Cast.

Pinei nucleis Indici, Fragofo.

an Pinioen sive Nuces pineæ ex Puna, Joseph. Acoft. l. 4. c. 29.

XII. Pino similis Orientalis.

Cibage, Cam.

XIII. Pineos nucleos duros referens fructus. Fructus peregrinus 8. Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

XIV. Pineæ nucis nucleo simile semen flavo spadiceum Brasilianum.

Fructus miscellaneus 9. Clus. exot. l. 2. c. 15.

XV. Arbor spinosa fructu pineæ simili.

Cachi arbor spinosa, cujus fructus Ciccara, forma pineæ nucis, Scalig. Ludovico Romano, Nic. Costino, & ex his Lugd.

## L A R I X.

**Q**Uæ Larix aut Larex, etiam Græcis λάρικς nuncupatur, an à Theophrasto descripta fuerit dubitatur: huius hæc vox in Gaza versione reperitur: Gaza tamen Larix nihil aliud est, quam πινος Theophrasti, quam vocem plerumque Piceam interpretatus est: attamen interdum πινος vocem, per Piceam & Laricem simul expressit: ut videre est 9. hist. l. 1. ubi legitur τριγυδον, πινος, ἀμυγδαλινος Gaza reddidit, terebintho, larici, picea, amygdala, &c. Sic Plinius de Larice agens, ea quæ Theophrastus πινος tribuit, omnia illa Larici adscribit: sic l. 16. c. 10. scribit: quinto generi situs idem, eadem facies, Larix vocatur, materies præstantior, longè incorrupta, vix emori contumax, rubens præterea & odore acrior: plusculum huic erumpit liquoris, melleo colore atque lentore, nunquam durescentis: & mox: Larix nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis vi consumitur quàm lapides. Verum experientia Plinio contrariatur, & ipsius propria verba, dum inquit: in Macedonia Laricem masculam urunt, semina & radices tantum. Et l. 16. c. 21. ei perpetuam comam tribuit, cum tamen in nostra larice contrarium contingat. Quare Gaza Larix, est πινος Theophrasti: at Plinij Larix, est πινος Theophrasti. An fortè hæc nostra Larix, sit Pinus urbana folio deciduo Theophrasti: siquidem scribat

Pini



*Pini urbani genus quoddam folium habere perpetuum: sylvestri autem omni id perpetuum esse: ex quibus colligere licet, urbani quoddam genus esse, cui folia decidant, quod in sola Larice animadvertum est.*

Larix, Brunf. Matth. Bellon. con. Dodon. ut: Ex hac colligitur resina laricea, de qua inter  
Fuch. Gern. hort. Lac. Turn. Lon. Adv. Lob. Cast. Resinas. Fungus etiam adnascitur qui Agari-  
Clus. pan. & hist. Lugd. Portæ, Tab. Ger. Cam. cum dicitur, quemadmodum Larici adpin-  
Pini sylv. genus cui hyeme folia decidunt, Cæf. gunt, Lob. Tab. Ger.

## DE PITY SEU PICEA.

**P**itys à πύτυν differre videtur, Theoph. 3. hist. 10. quòd (scilicet Pinus) pinguior sit, folio tenuiori, magnitudine minor, erecta q; minùs assurgit: præterea quòd conum breviorẽ horridiorẽq; ferat, ac nucem magis resinofam. Ambabus folia capillata, sed Pence materies candidior, similiorq; Abietis, atq; in totum minus spinosa. Et 3. hist. 6. quidam Pinum & Piceam florere existimant, quidam minime, sed Piceam uti expe- id est, nucamentum gignere, quod Grosus proportionẽ responder. Plinius lib. 16. cap. 25. Pinum Piceamq; nullo flore exhibitari negat: experientia tamen refutatur. Et ut lib. 16. cap. 10. Picea plurimam resinam fundit, interveniente candida gemma, tam simili thuris, ut mista, visu discerni non queat, &c.

Genera duo ex Plinio colligimus, sativam & sylvestrem, illam Sapinum, hanc Piceam nominat. Nam Sapinus inferiorem & eandem Abietis partem significat: sicut superiorem partem nodosam duriorẽq; Fusterna, Plinio lib. 16. cap. 39. scribente: verum etiam arborem significat: hæc enim lib. 16. cap. 12. habet: inter hæc genera proprium quidam fecere Sapinum (Sapinum Turnibus legit) quoniam ex cognatione earum feritur: ejusq; arboris imas partes Tedas vocant, cum sit illa arbor nil aliud quam Picea, sentiente paulum mitigata satum: Sapinus autem materies casarum è genere fiat. Sic Plinius ejus nucem Sapineam vocat: nam lib. 15. cap. 10. nucum Pincarum genera enumerans, tertium ait Sapineam, è Picea sativa, nucleorum cute verius quàm putamine, adeo molli ut simul mandatur.

## I. Picea major prima, sive Abies rubra.

Picea, Brunf. Matth. Ang. Cord. in Diosc. Gern. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. Cæf. cui & Tæda Plinij, Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.  
Abies prima & rubra, Trag.  
Abies, Dod.

Sapinus, Bellonio, Lac.

Picea Plinij & Abies mascula Theophrasti,  
Clus. pan. & hist.

Hanc alij Abietem marem Theophrasti: alij

Piceam ἀβειρίαν ejusdem i. caus. 9. quam Gaza pediculiferam, Scaliger pediculariam interpretatur. Sic dicta Plin. l. 16. c. 10. quod totis paniculis minoribus gracilioribusq; minimos ac nigros nucleos pediculis similes gignat: alij Tædam Plinij (de qua sub Pino quarta) faciunt.

## II. Picea minor.

Picea pumila, Clus. pan.

Pinum tubulum sive tibulum Plinij, Dalechampsius vocare videtur, Clus. hist.

## DE SUCCIS SEU HUMORIBUS

## Plantarum.

**Q**uemadmodum multis animalibus pili & penna decidunt, & serpentes singulis annis exuvias deponunt: sic & plantis folia, flores & fructus decidunt, & ex earum aliquibus humor superfluous profluit, ut Vitibus lacryma: Ceraso, pruno gummi: picea, terebinto, lentisco, resina: alijs alius liquor quantitate molestus. Nam ut in animalibus sanguis turget, sic in plantis humor seu succus, qui si vel sponte profluat, vel arte educatur, ad earum conservationem facit: nam & plantæ suas venas & nervos habent, per se nomine carentes, ut habet Theophrastus 1. hist. 3. quæ similitudine quadam nomina partium animalium sortiuntur. Sanguis autem plantarum, earum succus proprius est, ut in Ficibus lac, secundum Aristotelem 1. de plantis: in Vite veluti humor: in quibusdam veluti oleum: in alijs pice liquida similis: in nonnullis, ut gummi. Et ut Theoph. l. c. humore plantarum deficiente, & ipsa deficere incipiunt, eoq; exsiccato, tabescunt: quem humorem nonnulli simpliciter σάρον succum in cunctis appellant, quidam absque nomine relinquunt: in quibusdam vero σάρον succum, inq; alijs δάκρυον lacrymam vocant. Idem ferè habet Theophrastus 6. caus. 17. & hic pro coctionis diversitate, diversam crassitiem & colorem nanciscitur. Hinc si huius humoris consistentiam consideres (ex Theoph. 6. caus. 17.) alij callores lentioresq; sunt: alij aquosi, minùsq; lenti: hinc alij densari possunt, alij nequeunt: nonnullis etiam quòd densentur atque concrecant, aliquid miscent. Quare succus plantarum, qui χυλὸς propriè



is humior est, quo plantæ nutriuntur, quiq; non sponte, sed precedente expressione, aut alia preparatione elicitur: quiq; semper tenuior est, nisi calore exsiccatus, induretur. Liqueor verò sive ὀπός, crassior est, qui interdum sponte, interdum incisione delabitur, & velut lacryma profluit, unde communiter ἄλκυρον lacryma vocatur. Qui si oleaginosus & liquidus fuerit, ῥατὶν dicitur: si terrestrior, aqueus & in truncis arborum concretus, κόμμι gummi: quæ verò naturam mediam inter gummi & resinas possident, & partim terrestria & aquea, partim oleaginea & pingua sunt, κόμμι ῥατὶν gummi resina nominatur. Sed de succis inspissatis primum, dein de gummatibus, tum de Resinis, & tandem de Pice.

De succis inspissatis.

I. Ammoniacum, ἀμμωνιακόν Dioscoridi l. 3. c. 98. est Ferulæ (ὀπός) liquor, & totus cum radice frutex Agasyllis appellatur: Galen. 6. simpl. Ferulæ lacryma. Plinio l. 12. c. 23. Hammoniacum lacryma, ab Hammonis oraculo nomen habet, juxta quod gignitur arbor, quam Metopion vocant, resinæ modo aut gummi.

Ammoniæ lacryma, Matth.

Hammoniacum seu gutta Hammoniaca, Cord. histor.

Ammoniacum, Cæs.

Armoniacum officinis & Gummi ammoniacum.

Probat Dioscorides l. c. benè coloratum (exterius flavum, intus candidum) ligni & calculorum expers, thuris glebarum granorumve similitudine, syncerum ac densum, nulla forde spurcatum, castorei odore, & gustu amarum: quod genus θραύσμα (thrauston Plinio, quasi dicas fragmentum) appellatur: alterum, quod terræ calculorumve particeps est, φύραμα (Phryma Plinio, i. e. mixtura) dicitur: & hoc ad medicamenta in aqua resolvitur.

II. Galbanum χαλβάνιον Dioscor. l. 3. c. 97. liquor est Ferulæ in Syria nascentis, quam nonnulli Metopion vocant: Gal. 8. simpl. χαλβάνιον succus est plantæ ferulacæ: hoc secundum eundem 1. de Antidor. in Sagapenum convertitur. Plin. l. 12. c. 25. Galbanum dat & Syria in eodem Ammono monte, è ferula ejusdem nominis resinæ modo, quam Stagonitin appellant, de qua & l. 2. 4. c. 5. At Theoph. 9. hist. 7. Chalbanum in Syria nascitur ex Paco vocato.

Galbanum, Matth. Cord. hist. Cæs.

Probatissimum quod thuris effigiem præbet, colore maximè flavum (tale enim recens est) gummosum purum, pingue, minimè lignosum, odore gravi, nec valdè humidum, nec penitus aridum, & cum accenditur clarum, flammam nutriendum: hoc Dioscorides resinâ & ammoniaco, Plinius vero Sagapeno, adulterari scribit.

III. Opoponax ὀπονάκῃ Dioscor. lib. 3. cap. 55. ex Panacis Heraclei radice concisa colligitur. Gal. 8. simpl. radicibus & caulibus: at Mesuæo, ex ferulaceo panace: nonnullis ex Chironio. Opoponacis Plinius lib. 20. cap. 24. in Theriaca meminit.

Opoponax sive Opoponacum, Cord. hist. Lugd. Opoponax, Cæs.

Probat amarissimum, intus candidum aut subflavum, foris ad auri colorem inclinans, læve, pingue, Galbani instar lentescens, friabile, graveolens, & dum resolvitur propius ad lacteum liquorem accedens.

IV. Sagapenum: σαγαπένιον Dioscor. l. 3. c. 95. ferulacæ herbæ liquor, quæ in Media nascitur: Gal. 8. simpl. ex planta ferulæ (panaci addit Clusius) a simili. Sanè ipsa planta Sagapenum dicitur, at liquor abusivè hoc nomen obtrahit, rectius Sagapeni succus diceretur. Plin. l. 20. c. 18. Sagapenum, Hammoniæ lacrymæ simile. Sagapenum officinis Serapinum, Matth. Cord. histor.

Sagapenum, Cæs.

Probat quod sincerum, pellucidum, foris rufis, intus cum frangitur flavis aut candicantibus guttis compactum, inter digitos lentescens, medio inter Silphium & Galbanum odore, acriq; gustu: & ut Asa foetida resolvitur.

V. Meconium, μεκόνιον Dioscor. lib. 4. capite 65. succus est, ex papaveris nigri folijs & vasculis cufis expressus & exsiccatus, quem privatim Græci μεκόνιον vocant, sed liquore viribus multò imbecillior est: propter aqueam & incoctam substantiam. Eidem l. 6. c. 17. μήμων & ὀπός dicitur. Plinio l. 23. c. 1. Meconium: licet eidem l. 20. c. 19. Mecon tithymali species sit: & lib. 27. c. 12. meconion aphrodes, peplos est. Meconium, Lugd.

VI. Opium, ὀπός τῶν μήμων Dioscor. l. 4. c. 65. est liquor lacteus, qui ex papaveris nigri scapo leviter inciso colligitur: ubi colligendi modum docet.

Opium, Matth. Cæf. Lugd.

Opium nigri papaveris liquor, Cord. hist.

Opium, Ofuim Mauritanis, Garz. Frag. vide Acoftam.

Amfion five Opium. Linc. par. 4. Ind. Or. c. 34.

Opium triplex est: album quod è Cairo adfertur, quod forte Thebaicum: alterum nigrum & durum, ex Aden: tertium flavesceus magis ac mollius ex Cambaja & Decan, Garz. Lincot. lib. c. at Fragofus, albicantis & nigri tantum meminit.

Ex Papavere nigro elicitur, Plin. l. 20. c. 18. & Avicennæ: at apud Turcas ex papavere albo, qui totos agros, ut nos tritico conferunt, cum apud eos & Persas in quotidiano usu fit, at drachmæ unius pondus: ejus enim usu se animo-fiores fieri credunt, neq; belli pericula reformidare, Bellonio scribente: & ut Lincot. l. c. qui semel, sed sensim, assuevit, nisi indies iteret, brevi tabidus moritur: & si per dies quatuor aut quinque; intermittat moritur. Paludanus in Linc. scribit, Turcis privato nomine Maslac vocari, & ab ipsis indies pisci magnitudine devorari.

Probatum candidum, vel leoninorum pilorum modo flavesceus, in massam veluti ex granulis diversi coloris coactum grave, densum, solidum, sine sordibus existens, amarum, gustu calidum, odore gravi & viroso, somnum inducens & in aqua promptè liquefcens, Bellonio & Paludano monentibus: & hoc in Asia minore in placentulas. unciarum quatuor, vel selibre pondò cogitur. Quis ergo nostrum adulteratum esse non animadvertit? Attamen ex eo quod adfertur, eligendum, purum, colore maxime rufsum aut spadiceum, cum frangitur, splendore quodam nitens & quod facile dissolvitur, sed non ceræ instar lentifcens.

VII. Aloë, Aloë & de herba & ejus succo densato dicitur: ex Aloë, Diosc. l. 3. c. 25. (πισμα) succus coactus ex India adfertur.

Genera duo (τὸ χυλίζμα) succi: alterum arenosum, quod veluti sæx & crassamentum purissimæ esse creditur: alterum (παλίσου) ad jecoris imaginem vergit, Diosc. l. c. Recentioribus illam Caballinam, quod equis & veterinariis medicandis dicata sit: hanc Hepaticam, quod Hepatis modo coacta sit, nominat: quam etiam nonnulli Succotrinam, quasi succo citrina, quod ejus pulvis citrinus sit. Vel potius Socotrina (ut Linc. p. 4. Ind. Or. 6. & p. 4. c. 38.) à solo natali

Socotra Insula, quæ alijs omnibus præstat, solida atq; compacta. Sunt tamen qui has differentias faciant, succotrinam, subcitrinam & optimam: alteram Hepaticam, nigriorem synceram tamen: 3. Caballinam, lividam, arenosam.

Aloë, Matth. Cord. hist. Lugdun. Aloë ex India, Cæsalp.

Eligenda pinguis, nitida, calculorum expers, subflava, hyeme friabilis, æstate molliuscula, hepatis modo coacta, facile humescens, eximieque amara: nigra contrà, fractuque contumax, improbanda: lavanda quin etiam & quod arenosum substitit abjiciendum, pinguisimum & quod leve est recipiendum: hæc Diosc. l. c. Apulam & Hispanicam succo faciendo inutilem Cordus scribit: at quomodo tam Hepatica, quàm Socotera dicta, ex nostra Aloë elici possit, eleganter Doctif. Fabius Columna in sua plant. *ἐμπραξί* ostendit.

VIII. Succus Aloë facie.

Iraticuch & Aiavve succus primus & America, Musæ folijs involutus, Clus. ex. l. 4. c. 7.

IX. Scammoneum *σκαμμονία*, Scammoneæ plantæ succus, qui ex radice lactei succi plena incisa & exsiccata reservatur: cujus modum Dioscorides l. 4. c. 171. docuit.

Scammonium, Plin. l. 26. c. 8. vocat: quem tantum usui esse, Theophrastus 9. hist. 12. scribit.

Scammonium, Matth. Cord. hist. Cæf. Lugd.

Scammonea officinis ad Arabum imitationem hic succus dicitur, qui densatus in massas cogitur, & exsiccatus fuscus, aut lividus, aut cinereus, aut fulvus redditur.

Differentiæ hujus ratione loci apud Diosc. & Plinium: ille, eum qui ex Mysia regione Asiæ deportatur, commendat: natione autem Syriacum & Judaicum deterrimum haberi, ervi farina & Tithymalo adulteratum. At Plinio laudatur Colophonium, Mysium, Priennense: adulterinum verò fieri ervi farina & Tithymali marini succo, in Judæa ferè, quod deprehendatur gustu, cum Tithymalus linguâ excalefaciat, &c. Quod verò Scammonium nostrum, notas à Dioscorid. tributas non habeat, causa putatur, quod hoc tempore veterem parandi modum non observent, ac non ex radice incisa, ut Dioscorides docuit, sed prorsus dissecta, vel expressa, aut è stipitibus & folijs contusis paretur: alioqui tanta Scammonij copia quotannis vix afferri posset; vel etiam lacte Tithymali adulteratum.

Opti-

Optimum est quod ex Anthiochia defertur, dein Armenū, Europaeum omnino primum est. Probatur quod pellucidum, laeve, rarū, spongiæ instar foraminosum, colore cum frangitur fulvum, taurini glutinis modo translucens: nec vehementer linguam excalescens (quod admitti Tithymali argumentum est) & cum linguæ affricatur, in candidissimum liquorem lacti similem se superficie resolvens: cito liquefcens, friabile, non valde ponderosum, nec tetri odoris. At glebæ ingentes nigrae & graves, aut aduleteratæ sunt, aut succus est ex tota planta expressus.

Huius vehementia corrigitur à quibusdam Aloë addita; sed rectius, si Malo cydonio excavato indatur, pasta circumdetur, & in clibano coquatur, dein contundatur, ut veteres fecere: aut ut alij, in succo Cydonio coquatur: melius verò si semina fœniculi, anisi, dauci adderentur. Sic correctum Diacrydium, quasi lacrymula dicitur, in officinis Diagredium, quod nimis recens, vehemens: antiquum imbecillum, quare tormina excitans: bimum optimum est.

X. Elaterium, *ελαιτήριον* Dioscoridi l. 4. c. 155. & Theophrasto 9. hist. 10. dicitur (Gaza agitatorium vertit, fortè quia motu turbatorio corpus exagitat) Elaterium Plinio l. 20. c. 1. Hoc Dioscorides ex succo fructus, addito extrahendi modo: Theophrastus ex semine (fructum intelligens) liquato: Plinius ex succo è semine expresso fieri scribit. Hoc à bimatu ad decennium colore candido utile, Dioscoridi: Ægineta, quod anno antiquius non est, & quod virefcit probat. Theophrasto, omnium medicamentorum diuturnissimum, & optimum quod vetustissimum: hinc Plinius ex Theophrasto 9. hist. 14. ducentis annis servatum meminir. Hòc Hippocrates usus fuit, nunc verò ob ejus vehementiam, non facile usurpatur.

Elaterium, quod leve & candidum & igne instar pinguedinis accenditur, Bellon. Elaterium, Matth. Bellon. Cæs. Lugd.

Plinius l. 20. c. 1. meminit Cucumeris sylv. in Arabia nati, heliorropio simili, semine nucis juglandis, quod semine & Elaterio contra serpentes efficacissimum sit: hoc necdum novimus.

XI. Euphorbium *εὐφώριον*, succus est acerrimus, arboris ferulæ speciem gerentis, Diosc. l. 3. c. 96. qui & colligendi modum docet, ut supra, l. 10. sect. 6. ostendimus: At Dodonæo non arbor, sed herba potius est, cujus folijs incis li-

quor acerrimus, facileque concrefcens effluit: verum ætate arborefcere videtur.

Euphorbium Plinio.

Euphorbium, Matth. Cæsalp. Lugd. euphorbiæ nominata plantæ liquor, Cord. hist.

Genera duo sunt: unum Sarcocollæ modo pellucidum, flavum, pisi magnitudine in guttas æquales densatum, modicè cavernosum: alterum in utriculis quibus excipitur, in massam densatur, candicans, aut vitri colore: adulteratur Sarcocolla, aut gummi & tithymali liquoris admixtione. Eligendum est purum, translucens, candidum aut flavum & acre, quod levi linguæ contactu os accensum diu detinet: quare etiam non sine molestia tunditur, nisi naribus diligenter obturatis & munitis.

XII. Succus liquiritiæ: ex radicibus succus exprimitur, & in pastillos condensatur ex Cappadocia, Hispania, etiam Bambergæ ubi frequens est, adfertur.

XIII. Succus Acaciæ: ex Acacia in Ægypto (*εγχύλισμα*) succus exprimitur, qui in umbra siccat, ex maturo quidem fructu niger, ex immatura subfulvus redditur: aliqui tamen è folijs una cū ipso fructu exprimunt. Eligendus modicè fulvus & odoratus: hæc Dioscorides l. 1. c. 133. Acacia legitimæ Matth. Lugd.

XIV. Acacia Germanica: ex prunis sylvestribus coctis succus exprimitur, insolatur & exsiccat, & tessulatim divisus, Acaciæ veræ loco asservatur. (Lugd. Succus è syl. prunis, Acaciæ succedaneum, Matt. Acacia Germanica, Dod.

De Manna.

I. Manna.

*Δροσόμει & αἰρόμει*, Galeno.

Melleus humor in Robore, Theophrasto.

Mel ex aëre, cui cœlestis natura, Plinio.

Men, Siracost & Terniabin, Arabibus.

Thereniabin & Trungibin, Serapioni & Avimanna purgatoria, Matth. (cennæ.

Drosomeli, Cord. hist.

Manna & mel rosucidum, Cæs.

Manna, Persis Xercest, sive Xerkest, id est Lac arboreum, Linscot. part. 4. Ind. or. 29.

Est autem Manna seu Mel aëreum vapor terræ succosus & opimus, æstatis calore elevatus, & in aëre in dulcem liquorem excoctus, noctis frigore coactus, & roris modo supra arborum & fruticum folia decidens.

II. Man-

## II. Manna liquida.

Cedrium mel Hippocr. Ros Libani Græcis, Bel. Terniabin Arabibus & Turcis, Eid.

Manna mellis instar liquida, Linscot.

an Manna Germanica liquida flava, ceu Syrupus folijs insidens, liquidum permanens, dum ab apibus auferatur, Cord. hist.

Hæc in monte Sinai colligitur, & instar mellis in fœtilibus, Cairum venalis deferitur.

## III. Manna officinarum.

Manna nostra laricea, Rauvvolf.

Manna durior & concreta, quæ Mannæ nomine Cairi officinis reperitur.

Hæc communiter Calabrica nominatur, quia in Calabria circa Canis ortum ex Fraxino & Orno, ab incolis in usum medicum colligitur: quæ duplex in officinis.

Granata, quod minoribus granulis constat.

Masticina, quæ majoribus & masticchi guttis propè æqualibus.

Vel Manna foliorum, quæ minutioribus micis constat, quia ex folijs colligatur: & Manna corporis, quia ex ramis arboris habetur, Cæs.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: ruffa enim & fusca, inveterata est: adulteratur saccharo penidio, herbarum folijs circumvoluto: & quæ Sennæ folia granis suis amplectitur, factitia est.

In Apennino quoque, aliquando in canicularibus promiscuè in pluribus arboribus, sed præcipuè in Quercu & Salice colligitur, nunc concreta similis Calabrichi, nunc liquidior melli similis, Cæs.

## IV. Manna Persiana granis Coriandri.

Transchibil, mannæ species, quæ ex spinoso frutice, quem Arabes Agul & Allagi vocant, colligitur, forte Manna Israelitarum, Rauvv.

Mannæ genus aliud, Tiriam Jabyne, seu Trumgibyn dictum, quod ex floribus alijs quoque & folijs legitur, magnitudine seminis cannabini, colore rubro: cujus in Ormo & Persia, non verò India, usus est, Linsc. part. 4. Ind. Orient.

Ex Syria longè candidior Italica adfertur duplex: Masticina, quæ translucida Mastiche similis: Bombycina, minimè translucida, candore Gossipij, Matth. Cæs.

## V. Mannæ Calabrinæ similis Persicæ.

Mannæ tertium genus, cujus fragmenta folijs adhuc coheræntia advehuntur, Linscot.

## VI. Manna Armeniaca.

Manna frustis pugni magnitudine, fusci colo-

ris fortè Manna Alhagiezi Avicennæ, Rauvv.

## Succi exotici.

## I. Succus laxativus est flavo rufescens.

Succus undecimus qui Ghitta jamau dicitur, Clus. ex. l. 4. c. 8.

Gutta Gamandra: gummi gotta: gutta gemau: gummi Peruanum alijs: alijs succus Gambici, vel Crambici.

Cattagauma, vel gemu, Burgraf. in Achille.

Hic ex Sinarum regione adfertur: & aliqui Euphorbij succum censent, sed arbor tanta non est: alijs Rhamni solutivi: alijs Cataputiæ succus: alijs ex Scammonio & Tithymallo compositus nonnulli compositum ex Chelidonie majoris succo Scammonea & Croco suspicantur: alij ex succo corticis mediani Frangulæ. Quid si fortè succus è floribus Ricini Indici expressus, & exsiccatus, cujus in Hydropicorum ferosis humoribus ducendis insignis usus.

an Gummi ad podagram ex novi orbis continente, quo isthic podagrici se purgant, Monardi, Lugd.

## II. Succus splendens Anethi odore.

Ufuc & Gyp succus 2. ex Amer. Clus. ex. l. 4. c. 7.

## III. Succus Aspalatho similis Anethi odore.

Succus primus concretus à Gareto, Clus. exot. lib. 4. cap. 8.

IV. Succus colore albo, flavo & rufo mixtis Anethi odore.

Succus quintus à Gareto, Clus. l. c.

## V. Succus cinericeus fœniculi odore.

Succus nonus, Clus. l. c.

VI. Succus aspalatho similis ater micis albis aspersis odor.

Succus tertius à Gareto, Clus. l. c.

## VII. Succus aspalatho similis inodorus.

Succus ater à Gareto, Clus. l. c.

## VIII. Succus attrorubescens inodorus.

Succus decimus, an Bixa Oviedi, Clus. l. c.

IX. Succus flavus albis granis commixtis, gravi odore.

Succus quartus à Gareto, Clus. l. c.

## X. Succus visco similis colore vario.

Succus circa bacillum concretus, Clus. l. c.

## XI. Succus masticinæ resinæ non absimilis.

Succus sextus à Gareto, Clus. l. c.

## XII. Succus Succino non absimilis.

Succus septimus Anime similis, Clus. l. c.

## XIII. Succus Sanguini draconis affinis.

Succus duodecimus, Clus. l. c.

XIV. Succus camphoram redolens ex radice Canellæ vulneratæ, Garz.

Canellæ liquor è viridi cortice præsertim radicem inciso, Acoftæ.

## D E G U M M I.

**G**ummi (γάμμα Græcis) lacryma est, in truncis arborum ipsum producentium coagulata & concreta, Galeno 7. simpl. cuius substantia magis aquea est, ut Resina oleaginosa: quare Gummi aqueis facile, oleaginosi difficilimè miscetur: contra Resina, quæ etiam flammam facile concipit, cum Gummi in igne crepitat, etsi calidum stillando procedat, ubi tamen aërem contigerit, coagulatur & aqua simile est, ut Aristotelis 2. de plantis, verbis utar: quare id prunis ardentibus injectum, fragorem edit. Verum, ut idem Aristoteles, quadam quomodo concha & lapides coagulantur, alia molliuscula: quadam pellucida, aureo colore flavescencia, alia obscura, pallidiora. Nunc ad specialia.

I. Gummi Arabicum: à Serapione sic dictum, quia ab Arabia regione Ægypto contra-mina importabatur.

Κόμμι ἐν τῆς ἀραβίας, Diosc. l. 1. c. 133.

Commī ex spina Ægyptiaca, Theoph. 4. hist. 3.

Gummi ex Ægyptiaca spina, Plinio l. 13. c. 11.

Gummi Acanthinum, Celsus, l. 5. c. 1.

Gummi Thebaicum, Galeno, nonnullis Babylonico, quod Gummi est à Græcis simpliciter sic dictum, Matth.

Gummi Acaciæ, diversum ab Arabico vulgaris usus.

Gummi Arabicum & Acaciæ gummi, Bellon.

Gummi quod Arabicum cognominatur, Cord. histor.

Gummi Arabicum, Lugd.

Probat Diofcoridi vermiculatum, vitri modo pellucidum, ligni expers: proximum est candidum: at resinofum ac fordidum inutile est.

II. Gummi tragacanthum: quod ex radice plantæ spinosæ ejusdem nominis vulneratæ effluit, Diosc. l. 3. c. 13. qui δάκτυλον vocat, quàmvis Theoph. 9. hist. 8. sponte profluere asserat.

Τραγάκανθα, Gal. 8. simpl.

Tragacantha lacryma, Matth. Lugd.

Dragagantum officinarum.

Gummi Tragacanthæ, Bellonio.

Tragacanthum, Cord. hist.

Probat Diofcorides pellucens, læve, gracile, purum ac subdulce: Vel eligito candidissimum, purum, æqualiter translucens, & cuius minima portio, maximam aquæ copiam coagulet: & hoc non nisi pilis & pistillo calidis lævigatur.

III. Sarcocolla.

Σαρκονόλλα (δάκτυλον) lacryma arboris in Perside nascentis thuri tenui similis, subfulva, gustu amariuscule, quod κόμμις admixtione adulteratur, Diosc. l. 3. c. 99. Sic Galeno 8. simpl. lacryma arboris Persicæ. Plinio l. 13. c. 10. fit & ex Sarco-

colla, ita vocatur arbor, gummi utilissimum, simile pollini thuris, & ideo candidum quàm ruffum melius: & l. 24. c. 14. sunt qui Sarcocollam spinæ lacrymam putant, pollini thuris similem, cum quadam acrimonia dulcem.

Sarcocolla, Matt. Lac. Cord. in Diosc. & hist. Cæs.

IV. Gummi Hederæ.

Κισσὸς δάκτυλον, Dioscor. l. 2. c. 210 Galen. 7. simpl.

Lacryma hederæ, Plinio l. 24. c. 10.

E majore Hederæ trunco vulnerato, & interdum sponte lacryma quædam, & gummeus succus exit, ex flavo rubescens, odore gravis, sapore acer.

V. Cancamum.

Κάναμον, lacryma est Arabicæ arboris (folia Myrti habentis, Amato) myrrham quadantenus referens, virosi gustus, quæ tanquam thymiamate, id est, suffimento utuntur, Diosc. l. 1. c. 23. Et ut Plin. l. 12. c. 20. ex confinio Casiæ, cinamiq; & Cancamum ac Tarum invehitur. Verum illud Anime, hoc Agallochum sylv. Dalechampi in Plinium, credit.

Cancamum Diofcoridis, Laccam dicunt Serapio, Ægineta, Marthiolus: at Brassavolas, Garzias, Clusius, res diversas faciunt: aliqui non modò diversum, sed & incognitum putant: quidam Cancamum Diofcoridis, Benivi esse volunt. Anijmum, Amato.

Anime (quod ex Æthiopia Arabiæ finitima in Lusitaniam advehitur) Monard. Frag. & par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 29.

Anime vulgo, quasi Aminea Myrrha, Cæs.

Anime triplex habetur: 1. fulvescit & pellucidum est: 2. nigricat & taurino glutini sive Colophoniæ ferè simile, vel Myrrhæ, quam & Minæam, à terra ubi præcipuè nascitur, Diofcorides appellat.

Aminea Serapioni, unde Lusitanis corruptè pro Minea vel Aminea, Anijmum & Hermolao Myrrha

Myrrha Aminea : 3. pallidum & retorridum, Clus. & Lugd.

Sic alia ex Hispania nova sive America, quæ Monardi Orientalis : alia candidior orientali, de qua Garzias & Cancamum Græcorum esse vult : licet aliqui Succini speciem suspicentur.

#### VI. Lacca officinarum.

Lac legitimum nomen, sic dicitur, quod hoc medicamentum, cum ejus usus est, in Loc sive mellis crassitiem dissolvatur : & ubi præstantissimum nascitur, Trec nominatur.

Myrrhæ similis Avicenna.

Chermes Arabum quorundam.

Formicarum alatarum sterces, Amato.

Formicæ enim hanc Laccam elaborant, materiam ex arbore exsurgentes (unde plerunque formicarum alæ permixtæ conspiciuntur) & hos ramulos arbore avulsos in umbra siccant, Garzia monente. Fortè rectius dixerimus, lacrymarum & reliquorum Gummi modo, sponte exudasse & concrevisse. Verum & in arbore Benifera reperitur. Cancamum, officinarum Lacca, Matth. Cord. in Diosc. & hist.

Lacca Arabum & officinarum, an Cancamum Dioscoridis, Lob.

Lacca, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. Lugdun. (qui Cancamum esse negat) Tab.

Gummi Laccæ, legitimum est Cancamum, Cæsalp.

Lacca à Malaijs Cajulacca dicta, ex qua ceram Hispanicam conficiunt, Linscot. part. 4. Ind. or. c. 24. & fig. 18.

Duplex habetur : ea quæ cum bacillis, vix enim sine ijs adfertur, quam Laccam Sumetri vocant, quia ex Sumetra insula, id est, Taprobana habetur : ut eam quæ in glebis sine furculis affertur, Laccam Comberti nominant : & altera factitia, qua insectores utuntur, quæ & suas differentias habet.

#### VII. Sanguis draconis officinarum.

*Αἷμα δράκοντος*, Diosc. l. 5. c. 109.

Cinnabari seu sanguis draconis, Cord. hist.

Sanguis draconis, Matth. Cadamusto, Theveto, Monardi, Cæf.

Sanguis draconis verum est Cinnabarum Diosc. Cast. Cæf.

Est arboris exoticæ lacryma, nam statim anno tempore arbores ferro sauciantur, quæ anno sequenti gummi emittunt, quod coctum & defœcatum hoc gummi efficit : in Africa, in parva

quadam insula Atlantici Oceani præpè Mederam : nunc laudatissima ex Carthagine Peruana adfertur. Arborem hanc primus Clusius, arboris Draconis nomine exhibuit. At Acoftæ, in India arbor Ber, sive Malus Indica dicta, æstate alatis formicis perpetuè onusta conspicitur, quæ in ejus ramis Laccam elaborant. Cinnabarim Dioscoridis, Solinus & alij censent, (at Clusius subdubitat) fortè quia Diosc. l. c. scribit, Cinnabarim altè & abundè coloratam esse, & eam ob causam quosdam *αἷμα δράκοντος* appellasse.

Duplex habetur, nativum & quoddam factitium, panibus coactum, ex rubrica & pice colophonia, quo potissimum veterinarij utuntur, Cæf. Frag.

#### VIII. Asa fœtida.

Asam aliqui duplicem faciunt, aliam dulcem sive odoratam, aliam fœtidam : hanc Altit Arabum : illam Belzoinum officinarum esse, & utrumque è Laserpicio proficere volunt. H. c. de Asa fœtida, quæ gummi est Laseris sive Laserpitij plantæ ferulacæ, quæ *σίλφιον* Dioscoridi l. 3. c. 94. dicitur, ex cujus radice atque caulibus incisis (*ὀπός*) liquor hic colligitur.

Altit, Avicennæ : Anjuden, Indis.

Asa, officinis, sed rectius Asa, quasi Laser, fortè voce ex Laser corrupta.

Asa fœtida, laserpitij species, Cord. histor. Lugd.

Succus Lybicus, interdum Medicus & Syriacus, alias Cyrenaicus, à loco natali vocatur.

Duplex Theophr. 6. histor. 3. alter ex caule, quem *πυλίων* Scaparium : alter ex radice, quem *ρίζιον*, radiceum vocabant : & Plinio lib. 19. cap. 3. duo sunt nomina, Rhizias, atque Caulias vilior illo : & lib. 22. cap. 23. Silphium venit primo è Cyrenis : nunc ex Syria importatur, deterior Parthico, sed Medico melior, extincto omni Cyrenaico, &c. In officinis sæpe duplex : una pura & translucens : altera impura & turbida, cui Sagapenum (quo adulterari Diosc. scribit) cujus odorem refert, permiscetur, unde Germani Diaboli sterces nominant : utraque tamen gravis odoris est. Cujus si usus esse debeat ad medicamenta liquida, aqua aut aceto, aut vino injectum supra prunas resolvenda, & quod in fundo manet rejiciendum : vel per colum cui adhærebit, transmittendum.



IX. Gummi ex Molle fœniculi odore.  
Gummi album ex cortice arboris Molle, Lugd.  
a Succus octavus, Clus. exot. l. 4.

X. Gummi caryophyllorum, similis facultatis cum resina Terebinthina, Garz. Frag.  
Gummi ex atro rufescens, inter Caryophylla interdum reperitur, Clus. in Garz.

XI. Camphora officinarum.  
Capur & Casur Arabum, Garz.  
Camphora ex genere bituminis, Cæs.  
Caphura, Matth. Cast. (qui arborem adpingit) Lugd.  
Camphora, vulgo Alcanfor, Frag.

Est gummi-resina pellucida, candida, ex rimis arboris peregrinæ, juglandi nuci simili, folijs salignæ similibus, Garziæ: Dioscoridi & Græcis veteribus incognita: è recentioribus Aërio & Sethi cognita.  
Insula Borneo, arboribus camphoriferis refertissima est, nec preciosior in Oriente camphura habetur, Linsc. part. 2. Ind. or. c. 24.

Differentiæ duæ: 1. Caphura de Burneo, quæ rarò adfertur, & omnium nobilissima: (part. 9. Ind. occid. additam) altera ex Sina in Europam adfertur, Garz. Acostæ, in panes orbiculares casta: Et Arabes genera quatuor constituunt, in caput, pectus, crura & pedes dividentes, Garziæ & Fragofo monentibus: hicque alteram dicit Chyneam, à Chyna unde advehi soleat: vel Chinichen, Linscot. part. 4. Ind. or. c. 36. Sic alia rudis est, alia elaborata: rudis est ignem non

experta: elaborata, quæ solis aut ignis calore excocta atque purgata, album colorem contrahit, Matth. (odora.

Eligenda instar crystalli splendens, syncera,  
XII. Chonidetros gummi quoddam Succino crudo persimile, quod Caphuræ quæ ex Burneo adfertur, sæpe permiscetur, Lugd.  
Gummi Chamderros vocatum, Garz. Frag.

XIII. Gummi Juniperi.  
Gummi Juniperinum, Plinio l. 13. c. 11.  
Sandarax Serapioni, Cord. hist. resina majoris juniperi arida, dura, flava, Mastichi similis.  
Vernix Latinis & Vernilago, ab anni tempestate, quasi Veris ros.

Gummi Juniperi, Sandaracha & siccus Vernix, Matth. Juniperi lacryma, Vernix, Lugd.

Gummi est resinosum ex Junipero, sed ne quis vocum affinitate deceptus, Sandaracham Græcorum, quæ metallicum est, & Auripigmento cognatum, & exitiosum venenum, substituat.

Ab hoc differt Vernix liquidus, qui ex prædicto eoque syncero & oleo ex semine lini expresso fit, quo ad picturas & tabulata illustranda utuntur. Sandaracha verò Aristotelis (σάνδαρον) 9. hist. 40. & Plinij lib. 11. cap. 7. est apud operantur cibis, qui sæpe invenitur in favorum inanitatibus sepositus, amari saporis vel ceruginosi mellis genus.

XIV. Gummi Ceraforum, Matth.

XV. Gummi Ulmi, vide in notis nostris in Matth.

## D E R E S I N I S.

**R**esina præterea lacryma seu liquor est pinguis ac oleaginosus, ex arbore sæpius sponte, interdum eâ vulneratâ defluens: qui sponte defluit ἀρόρησις & ἑσπορησις dicitur. Est autem ratione consistentia duplex: liquida quæ Græcis ῥηγά, h. e. humida seu fluxilis, ut Terebinthina: altera durior & siccior, quam φεγγίτις, id est, siccata seu testam nominant, ut Colophonia recentiorum.

Resina humida.

I. Terebinthina vera.

Τερεβινθίνη, Dioscoridi.

Gluten Albotin, Avicennæ.

Terebinthina vera ex Cypro adfertur, Lugd.

Terebinthina resina, Matth. Cord. hist.

Est liquor pinguis ex Terebinthi trunco & ramjs defluens, quæ omnes resinas arecellit, Diosc. l. 1. c. 91. testimonio: quæ pro ratione loci magis commendatur, ut prima sit Chia, dein Lybica, tum Pontica: tandem Cypria, Syriaca, Judaica, Arabica. Hæc liquida destillat, dein paulatim arefcit & sæpe cum Thure adfertur, &

in templis cum eo suffimigatur, & ineptè Incensum, ipsum verò Thus, Olibanum appell'ant.

Probatur alba, pellucida & vitreo colore & in cæruleum vergente odorata & acris.

Et ut Diosc. l. 1. c. 91. & 92. resinas omnes antecellit Terebinthina, proxima huic lentiscina: dein pinea & abiegna: post hæc picea & strobilina. Verum Terebinthina Veneta, ex novellis Abietibus colligitur.

II. Resina laricea.

Λάρινα & ῥητίνη λαριναία Dioscoridi.

Resina larigna, Matth. Cord. hist.

Terebinthina officinarum Germaniæ.

Hæc



Hæc ut Galenus 2. compos. med. secundum genera, 4. scribit, pro prima sæpe venditur (etiam nunc, non solum illius locum, sed etiam cognomen sibi vendicat, Matth. & Lugd. quoque monentibus) quæ illa humidior & acrior est.

Optima quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffluit.

III. Resina lentscina sive Mastiche: & Matth. G'uten Romanum Arabibus. (Lugd.

Masticha seu Mastiche, hodie Mastix, Cord. hist. Πύστιν χυλόν Dioscor. l. 1. c. 90. (resina lentscina Plinio) cui & μαγίχη: ex lentisco effluit, & inter

Gummi-resinas reponenda videtur. Et cap. 92. Terebinthinæ proportionem respondere scribit.

Galenus verò 3. compos. med. secundum gen. 6. Terebinthinæ præfert. Idem 2. ad Claucon.

Ægyptiæ mastice meminit: runc solos lentiscos in Chia, non autem in Gallia nec Italia

(vel saltem exigua) licet similes sint, mastichen profertre, Bellonius asserit.

Mastiche etiam in Brasiliæ dumea nascitur, Lerio, Ind. occid. part. 3. c. 12.

Probatum candida, splendens, odorata, & friabilis: quæ in Chio nata: deterior vire

& nigra bitumini similis Ægyptia, aut Pontica, hæc thure & resina mista adulteratur.

Duplex est, propriè & impropiè dicta: propriè quæ ex lentisco effluit: quæ vel alba, vel

viridis Dioscor. vel ut Galenus, alia alba quæ Chia: alia nigra. Ægyptia: habetur & Cretensis, quæ

flava: est & amara. Impropiè dicta est ea quæ ex spinosa planta emanat, Theoph. 6. hist. 4. vel

ut Plinius, ex humili spina quæ Chamaeleon est Dioscoridis: hæc est Acanthice mastiche

Theoph. Gaza spinalem vertit.

IV. Thus sive Olibanum officinarum. Λιβανός Dioscor. lib. 1. c. 81 sic dictum quibusdam,

quod è monte Libano deferatur: vel potius à λίβω stillo: Thus verò, à θύω sacrificio.

Thus, Matth. Cord. hist. Cæs. Lugd. Lovan Arabibus } Garziæ & Linscot. part. 4.

Conder Avicennæ } Ind. or. c. 28.

Liquor est arboris Thuriferæ, quæ in Arabia thurifera cognominata, provenit Dioscor.

Primas tenet masculum γαρζίας, natura rotundum, candidum: at Indicum subfulvum, &

arte rotundum factum, quod ξίρου aut σίραξ. II. ὀροβίος ἀραβίος orobium, quod in Amelo nascitur, quod ὀροβίον vocant, minus est & fulvius.

III. ἀρωμάντις cognominatum, quod candidum & dum mollitur, mastiches more digitos cedit, Dioscor. l. c. Ex his colligitur veteres aliud Arabicum, aliud Indicum fecisse, cum tamen in India non nasci Garzias affirmet.

Et nunc plures species habentur, etiam Cordo in sua historia monente, colore & magnitudine

granorum tantum differentes: 1. est Indicum dictum, quod maximis & inæqualibus glebis

constat, lividum nigricansque candicantibus aut flavis maculis varium. 2. mammosum, ob-

longis grumis mammarum forma compositum. 3. masculum, parvis, rotundis, candicantibus

aut flavis grumis, interdum singulis, interdum geminis velut testiculis constans. 4. Orobæum,

minimis grumulis,ervo æqualibus, odore masculino simile.

At hujus pollen & farina ex crebra in faccis concussione, Manna dicitur: nonnunquam &

cortex adhærens adfertur.

At Theveto aliud candicans, nitidum, quod æstate: aliud rubescens & vilius, quod vere colligitur:

Et ut Garzias, Frag. & Lug. quæ ex montanis fluit, laudatissima Melato, nobis mascula

dicitur: quæ ex ijs quæ in planis, nigrum im-

bum, & cum aliarum arborum resinis permixtum, quæ naves, ut nos pice oblinunt.

V. Resina Cupressi. Κυπρίστιν, è cupresso etiam resina liquida fluit, Dioscor. l. 1. c. 92. Matth. Lugd.

VI. Resina Cedri sive Cedria. Σιδίρια Dioscor. l. c. 105.

Cedrus dat picem quæ Cedria vocatur, Plin. lib. 24. cap. 5.

Cedria sive Resina ex Cedro, Matth. Lugd.

VII. Myrrha. Σύριγξ Dioscor. Theoph. Gal. 8. simpl.

Bola Indis, Garzias & Linscot. par. 4. Ind. or. c. 28. Myrrha, Matth. Cord. in Dioscor. qui in histor.

quinque dicit genera, & sextum adulterinum. Myrrha, Theveto, Garz. Frag. Cæs. Lugd.

Myrrha & Opocalpasum, lacryma est ex unius arboris trunco manans, Guil. the.

Myrrha suo furculo spinoso hærens, Ad. Lugd.

Lacryma est (seu gummeus succus concretus) arboris nascentis in Arabia, Ægyptiacæ spinæ

similis, quæ incisa, in substratas tegetes destillat, pars verò circa caudicem concrevit, Dioscor. l. 1. c. 77. quæ & Theoph. 9. hist. 4. habet & scribit,

Arborem esse minorem Thuris arbore & fruticosem,

cosiorem, caudice duro, contorto, cortice lævi:  
alijs, Thuris folium laurinum & læve: Myrrhæ  
aculeatum non læve, Ulmeo simile, crispum  
extremo spina horridulum, Ilignei modo, &c.  
Alij, terebintho: Diodorus, lentisco æquat.  
Myrrhæ arborem spinosam, folijs Acaciæ, se  
vidisse testatur Bellonius.

Differentiæ: alia *περίστυμ*, id est, campe-  
stris, quæ expressâ *σκήλη* excipitur: Nam Staëte  
(quæ quibusdam Styra liquidum) ut habetur  
apud Dioscor. l. 1. c. 73. pinguitudo est recentis  
myrrhæ cum aqua pauca contusæ & organo  
expressæ, & ex qua unguentum factum.

Staëte nominatur: & Cord. hist. Staëte liquor  
ex Myrrha. Alijs tamen Staëte stillaritus ros  
est, qui ante corticem ferro solutum, sponte &  
sine plaga, sed veluti cutis poris hiantibus, qua-  
si saliva quædam exudat. Alia *γαβίρεκ*: primas  
tenet *τρωγλοδίτιν*, à loco natali denominata,  
quæ subviridis, pellucida ac n. ordax: 2. tenuis,  
bdellij modo lentescens: 3. *καυκλῆς*, nigra & re-  
torrida: 4. demum *ἐργασίμη* dicta, quæ aspectu  
gummi refert. Improbatur etiam quæ *ἀμιννέα*  
nominatur: adulteratur gummi, Dioscor. l. c.  
Hanc esse Anijmum nigram Lusitanorum, A-  
matus vult. Ex Arabia & regione Alexim. & in  
Æthiopia est, adfertur, Garzia auctore  
Myrrha animinea, Dioscoridi.

Anime occidentale, Hermolao, Lugd.

Anijmum nigrum Lusitanorum, Amato.

Adversariorum auctores fulvâ, albâ, ten-  
tem & viridem se vidisse testantur.

Eligenda friabilis, levis, unaquaque concol-  
lor, quæ confracta intrinsecus lineas candidas  
inter currentes habet, unguium speciem præ se  
ferentes ac læves, quæ minutis glebis, amara,  
odorata, & acris: at ponderosa & quæ piceo  
coloris, inutilis est.

Myrrhæ Bæoticæ etiam Diosc. lib. 1. cap. 78.  
& Galenus meminere, quæ ex arbore quadam  
in Bæotia nascente, è radice incisa stillat.

VIII. Styra (sive Storax officinarum) quia  
striatim ex arbore extillat.

*εὔρεα* lacryma est arboris malo cotoneo simi-  
lis, Diosc. l. 1. c. 79. & Plin. l. 12. c. 25. sive succus est  
gummeus resinofusq; Syriacæ cujusdam arboris  
concretus, nullus enim liquidus & fluxilis  
est, nam lacryma quæ extillat, mox in glebam  
densam, pinguem & resinofam, aliquot granis  
albicantem, suavissimè fragrantem, concrevit.

Seplasiæ, Arabes secutæ, in liquidum & siccum  
distinguunt: liquidus est Myrrha Staëte: siccus  
Storax calamita officinarum.

Styra, Matth. Cord. hist. Lugd.

De hac Plin. l. 1. c. 25. lacrymæ est austero jucun-  
diores, intus similitudo harundinis, succo præ-  
gnans: huc circa canis ortum ad volant pennati  
vermiculi erodentes: ob id in scobe fordescit.

Dicitur calamita, quod in calamis è Pamphi-  
lia ferebatur: nam & cætera odorata olim arun-  
dinibus recondebantur, ne expirarent & vires  
amitterent, quod & de Distagino Cretico The-  
ophrast. 9. hist. 16. scriptum reliquit. Dioscoridi  
est *καταβαλίτης, πικρὸς, λευκὸς ἢ κίτρινος*: addit: inveni-  
ri & lacrymam gummi similem, translucidam,  
myrrhæ æmula, quæ per pauca. Et Plin. l. 12.  
c. 17. ex Syria (& ibi: ex Cypro, Sydone, & Psy-  
dia) revehunt Styra, acris odore, ejus vi foris  
abigentes scorum fastidium.

Præfertur flavus ac pinguis (ruffus & pingui-  
ter lentus, teretior furfurosus, & cano situ ob-  
ductus) sinosus, albicantibus grumis, qui  
dum molitur, melleam humiditatem & odore  
perseverantem, ex se remittit.

Adulteratur arboris scobe, quæ vermiculo-  
rum erosione facta fuerit, & hunc Styra ideo  
*σκολιήτην* quasi vermiculatum cognominant,  
quod imperiti tanquam syncerum admittunt,  
Diosc. At Plinio, cedri resinâ, vel gummi, alias  
melle, aut amygdalis amaris adulteratur.

Ex Styra afflato fuligine quoq; colligitur: & in  
Syria unguentum Styra cinum conficitur, Diosc.

Styra liquidus: & Cord. hist. Lugd.

Alij ex Styra calamita, laricea resina, oleo &  
vino simul coctis conficiunt, & quod post men-  
ses aliquot tenuissimum & liquidum, Oleum  
Styra cinum vocant ex decoctione quorundam  
furculorum in aqua fit: licet aliqui Styra  
liquidam, è peculiari arbore à Styra discre-  
pante, manare velint: & sic Styra cin liquidæ  
duæ species erunt. At Cæsalpino, qui ad nos  
adfertur, laricea resina est consistentiæ, cintra-  
ceus, odore altero vehementiore.

Storax rubra officinarum, est cortex de quo  
inter arbores.

IX. Liquidambar, Monard. Mexiocan. hist.  
Cæs. Lugd. & par. 9. Ind. oc. l. 4. c. 29. resina est li-  
quida, quæ ex India occidentali affertur: nam in-  
cisa arbore vastæ magnitudinis, quam Americi  
Ocosolt vocant, folijs hederæ, cortice crasso,  
cinereo

cinereo, quo inciso aut excavato effluit, ut ex Monardi & histor. Mexiocanæ autore, Lugdunensis refert: ex hac recenti, oleum odoratius per se stillare ajunt: ex primi quoque, ut majorem qualitatem habeant, sed minus perfectum, quo chirothecas inficiunt: & cum Styracis odore sit ad Styracis genera referri posse, Cæsalpinus monet.

#### X. Bdelium.

*Βδέλλιον* nonnullis *μάστιχον*, alij bolchum appellant, lacryma est arboris Sarracenica, Dioscor. l. i. c. 80. & Plinios. l. 12. c. 9. vicina est Bactriana in qua Bdelium nominatis. arbor nigra est, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprifici, naturaque. Alijs, ex arbore valde simili ei quæ Myrrham profert.

Duplex est: alterum quod probatur amarum, translucentum, taurino glutini simile, intus pingue & facile mollescens, lignorum & sordium expers. Alterum sordidum ac nigrum, grandioribus glebis in offas convolutum, quod ex India adfertur, quod Adrobalon nuncupatur & omnium pessimum est.

Defertur & jam à Petra, siccum, resinofum, sublividum, Diosc. qui Sarracenicum, quod Saraca felicit Arabiæ civitate devehitur, laudat; Galenus verò, Scythicum. Plinius, Bactrianum. Laudatur etiam quod in Media nascitur, Parthicum nominatum. Adulteratur gummi admixto Diosc. Sunt qui Anime, legitimum Bdelium esse putent, Clus. in Garz. monente. Bdelium, Matth. Lac. Cord. hist. (qui sex species facit) Cæs. Frag. Lugd.

Bdelij fructum Cortusi Clusius ad notas in Garz. pingit: Lugd. vide inter Palmas.

#### XI. Belzoinum officinarum.

Benzoinum, Laseroitium non est, Matth. Benzoum, benzoi & Afa dulcis, Cord. hist. Ben Judæum, Ruellio: forse nominum vicinitate lapsus, Ben jaoy, id est, filium de Jaoa, ubi plurimum nascitur nominare debuit, Garzias. Benivi, quod neq; Græcis, neq; Arabibus, neq; Judæis cognitum, Garz. Belzoe vel Belzoin, vel Belzuinum vulgo, Lugd. Belzoi vulgo, lacryma ex Oriente, Cæsalp. qui Myrrham suspicatur.

Benevinum, Linscot. part. 4. Ind. Or. c. 27.

Est Benivifera arbor vasta, folijs citri aliquantum minorib. parte averfa candicantibus, excus ramis vulneratis gummi effluit, Garz. Cujus

plura genera, præfertur Amygdaloides (hanc Myrrham Troglodyticam Dioscoridis, Amatus censet) quod unguis seu maculas candidas amygdalarum instar admistas habet, & in Seylan provenit: aliud genus nigrius in Samaria & Jaoa, quod vilius: 3. quoq; nigrum est, è novellis arboribus profluens, quod priore odoratius, & ab odore grato Benive de Bonias, quasi de floribus, vocant, Garz. Linscot. part. 4. Ind. Orient. cap. 27. Quare aliud album, aliud nigrum est, Eidem part. 2. Ind. Oriental. cap. 22. commisceri tamen solent, ut unâ commodius vendantur.

XII. Copal, Monardi, Cæs. Lugd. & par. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 29.

Copal aut Pancopal, Frag.

Resina candida, diacitro valde transparenti haud dissimilis, odorata, quæ ex Hispania nova adfertur.

Genera duo facit Gomara in hist. Mexiocana: alterum rugosum, molle, thuri simile Xolochcopalli vocatum: alterum præstantius Copal cahuiel, quod pleriq; Myrrham existimant, Clus. notis in Monard. Lugd.

Copal & Suchi copal, altera Styracis & thuris genera: part. 9. Ind. Occid.

XIII. Resina abiegna Indica, Monard. Lugdunens.

Ex arboribus spurijis, quæ neq; pinus, neque cupressi dici possunt, in quorum cacumine vesiculæ, quibus contractis, liquor guttatim stillat, quo ut Balsamo utuntur: ex novis Orbis continente adfertur.

XIV. Resina è Pinu & Picea liquida quodque manat, quæ ex Gallia & Hetruria vehitur: dein è Colophone asportabatur, hinc *καλοπικρα* appellata, Diosc. l. i. cap. 92. Sic etiam aliquando ex Populo profluit.

XV. Resina Carthagenensis, quæ à Carthagine novi orbis provincia mittitur, purissima, odorata, Terebinthinâ Venetâ multo præstantior, Monard. Lugd.

XVI. Resina Ambræ facie, Clus. exot. lib. 4. cap. 6.

XVII. Tacamahaca, resinæ genus ex nova Hispania, odore gravi Galbani, Monard. Frag. Lugdun. & part. 9. Ind. Occid. l. 4. cap. 29. vide supra in Populo.

XVIII. Caranna, Monardi, Frag. & part. 9. Ind. Occident. l. 4. c. 29.

Caragna,

Caragna, Lugd.

Resina pinguis oleaginosa ex continentis parte interiore, colore & odore; sed graviore Tacamahaca.

Duplex est: nam præter illam, alia purior ex Carthagine crysalli modo limpida adfertur, quæ Caranna purior, Monard. Lugd.

#### XIX. Gummi Elemi officinarum.

Impropriè Gummi dicitur, cum Resina sit, ut quæ flammam faciliè concipiat, & oleaginis diluatur: Diosc. l. i. c. 141. monente: Oleæ Æthiopicæ lacryma, similis quodammodo Scammonio (ἐνυμφή) fulva, ex parvis stillis conflata, mordax est.

Resina Elemi, aliquibus Gummi elemi, Cedri lacryma videtur, Cord. hist.

Gummi elemi officinarum, seu Oleæ Æthiopicæ lacryma, quæ in glebas concreta adfertur, quæ gustu iners, nec palatum ferit, Lugd.

Gummi elemi Æthiopicæ oleæ lacryma non est, Matth.

Similem ferè lacrymam, sed paucior, Oleæ & oleastri fundunt.

#### Resina sicca.

#### I. Colophonia officinarum.

Pix est quæ præ cæteris φρυγίη & aliquando συρμιγίη quasi confusa, nominatur, quod ex mul-

tis simul congestis in massam induruerit, quæ igne liquata & repurgata durior & siccior evadit.

Hæc duplex est, alia veterum, Diosc. l. i. c. 92. *κολοφονία*, quod ex Colophone ol. n. advehebatur, & resina erat liquida, quam Cord. ejusdem arboris censer, à qua Elemnia resina profluat, Cedrus videlicet. Altera verò est recentiorum. Colophonia Hispanica & Græca, Matth. Lugd. Colophonia pix arida, quibusdam Pix Græca, Cord. hist.

II. Resina sicca, Græcis *συρά* dicta, quæ absq; ignis ope cito concrevit, *φύσιμα πύρινον*, quasi germinatio piceæ, Galeno nuncupatur: hæc resina est confusa ex Abietina, Strobilina, & Pityina. Nam ut Diosc. l. c. ex siccis resinis alia est Strobilina, alia Abiegna, alia Pineæ & Piceæ.

III. Strobilina *στροβιλίνη* Diosc. l. c. Gal. quam alij ex Pinu, alij ex Picea, alij ex Pineis nucibus, quas Strobilos vocant, profluere dicunt.

IV. Abietina *ελαινή* Diosc. à quibusdam malè Colophoria dicta, quæ diu liquida permanet. Lapidés quoq; resinacei in India Occ. circa portum Tierra de Brea, tanta copia habentur, ut omnes totius mundi naves istis implere possis: hæc admodum bona pro navibus, nec ardore Solis liquefit, part. 8. Ind. Occid.

## D E P I C E.

**P**ix liquor est pinguis & resinofus ex accensata profluens. Tada autem, etsi de arbore quoq; dicatur, hic tamen pini arboris morbus intelligitur ubi ea per senectutem nimiam pinguedine veluti strangulata est, quâ Tada accensa, Pix nigra effluit. hæc coctione purgata crassescit, siccior duriorq; reddita, *συρά* nigra sicca pix, & *παλιμπία* Diosc. l. c. quasi iterata & secundo cocta pix dicitur: & Matth. Lugd.

Extæda, picem nigram & Cedriam confici, Bellonius scribit.

Zopissa verò & Apochyma, nominatur pix à navibus maritimis detarsa, Diosc. l. c.

Pix navalis, ab illa secundum aliquos distinguitur, eam significantes, quæ picandis navibus apta, & non ab ijs abrasa est.

Differt autem Pix à Resina, quod hæc sponte effluerit, illa verò ignis beneficio educta, & est

veluti Resina cocta: & ea quæ primo extillat, Pix liquida officinis, Pisselæon Dioscoridi, Cedria Plinio dicitur.

Pix sive Bitumen, resinave in Siruam non procul à Moluccis, quod ex Samatra advehitur, quæ picandis navibus uruntur, aliqui falsò Anime esse credunt, Garz. cap. de Lacca.

Sic Americani, ex arbore Oxyacanthæ simili, igne resinam eliciunt, quæ picis loco utuntur.

## A B I E S.

**A**bies, Græcis *ελάν* Theophr. l. hist. 7. procera est & longo caudice, cui cortex tunicis multiplex: l. hist. 9. una tantum radice eaq; nervosa constat: l. hist. 16. folia habet rara, eadem multifida & quasi serrata: l. hist. 6. flos Cocci colore, &c. Plinio l. 16. c. 10. Abies est cunctis amplissima est, materies præcipua trabibus, nec Abieti forma alia quam Picea.

*Genera Theoph. 3. hist. 10. est quadam mas, quadam fœmina : mari folia acutiora, magis pungentia ac magis flexa, quare aspectu crispior tota arbor videtur. Materia candidior in fœmina, mollior operiq; faciliior & toto caudice procerior est : mari magis varia, latior, durior, medulla plenior & aspectu minus pulchra : conus maris, paucos nucleos habet in priore tantum parte : fœmina conos nullos omnino, ut Macedones dixerunt. Plinio l. c. fœmina proluxior, materie mollior utiliorq; : arbor rotundior, folio pinnata, densa ut imbres non transmittat, atque hilarior in totum : & lib. 16. cap. 24. folia insecta pectinum modo pungentia. Verum Theoph. 4. hist. 7. marinam habet, quæ supra lapides patellarum modo adhæret, &c. Sic in insula Virginia Abietes magnæ & præalta ad malos navium reperiuntur.*

I. Abies conis sursum spectantibus sive mas.

Abies, Dod. gal. Lac.

Abies legitima vel mas, Bellon. con.

Abies altera, Dod.

Abies Pilati, du Choul, Lugd.

II. Abies alba sive fœmina.

Abies, Brunf. Trag. Matth. Cord. in Diosc. Gesn.

hort. Adv. Lob. Thal. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Abies fœmina, Ang.

Picea, Dod. ur.

Abies Plinij & fœmina Theophrasti, Clus. pan. & hist.

In hac Viscum, quod Stelin Plinius l. 16. c. 44. ex Theophr. 2. caus. 23. appellat, albis baccis præditum, Clusius observavit.

Inter cortices abietum novellarum, quæ tuberculis scatens, liquor præstantissimus, sed paucus, continetur, ita ut unumquodque tuberculum sæpè aliquot duntaxat guttas contineat, qui Italis lacryma dicitur: fortè apud Galenum 3. compos. medic. secundum genera, liquida Piceæ resina, quam Terebinthinæ loco institores vendebant : & hæc Abiegna lacryma sive resina liquida, in quibusdam Italiæ locis, Oleum Abiegnum nominatur : officinæ Terebinthinam Venetam vocant. Verum ex gemmis quoque, more Populi, lacrymam fundit. Sic ex Abiete, veluti ex Pinu ac Picea resina etiam sicca & candida colligitur, quæ thus ementitur, ac pro eo à vulgo usurpatur.

## T A X U S.

**T**axus etiam si resinam non fundat, inter resiniferas tamen, propter similitudinem quam cum folijs habet, relata est, quæ a Plinio & Theophrasto : quia & Nicandro : Dioscoridi l. 4. c. 80. *σμίλαξ*, quibusdam *θύμαλον*, Romanis *ταξ* & arbor est similis Abietis & folijs & magnitudine. At Theoph. 3. hist. 6. perpetuo viret ex sylvestribus : 3. hist. 10. unius generis est, proceræ, auctu facilis, similisq; Abietis, sed non tam alta & alis magis sinuata : folio quoque Abietis similis, sed pinguiore & molliore : quæ in Arcadia crescit, ligno nigro aut puniceo constat : quæ autem in Ida, flavo & Cedro simili, quare aliqui emprores decipiunt, pro Cedro vendentes, &c. in Macedonia fructum abundè profert rotundum, sabâ paulo majorem rubrum, tactu mollem, &c. si ab aliquibus hominibus manditur, suavis est & innoxius. At Matthioli apud Tridentinos perniciosum scribit : contra Pena, ejus baccas à pueris in Anglia innoxie estari, refert. Plinio l. 16. c. 10. Similibus (scilicet Abietis & Piceæ) etiamnum aspectu est Taxus, minus virens gracilisq; & tristis ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera : mas noxio fructu : lethale quippe baccis in Hispania præterea venenum inest, &c. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicant venena, quæ nunc Toxicæ dicimus, quibus sagittæ tinguntur.

Taxus, Matth. Ang. Dod. ur. Gesn. hor. Lac. Tur. Lon. Adv. Lob. Cæs. Lugd. Cam. Thal. Portæ.

Milax arbor, Cord. in Diosc.

Smilax arbor, Cam.

## D R A C O A R B O R.

I. Draco arbor, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd.

Arbor Gadenfis Posidonij fortè apud Strabonem.

Draco, Tab.

Arbuscula Dragonalis, Frag.

Fructum ferre Cerasi magnitudine, Cadamuræ, Thevetus & Clusius, & ex hoc, alij scribunt : & Dragonal nomine fructum missum, Clusius,

in notis ad Monardem refert. Verum Monardes scribit, si à fructu, pellis qua integitur auferatur, Dracunculi effigiem apparere (ur apud Monardem, Lugd. pingitur) à quo fructu procul dubio arbor denominata sit : Vide Fragosum. Hujus lacryma Sanguis draconis dicitur.

II. Prægrande folium, Adv. Lob. ico.

an Algæ similis grande folium, Cæs.

Sff

Folium

Folium arboris Draconis ex Indijs delatum, Lugd.

Folium palmæ filamentis & textura, Tab.

III. Draconi arbori affinis Americana.

Tacori in Kayua & Wiapack nascentia folia, Clus. exot. l. 2. c. 21.

Incolæ ex folijs maceratis & in tenuia stamina deductis, funes conficiunt.

## P A L M A.

**A**rbor quæ *Φελύξ* Græcis, Latinis Palma dicitur, fructus verò *δάκτυλοι* *φαινίνες*, Græcis: Latinis Palmulæ & Dactyli: Arabibus, Tamar: at ut Dioscorides l. 1. c. 148. *φελύξ* in Aegypto gignitur: (at in tota India non reperiri, Guiland. de pap. scribit) ex ea verò fructus in medio Autumni vigore colligitur, Arabia Myrobalano similis ac *πώμα* dicitur, viridi colore, referens mali cydonij odorem: si verò integrè maturuerit, *φαινιμόδαλον* fiet. Et in fine seq. cap. postquam de Palmis Thebaicis egit, Aegyptiacos nucleos, ἐν τῶν χαμαϊσῶν φαινίνων, id est ex humilibus decerpi scribit. Idem cap. 150. involucrum fructus palmarum adhuc florentium, etiam Palmam ἐλάτωρ *πᾶσθλον* (Palmitem Plinius) nominat: & fructus qui sub ea continetur, similiter elaten, quæ à nonnullis *βόλας* appellatur. Sic quod in trunci superna parte includitur, ἐνέφαλον Theophrasto, Galeno (cui etiam *νοσφύ* vertex 2. aliment.) & alijs Græcis dicitur: at Diosc. ἐνυάρολον τὸ πέργυρον, medulla trunci improprie dicitur. Sanè Palma vitalis vis in vertice, ea contra pondus resurgit, & in ea uterq; sexus maximè elucet, in cujus quoque folijs scriptitatum, ut Guiland. de pap. exposuit, Plinius l. 13. & medullam & cerebrum vocavit: Serapio verò Cephionem.

Ex Theophrasto seqq. sufficiant (quæ pleraque & Plinius l. c.) Palma cortice scabro constat. 1. hist. 8. medullam omnino nullam habere videtur, 1. hist. 9. quæ ad longitudinem tantum apta augeri, 1. hist. 14. folia arundinacea habet, 1. hist. 6. semina protinus post regmen ambientia subeunt, ut nucis & amygdale, sed cavitatem nullam habent, sed tota plena atque persolidâ sunt: tamen humor quoq; quidam, calorq; inest, 1. hist. 18. mas floret, fœmina minimè, sed protinus fructum promit, 1. hist. 22. & quodammodo cacumine gignit, 1. hist. 23. Verum 4. hist. 7. Palmam pelagicam scribit esse caudice admodum brevi, virgis ferè rectis, quæ subitus exeunt, & c. folijs spinarum acanicarum, erecti tamen, nec circumflexi, & c.

Genera: Theophrasto 2. hist. 8. alia fructifera, alia steriles: illarum alia mares, alia fœmina: sic in fructu differentia: alij nucleum habent, alij eo carent. quidam durum, nonnulli mollem: sic colore, alij candidi, alij nigri, alij flavi sunt: magnitudine, quidam rotundi: veluti mala: alij parvi, cicerum magnitudine. Et Plinio l. 13. c. 4. palma genera undequingaginta sunt: at clarissima omnium quas Regias appellavere: quia Regibus tantum Persidis servabantur, Babylone nata: plura videantur ibidem: at quas in Caryotarum genere Nicolaos, in honorem Nicolai Peripaterici Philosophi, ab Augusto ita nominatas Athenæus voluit, harum & Aegineta meminit.

### I. Palma major.

Palma, Trag. Matth. Dod. ut: Ang. Lac. Turn. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Adv. Lob. Cæs. Cast.

Acostæ, Lugd. Cam.

Palma sive Dachel, Alpino.

Palma major, Bellon. (quæ in Aegypto cellissima) Tab.

Palma Tamara, in insula S. Thomæ, Roëlsio in ep. ad Clus.

Palma dactylifera, Linscot. 4. part. Ind. orient. figur. 14.

Pingunt arborem, dein fructum cum floribus & Spatha.

Spatha, Ang.

Dactyli cum palma elate, Matth.

Palma elate, Cord. in Diosc. Lugd. Tab.

Palmarum fructus, & flores & elate, Dod.

Caryotæ, Carotides, fructus palmæ dactyli, Cast.

Palmarum fructus sive dactyli, Lob.

Fructus dactyli in Italia, Caryotæ verò Dioscoridi & Plinio, Cæs.

Palmarum excelsum sylvâ, in Arabiæ deserto Rauvvolfus transivit, & res species Dactylorum observavit: 1. quales ad nos adferuntur: 2. penitus rubros: 3. flavos, primis minores sed sapidiore, qui à Serapione Hayron nominantur.

Palmæ cerebrum sive medullam, ἐνέφαλον Græci vocant, quæ vescebantur, ut etiamnum in Alexandria & quidem cruda, cinaræ etenim saporem refert: solent Aegyptij rustici palmas abortivas requirere, quarum cacuminibus excisis, candidam medullam eximunt & venalem proponunt. Varia palmarum genera sunt, spinosum in Creta, differens à Cephaloni sive pumila Palma, Bellon.

### II. Palma minor.



*Χαμαίριφης*, Theoph. 2. hist. 8.

*Chamærops*, Plinio l. 12. c. 4.

*Palma humilis*, Match. Cæf.

*Cefaglioni*, Ang.

*Palma minor*, Gefn. hort. Tab.

*Chamæriphe*, Dod. Adv. Lugd.

*Palmites*, Lob. Garz.

*Palma Chamærops* Plinij, Lugd.

III. *Palma humilis exotica*.

*Chamarrippe peregrina*: & ejus fortè folium,  
Cluf. exot. l. 4. c. 12. & 13.

IV. *Palma sylv. in Cambaya similis*, Garz.

V. *Palma Americana fructu racemoso*.

*Palma Yuri dicta*, Lerio in part. 3. Ind. occid.

*Palmarum in America quatuor aut quinque genera reperiuntur*: inter quæ frequentissima ea, quam *Gerau*, alia quoque quam *Yri* vocant: hæc fructu est rotundo ad effigiem racemi, tanti ponderis, ut ægrè una manu sublevetur, sed nucleus tantum *Cerasi* crassitudine edulis, &c. *Lerius*.

VI. *Palma manicam Hippocraticam referens*.

*Palma saccifera*, Cluf. exot. l. 1. c. 2.

Ex insula maris Atlantici *saccifera dicta*, quia forma illi colo seu sacco, quale vinum aromatites percolare solent: in quibus nuces orbiculares durissimæ continebantur.

VII. *Palma Americana spinosa*.

*Hairi Theveti*, Lugd.

*Ayri Brasilianis*, Lerio in desc. Brasil. sive Am. part. 3.

*Ebenum esse mulri existimant*: quia lignum ferri modo in aqua sidit, ex quo Barbari enses & sagittas, qua ferreas loricas penetrare possunt, conficiunt: fructu est rotundo, pilæ lusoriæ magnitudine (cui nucleus ut nix albus, minimè tamen edulis inest, Lerio) simili facie, nomine *Kayama Oviedus* descripsit.

VIII. *Palma vinifera Theveti*, ex qua incisa succus effluit, qui vasis terreis excipitur, & in quotidianam potionem, quam *Mignol* appellant, in promontorio Æthiopum (nunc promontorium Viride nominatum) reponitur: quæ suavissimi gustus, quamvis ejusdem arboris fructus, qui parvi sunt dactyli, acerbi sint nec facile edi possint. Sic ex palma *Cichorin* similis succus elicitur, Lugd.

an *Palma* cum grandibus folijs, ut unum viro contra pluvias tegendo satis sit, quæ pertere-

brata & tubulo immisso vinum copiosum, gustu Hispanico simile profundit, quod Vinum *Palmirem* Hollandi vocant: par. 5. Ind. or. fig. 2.

IX. *Palma vinifera fructu ex arboris trunco spinoso*.

*Palmitas*, cujus fructus pineæ nuci similes, Linsc. part. 3. Ind. or. c. 10. & part. 4. fig. 16. & part. 5. fig. 2. num. 7.

*Palmites arbores vinum exstillantes non secus ac arbores Cocos*, part. 4. Ind. or.

*Palmites arbores ramis & frondibus carentes, fructu ex stipite Ananas non dissimili, grana plurima instar punicæ alicujus continente*, par. 6. Ind. or. c. 38.

X. *Arbor fructu nucis pineæ specie*.

*Melenken Theveti in Necumere maris Indici insula*, Lugd.

Huc referri possunt

*Palmae aliæ, quarum fructus Cola dicitur, nuci pineæ majori similis, pulpa quadruplici, intus colore rubicundo castaneæ forma continens: Pigafer. desc. regni Congiani l. 2. c. 1.*

XI. *Palma humilis longis latisque folijs*.

*Palma*, quam in Cypro crescere Theophr. 2. hist. 8. scribit, quibusdam: quod Guil. in The. refutat, quia hujus fructus sapidus non sit, cum *Musæ* longè suavissimus sit.

*Pala* Plinio l. 12. c. 6. major alia pomo & suavitate præcellentior, quo sapientes Indorum vivunt: folium alas avium imitatur, longitudine trium cubitorum, latitudine duum, &c. arbori nomen *Palæ*, pomo *Arienæ*.

*Musa*, Maum & *Amusa*, Serapioni, Avicen. Indis, *Quelli*, & Guinenisibus *Bananas*.

*Musa*, Matth. Dod. gal Bellon. Guil. Ad. Rauv. Cæf. Cast. Frag. Tab. Lugd. Garz. cui & *Ficus Martabanis*.

*Palmae species pumila quæ Musas fert*, Gefn. hor. *Musa Serapionis*, Lob.

*Musa sive Ficus Indica*, Acoftæ, Lugd. app.

*Poma paradyfi*, Lud. Romano. hujus enim arboris fructum Adamum comedisse volunt.

*Dudaim in Biblijs*: *Phyximilon Æschylo*: *Margraita Græcis & Latinis*: *Muz & Gemez*, Mauritanis: *Ficus Pharaonis*, Kafi: *Melaplanda*, Indis orient. At Indis occid. *Platanus*: *Abella*, insulæ D. Thomæ inquilinis dicitur, teste Guil. in The.

*Mauz*, Alpino.

*Mauze Theveti*, Lugd.



Huc referri debet,  
Paquouere Americanorum, Theveti.  
Musa pacouere Lugd. qui figuram Theveti à  
priori diversam exhibet.

Hujus folijs gummi Elemni, aliquando &  
Sacchari panes involvuntur.

XII. Musæ affinis in regno Catay.  
Photel, nonnullis Ficus Pharonis, Thevet. Lug.

XIII. Musæ affinis altera.  
Banam, fructus in regno Congiano, forma &  
gustu Musæ Ægyptiacæ: par. 1. Ind. or. l. 2. c. 1.

XIV. Palmam referens arbor farinifera.  
Zagu, Ferd. Lopez.  
Sagu, Pigafettæ, & ad Clus. cur. post.  
Arbor vasta in regno Fanfur, Polo Veneto.  
Arbor farinifera, Clus. exot. l. 1. c. 3. & 16. Lugd.  
& Claudio Dureto.

In Ternate insula Æquatori proxima provenit, cujus summum fastigium in caput orbiculatum instar Brassicæ capitatae extuberat, in cujus meditullio farina, ex qua panes fiunt: sicut etiam apud Amboënses, & panes & alia cum lacte fercula conficiuntur.

Arborem quandam in insula Ternate detruncant, findunt, ligna fissa tamdiu tondunt, dum farina decidat, quam Sagge nominant, ex qua panes candidos quadrilateros conficiunt: part. 5. Ind. orient. At parte 8. panis Sagu Molucensium, ex radicibus arborum confectus dicitur: quare Lerijs in descript. Brasiliæ, putat farinam non ex ligno attrito, sed ex radicibus Aypi & Maniot confici.

XV. Arbor exotica fructu dactylis simili.  
Arbortinctoria, Theveto, Lugd.

In regno Senegæ, arbor ex cujus nucleis oleum expressum cum aqua mixtum, pocula & pileos croceo colore tingunt.

XVI. Genus fructus palmulis simile, sed ut piper linguam exurens, Linsc. part. 3. Ind. or. 10.

XVII. Arbor folijs amplissimis fructu cucumeris forma.

Bonannas part. 7. Ind. or. fig. 4. & part. 5. c. 7.

Bannana: part. 6. Ind. or. & part. 8.

Folia tantæ magnitudinis, ut virum aliquem cooperire possint.

Huc referri potest

I. Ficus Indica fructu racemoso folio oblongo, an Uva quam ex benedicta terra Moyse attulerunt?

Piatanus, Oviedo: & part. 4. Amer. c. 28.

Platanus Indica: part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 21.

Daracht, Moris ipsa arbor dicitur: Avicenna, Serapio, Rhafis meminere, Paludanus notis in Linscot.

Ficus Indica, Linscot. 4. part. Ind. or. 11. & fig. 11. Pacoaire frutex, (ad Musam Matthioli accedere censet) Lerijs 3. part. Ind. occid. 12.

Platanus sive Bonannas, part. 9. Ind. occid.

At fructus dicitur

Bavanas, Patan, Prian, Quelli Indis, pacona Brasilianis Linscot. l. c.

Paco, Lerijs l. c.

Pacona, part. 3. Amer. ep. 1. de Brasil.

Poma Paradyfi, Brocardo ter. sanct. desc.

Davanas fructus, part. 2. Ind. or. 4.

Vannanas seu Ficus Indica, in Sumatra, part. 4. Ind. or. c. 4.

Arbor Vannanas: part. 8. Ind. occid.

Genera plura: 1. cæteris crassius, Figos Dorta, Fici aulici Lusitanis dicuntur: 2. minus Seneryn dictum: 3. Cadolyn: 4. ficus nobilissimæ Chyncapoloyn nuncupantur, Linscot. l. c.

Folia hujus, quæ ulnam longa, tres Spithamas lata (lapathij aquatici sex pedes longa, duos lata, Lerijs) in variam supellectilem Indis in Goa cedunt, quibus & Turcæ papyri loco utuntur. Surculus sæpè 200. ficibus prægnans est, uvarum modo in se compressis: acini ex quibus dependent, sæpè in tantam molem grandescunt, ut à binis bajulis transversa pertica vix gestari queant: Toto anno fructifera est, & Indis commeatum quotidianum largitur: Linsc.

Ex folijs in insula Capul, supparum conficiunt, quo corporis partem inferiorem & pudenda tegunt: part. 9. Ind. occid.

Aliæ Platani adhuc in India reperiuntur, exiles & candidi, quas in Hispaniola Dominicos vocant: alibi etiam crassiores, & rubentes proveniunt: Joseph. Acosta l. 4. c. 21.

II. Ficus Indica fructu racemoso altera. an Ficus Indica circa Acesinum amnem nascentis, Theoph. 1. hist. 12. 4. hist. 5. & 2. caus. 14. an Fructus arboris Gaguey, Oviedo. Arbor peregrina fructum similem ficui gerens, Clus. exot. l. 1. c. 11.

Huc referre oportet

Fructum exoticum tertium, Clus. l. 2. c. 19.

Palma nucem ferens.

I. Palma Indica coccifera angulosa. Jausial Indi, id est, nux Indica, Avicennæ.

Nux

Nux Indica, Matth. Adv. Lob. Cæs. Cast. Lugd.

Nux Indica grandis, Cord. hist.

Palma in India nascens, Theophr. Arnano, Straboni, Guil.

Coccus Indica, Lac. Frag. (ap.

Palma Indica Garzizæ, quæ & Elephantis, Lug.

Nux Indica 1. & 2. Tab.

Palma nuces Indicas Coccus dictas ferens, Pigafetta in desc. regni Congiani, sive part. 1. Ind. orient. lib. 2. cap. 1.

Palma Indica sive Cocos, par. 9. Ind. occ. l. 4. c. 26.

Palma seu nucifera arbor Indica, quæ Arabibus Mato, Indis Tengamaram & Lanha: at nux, Arabibus Narel, Indis Tenga, Lusitanis Coquo, Linsc. part. 4. Ind. orient. c. 12. & fig. 11.

Palma Indica Cocos vocant ut & fructum: part. 9. Ind. occid. additam.

Cocos sive nux Indica: part. 8. Ind. occid.

Coques nuces, ex cujus corticibus, corbes parant: part. 9. Ind. occid. additam.

Palma Coccoichne, palma indica nucem Indicâ ferens, quas Linscottus rotundas pingit, cum ex Guinea triangulares advehantur, nisi fortè succo plenè rotundiores sint, Roëlius in ep. ad Cl. ubi Linscottii figura à Clusio reprehenditur.

Fructus Lusitanis Cocos & Coquen dicitur, ob tria foraminum vestigia, quibus Cercopitheci caput repræsentant: & nucleus inclusus siccatus, Copra nominatur, qui fructus & vitum & amictum Indis suppeditat, & omni tempore nuces fert, Linsc. l. c.

In Caryotarû genere, quas Plinius Nicholaos appellat, aut quod Pateton vocat, esse volunt.

Liquorem colligunt ex nuce, quem Suram nominant: & Ambonenses Vinum de palma: & quomodo vinum ex his fiat, ostendit ad Clus. cur. post. Ex hoc spiritum eliciunt, qui incolis Arack, alijs Fula, sive Mype, id est Vinum sublimatum dicitur: sed & alio modo distillata Sura, Uraca fit. In summa ex hac Palma, fructus, oleum, lac, mel & acetum colligunt: ex cortice ligneo pocula, ex palcaceis nucum integumentis, funes ad naves, foliorum denique quoque usus existit.

Genera Cocos seu Palmæ Indicæ quatuor sunt: 1. nucum jam dictarum, ex quibus Indi universi omnem suum victum quærunt: 2. Lusitanis Arraquero: quæ Areccam fert: 3. dactyli-fera, Tamar: 4. Lantor dicta, ex quo Indi papyrum suum quærunt: 4. part. Ind. or. c. 3.

II. Palma coccifera figura ovali. (Garz. Coccus de Maldiva, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. ad an Nucum genus peculiare contra venena, in insula Melandyna, Linsc. part. 2. Ind. or. c. 15.

Fructus argento includuntur, ut & priores: aliquando prægrandes admodum, interdum exigui in litus ejecti reperiuntur.

III. Palma Javanensis longissimofolio. Lantor, è Coquos seu Nucum Indicarum classe, folia viri longitudine proferens, part. 4. Ind. or. c. 7. & 6. fig. 15.

Fructum fert pusillum Cerasi magnitudine, qui nucleum carnosum dictum continet: hanc Palmam aliqui primæ fœminam existimant.

IV. Palma coccifera ex Guinea.

Avellanæ Indicæ species, Matth. Lugd.

Avellana Indica, Lob. Tab. (Garz.

Fructus cum Cocco affinitatem habens, Clus. ad Palma Ady Roëlius in epist. ad Clus. quian sit Palmæ Caryorides Diosc. & Galeni, dubitat.

Fructus Abariga incolis, Caryoces & Carcoso Lusitanis, Citrij mali magnitudine, ex cujus pulpa oleum exprimunt, id eduljis miscentes: ex germinibus succum colligunt, quout Vino inebriantur.

V. Palma coccifera Brasiliiana.

Sabucaje pomo est amobus pugnis ampliore, forma calycis, in quo nuclei amygdalinis similes, etiam sapore, Lero 3. part. Ind. occid. c. 12.

VI. Avellana angulosa villis obsita si modo à priori diversa sit.

Fructus peregrinus 3. cum priore magnam similitudinem habens, Clus. exot. l. 2. c. 29. Lugdun. Tab. Ger. hujus nucleus pro

Fructu peregrino 5. proponitur à Clus. Lug. Tab.

VII. Palma coccifera minor. (Ger.

Palmitas quatuor aliquas fœmellas dicunt, quæ vinum nullum proferunt, sed fructibus abundant, quorum nucleus juglandis magnitudine, cujus cortice aperto, tres in eo nuces, avellanis similes: part. 6. Ind. or. c. 12.

VIII. Palma cujus fructus Cuci.

Κυτιοφόρον inquit Theoph. 4. hist. 2. similis Palmæ, similitudinem in caule & folijs repræsentans: quæ cum aliquantulum increverit bifida fit, iterumque horum utrumque pari modo dividitur: virgas breves nec multas profert: fructum fert magnitudine qua manum impleat, rotundum & oblongum, colore flavicante, succo dulcem & gratissimum, non congestum ut

Palmae, sed per singula discretum, nucleo magno vehementerque duro, &c.

Cuci Plinio l. 13. c. 9. qui eadem ferè quæ Theophrasti. habet.

Cuciophera, Matth. Cam. ep. Lugd. ap. Tab. Ger. Cuciophoron, Ang.

an Nux Indica minor, Cuci Theophrasti, Cord. histor.

Bdellij fructus Cortusi, Clus. hist. Lugd.

Perseæ, hunc fructum adpinxit, Lugd.

Cuci fructus, suo pulvino nudatus, Clus. hist.

Cuci fructus, Linsc. part. 4. Ind. or. fig. 18.

IX. Nuci Indicæ majori affinis fructus Brasilianus.

Fructus exoriscus quintus binis foraminibus parte anteriore, Clus. exot. l. 2. c. 16.

X. Nucula Indica ex Guinea.

Nucula Indica, Adv. Lob. ico.

Nux altera, Clus. exot. l. 2. c. 26.

Nucula Indica secunda, ad Clus. cur. post.

Ex folijs liquor exprimitur, aut ea in aqua decoquantur, eoque pro potu utuntur: at ex fructu panem suavem conficiunt.

XI. Palma cujus fructus sessilis Faufel dicitur. Faufel Serapioni: Filfel & Fufel, Avicennæ.

Avellana Indica, Matth. qui una tabella triplices fructus pingit, ut & Lugd. hic tamen & nucem ex Clusio adposuit.

Faufel, id est Avellana Indica, Cord. hist. Frag.

Faufel sive Areca, Garz.

Areca sive Faufel, Clus. in Garz. Lugd.

Avellana Indica cujus fructus Areca, Acoftæ.

Areca palmæ species, Scalig. Vartomanno, cui fructus Coffol. & Lug. Romano Chofola, Lugd.

Areca, Cast. Tabern. Ger. hi duo & arborem & fructum, tam hujus quam sequentis, una tabella proponunt.

(Lob. Faufel cum suo involucrio & eodem exutū, Adv.

Nuci Indicæ affinis fructus, Areca, Cæf.

Palmae Indicæ altera species, quæ Lusitanis Arequiero, quæ fructum Arecca seu Faufel parit,

Linsc. 4. part. Ind. or. c. 5. & fig. 11.

Arecca & Arrequa, Supary, Arabibus Faufel fructus dicitur, Linsc. 4. part. Ind. or. c. 16.

Genera tria: 1. latere uno pressior, altero latior & major: 2. minus, nigricantius, durius, Checanyn dictum 3. à cujus masticatione homo ac vino inebriatur, Linsc. l. c.

XII. Palma cujus fructus oblongus Faufel similis.

Avellanæ Indicæ genus oblongum, Clus. in Garz. Lob.

Nux oblonga quæ Faufel cum suo involucrio magnitudine æquat, Lugd. cui Avellana Indica 4. ordine in tabula.

XIII. Palma fructu nuce juglandis minore & rotundiore.

Alia species Coquillo dicitur, in Chile fructu suaviore, part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 26.

XIV. Fructus exoriscus Faufel affinis.

Fructus exoriscus 2. à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 23.

XV. Fructus Javanensis quadrangulus cortice reticulato spadiceo.

Peregrinus fructus *παραγινω* prægrandis, alterius Palmae fructus fortè, Clus. exot. l. 2. c. 5.

Hunc cum pluribus alijs à D. Hooft Guillemi, Amstelrodamo accepi.

XVI. Nuci de Coulcul quæ gemini pugni magnitudine sit, quæ parvis granis esui aptis, atque Avellanæ instar dulcibus plena sit, meminit Bellonius obs. l. 1. c. ult.

XVII. Couroq, fructus Brasilianis, ex quo oleum exprimunt curandis vulneribus præstantissimum: Lerijs, vel 3. par. Ind. occid. 10.

*Palma squamoso fructu.*

I. Palma conifera ex Guinea squamis ad pediculum conversis.

Palma pinus sive conifera, Adv. Lob. ico.

Palmapinus sylvestris, Lugd.

Peregrinus fructus squamosus, Clus. in auctar. ad exot.

Fruticis aut arboris exoticæ ramus cum fructibus squamosis, Clus. cur. post.

Includitur nucleus durus, venosus, qualis interdum pro insigni aliquo lapide obruditor.

II. Palma conifera squamis sursum cōversis. Fructus peregrinus abiegnae nuci similis, Clus. exot. lib. 2. cap. 3.

III. Palma conifera squamis à prioribus differens.

Palmapinus sive conifera Penæ, Lugd.

Palmapinus, Cast. app.

Palma conifera, Tab.

IV. Fructus squamosus orbicularis major juglandis magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus tertius, Clus. exot. lib. 2. cap. 3.

V. Fructus squamosus orbicularis minor, avellanæ magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus secundus, & fructus

fructus Canne de Bengala creditur, Cl. ex. l. 2. c. 3.

VI. Fructus squammosus orbicularis sulcis rectis, obliquis & transversis.

Guayaquæ fructus elegantissimus, Cl. ex. l. 2. c. 4.

Guanavanus, part. 9. Ind. occid. c. 28.

Variæ fructu cordis effigie viridi: item orbiculari crocei coloris.

VII. Fructus squammosus pyriformis.

Fructus aspero cortice ex Baly insula, Clus. ex lib. 2. cap. 4.

VIII. Palma fructu aculeato ex arboris trunco prodeunte.

Jaca, Garz. Acoft. Frag. Lugd.

Jaca minor, Cast.

Jaceros in Calecut, Ludov. Romano.

Jaaca & Jaqua, Linsc. 4. p. Ind. Or. c. 6. & fig. 16.

Fructus melonis magnitudine: quoddam genus adeo auget, ut ab uno homine ægrè attolli queat: Duplex est, alter & præstantior Barca: aliter Papa aut Girasol appellatur.

IX. Arbor fructu Anancs ex caudice emergente, nucleis turgente.

Arbor sine folijs seu ramis, in Insula minore S. Mariæ part. 4. Ind. Or. c. 6.

X. Arbor Indica fructu racemoso erinaceo.

Erinaceus Lusitanorum, Linsc. p. 4. Ind. Or. fig. 16.

Fructus in Baly Insula pomi ferè magnitudine aspera & spinosa cure tectus.

XI. Fructus cortice squammoso.

Fructus ex Bally pyri magnitudine, cortice instar piscis squammarum aspero, nucleo uno vel altero, Linsc. par. 3. Ind. Or. 39. & par. 4. c. 6.

*Nuces exotica.*

I. Nuculæ saponariæ non edules. Arborea, quæ à precarijs sphæculis & à saponem cognomen acceperunt, folijs filicis, Oviedo hist. Ind. Lugd.

Sphæculæ saponariæ Oviedi, Monardi.

Fructus exotici 16. Clus. ex. l. 2. c. 16.

In Hisp. fructu integro cum aqua pro saponem utuntur: ex osiculis sunt corollæ ebenis similes

II. Nux vomica in Officinis.

Nuces vomice Sepalsijs, quas Methellas genuinas crediderunt, Matth.

Nux vomica communis, nec vomica est, nec metella, Ang.

Nux vomica, Cord. hist. (cui & canina) Cast. Lugd. Tabern.

Nux metella, Lac. vulgò & Fungus orient. Cæs.

Nux metella vera, Vomica officinarum, Lon.

Vomica officin. falso Metella, Guil.

Tithymali myrsinitis fructus, Fuch. comp.

Nux vomica, fortè Cutschula, Rauvvolf.

Homini noxiam dicit Matth. innoxiam Milichius & Renodæus: potiones somniferas ex his se parasse, Brassavolus scribit.

III. Nux metel officinarum oculata.

Nux metel communis, Vomica non est, sed potius Metel verum, Ang.

Nux vomica, Lac. vera, Metella officinar. Lon.

Nux methel sive methela, Lugd.

Hippomanes Cratevæ quibusdam, Eid.

Fructus peregrinus sextus, Clus. exot. l. 2. c. 30. & in altera tabula, Lugd. Tab. & Ger.

Nucum genus gallis tum forma tum magnitudine simile, Ind. Or. part. 4. c. 8.

IV. Cocculæ Officinarum.

Baccæ cotulæ Elephantinæ Germanis pharmacop. Matth. epist.

Solani furiosi fructus, Cord. in Diosc.

Cuculi fructus Solani furiosi in Ægypto, Eid. h. Coco de levanti, quidam fructum Tithymali paralij esse putant, Lac.

Grana orientis, Cornaro.

Nux vomica fortè, quæ officinis Galla orientalis, Cæs.

Cucculus Indicus, Cast.

Cocculæ orientales, Doam Sames in Halepo, Rauvvolf.

Coco orientalis, Frag.

Cocci orientales, Tab. Ger.

Baccæ orientales & piscatoriæ, Condroncho.

Hæ sæpe racematim pediculis hærentes, hedera corymborum modo ex Alexandria adferuntur. Pro pediculis nullum præstantius remedium inventum, Condronchus peculiari de his baccis tractatu scribit.

Quidam Solani manici, quidam Tithymali, quidam Clematidis fructum opinantur.

V. Anacardium: fructus hic veteribus Græcis incognitus censetur, quem recentiores Græci *ανανάδιν*, à cordis cum primis resiccati, tum similitudine, tum colore nominarunt. Baladar Arabibus, ut Serapioni.

Anacardium, Matth. Lac. Cord. hist. Lon. Cast. Garz. Acoftæ, Frag. Lugd. Tab. Ger.

Anacardium, Arabibus Balado, Lusitanis Faba Malaccana, ex qua viridi Achar conficiunt, id est, sale & aceto maceratum condiunt, Linsc. part. 4. Ind. Or. c. 29.

Anacar-

Anacardus sive Anacardium: Persea forte Plinij Cæs.

Variat: nam quod in Malavar, oblongiore porrecto collo est, eo quod in Sunda prodit.

VI. Anacardij alia species.

Acajon, Theveti, Lug. Lerio 3. par. Ind. occ. c. 12.

Cajous Acoftæ, Cluf. ad Garz. Lugd. Ger.

Cajos, Linc. part. 4. Ind. or. 9. & fig. 13.

Castaneæ quæ ex Indijs adferuntur: Rondil. cap. de memoria deperdita.

Anacardij aliud genus, quod Cajous, Frag. Tab.

Fructus peregrinus 7. Cluf. ex. l. 2. c. 30. & in tab. altera, Lug. Tab. Ger. nux est Cajous immatura.

Fructu ovi anserini forma, cujus extremo nux leporini renis figura (cujus nucleus suavissimus) adnascitur: ex fructu Canibales potioris genus conficiunt.

*Arbores venenata.*

I. Arbor fructu orbiculari venenato.

Penoabsou Theveti, Lugd.

Arbor in America portulacæ folijs, & in fructu quolibet nuces senæ amygdalis similes, in singulis singuli nuclei, ad vulnera sananda, ut & oleum ex ijs expressum, utile.

II. Arbor fructu pilæ magnitudine.

Arbor venenata 1. Theveti, Lugd.

Hujus succo Canibales sagittas imbuunt.

III. Arbor succo venenato, radice esculenta.

Arbor venenata alia, ex qua scarificata succus mortifer emanat, radice tamen esculenta, ex qua farinam; qua vescuntur, faciunt, Thev. Lug.

IV. Arbor fructu venenato, radice venenorum antidoto.

Arbor Baxama, cujus & umbra & fructus suffocant: cum tamen radix in alijs regionibus, venenorum antidotus sit, ut & fructus qui Rabaixit vocatur, Theveto, Lugd.

V. Arbor brassicæ folio excelsissima Americana.

Uhebebasou fructu pedis longitudine, quo apum examina nutriuntur, Theveto, Lugd.

HERBAE ET ARBORES

*admiranda.*

I. Planta sanguineos sudores excitans, in epist. ad Monard.

II. Herba mortem aut vitam in morbis prænuncians, Monard. Lugd.

III. Baharas in Judæa radix colore flammæ as similis, circa vespæram veluti jubare fulgurans: quæ accedentem & evellere cupientem

tam diu refugit, nec prius fugam sisti, quam urina muliebri, aut menstruo sanguine conspersa fuerit, Joseph. de bello Judaico.

cum Aglaophoride sive Cynoscasto terrestri Æliani: marmaritime Democriti: Cynocephalia & Osiritide Apionis: moly, Hemeri: & pœonia non Dioscoridis, sed Galeni, nisi fallor, convenit. Guil. pap.

Baaras aut Babras Josephi, ex loco natali, Cast.

IV. Frutex Tartaricus.

Agnus Scythica, Boramerz, Sigisf. Baroni ab Herberstein in hist. Moscovitica, Scalig. Lugd. Boramerz Tartarica, Claud. Dureto, qui eum pingit.

Ex semine Melonis magnitudine crescit figura agni, quem omnibus partibus repræsentat & pro carnibus pilos gerit singulari cornu specie, & radix ad umbilicum surrigitur.

V. Arbor veneræos stimulos domans: in epist. ad Monard.

VI. Arbor folijs ambulantibus, Pigafettæ.

Arbor in insula Cimbabon, Costæo, Guil. pap.

Arbor mira cujus frondes repunt, Scalig.

Arbor folijs virentibus & ambulantibus, Dureto, qui eam pingit.

In insula Cimbabon, arbor folijs Mori mul- rum similibus, parte utraq; binos pedes breves & acutos habens, quæ ubi tangitur, diffugiunt.

VII. Arbor Malavarensis folijs tactu se contrahentibus.

Arbor in provincia Pudefetan in Asia, Nicolao Conti, Poggio Florentino, Cardano.

Arbor pudica, Scal. Dureto, qui arborem pingit.

Arbor verecunda in Pudefetaniam, Costæo.

Planta in Peru nascens, cujus folia contactu siccantur, Francisco Lopetz: quam tamen Acuan verum aliqui putant, Clusio monente.

Herba pudica, Lugd.

an Arbor circa Memphim, Theophr. 4. histor. 3. nascitur peculiaris quædam arbor circa Memphim, non folijs, vel ramis, vel tota forma peculiare quid sortita, sed eventu: facies enim ejus spinosa, folium filicibus (pennis Plinius) non absimile: sed cum ramulos quispiam cõtigerit, folia veluti arescentia & languescencia corrahi ajunt, deinde paulo post ad vitam redire. Idem fere Plinius l. 13. c. 10. Huic arbori affinis herba, quam l. 10. s. 2. sub Herba viva proposuimus.

II. Arbor aquam fundens.

Arbor perennes aquas è folijs exudâs, Benzoni in insul.

in Insul. Canar. descr. vel Ind. Occid. par. 6. ubi & figura habetur.

Arbor mediocris magnitudinis in Insula Ferro, cui similis in toto orbe non invenitur, Linsc. part. 3. Ind. Or. c. 5.

Arbor in Ferro Insula, quæ incolis Garoë: Hispanis Sancta: veteribus historicis Til vocatur, par. 8. Ind. Orient.

Vide & Cardanum 6. variet. rer. 22.

Ombriou sive Pluvialem Plinij & Solini, hanc Insulam suspicantur. Plin. l. 6. c. 32. in Insula Ombriou vocata, arbores similes Ferulæ, ex quibus aqua exprimitur: ex nigris amara, ex candidioribus potui jucunda. Verum Benzo & Linscottus, arbori folia Juglandis, quanquam paulò majora & perpetuò viridia, tribuunt, quæ fructum habet in cortice glandis instar pendentem, cum nucleo suavissimo & valde aromatici gustus, par. 8. Ind. Oriental.

In tota Insula nulla aqua reperitur, præter eam quæ ex illa arbore manat, quæ perpetua ac densa nebula, ubi solis æstus non flagrat, circumdat.

IX. Abores quibus ædiculæ superstruuntur. Ceibas sive Cerbas arbor maxima in Ind. Occident. quam homines quatuordecim simul complecti nequeunt, Oviedo, Cardano, Francisco de Bello foresto.

Cerbas arbor in Nicaragua, quam quindecim complecti non possunt. Tantæ crassitie, ut Indi ædiculas supra construant, Petrus Martyr: pingit Claudius Duretus: vide & part. 6. Ind. Occid. 61.

Ceyba arbor, Leri de Bras. c. 12.

Ceyuas arbor grandis in India, ex quibus Indias Canoas fingunt & excavant, 9. par. Ind. Occident. l. 4. c. 30.

Ligno est fungoso ut Suberis: fructu lana referto & semine bombacis.

Quomodo Indi in arboribus domicilia habeant, duabus figuris exprimitur, in parte 6. Americ. & istorum ædificiorum meminit etiam Petrus de Cieca part. 1. Chronicæ Peruanæ c. 12. & 27. & 29. quæ valde capacia esse scribit, ut plures etiam integras familias capere possint.

X. Arbor in summo cacumine saltem frondes minimas parturiens, ex cujus trunco integro, Canoas suas exstruunt, Linsc. p. 4. Ind. Or. fig. 21.

XI. Licondo, arbor tantæ magnitudinis, ut sex viri brachijs expansis vix possint circumdare, & tantæ magnitudinis, ut 200. viros cum ar-

mis & remis capere possint, ex cujus trunco excavato scaphas conficiunt in regno Congiano, part. 1. Ind. Orient. c. 4.

XII. Rattiak arbor, ex qua in Virginea lintres fabricant, 1. part. Ind. Orient.

XIII. & XIV. Yga, Yuvera, arbores in Brasilia quas integras decorticant, cortice illæso, ex quo scapham parant, quarum singulæ triginta armatos vehunt: nam cortex pollicaris crassitudinis, quatuor pedes latus, quadraginta longus: par. 3. Ind. Occid. l. 3. c. 25.

Sic ex arboris Yuire vocatæ cortice, tiliæ per simili, funes conficiunt: Leri de Bras. c. 14.

Lintres singuli, ex cortice arborum detracto constant, quos Ygat nominant, tantæ amplitudinis, ut singuli quinquaginta homines capiant: idem capit. 13.

XV. Gelsomoro arboris ab incolis dictæ cortex, in quibusdam Indiæ locis pecunia est: Pigafetta in desc. regni Congiani lib. 1. c. 4.

XVI. Pindo herbæ caules aut Palmarum ramos, ad januas ædium Brasiliiani adponunt, Leri de Bras. c. 13.

*Arbores anattifera.*

I. Arbor ex cujus ligni putredine vermes, & ex his Anates viventes & volantes generantur, Claud. Duretus arborem pingit.

Hector Boëtius in desc. Scotiæ in Insulis Hebridibus, Klaki avem nominant, in quibus vim procreandi potius, quàm arboribus inesse, &c. quæ citantur à Cardano l. 6. de Var. rerum, dubitatione prorsus digna dicens. Polydorus Virgilius pro fabula habet.

Olaus Magnus scribit, è lignis putridis fungos primum nasci, ex his aves maritimas, quæ piscibus vivant. Idem confirmat Cornelius Scribonius in epit. hist. de gentibus Septentrionis. Alexander ab Alexandro de diebus genialibus: Antonius Torquemada in suo Hexamero: Joh. Baptista Porta in phytognom. Abraham Ortelius in suo theatro. Sic Syl. Giraldo in hist. Hiberniæ, Bernacæ dicuntur, quæ anatibus palustribus similes, sed minores.

Bernacles, Ad. & Lob.

Britanniæ conchæ anattifera, Lob. belg.

Anatifera concha, Lon.

Ex furculis arborum conchæ anattifera, Lugd. Conchæ anattifera ex arbore dependentes & trunco adhærentes, Aldroand. de avibus, & lib. de testaceis.

Conchæ vulgo anatiferae, non sunt fructus terrestres, neque ex ijs anates oriuntur, sed Balani marinae species, Colum.

In navigat. tertia Hollandorum per Norvegiam in Chinam Ann. 1596. sive in par. 3. Ind. Or. hæc habentur: hoc loco Anserum rubentium ova magno numero collegimus: cujus generis anseres quodannis magna copia in Hollandia ad Wiringam capiuntur: qui quo loco sua ova excluderent, hæcenus nemini adhuc compertum fuit, cum multi eosdem in Scotiae arboribus nasci, frustra contenderint.

II. Arbor ex cujus fructibus in aquam delapsæ anates prodeunt, Claud. Dureto, qui ejus figuram proponit.

Arborem in Scotia apud Orcades Insulas reperiri audio, cujus fructus avem Anatam formam habens, producant, Æneas Sylvius in descript. Europæ.

Arbores in Scotia quarum fructus folijs involutus, si in aquam decidat, in avem transmutatur, quam avem arboream vocat, Seb. Munsterus in Cosmogr. Saxo Grammaticus etiam meminit.

Arborum quarundam fructus similes conopini, si in mare decidant, in aves transeunt, quibus etiam in Quadagesima uri licet, Joh. Borerus in sua relat. De his etiam Pierius Valerianus in suis Hieroglyphicis, & Andreas Thevetus, in sua Cosmographia.

Fructus ostraceis non dissimilis arboribus nascens, in tanta copia, ut folium vix cerni liceat: par. 8. Ind. Occid. descr. navig. 1. ipsius Drake.

In Guajana, Ostrea in arboribus, & non in terra crescunt, quod in India Occidentali & alijs lo-

cis frequentissimum est: quam arborem Thevetus in sua Gallia Antartica c. 26. describit, addita imagine peregrini cujusdam fructicis: describitur etiam à Plinio l. 13. c. 25. par. 8. Ind. Occid. in hist. Ralegh.

III. Arbor cujus folia si decidant super terram, in aves volantes si verò in aquam, in pisces mutantur, Claudio Dureto, qui figuram fugit.

*Cornu plantabile.*

Coronidis loco de Cornu plantabili quædam ex Hugonis Linchotani historia Indica, quæ par. 4. Ind. Or. habetur, qui cap. 17. hæc refert, in Goa Insula, ad hujus nominis civitatem, juxta murorum terminos, locus quidam discretus est, quo omnis generis pecudes mactare solent, in quo animalium cæforum cornua passim objecta jacent, non solum ceu nullius apud Indos usus, sed præcipuè hanc ob causam longius objiciuntur, quod Indis haud exigua contumelia sit, si ei cornu ostendatur, ædibusve objiciatur: ita ut cornu ostendenti, à magistratu pœna constituta sit. Hæc cornua, si illo loco aliquandiu jacuerint, radices in terram defigunt, medulla ejus in plurima quasi filamenta dissecta & protuberante, & hoc modo in solum se immitte: radix brassicæ similis: sicut plures meis manibus evulsi, duas trêsvè spiritummas elongatas, id quod nullo uspiam terrarum angulo similiter fieri compertum est. Hujus causam veram & immotam qui scrutaretur & assequeretur, nemo quod sciam, uspiam comparuit:

nam & terra, in omni illo confinio, valde saxosa & lapidosa est, &c.

SOLI DEO GLORIA.



CON-



# CONCLUSIO.



*Um ad huius Operis in quo DEI Opt. Max. admiran-*  
*dam sapientiam, clementiam ac bonitatem, in tot millibus PLANTARUM*  
*creandis, velut digito solum demonstrare volumus, finem pervenerimus, Tibi*  
*DEVS, qui solus immortalis es, tibi inquam, TRINXNI & UNI TRINO*  
*Hygie & Panacee Parenti, sit honor & gloria in secula, quod pro ineffabili*  
*tua misericordia, inexplicabili clementia, inexhausta bonitate (ut qui solus*

*ipsa Bonitas & Sapientia es) mihi misero peccatori tua gratia adfuisse, tuoq; auxilio, ut ea qua*  
*nunc supra quadraginta annos, in Plantarum historia adeo admiranda, suspicienda, vaga,*  
*Oceanog, imperscrutabili simili, in qua potentiam tuam, sapientiam & bonitatem declarasti,*  
*partim varijs & laboriosis peregrinationibus, partim diligenti Botanographorum lectione,*  
*partim optimorum virorum communicatione, observavi, & observata Veterum & Recentio-*  
*rum lectione comprobari cognovi, in hunc Indicem conferre potuerim. Tibi aeternae DEVS,*  
*quod me vita & beneficijs, toto vita mea tempore adeo clementer affeceris, mihiq; tua cura*  
*spiritum servas, sit laus in secula. Insuper devoto pectore & supplex rogo, ut porro & men-*  
*tem & intellectum meum illumines, manum meam regas, ut ea qua solum nomine in hoc*  
*opere attigi, & quorum historiam in THEATRO BOTANICO, (cujus Operis hic solum*  
*Index est) fideliter tradere & absolvere possim, quod ea ad altissimi tui Nominis gloriam, ad*  
*humani generis utilitatem vergant, cum sine Tuo auxilio a nobis nihil, at Tua ope omnia*  
*præstari possint. Largire queso tuum S. Spiritum, ut miracula tua in Arborum & Her-*  
*barum creatione, explicare queam. Tuo enim jussu, ut cum Sancto tuo Propheta loquar,*  
*terra, tertio Creationis die STRIPES creavit, Herbas frugiferas, & Arbores fructiferas,*  
*qua suo quæque in genere fructum ederent, & in quibus suum semen inesset in terris: tra-*  
*didisti sexta die homini omnes Herbas, qua sunt in omni terra solo frugiferae, omnesq;*  
*arboreo factu praeclatas Arbores semen parientes, quibus ad alimoniam uteretur. Sic bestijs*  
*terrestribus omnibus, aërisq; volucribus, & quæcunque vitali spiritu animata in terris mo-*  
*ventur, his omnem Herbarum viriditatem ad pastum dedisti. Quare o S. TRINITAS*  
*meo instituto clementer adesse digneris, quo opus, a multis annis inchoatum, ad felicem*  
*finem perducere queam: siquidem*

*Nullius sit felix conatus, & utilis unquam,*  
*Consilium si non detq; juvetq; Deus.*

F I N I S.

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΝΕΡ.

# A P P E N D I X.

## ALIQUOT PLANTARUM DESCRIPTIONES ADPONERE L U B E T:

*Ad pag. 75. post Allium Pyrenaicum ponatur.*

**ALLIUM** five Moly Virginianum: folijs est gramineis angustis, palmaribus, nervosis acuminatis, per margines non nihil asperis, & cauliculos superantibus: cauliculis semipalmari-  
bus, umbella ceu in Moly luteo insidet, quam flores plures purpureo cœrulei oblongis pediculis donati, ijq; trifolij insident: at umbellæ folia bina oblonga, ut in Allij five Moly montani speciebus, sed latiora, subjiciuntur. Hoc Phalangij Virginiani nomine Lutetia ex horto Jo. Robini, D. Georgius Spörlinus Basileensis, Medicinæ candidatus, in hoc studio versatissimus, unâ cum alijs multis, Anno 1622. misit.

*Ad pag. 138. lin. 21.*

**BOTRYS** ambrosioides Mexiocana: radice est oblonga, fusca, capillaribus fibris cincta, intus candida: caule pedali, etiam altiore, sed cubitum non superante, eoq; subrubente quandoque, rotundo, striato, pilis levissimis & rarissimis aspersis: folijs pallide virentibus, Atriplicis sylvestris vulgaris forma similibus, oblongis, sinuatis, pediculis oblongis donatis & absque ordine caulem ambientibus: ad singulorum exorrum, ramuli unciales, ut in Atriplice emergunt, pluribus velut capitulis alternatim dispositis, onusti, quibus singulis foliolum exiguum subjicitur, quibusq; apertis flosculi exigui, luteoli, ut in Botry conspiciuntur, hisq; semen minutum copiosumq; succedit. Planta annua est, ex semine deciduo sese propagans. Et licet tota planta primo intuitu Atriplicem referat, ita ut Atriplex Mexiocana dici possit: attamen propter odorem gravem quidem, sed non ingrati, & saporem aromaticum ad Cuminum accedentem, & propter florum & seminum copiam, ad Botrym referre maluimus: hocq; primum nomine Parote Mexiocani in horto Cl. Doctoris Plateri Anno 1619. crevit.

*Ad pag. 141. lin. 34.*

**MILLEFOLIUM** aquaticum cornutum minus: hoc priore longè minus, quod pro radice fibellas capillares tenuissimas habet: ex qua cauliculi palmares, pilo tenuiores quos foliola plura, etiam quovis pilo renuiores & brevissima orbiculatim ambiunt, quæ simul juncta lentis magnitudinem non æquant: ex quorum medio pedicelli tenuissimi prodeunt: flores necdum observavimus. Hoc in fundo paludum Michelfeldensium D. Spörlinus, Anno 1621. reperit.

*Ad pag. 184. inter Aconitum & Doronicum.*

**DORONICUM** Americanum laciniato folio: folia habet atrovirentia non nihil hirsuta & aspera, in quinas lacinias divisa, quarum quælibet uncias quinque vel sex longa, duos lata, in acumem delinit & per margines profundius incisa est: quarum tamen media in summitate trifida: caulis est rotundus, striatus, lævis, circa cujus summitatem folia ex rotunditate acuminata, non quidem laciniata, sed per margines profundius incisa: caulis summo flos magnus luteus Doronici forma, folijs luteis oblongis discum ambientibus, quare ad Doronicum retulimus: licet Aconiti Americani nomine Lutetia D. Spörlinus miserit, (ex horto Vespas. Robini Botanici Lutetiani seduli, à quo multa nos expectamus) & ad viri altitudinē assurgere scripsit.

*Ad pag. 242. lin. 28.*

**LYSIMACHIA** lutea corniculata: planta est ramosa ad viri altitudinem assurgens, forma ad Lysimachiam latifoliam purpureâ siliquosam accedens: hæc ex radice oblonga alba, digitali cœcitate superante, paucis fibris capillata, caulis exsurgit initio rotundus, at supra medium, ob plurimos ramos angulosus, subcinereus, lævis, statim à radice in breviores, mox majores ramos, hicque in alios latè expansos, brachiatus, qui rotundi, paucissimis pilis donati,

nati, hinc inde maculis parvis rubentibus variegati, ex quibus tanquam ex poris pilus prodit. Folia statim ad radicem plura, oblonga, palmum superantia, latitudinè unciam vix excedentia, quæ crassa, pallidè virentia, lævia, in acutum delinientia: quorum inferiora quandoque laciniata, reliqua verò obscurè sinuata, per quorum medium costa alba, ut in *Lyfimachia Chamænerion* dicta, excurrit: ex alarum sinibus pediculus articulatus & rotundus prodit, cujus pars supra articulum triuncialis fistulosa, cui flos magnus, flavus, quadrifolius, extra folia effertur: qui cum primo florere incipit, quadrangulus est, quo aperto, verum Sole tantum lucente, in ejus medio stilus conspicitur, qui viridis ad articulum usque descendit, & apicibus quatuor sulphurei coloris. crucis in modum dispositis, donatus est, quem stamina octo circumstant, quorum quatuor singulis folijs adposita, alia quatuor ipsis interjecta sunt: hisque singulis capitulum oblongum albicans insidet: ipsi verò flori, calycis in modum, folia quatuor oblonga, angusta, pallida subjiciuntur. Flos odoratus est, nonnihil ad Keiri, vel potius *Liasphodeli* lutei odorem accedens, ultra diem non persistens; cum is qui sub vesperam aperitur, ad sequentis diei vesperam flaccescat, unde *Ephemerum* dici meretur. Flore, cum pedicello ad articulum delapso, altera pediculi pars sesquiuncialis, sensim ad uncias binas, etiam ternas oblongatur, & in siliquam sive corniculum abit, & propter semen copiosum, nigrum, parvumque quod continet intumescit: quod ubi maturuit, ipsa cornicula quæ utrinque ad caulis latera numerosa sunt, in quatuor partes dividuntur. Hujus semen, *Lyfimachia* Virginianæ nomine anno 1619. Patavio accepimus, quod Vere satum, tota æstate & hyeme sine caule remansit: at sequenti anno, circa Veris finem calescere, & Junio florere cœpit: nunc verò ex deciduo semine (annua enim planta est) autumnò delabente, singulis annis in hortulo meo copiosè & usque in autumnì finem floret. Matthioli *Ephemerum* esse suspicatus sum, sed cum nullas, nisi *Dioscoridis*, notas adposuerit, nil pronunciarè licet.

*Ad pag. 258.*

**LITHOSPERMUM** angustifolium umbellatum: cauliculo est palmo minore, rotundo, quem folia strictissima, oblonga, nonnunquam

utrinque bina, ambiunt, in cujus summitate flores quasi in umbella dispositi, cærulei, parvi, oblongi, cavi, per ora in quinque crenas divisi. Hoc ex horto Patavino, ante plures annos D. Heyl, nunc Dantisci medicus, attulit.

*Ad pag. 268.*

**VIRGA aurea Mexicana**: ex una radice caules plures, nonnihil tamen reclinati, asurgunt: circa quos folia palmaria, sesquiunciam lata, crassiuscula, splendentia, in summitate tamen multo breviora: ex foliorum alis ramuli prodeunt, quibus flores saturatè lutei, sursum spectantes & unam tantum caulis partem occupantes, insident. Lutetiæ in horto Robini D. Spörlinus collegit.

*Ad pag. 299.*

**VITIS Virginiana**: folijs est *Vitalbæ* nonnihil similibus, sed multo latioribus, rotundioribus & tenuioribus, viticulis suis alte scandens, & suis claviculis arbores comprehendens, cujus fructus corymbis hederaceis similes esse dicunt. Lutetiæ in horto Robini D. Spörlinus legit.

**VITIS Canadensis** nomine, ex eodem horto misit alterius fruticosæ plantæ folia, tria in uno pediculo, instar foliorum *Trifolij* disposita, pediculo longo glabro, folijs latis, crassis: quod si pediculis aculei additi forent, arboris *Coral*, quam Clusius in *Append. historiæ suæ rar. plantarum* descripsit, pronunciarem.

*Ad pag. 414. post lin. 37.*

**II. RHUS Virginianum**: arbuscula est *Rhoë* vulgari major, folijs multo majoribus, acutioribus, mollioribus & viridioribus, quorum quælibet pinna, uncias quinque & sex longa sunt, & sequentis quod ex *Tupinambault* habemus, longiora, latiora, profundius crenata & viridiora: folia verò superiora *Jasmini albi* folijs similia sunt: rami ex stipite pullulantes, tenella cervorum cornua, ex cranio modo erumpentia, referunt: similiter enim hirsuti sunt, eundem colorem, eandem figuram habent: spicam, *Rhoë* vulgari multo majorem habet. Ex eodem loco habemus.

*Ad pag. 444. b.*

**PRUNO Sylvestri** affinis *Canadensis*: frutex est sesquicubitalis, caule lignoso, rotundo, atrobubente cortice vestito, in ramulos brachiato: folia habet *Rutæ Hypericoidi* similia: flores, *Pruni sylvestris* floribus similes, sed multo

minores, copiosos, candidos, pediculis oblongis uncialibus & capilli modo tenuibus, caliculis virentibus sustentari, insidentes; in quorum medio, filamenta plura exigua & tenuissima: flos nullo fructu succedente, Lutetiæ in horto Robini decidit: qui Hypericum frutescens nominat, & è Canada allatum asserit.

*Ad pag. 432.*

**RICINUS** Americanus folio Staphisagriæ: hujus ramum habemus cubitalem ferè, lignosum, crassum, rufescentem & circa foliorum exortum hirsutum, quem folia pallide virentia, pediculis oblongis & hirsutie asperis donata, ambiunt: folia inferiora, ad foliorum Ficus formam nonnihil accedunt, & in lacinias quinque divisa sunt: superiora verò, quæ Staphidis agriæ folijs similiora, in ternas lacinias secta sunt: omnia verò per circumferentiam crenis acutis exasperantur & nonnihil pubescunt, ita

ut tactu mollia sint: caulis summitas in ramulos aliquot villosos dividitur, quibus flores quinquefolij, ex intensa purpura rubentes (ut figura pictor expressit) insident. Plura non licet, cum solum ramum siccum, cum figura coloribus illustrata, Ricini Americi folijs Ficus nomine anno 1621. Verona ab insigni Pharmacopœo & Botanico, D. Johanne Pona, una cum alijs elegantissimis acceperimus: & quotidie, ex Illustr. & Magnifici Dn. Nicolai Contareni Senatoris Veneti, instructissimo viridario, multa pulchra & exotica, ipsius opera, accipimus: pluraque quotidie ab ejusdem filio Francisco Pona, Philosopho & Medico apud Veronenses clarissimo expectamus, & non solum plantas & semina; verum etiam Naturæ *παυσίαν* Parentis sui, duplici Indice ab ipso complexum, veluti nuper ad nos perscripsit.

## A P P E N D I C I S F I N I S.



# L A V S COGNITIONIS SIMPLICIUM.

## ORIBASIIUS XV. COLLECTAN. CAP. I.

*Simplicium medicamentorum & facultatum quæ in eis insunt, cognitio ita necessaria est, ut sine ea nemo ritè medicari queat: ita enim magna nobis suppetit copia, & nos in quacunq; temporis opportunitate medicamenta facile comperimus. Valet enim eadem notitia ad composita remedia conficienda: præterea verò ad eorum vires Universales inveniendas, pertinet, & quod artis est apud omnes patet facit.*

## AETIUS TETRAB. II. SECT. IV. CAP. LI.

*Omniium simplicium pharmacorum vires nosse oportet eum qui aliquod compositum est facturus: qui enim eas noverit, etiam eis, quæ ab alijs composita sunt, rectè utetur; maxime cum indefinitè descripta fuerint.*

## FERNELIUS IN SUA MEDENDI METHODO.

*Simplicium cognitio, collectio, delectus, expurgatio, conservatio, preparatio, correctio & miscendi industria seorsim ad Pharmacopœos referuntur, ac pertinent: quorum tamen & Medicum imprimis guarum, peritumq; esse oportet, siquidem apud artis ministros auctoritatem, dignitatemq; suam retinere ac tueri velit, quos docere hac ipsa debet.*

M O N Ω  
T Ω T P I Σ M E Γ I Σ T Ω  
Θ E Ω  
T I M H K A I Δ O E A  
E I Σ A I Ω N A.

# I N D E X.

*Notandum ubi (a) habetur columnam primam, ubi (b) columnam secundam: ubi (a.b) utraq.; ubi neq. (a) nec (b) semper primam pagina columnam denotare.*



|                                |          |                                |              |                               |        |                                  |                            |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------|
| Bariga                         | 509 b    | Acetabulum Fuch.               | 287          | nij                           | 307 b  | Alexander Turn.                  | 154 b                      |
| Abavo                          | 434      | Acetosa ejusq; species         | 114          | Æthiopis ejusq; species       | 241    | Alfalfat Avic.                   | 330                        |
| Abelica Ponæ                   | 393 b    | Acetoiella Lon.                | 114 b        | Agæ Cretensium                | 381 b  | Alga Trag. 141 b. secunda        | 193 b                      |
| Abella                         | 507 b    | Achanaca Thev.                 | 111 b        | Agallochum 393. sylv.         | 498 b. | Alga angustifolia                | 364 b                      |
| Abelmoluch                     | 432 b    | Achauvan Alpin.                | 131 b. 134 b | quitbuldam                    | 392    | bombicina 363 b. intibacea Lugd. | 364                        |
| Abelmusch Ponæ                 | 317 b    | Achillea Match. 132. Dod.      | 140          | Agaricus arboreus 375. saxa.  | 375 b  | latifolia 364. marina Lob.       | ibid. b. minima Cæf. ibid. |
| Abdelvi Alpii                  | 311 b    | montana Lob.                   | 134          | tilis                         | 439 b  | tinctoria.                       | 369                        |
| Aberas                         | 384 b    | Achilleos Cæf. alp.            | 278 b        | Agaluga                       | 380 b  | Algodon                          | 430                        |
| Abhel                          | 488 b    | Achilades                      | 439 b        | Agavanus Ponæ                 | 380 b  | Alhagi Kauvvolf.                 | 394 b                      |
| Abies 504. Dodon.              | 493. ma- | Acinaria marina 365. palu-     | 471 b        | Agerarum ejusq; species 221.  | 14     | manna                            | 497                        |
| nina 355. macula Theoph.       | 493.     | lris                           | 471 b        | Dod. gal. 264. ferulace.      | 479    | Alypias Actij Ang.               | 462 b                      |
| Abrotanoides fæxa Cl.          | 365 b    | Acinos ejusq; species          | 224          | um                            | 3141   | Alypum Match. 463 mon-           | ibid.                      |
| Abrotanū ejusq; species 136.   |          | Acotium ejusq; species 182.    | 182          | Agia ali Alpini               | 512 b  | Alisma Cord. 84. Matth. 185      |                            |
| fæmina ejusq; species 136 b    |          | batrachoides 182. candi-       |              | Agitationum Gazæ              | 3141   | Lugd. 185 Cordi 190 Trag.        |                            |
| fæmina, Fuch.                  | 138 b    | dum Lugd. 182. lycotto-        |              | Aglaophotis Aliani 323. Gu-   | 113 b  | 216 Lob. 19 b. Guil. 252 b       |                            |
| Abrus Alpii                    | 343      | num 182 b. pardalanches        |              | land.                         | 512 b  | 267 Diosc. Colum. 242            |                            |
| Abfynthum ejusq; species 138   |          | ejusq; species 184. parda-     |              | Agleofotis Cortusi            | 354 b  | Cæf. 244 b. alterum Plin-        |                            |
| arborefcens 136. dulce 159.    |          | lianthes Fuch. 167. ræce-      |              | Agmir Fragof.                 | 321 b  | nii 241. 243. pratorum           |                            |
| marinum 137. montanum          |          | mosum 183 b. falutiferum       |              | Agnus castus ejusque species  | 512 b  | Col.                             | 241                        |
| ejusq; species 139 b           |          | Tab. 167. Gefn. 184            |              | 475. Scythica                 | 425 b  | Alisma bettivodes 186 b. 187     |                            |
| Abfynth. Santonicum ejusq;     |          | Aconitum Americanū 520 b       |              | Agria Angul.                  | 321 b  | folio glabro 188 b. sylva-       |                            |
| species 139 b                  |          | Aconiti lycoctoni genus        |              | Agrimonia                     | 321 b  | rum Col.                         | 241 b                      |
| Abfynth. Seriphium ejusque     |          | Lugd.                          | 322          | Agrimonoides Col.             | 384 b  | Alyfion Antonij Coi Col. 232.    |                            |
| species ibid. Seriphium        |          | Acorus ejusq; species          | 34           | Agriocinara Ponæ              | 452    | Marth. 107. Dod. 201 b. Fra-     |                            |
| Trag.                          | 105 b    | Acorus Theoph. Ang.            | 274          | Agriomelea                    | 153    | caft. 238. Col. 250. Diosc.      |                            |
| Abfus Alpini                   | 332 b    | Actæa Plin.                    | 183 b        | Agriopastinaca Belli          | 21 b   | 201 b. montanum Colum.           |                            |
| Abutilon Avicen. 316 b. Po-    |          | Acua porus 24 b. Acuan ve-     |              | Agriofari Belli               | 434 b  | 249. Galeni Cæf. alp. 230.       |                            |
| næ.                            | 317 b    | rum                            | 512 b        | Ahovay Theveti                | 91     | Galeni Clufij 232. Germa-        |                            |
| Acacalis Cam. 402 b. Diosc.    |          | Aculeata Lonic.                | 178 b        | Aypi                          | 495 b  | nium echinoides 257 b            |                            |
| Amat.                          | 456 b    | Aculeofa Gazæ                  | 385 b        | Ayi Hyacinthus                | 91 b   | Alyflos Gefn.                    | 334                        |
| Acacia ejusq; species 392. al- |          | Acu3 mofchata Cæf.             | 319          | Ayi Palma                     | 507    | Alyfion arvenfe album, Ta-       |                            |
| tera Ang.                      | 394      | Acuta Ipina Cæf.               | 454 b        | Atavve                        | 495 b  | ber. 232 b. majus Tab. 233       |                            |
| Acacia Germanica 496 b. In-    |          | Acutella Cord.                 | 389          | Aves Claf.                    | 250    | b. Plinij 333 b. Cæf. 335 b      |                            |
| dica 403 b. maior Caftor.      |          | Adiantum ejusq; species 355.   |              | Atuga Matthiol. 249. lutea    | 250    | trigonum Lugd.                   | 465 b                      |
| 402 b. vera Marth. ibid.       |          | album Cæf. ib. Lob. 358 b.     |              | Cluf.                         | 250    | Alkikengi                        | 165                        |
| Acacia succus                  | 496 b    | Tab. 356 b. aureum Tab.        |              | Azoon arborefcens 282 b.      |        | Alagacy                          | 256                        |
| Acaciu                         | 512      | 356. furcatum Thal.            | 318          | dactyphyllum 283 b. tele-     |        | Alleluia Lon.                    | 330 b                      |
| Acantha Hipp.                  | 392      | Adiantum nigrum, Cæf. 356 b    |              | phium                         | 109    | Almaria                          | 110                        |
| Acanthalence Diosc.            | 381 b    | Lob. 355 b. Tab.               | 315          | Aizoo perfimilis Lob.         | 382    | Allhoperrum                      | 74                         |
| Acanthifolia peregrina Cæfal.  |          | Adonis ejusq; species 178      |              | Alabaftrites Lob.             | 322    | Allium ejusq; species 73. an-    |                            |
| 386 b                          |          | Adorem Lugd. 21. Dod. 22       |              | Alaternus Lugd.               | 276 b  | gurnum 74 b. bicornæ 74          |                            |
| Acanthioides Col.              | 379      | Adrachne Cretenf.              | 460          | Albaba Acoftæ                 | 426 b  | b. caninum exiguum Tra-          |                            |
| Acanthium ejusq; species 382.  |          | Adrachla Cretenf.              | 460          | Album olus Dodon.             | 165 b  | gi 43. can. 1. Trag. 74 b.       |                            |
| montanum Lugd. 382 b           |          | Ægilops Plinij, Trag. 21. Gef. |              | Alcali Gef.                   | 289    | Byzantie                         | ibid.                      |
| Acanthus ejusq; species 383.   |          | 9 b. Marth. Lob.               | 10           | Alcanna Arabum                | 476    | Allium montanum ejusque          |                            |
| Germanica Trag. 378 b.         |          | Ægilops arbor                  | 420 b        | Alcea ejusq; species 316. Sy- |        | species 74 b. mofchat. 75 b.     |                            |
| fyl. Lugd. 376. 377. vulga-    |          | Ægyptiorum Cratevæ             | 389          | riaca 317. Veneta ibid. ve-   |        | favacile. ibid. fylveftre 74     |                            |
| ris                            | 157      | Ægoletheon Plinij              | 180 b        | ficaria Dod. 317. villofa ib. |        | b. fphærico capite 74. ul-       |                            |
| Acanus Lugd.                   | 380      | Ægeria                         | 88 b         | Alchimelch Alpini             | 331 b  | picum Plin. 74. urfinum ib.      |                            |
| Acarna ejusq; species          | 379      | Ægopodium Tab.                 | 156          | Alchymilla 319. montana 152   |        | Allium five Moly Virginia-       |                            |
| Accipitrina Cæf.               | 105 b    | Æquum Gazæ                     | 455          | Aleyonium ejusq; species 368  |        | num                              |                            |
| Acer ejusq; species            | 430      | Æra Græcorum                   | 9            | rubrum                        | 367 b  |                                  |                            |
|                                |          | Æreomeli                       | 496 b        | Alektorolophos Dalechampij    | 238    |                                  |                            |
|                                |          | Æfchinomene 359 b. Plin-       |              | 110. Ang. 163 b. Plinij       |        |                                  |                            |

|                                 |         |                               |                                |       |                                |       |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| num                             | 520     | Amomum Cord. 138. 484 b.      | Anthedon Theoph.               | 453 b | Arachida Cæf.                  | 88 b  |
| Alnus ejufq; species 428. bac-  |         | Lob. 166. Germanicum 154      | Anthemis 135. eranthemos       |       | Arachyda Belli 345. Col. 344   |       |
| cifera                          | ibid. b | Amomum Ang. 412 b. offi-      | Lugd. 142 b. Dalech. 178.      |       | Arachidna 90 b. Theoph.        |       |
| Aloë ejufq; species 286. suc-   |         | cin. Lob. 412. Clufij 413 b.  | Theoph.                        | 454 b | Cluf.                          | 167   |
| cus                             | 495     | Ponæ 413. quorundam           | Anthemon 204 b. phyllodes      |       | Aracle potus                   | 24 b  |
| Alepecuros graminea 328 b.      |         | Clufij                        | Theoph.                        | ibid. | Arachus ejufque species 345.   |       |
| Theoph. Ang. 4 b. mon-          |         | Amomum falſum Gef. 455 b      | Anthera                        | 310 b | Fuch. 338 b. latifolius Do-    |       |
| rana Lugd.                      | 235 b   | Amores                        | Anthyllis ejufq; species 282.  |       | don.                           | 351   |
| Alſpenfrant Lon.                | 236     | Ampiloprafum 72 b. 74. pro-   | prima Diof. Cæf. 288 b. al-    |       | Aracus Cæf. 345 b. Dod. 344.   |       |
| Alpina Gazæ                     | 429 b   | liferum                       | tera Cluf. 249 b. altera Cef.  |       | Marth. 343. Tab.               | 345   |
| Alſineanthemos Thal.            | 191 b   | Amuſa                         | 267 b. altera Lugd. 289.       |       | Aralda Gef.                    | 243 b |
| Alſine ejufq; species 250. al-  |         | Anabaſis Dodon.               | montana Lugd. 213 b. falſa     |       | Arantia marina                 | 369 b |
| pina Schwenck. 191 b. e-        |         | Anacampſeros Gefner.          | Cam.                           | 289   | Aratoucon fructus              | 406 b |
| juſq; species                   | 251     | Anacardium                    | Anthyllis altera Dod. 347. Lo- |       | Arbor aquam fundens            | 512 b |
| Alſine Cæf. 122 b. corniculata  |         | Anacod Clufij                 | bel. 486 b. claviculata Lug.   |       | Arbores admirandæ 512. ædi-    |       |
| 204 b. hederulæ 231 b.          |         | Anacendromalache Gal. 315     | 351. léguminofa Lob. 332 b     |       | culas ſuſtinentes 513. ana-    |       |
| lutea 252. minima Taber.        |         | Anagallis ejufq; species 252  | Anthylloides Thal. 289. mi-    |       | tiferæ 513 b. ſiliquas feren-  |       |
| 108 b. nodofa                   | 251     | Anagyris ejufq; species 391   | nor                            | 282 b | tes 404. venenatæ              | 512   |
| Alſine bifruta ejufque species  |         | Ananas Lugd.                  | Anthora 184. Avicennæ          | 36    | Arbor Brakia 393. citrifolio   |       |
| 251 b. myofotis Lob.            | 254     | Anapallus                     | Anthriscus Lugd.               | 152 b | 465 b. contrarium facult.      |       |
| Alſine paluſtris ejufq; species |         | Anblatum Dodon.               | Antiphates Lob. 366. Ponæ      |       | 457 b. contra fluxum           | 408   |
| 251. petræa Tab. 285. pur-      |         | Anchula ejufque species 255.  | 366 b.                         |       | b. Cochinnile                  | 458 b |
| purea Lugd. 205 b. trida-       |         | Dod. 256. Cord. 257. dege-    | Antirrhinum ejufque species    |       | Arboris cortex ad rheumatiſ-   |       |
| ctylites alpina 284 b. ver-     |         | ner 258. ſylv. Thal.          | 211. Diof. Cæf. 250. Tra-      |       | mos                            | 427 b |
| na                              | 210 h   | Andirian Rhafis               | gi                             | 100   | Arbor paradylæa 488 b. pe-     |       |
| Alſines facie Colum.            | 122 b   | Andrachnes Theoph.            | Antonii herba Gef.             | 245 b | regni. ex Guinea Cluf.         | 461   |
| Altercum                        | 169 a   | Androlace ejufq; species 367  | Antophylli                     | 411 b | b. Laurocerafi folio           | ibid. |
| Althæa ejufq; species           | 315     | Androlace Ang. 219 b. altera  | Aparaepo                       | 184 b | Arbor piperis 455 b. pudica    |       |
| Altiht Avicen. herba 156. ſuc-  |         | Marth. 251. Bellonij          | Apargia Dalech.                | 127 b | 512 b. rupturas curans 458 b   |       |
| cus                             | 499 b   | Androſemum Lon. 279. ejuf-    | Aparine ejufque species 334.   |       | ſancta 416 b. ſine folijs 411  |       |
| Alubias de Indias               | 340     | que species                   | major Plin.                    | 257 b | Arbor tinctoria 508. trifitis  |       |
| Allum Gallicum Scribon.         | 259     | Andryala Lugd.                | Aparine 334. lævis Thal.       | 335 b | 469. vitæ 488. vitis 401 b     |       |
| Aman                            | 238     | Anemone ejufq; species 173.   | Apate Dalech.                  | 130 b | Arbor de rayz 458. eryſipelas  |       |
| Amaracus ejufq; species 224.    |         | agreſtis Trag. 178 b. alpina  | Aphaca ejufque species 344.    |       | curans 359 b. farinifera 508.  |       |
| Galen                           | 133     | 177 b. corniculata 172 b.     | Lob.                           | 345 b | folijs ambulantis 512 b.       |       |
| Amara dulcis                    | 167     | latifolia 173. limonia Gef.   | Aphace Theophr. Lob. 126.      |       | ſinium regundorum 419 b.       |       |
| Amaranthus ejufque species      |         | 49. lutea 177 b. 178. minor   | Diof. Dod. 345. Plin. 126 b    |       | ſectida                        | 428 b |
| 120. luteus                     | 264     | Lug. 172. nemorola 177. 178   | Apharca Theoph.                | 476 b | Arbor Goa 458. Indica Stra-    |       |
| Amarella Cæf.                   | 215     | Anemone flore pleno ejufq;    | Aphyllantes prima Lugd. 92     |       | boni 458. Judæ Bell. 402.      |       |
| Ambarc                          | 417 b   | species 176. ſylv. ejufque    | b. Lob. 209 b. Anguil. 262.    |       | Magellanica 461 b. Ne-         |       |
| Amela                           | 405     | species                       | Dod.                           | 273   | pal                            | 458   |
| Ambo & Amba                     | 440 b   | Anemone tenuifolia ejufque    | Aphrocorodon Gef.              | 74    | Arbutus ejufq; species 460     |       |
| Ambra dulcis Cluf.              | 224     | species 174. Cordi 178 b.     | Apiaſtrum Cord. 180. Lob.      |       | Archangelica Cæf. 94. Tab.     |       |
| Ambroſia ejufq; species 138     |         | Matthioli                     | 229                            |       | 155 b. Cluf. 156 b. Lob. 231   |       |
| Ambroſia Cord. 132. Lon. 136.   |         | Anethum 147. Col. 153 b. ſyl. | Apios Fuch. 344. Turn. 162.    |       | Arctium Cord.                  | 198   |
| altera Marth. ibid. Taber.      |         | Lacu.                         | ejus species                   | 292   | Arcepodium Tab.                | 100   |
| 137 b. montana Lugd. 191.       |         | Angarathi                     | Apium ejufq; species 153. ci-  |       | Arctium                        | 198   |
| b. Nicandri Ang.                | 76      | Angelica ejufq; species 155   | cutarium 161. montanum         |       | Arctolcorodon Gef.             | 74    |
| Ambulon                         | 459 b   | Angelina arbor                | Gef. 150 b. ſylvaticum Thal.   |       | Arcturus Pon.                  | 240 b |
| Amedanus                        | 428     | Angiers floſ                  | 150 b. ſylv. Dalech.           | 152 b | Arctifrigi Avicen.             | 480 b |
| Amelanchier I. ob.              | 452 b   | Anguria ejufq; species 312    | Apochyma                       | 504   | Area, Lincot.                  | 286   |
| Amellus Lob. 267. montanus      |         | Anil herba                    | Apocynum ejufq; species 302    |       | Areca                          | 510   |
| Col. 265 b. Virgilij Thal.      |         | 113. 342 b. 352               | Amati 351. latifol. Cluf. 294  |       | Arepas panis                   | 25 b  |
| 276 b. paluſtris Col.           | 267     | Anime 498 b. Occident. 502    | b. Dioſcor. 303. Syriacum      |       | Argemone ejufq; species 172.   |       |
| Amygdalus ejufq; species 441    |         | Aniſum ejufq; species 159     | Cluf.                          | 116   | an Diof. 133. Trag. 171 b.     |       |
| Amygdaloperſicus                | 440 b   | Aniſomarathrum Col. 152 b     | Apollinaris                    | 169   | Tab.                           | 178   |
| Aminea                          | 498 b   | Annona                        | Aque ligna in lapides verten-  |       | Argemone altera Fuch. 321 b    |       |
| Amirbaris Avicen.               | 454     | Anon Oviedi                   | tes                            | 421 b | Argemonia 132. Plinij 133.     |       |
| Ammi ejufq; species 159. par-   |         | Anonis ejufq; species 388     | Aquiſolia vulgo                | 425 b | 321 a, b                       |       |
| vum 154 b. quorundam            |         | Anonymos Garzia 359. Fra-     | Aquiſolium Plinij              | ibid. | Argentaria petræa Gef.         | 326   |
| Lugd.                           | 386 b   | goſo 408 b. Clufij 213 b.     | Aquilegia ejufq; species 144.  |       | Argentilla Thal.               | 164 b |
| Ammiodes 159. Ammiofeli-        |         | altera Cluf. 466 b. flore     | minor Lugd.                    | 178 h | Argentina Lob. 321. Tab. 248 b |       |
| num                             | ibid.   | coluteæ Cluf.                 | Aquilla brava                  | 394 b | Arria Theoph.                  | 452   |
| Ammoniacum                      | 494     | Anonyma radice dentata Co-    | Arabis Dod. 106 b. Matth. 109  |       | Ariena pomum                   | 507 b |
| Amomis Clufij 413 b. Diof.      |         | lum.                          | Arabutan                       | 393   | Arifarum Marth. 195. ejufq;    |       |
| Cæſalp.                         | 484 b   | Anferina Trag.                | Aracinnappil                   | 437   | ſpecies                        | 196   |
|                                 |         | Anteuphorbium.                |                                |       | Ariſto-                        |       |



|                                 |          |                                |       |                                    |           |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-----------|
| Aristolochia ejusq; spec. 307.  | 251      | Banani                         | 508   | Bette                              | 410       |
| rotunda vulg. Trag. 143 b.      |          | Bangué                         | 320   | Betula                             | 427       |
| rot. vulg. similis Trag. 178 b. | 349 b    | Baobab Alpini                  | 434   | Berulus                            | ibid. b   |
| Armeria ejusq; species 208 b.   | 351.     | Baptifecula                    | 273   | Bexugo                             | 300       |
| sylv. 210                       |          | Baracocca                      | 442   | Bezoardica radix                   | 14        |
| Armoracia Tab. 95 b. Brunf.     | 349      | Barba capre ejusq; species 163 |       | Bibinella, Cæf.                    | 191       |
| 96 b. Plinij Lac.               | 186      | capri Cæf. 183 b. hirci 274.   |       | Bidenes, Cæf.                      | 321       |
| Armoraria Lob.                  | 205 b    | sylvana Cæf.                   | 194   | Bifolium 87. Lonie.                | 304 b     |
| Arnabum                         | 35       | Barba caprina minor Gef. 336   |       | Bifa radix                         | 259 b     |
| Aromata                         | 407      | Barba Jovis 390. Cæf.          | 397   | Bifermas Cam.                      | 238       |
| Arraguero                       | 509. 510 | Barbarea 98 b. minor 101 b.    |       | Biflingua                          | 305       |
| Artemisia ejusq; species 137.   |          | muralis                        | ibid. | Bifmalva                           | 315       |
| marina 139. monoclonos          |          | Bardana                        | 198   | Bifnaga                            | 151       |
| 132. polyclonos 131. ramo-      |          | Baryococcalon                  | 168   | Bistoria ejusq; species            | 192       |
| 133. tenuifolia Fuch. 135.      |          | Basilicum ejusq; species 225.  |       | Bixa Oviedi                        | 419 b     |
| fecunda Cl. 136. Turcica 138    |          | sylv. 204. aquaticum           | 129 b | Blattaria ejusq; species           | 240       |
| Arthanita                       | 308      | Batan                          | 434   | Blatterlos Holand.                 | 484 b     |
| Arthetica Pandect.              | 260      | Baratas                        | 91    | Blitum ejusq; species 118. 121.    |           |
| Arthetica Thal.                 | 333      | Barthlechia                    | 167 b | dicum 120. Peruanum                | 121       |
| Arthritica Cam.                 | 241      | Baricula 288. Batis            | ibid. | Bolbonach                          | 203       |
| Artifi vulgo                    | 274 b    | Barie Indi                     | 311 b | Boleti quercus                     | 422 b     |
| Artifchochi                     | 383      | Barrachion Apuleij Dod. 179.   |       | Bolunbac                           | 433 b     |
| Artifchoki sub terra            | 277 b    | Cluf.                          | 180   | Bombax 430. humilis                | 263       |
| Arturo Cortusi                  | 350      | Bavanus                        | 508 b | Bon vel Bao 428 b. Alp. 474 b      |           |
| Arum ejusque species 195.       |          | Baucia                         | 155 b | Bonannas                           | 508       |
| Ægyptiacum 196. palustre        |          | Baxama                         | 512   | Bonduch Ponæ                       | 399 b     |
| Geln.                           | 195 b    | Bdellium 503. ejus fructus 510 |       | Boniama                            | 384 b     |
| Arundinacea pinnata Lobel.      |          | Beccabunga                     | 252 b | Bonifacia                          | 305       |
| 38 b.                           |          | Bedeguar                       | 483   | Bonus henricus                     | 115 b     |
| Arundo ejusq; species 17. In-   |          | Bedengian                      | 167 b | Bona Dod. 338. sylv.               | 388 b     |
| dica Guilan. 17 b. ejus spe-    |          | Been album Gef. Dod.           | 205   | Boramez                            | 512 b     |
| cies 18. litholpermos Gef.      |          | rubrum quibusdam 165.          |       | Boræ                               | 446 b     |
| 258. minima Lugd. 5 b. fac-     |          | officin. Guil. 192. quibus-    |       | Borda                              | 289       |
| charifera 18 b. versicolor      |          | dam                            | 205 b | Borrage 256. minor sylv. Col.      |           |
| ibid. volubilis                 | 19       | Behen album & rubrum Ara-      |       | 257 b. minima Lugd. 259 b          |           |
| Afa 156. foetida                | 499 b    | bum 235. Anguil.               | 151 b | Botryo rubrum                      | 191 b     |
| Afarina Mart. 197 b. Lob. 136 b |          | Beidellar Alpini               | 116 b | Botrys ejusq; species              | 138       |
| Afarum 197. muri Lugd. 259 b    |          | Beila donna                    | 166   | Botrys ambrosioides Mexio-         |           |
| Afcalonium Cæf.                 | 72 b     | Bellan Lugd.                   | 388 b | cana                               | 520       |
| Alcebra magnum Mef.             | 290      | Bellevidere                    | 212   | Bourgespine                        | 476 b     |
| Aftelepias ejusq; species 303   |          | Bellis ejusq; species 261. cæ- |       | Brabyia                            | 443       |
| Afcyrum Cord. 279. ejus spe-    |          | rulea 262. lutea ejusq; spe-   |       | Branca urfina 157. Italica 383.    |           |
| cies                            | 280      | cies 162 b. lutea Dalech.      |       | aculeata                           | ibid. b   |
| Afcolimbro Belloo.              | 384      | 265 b. Plinij                  | 176 b | Brasiliun arbor                    | 393       |
| Afcopo arbor                    | 409 b    | Belmufcus Ægypt. Ponæ 317 b    |       | Braslica ejusq; species 110. sylv. |           |
| Afouzenas Lob.                  | 155      | Belzoinum                      | 503   | ejusq; species 112. marina         |           |
| Alpalathus ejusq; species 392.  |          | Benedicta Trag.                | 321 b | 295. spinosa                       | 111 b     |
| & 394                           |          | Ben Judæum 503. magnum         |       | Braslica Murciana 359 b. pra-      |           |
| Alparaguse ejusq; species 489   |          | Monard. 418. parvum Mo-        |       | tentis Lon.                        | 376       |
| Alperula ejusque species 334.   |          | nard.                          | 402 b | Brelma                             | 412 b     |
| muralis Col.                    | 334 b    | Ber 333 b. Acostæ              | 409 b | Brindones                          | 434 b     |
| Alperugo Pli. 334. Dod. 257 b   |          | Berberis ejusq; species        | 454   | Bryon Plinij 422 b. lafcuæ         |           |
| Alphodelus ejusq; species 28.   |          | Berettous fructus              | 451   | folijs Lob.                        | 364       |
| femina Fuch. 77 b. Galeni       |          | Bernacles                      | 513 b | Bryonia ejusq; species             | 297       |
| 70 b. liliaceus Tab.            | 80       | Berula Tab.                    | 252 b | Britannica Plin. 101. Ang. 242     |           |
| Alplenium Matth. 354 b. sylv.   |          | Beshale Avic.                  | 408 b | b. Cam. 211. Gefner. 110.          |           |
| Trag.                           | 359      | Beta ejusq; species 117. sylv. |       | Geln. Lob. 205 b. quorun-          |           |
| Alfa five Tamarindi             | 403 b    | Cord. 191. Plinij              | 192   | dam                                | 233 b     |
| Aster Atticus ejusque species   |          | Betella                        | 410   | Briza                              | 21 b      |
| 266. luteus alter, Lugd. ib.    |          | Betonica ejusque species 235.  |       | Bromos                             | 9 b. 10 a |
| cernuus ib. caruleus Cluf.      |          | altis 206. aquatica 235 b.     |       | Brunella ejusque species 260.      |           |
| 267. coryzoides Lob. 266        |          | 236. foetida 236 b. sylv.      |       | Italica                            | 234 b     |
| b. Peruanus 277 b. purpur.      |          | Fuch. 209 b. 210. sylv. Pau-   |       | Brufathaer                         | 434 b     |
| Fuch. 267. non atticus Tra-     |          | li Quadramio                   | 231 b | Brufcus                            | 470       |
| gi                              | 167      | Betonica Pauli Ded. 246. Ca-   |       | Bubonium Hippocr. 159. lu-         |           |
| Astergir Rhafis                 | 415 b    | met                            | 247   | reum Tab.                          | 266 b     |
|                                 |          |                                |       | Vuu                                | Buc-      |



|   |   |                             |  |
|---|---|-----------------------------|--|
| Cicuta ejusq. species 160. ma-<br>xima Eyster. 154 b  | Citrus 435  | Colubina Trag. 192          | Cornu cervinum Lobel. 190.   |
| Cicutaria ejusque species 161.<br>odorata 160   | Clavi filiginis 24 b  | Colus Jovis Lob. 238 b      | plantabile 514 b   |
| Cidromela 435   | Clematis daphnoides ejusq.<br>species 301. Aegyptia Plin.<br>nig 302 b. cerulea 398. mi-<br>nima 143 b      | Colus rustica Cord. 379     | Corous ejusque species 447.  |
| Cyle Oviedo 430 b   | Clematis ejusq. species 300   | Colutea ejusque species 390 | foemina Cæf. 451   |
| Cymbalaria 306. verior Co-<br>lum. 237  | Cleome Octavij Ang. 101   | Coma aurea 264              | Coronal imperialis ejusq. spe-<br>cies 79. regia quorundam<br>168. fragol. 276 b. Solis<br>Tab. 276 b    |
| Cminagero 146 b   | Clymemon Diofc. Colum. 275  | Comacum Theoph. 407         | Coroneola Cæf. 365 b   |
| Cyminum bulbosum Pl. Col.<br>162. equinum Trag. 158 b                                       | b. Columnæ 287 b. Italo-<br>rum Lob. 280 b  | Comanda ovalou 235          | Coronilla Lob. 349   |
| Cynagrostis 1   | Clymemon foemina Gef. 236.  | Comaron Apuleij 326         | Coronopus ejusq. species 190   |
| Cinamomum ejusq. species<br>408. veterum 409 b  | mas Gef. 235. minus Lugd.<br>236 b. Matrh. 344. quorun-<br>dam Lob. 300 b                                   | Comarum 400                 | Gef. 179 b. Marth. 190 b.  |
| Cynanthemis Lob. 135 b  | Clinopodium Cæf. 218 b. e-<br>jusq. species 224. alpinum<br>Ponæ 247 b                                      | Concubum Plinij 7 b         | caruleus Gef. 131. Lon. 8.   |
| Cinara ejusq. species 383   | Cneoron album Lugd. 463 b.  | Conchæ anatiferae 513 b     | Coronopus ex Cod. Cæf. 332 b   |
| Cinnabarium 499   | Theoph. 462 b   | Conder Avicco. 501          | Cor Indum Lob. 343. D. Tho-<br>mæ 338 b  |
| Ciceraria 131   | Cneoron Cæf. 463 b. Galeni<br>Ang. 462 b. Marth. 206 b.   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Corrigiola Cord. 281   |
| Cynocephalus Plinij Lug. 211  | Ang. 463. Theoph. 217. 463  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cortex ad alvi profluvia 408   |
| Cynocephalea Guil. 512 b  | Cnicus ejusq. species 378   | Condurum Plinij 165. 104 b  | b. eriophorus Cluf. 409 b.   |
| Cynocrambe Cæf. 119 a. b.   | Coagulum terræ Plinij 86 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | W. interan. 461 b. xylocaf.<br>facie Lob. 408  |
| Lon. 302 b. Marth. 122. le-<br>gitima ibid. b   | Coca 469 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cortufa Matrh. 243 b   |
| Cynoglossum ejusque speci-<br>es 257. Marth. 255. Trag.<br>257                              | Coccimelea Theoph. 443 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Coruda ejusq. species 490  |
| Cynoglossum montanum e-<br>jusq. species 258  | Coccognidium 159 b. Beilo.<br>463. Cord. 462 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Coru Acoft. 437  |
| Cynogl. minor Brunf. 254 b.   | Cocum infectorium 425   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cosinofandalos Poëtarū Do-<br>don. 77  |
| quorundam 189 a. b.   | Coccus baphica 425. Indica<br>509   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Costa Camer. 129   |
| Cynomorion Plinij 87  | Coccus radicum 159. 281   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Costus ejusq. species 36. Mar-<br>thol. 156. Arabicus 36. ama-<br>rus, dulcis 37. niger Eyster.<br>183 b |
| Cynops Theoph. Gef. 191 b   | Cochinilla Frag. 159 b. 451 b   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Costus minor Gef. 221. hor-<br>rorum Lob. 226 b  |
| Cynorhodos Plinij 483. po-<br>lyacanthos Lugdun. ibid. b                                    | Cochlearia ejusq. species 110   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cota Cæf. 136  |
| Cynobatos Diofc. Adv. 483.  | Guiland. 252 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cortyledon ejusq. species 285.   |
| Theophr. Trag. 454 b  | Cochucho Acoft. 91 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | altera Cluf. 283. Diofc. 287.  |
| Cynoforchis ejusq. species 80   | Cocconileæ arbor 415. grana<br>458 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | aquatica Lob. 180. fyl. Trag.<br>304. tertia Dalech. 243 b   |
| draconias 86. militaris e-<br>jusq. species 81. macrocau-<br>les 85 b. palustris 86         | Cocculæ officin. 511 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cotinus 415  |
| Cynofpastos terrestris 512 b  | Cocculchau radix 91. 91   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cotis lignea 421 b   |
| Cyperella Cordi 7 b   | Codiummum Gef. 52 b   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Coronalter 452   |
| Cyperus ejusq. species 13. Ba-<br>bylonicus Corn. 35 b. efcu-<br>lentus 14 b. graminea 6 b. | Codomofo Bellon. 452 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Coronea malva 434  |
| Indicus 36. 37. longus & ro-<br>tundus 14   | Codol fructus 510   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Coronaria Lob. 263   |
| Cypore Cluf. 406  | Ceggygia 415  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Corula ejusque species 135 b   |
| Cyporus Diofc. Tra. 475 b. Gre-<br>corum 476. Dod. ibid. b                                  | Cohyne Thevet. 461 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | lurea Dod. 154 b. marina<br>Lob. ibid.   |
| Cireæa Diofc. Cæf. 102. Lu-<br>tetiæna Lob. 187 b. Mon-<br>spel. Lob. 167. Tragi 121        | Coix Myconi 2. Theoph. 258  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Coucouchias 402  |
| Citrium Italicum Fuch. 256  | Cola 507 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Coulcoul Matrh. 401  |
| Citrium ejusq. species 377. lu-<br>reum Lob. 379  | Colchicum ejusq. species 67.  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Couroq Lerio 510 b   |
| Cistus ejusq. species 464   | Alexandri Lob. 69. Illyri-<br>cum Ang. Lob. 68. luteum<br>69 b. montanum 68. vaite-<br>gatum ibid. verum 69 | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cracca ejusque species 345.  |
| Cistus ledon ejusque species<br>467. Silefiacus 468   | Coles Camer. 315 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | major Tab. ibid.   |
| Cytinus 437   | Coles phaeolus 404  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crassula major Cæf. 27 a. b.   |
| Cytisus ejusq. species 389. Co-<br>lum. Cam. 332. Tragi 328 b                               | Colyrea Theophr. 454. Lug-<br>dun. 391. tertia Theophr.<br>402 b  | Condurum Plinij 165. 104 b  | minor Dodon. 283. serrata<br>Thal. 285   |
| Citrargo Gef. 219   | Collum gruis German. 318  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crategus Theop. 425 b. Tra-<br>gia 35. Lob. 430. Lugd. 454   |
| Citrangula 435 a. b.  | Colocasia 195 b. 196  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crataegonon Lac. 101. Ang.<br>ibid. b. Dodon. 210 b. I. o-<br>bel. 234 a. b.                             |
| Citreolus Cæf. 310  | Colochierni Belli 379 b   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crater Jovis Frag. 276 b   |
| Citrullus 312   | Colocynthis ejusq. species 373  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Craurophyllon Thal. 206  |
|   | Colophonia 504  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crepanella Cam. 97 b   |
|   | Columbaria Lob. 270 b   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crepis Dalech. 124 b   |
|   | Columbaris Barba 269  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Cressione Cæf. 354 b   |
|   | Columbina Cæf. 144  | Condurum Plinij 165. 104 b  | Creta marina Lon. 288  |
|   |   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crias Apuleij 243 b  |
|   |   | Condurum Plinij 165. 104 b  | Crispu-  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Crispula</b> 133   | <b>Dactylon Col.</b> 284  | <b>Dotterblumen/Dod.</b> 276  | <b>Elleborine</b> 183   |
| <b>Crispina uva</b> 455   | <b>Damaſonium Lugd.</b> 185.  | <b>Draba ejusq; ſpecies</b> 109.  | <b>Emerus Cæſ.</b> 297  |
| <b>Criſpinus</b> 454 b  | <b>di 186 b. Dod. 187. Dioſc.</b> 106 b. minima Col. 108 b  | <b>Draco herba Dod. 98. arbor</b> 106 b. minima Col. 108 b                                  | <b>Empetron Ang. 463 b. phaeoides Lugd. 463. Rondel.</b> 288. Tragi 281 b.  |
| <b>Criſta Cæſ. 234. alpina Cæſ.</b> 163 b. galli Lob. ibid.   | <b>Cæſ. 244 b. ſtellarum Lug.</b> 190   | <b>Cluſ.</b> 505  | <b>Endivia major Trag. 112 b. ejus ſpecies</b> 125  |
| <b>Crithmum ejusq; ſpecies</b> 288. agreſte Trag. 386 b   | <b>Dante radix Acoſt.</b> 293 b   | <b>Dracunculus ejusque ſpecies</b> 194. cſculentus 98. hortenſ. Matth. 98. major Brunſ. 192 | <b>Eodivola Adv.</b> ibid.  |
| <b>Crocodilium Ad. 381. Cæſ. 386. Lugd. 380. 381 b. Tab. 380 b</b>  | <b>Daphne Alexand. Fuch. 304 b</b>  | <b>Dracuntium majus</b> 194 b   | <b>Enger</b> 113 b  |
| <b>Crocus ejusque ſpecies</b> 65. autumnalis ibid. Indicus Acoſt. 37  | <b>Daphnoides 301. Fuch. 462</b>  | <b>Dragonal ſtuſtus</b> 505   | <b>Engliantaria Ruell.</b> 483  |
| <b>Cocus anguſtiſ. ejusq; ſpecies</b> 67. luteus ejusq; ſpecies 66 b  | <b>Daracht</b> 508 b  | <b>Dragone Cæſ.</b> 98  | <b>Enneadynamis Gef.</b> 309  |
| <b>Crone</b> 412 b  | <b>Darſeni Avicen.</b> 408 b  | <b>Drakena radix Cluſ.</b> 14   | <b>Enneaphyllum Lob. 354. Plinij Lugd. 87 b. 180 b. 185</b>   |
| <b>Croton Nicandri Ang. 15 b</b>  | <b>Datura Lugd.</b> 168   | <b>Drymopogon Tab.</b> 164  | <b>Enula</b> 276  |
| <b>Cruciata Dodon. 335. muralis Col. 334 b. gentiane ſpecies</b> 188  | <b>Davanas</b> 508 b  | <b>Dryophanum Plin. Rucl.</b> 414   | <b>Enzanda Pigaferr.</b> 458  |
| <b>Crucialis Cæſalp. 257 b. maritima</b> 334  | <b>Daucoides majus Cord.</b> 152. minus Cord. 153   | <b>Dryopteris Matth.</b> 318  | <b>Ephedra Plinij</b> 15 a, b   |
| <b>Grus galli Brunſ.</b> 179  | <b>Daucus ejusq; ſpecies</b> 150. officin. 151. acantocarpos Col. 151 b. Creticus Lob. 148. alter Fuch. 157. alter Plinij Col. 153 b. ſclimoides Cord. 160. ſeparius Gef. 152 b | <b>Drypis Lob. 388. Lugd. 355 b</b>   | <b>Ephemerum Dioſc. I. ob. 243. Matth. &amp; Lob. 244. quetundam</b> 304 b  |
| <b>Cubebe</b> 411   | <b>Delphinium Cluſ. 142. buccinum Dioſc. Lob. 245 b</b>   | <b>Droſera Cord.</b> 310  | <b>Ephemerū non lethale Fuch.</b> 504   |
| <b>Cuci Plinij</b> 510  | <b>Dende Serap.</b> 432 b   | <b>Droſomeli</b> 496 b  | <b>Epilobium Gef.</b> 245 a, b  |
| <b>Cuciophora</b> 509 b   | <b>Dendrobryon Col.</b> 361 b   | <b>Dudaim</b> 505 b   | <b>Epimajorana Tab.</b> 224 b   |
| <b>Cucophicos Creteſ.</b> 338 b   | <b>Dens canis 87. canis gramin.</b> 116. Lonic. 316   | <b>Dulcichinum Dod.</b> 14 b  | <b>Epimedium Col. 255. Dodo. 276 b. Plinij 70 b. Lob. 323</b>   |
| <b>Cucubalus Plinij Ad.</b> 250 b   | <b>Dens leonis ejusque ſpecies</b> 116. Lonic. 316  | <b>Dulcamara Dod.</b> 167   | <b>Epimelis Dioſc.</b> 453  |
| <b>Cucullata Lugd.</b> 245 b  | <b>Dentali Cluſ.</b> 87 b   | <b>Dulcis amara Trag.</b> ibid.   | <b>Epimelis Gal. 260. I ugd. 452</b>  |
| <b>Cucullos Ferncl.</b> ibid.   | <b>Dentaria ejusq; ſpecies</b> 322  | <b>Dulcis radix Trag.</b> 352 b   | <b>Epipactis Camer. 186 b. Eyſtett.</b> 187   |
| <b>Cucumis ejusque ſpecies</b> 310. aſininus 314. Gal. 310. maritimus 311   | <b>Dentaria (Orobanche ſpecies) major Matth. 88. minor Cluſ.</b> ibid.  | <b>Dulbaha Arabum</b> 312   | <b>Epipetron Gef.</b> 369 b   |
| <b>Cucumis puniceus Cord.</b> 306   | <b>Dentellaria Rond. 97 b. Gef.</b> 265. Lugd. 322  | <b>Duracina</b> 440   | <b>Epithymum</b> 219  |
| <b>Cucumer marinus Aldroan.</b> 369 b   | <b>Dentilaria aha Gef.</b> 101  | <b>Duriaccon</b> 434  | <b>Epithymum</b> 218 b  |
| <b>Cucurbita ejusq; ſpecies</b> 311. laeiniata ib. Somphos Plinij 316. ſylveſtr.  | <b>Dentilulara Lugd.</b> 178 b  | <b>Duryaon</b> ibid.  | <b>Epithymum</b> 219  |
| <b>Culcas</b> 196   | <b>Deſiderium Gazæ</b> 301  | <b>Durion</b> ibid.   | <b>Equisetum ejusq; ſpecies</b> 15  |
| <b>Culices minores Lob.</b> 83  | <b>Diaboli ſteicus Germ.</b> 499  | <b>Dutroa Linſc.</b> 168.   | <b>Eranthemum Dod.</b> 178  |
| <b>Cuminum ejusq; ſpecies</b> 146. pratenſe 158. ſativum alter. Cæſ. 151 b. ſylv. Gefn. 142. ſyl. alter. Matth. 142. Fuch. 145. Matth. Lob. 172. ſili. quolum | <b>Diapentia Matth.</b> 319   |   | <b>Eranthites</b> 131   |
| <b>Cuneno Melitenſ.</b> 28 b.   | <b>Diſſamnis ejusq; ſpecies</b> 222   |   | <b>Ergen</b> 444  |
| <b>Cunila Cæſ.</b> 218  | <b>Digitalis ejusq; ſpecies</b> 143   |   | <b>Erica ejusq; ſpecies</b> 485. Alexandrin. 465 b. baccifera Lugd. 471 b. Lob. 486 b. chryſanthem. Lugd. 466 b. maritima Cluſ. 245 b |
| <b>Cunilago Plinij</b> 266  | <b>Dioſanthos Theoph. Anguil.</b> 209 b   |   | <b>Ericoides Thal.</b> 254  |
| <b>Cunous marinus Bellon.</b> 369   | <b>Dioſpyros Gef. 452. Theoph.</b> 447. Lugd. 448   |   | <b>Eriogon ejusque ſpecies</b> 131. Dod. 265  |
| <b>Cupreſſus herba Cord.</b> 136 b. arbor 488   | <b>Dipadi</b> 42 b. 43  |   | <b>Erinacea Cluſ.</b> 394 b   |
| <b>Curcas Baſamum 401 b. Riccini ſpecies Cluſ.</b> 432 b  | <b>Dipſacus ejusque ſpecies</b> 385   |   | <b>Eriogon ejusq; ſpecies</b> 380. Vegetij Cam. 384   |
| <b>Curcuma</b> 37   | <b>Dodecatheon Plinij Ang. 241. Gef. Cam.</b> 243 b   |   | <b>Erinus ejusq; ſpec.</b> 225. Matth. 229 b. Nicandri Ccl 92   |
| <b>Cuscuta</b> 219 b  | <b>Dolichus Bellon.</b> 340. Dod. 339   |   | <b>Erythimum ejusq; ſpecies</b> 100. Cam. 95. vetum Lugd. 58 b. Aldroan. 309. cereale Theoph. Lob. ibid. b                            |
| <b>Cuſſus altera Serap. Trag.</b> 295   | <b>Dorella Cæſ.</b> 109   |   | <b>Eriſſifales Lugd.</b> 377  |
| <b>Cutarapama</b> 184 b   | <b>Doryenium Dioſc. Poa. 272</b>  |   | <b>Erythrodanum maritimum Lugd.</b> 334   |
| <b>Cutſchula Rauvvolf.</b> 512 b.   | <b>b. Cordi 343. Imper. 463 b. Lobel.</b> 319   |   | <b>Ermellinus Cæſ.</b> 447 b  |
|   | <b>Doryenion congener Cluſij 332. ſimilis Ang.</b> ibid. b  |   | <b>Ervanga Gazæ</b> 294 b   |
| <b>D.</b>   | <b>Dorroneſ</b> 434   |   | <b>Erucago Col.</b> 100   |
| <b>Daburi</b> 419 b   | <b>Doronicon ejusque ſpecies</b> 184. Americum 520 b  |   | <b>Eruca ejusq; ſpecies</b> 98. 99 b. cinerea 151. muralis Lugd. 109 b. naſſur. cognata 105 b   |
| <b>Dachel</b> 506   | <b>Doronic. Arabum Poæ 35 b</b>   |   | <b>Eruca caerulea 99. maritima ib. peregr. 201 b. ſyl. Gef. 98</b>  |
| <b>Dactyliib. b. Trapezun. 405 b</b>  |   |   |   |
| <b>Dactyliobotanum cerul. Thab. 112 350. alt. Thal.</b> 285   |   |   |   |

Ervilium Cxf. 344. Lug. 342.  
 sylv. Dod. 343  
 Ervum Tab. 346. album Fuch.  
 343. candidum Trag. 344  
 b. sylv. Fuch. 344  
 Eschara coralloid. Cluf. 366 b  
 Esculus Plinij 420  
 Esula ejusq; species 291 b. 292  
 Indica 116. rara Lob. 291.  
 minor Lugd. 291. rotunda  
 292  
 Ettaleb Scalig. 489 b  
 Evonymus ejusq; species 428  
 Theoph. 468 b  
 Eupatorium ejusque species  
 320. 321 b. cannabinum  
 Lobel. 321. Mesues Matth.  
 221. Mef. Cord. Ichol. 270  
 Eupt orbium 387. succus 496.  
 arbor 458 b  
 Euphrasia ejusq; species 233.  
 cerulea 254. gramen 210 b.  
 nobilis 247. 4. Trag. 254.

F.

Falim Thev. 276  
 Faba ejusq; species 338. ar.  
 bor. 338 b. Egyptia  
 120. ficulnea 347. Græca  
 Pua. 447. 448. inverfa Cxf.  
 343. Lob. 287. Trag. 391 b.  
 Malucana 511 b. purgatrix  
 338 b  
 Fabago 402. Belgarum 480 b  
 Fabaria 287  
 Fael Serap. 400  
 Fafago Australis 368  
 Fagara 413  
 Fagotriticum 27 b  
 Fagus 419. fepiaria 427  
 Far 21. 22. clufiaum 22 b. ha.  
 licastrum 22  
 Farfara 197  
 Farfarus antiquor. 429  
 Farfugium Cxf. 276 b  
 Farrago Plinij 23  
 Ferruminatrix Indor. 458 b  
 Favagella Cxf. 309 b  
 Fauvel 85. 510  
 Fausbaum 428 b  
 Fegopyron Dod. 27 b  
 Felfel 412  
 Ferrara quorundam 235 b.  
 Geln. 276 b  
 Ferrum equinum ejusq; spe.  
 cies 349  
 Ferula 148. fagapenifera 149  
 b. Trag. 395 b  
 Ferulago 148  
 Festuca ejusq; species 9 b  
 Festucago Gazæ 10  
 Ficaria Brunf. 309  
 Ficus ejusq; species 457. Æ.  
 gyptia 459. Cypria ibid. b.  
 Indica 457 b. 458. Idæa 451.  
 Linfco. 508 b. Martaba-

nis Indica 507. Pbaronisi  
 459. infernalis 172  
 Filago Dod. 263  
 Filifil 411  
 Filipendula ejusq; species 163  
 b. Tab. 162  
 Filus ante patrem 245 b  
 Filix ejusq; species 357. faxa.  
 cilis 358  
 Filicula ibid.  
 Findens oculos Cxf. 387  
 Fior capuccio Cxf. 142  
 Fistula Lob. 17 b. pastoris Lo.  
 nic. 190. pastoris Avicen.  
 244 b  
 Fistularia ejusq; species 163  
 Flamma Ang. 131. Gef. 97 b.  
 203 b. Jovis 300 b. ranun.  
 culus 180 b. recta Camer.  
 300 b. repens ibid.  
 Floers 37 b  
 Fioribundio 470 b  
 Flos Africanus ejusq; species  
 131. ambarualis Dod. 215.  
 coccineus Lugdun. 203 b.  
 Constantinopol. 203. cu.  
 culi Dod. 104. Trag. 205.  
 Tab. 210. frumenti 273  
 Flos hepaticus Taber. 309 b.  
 Hierofolymit. 203. Mexi.  
 ocanus 133 b. noctis Geln.  
 295. pallionalis 301 b. Per.  
 ficus Cluf. 41 b. regius Do.  
 don. 142  
 Flos mirabilis Peruvian. 168 b  
 Flos sanguineus Monardi 306  
 b. Scarleti Lon. 209. Solis  
 Dod. 466  
 Flos Solis ejusq; species 276 b  
 Farnesianus 277 b  
 Flos tinctorius Fuchfij 395 b.  
 Trag. 265. trinitatis Eystet.  
 200  
 Focor Guebit 430  
 Foeniculū ejusq; species 147.  
 aquaticum 141 b. erraticū  
 Lonic. 158 b. maritimum  
 Lob. 288. montanum Tra.  
 gi 148. porcinum Lob. 149  
 b. sylv. Trag. 161 b. tortuo.  
 sum Lugd. ibid.  
 Fœnum Burgundiacum Lo.  
 bel. 336  
 Fœnum Græcum ejusq; spe.  
 cies 348. sylv. Tragi 353  
 Folium Indi 410. prægrande  
 Lobel. 505 b. palmæ fila.  
 menta 506  
 Fontilaparum Lob. 193 b  
 Forbelina Geln. 321  
 Formentone Cxf. 27 b  
 Fragaria ejusque species 326.  
 quarta Trag. ibid.  
 Fragula Cord. ibid.  
 Frangula Matth. 428 b. Lug.  
 dun. 451

Frassinella Cxf. 303  
 Fraxinella Dod. 222 b  
 Fraxious ejusq; species 416.  
 bubula 415 b  
 Fraxinea arbor Trag. 415  
 Frisoles 346 b  
 Frizoles Guateli 340 b  
 Fritillaria ejusq; species 64  
 Fromentone alterum Cxf. 295  
 Frondipora 367 b  
 Fructus cholagogus Monard.  
 Lugd. 419 b. exotici 405.  
 sub terra Lugd. 376  
 Frumento 27  
 Frumentum amyllum 22.  
 barbarum Ruel. ibid. b. fa.  
 tum Lon. 9. Indicum 24.  
 loculare Ruel. 21. Sarrace.  
 nicum 27 b. sylv. 10  
 Frutex coronarius Cluf. 398 b.  
 spinosus peregrinus Rau.  
 vvolff. 478 b  
 Frutilla 471 b  
 Fucus capillaceus 364. cupress.  
 sinus 365 b  
 Fucus folliculaceus ejusque  
 species 365. fungularis 364.  
 ferulaceus Lobel. 365. lio.  
 za 364  
 Fucus marinus Dod. ib. 365.  
 folijs abrotani 365. marin.  
 baccifer. ibid. b. vermicu.  
 laris 366. zoster 364 b  
 Fulle 470 b  
 Fumaria ejusq; species 143  
 Fumaria bulbosa ejusq; spe.  
 cies ibid. b. bulbosa mini.  
 ma Tab. 178 b  
 Fungus ejusq; species 369. A.  
 manita Gal. 372. auricular.  
 Cxf. 368. boletus Cxf. 371 b  
 Fungus capreol. Tab. 370 b  
 cervinus Matth. 376. ely.  
 peifor. Lob. 373 b. conoci.  
 elle. Portæ 371 b. coralloi.  
 des. Cluf. 375. digitelli Tra.  
 gi 372. elculentus 370. 371  
 Fungus galericulatus Lobel.  
 372 b. gallinaceus Cxf. 371.  
 galucci Portæ 370. ignia.  
 rius Trag. 372 b. lacinia.  
 372. lariceus 371 b. lepori.  
 nus Cluf. 371  
 Fungus marinus Ald. 369 b.  
 Dod. 374 b. minimus Cxf.  
 367 b. muscarius 373. ma.  
 ximus 372. orbicularis Do.  
 don. 374 b. orientalis 511 b  
 Fungi noxii ejusq; species 372  
 Fungus petreus 375 b. pezicæ  
 Col. 370. 372 b. Cxf. 375.  
 piperitis. Portæ 371 b. pra.  
 teoli. Cxf. 372 b. prunuli.  
 Cxf. 371 b. quercinus Col.  
 ibid.  
 Fungus ramosus ibid. fæxus

Clusij 375 b. in faxis 372.  
 (pongiolus. Lug. 370. fuil.  
 lus. Cxf. 371. turini. Cæ.  
 falpin. 370  
 Fusanus 428  
 Fustis 411 b.

G.

Agel German. 414 b  
 Gaguey 508 b  
 Gaiderothymum 236 b  
 Galanga ejusq; species 35  
 Galbanum 494  
 Galbulæ fructus Cupressi 488  
 Galestrago. i Xenocratis An.  
 guil. 385  
 Galga ejusque species 352.  
 montana Lugd. 351 b. sylv.  
 Dod. 345 b  
 Galeopsis Lob. 230. Dod. 235.  
 lutea Lugd. 238 b  
 Galerita Trag. 197  
 Galla 420. myricæ 485 b. re.  
 rebintbi 400 b  
 Gailicrus Apul. 8  
 Gallitricum 238  
 Gallium ejusque species 335.  
 tertium Tragi 334 b. tetra.  
 phyllon Colum. 333 b  
 Galum radix 193 b  
 Ganti radix 37 b  
 Garb five Garab Arab. 475 b  
 Garyophyllon Plinij 411 b  
 Gariochata Cxf. 321 b  
 Garnite fructus 406 b  
 Garosimum 119 b  
 Gato camber 407 b  
 Gehupharbor 440 b  
 Geiduar Lugd. 36 b  
 Gelapo 298 b  
 Gelbenech Ang. 279  
 Gelfeminum ejusque species  
 397. rubrum Cxf. 168 b  
 Gelsomoro 513 b  
 Gemez 507 b  
 Genipat 434  
 Genista ejusq; species 395. A.  
 rabica Bello. 395 b. humi.  
 lis Dod. 397. Iluensis. Lug.  
 396 b. rotunda. Cxf. 394 b.  
 rubra Cxf. 212 b  
 Genista spinosa ejusq; species  
 394  
 Genista spartium ejusq; spe.  
 cies ibid.  
 Genistella aculeata. Lob. 395.  
 montana. Lob. 396  
 Gânffblum/ Brunf. 108 b  
 Gentiana ejusq; species 187.  
 concava 206. palustris 188  
 b. pratenfis 188  
 Gentianella ejusque species  
 187 b  
 Geranium ejusq; species 317.  
 banachoides ibid. colum.  
 binum 318 b. mofcatum 319  
 nodo-

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| nodosum Clus. 318 b. robertianum 319 b. laxatile Camer. 318 b. sanguineum 318. ruberosum ibid. b  | roides 4 b. amourettes 2 a. b. anthoxanthos 3 b. aquaticum panicul. 3. aureum. ibid. arvense panicul. 3. arundinaceum 6 b. 7. avenaceum 10 b           | neri 218 b  | phraet. 214  |
| Geranium folio malve ejusq; species 315. b. primum quoruodam Lugd. 173  | Gramen bufonium 7. bulbosum 2. 3. caninum 1. canarium 7 b. caryophyllatæ folijs 3 b. 4. cyperoides 6 a. 7 a. b. cristatum 3 b. crucis 7 b              | Grossi ficuum 457   | Helianthemum ejusq; species 466. ejus species Lugdun. 465 b  |
| Gerau palma 507   | Gramen daetylon 7 b. 8 a. distachyophoron 9 a. dulce 1 b. ecbinatum 7 b. equinum 3   | Grossularia ejusq; species 455  | Helicbrysum ejusque species 264. Italicum Matth. 141. sylv. Trag. 263  |
| Geronopogon Gef. 274  | Gramen festuca 9 b. filicolum 2 b  | Guacarane Monard. 221 b   | Heliochrysis Trag. 213   |
| Gerbyllis Gef. 72 b   | Gramen geniculatum 8 b. glumofum 10 b.   | Guadarella Cæf. 100   | Heliotropium ejusq; species 253. erectum Ger. 254  |
| Geum alpinum 243 b. Gef. 322. Plinij 321. rivale Gef. 322   | Gramen holosteum 7 a. hordeaceum 9 a. hirsutum 7 a   | Guajaba 437 b   | Helleboraster Lob. 185   |
| Githa jamaica 497 b   | Gramen juceum 5 b. 6 a. 7. leucanthemum 7 b. leporinum 2. loliaceum 2. 3. 7. 9   | Guajabara 19  | Helleborine ejusque species 186 b. Dalechamp. 188  |
| Gicherum Cæf. 791   | Gramen manox 8. maritimum 6 10 b. miliaceum 8 b. montanum 3  | Guajanæ fructus 511   | Helleborus albus ejusq; species 186 b  |
| Giganthea 277 b   | Gramen nemorosum 7. 10 b. nodosum 2  | Guajanos 441 b  | Helleborus Hippocr. Taber. 186   |
| Gigarum Cæf. 195  | Gramen panicum 4. 8. paniculatum 2 b. panicula crispata 3. pennatum 5. phalaroides 4. 9 b. pratense 2 b  | Guayavas 437 b  | Helieborus niger ejusq; species 185. ferulaceus Adver. 186   |
| Gymnascriton hordeum Camer. 22 b  | Gramen segetum 3. sylvaticum 7. forghinum 8 b. spar-teum 5. spicatum 3 b. 5 b. spicalerizæ 9. spica geminata 9. secatum ibid. triticum 8 b. striatum 7 | Guama Oviedi 404  | Helixne Matth. 121. cissampelos 294. 295. sylv. Thal. 168 b. stans Guil. 295 b.  |
| Ginge Cam. 343 b  | Gramen tomentosum 4 b. 7. typhoides 9. triculum 2. triglochis 6 a. b. xerampelinum 3. 7  | Guanaabanus Oviedi 434. Scalligeri ibid.  | Hemeris 420  |
| Gingidium ejusq; species 151  | Gramen 2. Plinij Ang. 282 b. 3. Plinij Ang. 283 b. leucanthemum Dod. 210 b. flordum Cam. ibid. maritimum Clus. 211                                     | Guanas 417 b  | Hemerocallis Diof. 77 b. 78. Chalcedon. 73. Valentina Clusij 6 b   |
| Gypophyton Thal. 211  | Grana paradyfi 413   | Guanavano 439 b   | Hemionitis ejusq; species 255  |
| Gypsuccus 497 b   | Gratia Dei Ang. 279. Cæfal. 246 b. Dod. 465 b. Gallo-rum Gef. 278. Germanorum Trag. 319 b  | Guanavanus 511  | Händelstrant / Tia 205   |
| Girafoloryz 24 b fructus 145  | Gratiola ejusque species 279. cærulea 246 b. minor Gef.  | Gummi ejusque species 498. Dioscor. ibid. elemmi 472. 504. ex molle 500. adpodagram 497 b | ruleo flore Trag. 250  |
| Gith 145  |  | Gutta Gamandra ibid.  | Henne Arabum 476   |
| Githago Trag. 204 b   |  |   | Henophyllum Gef. 304   |
| Gladiolus ejusque species 44. cæruleus Trag. 32 b. cæruleus major Trag. 30 b. fœtidus 30. luteus Fuch. 34 b. palustris Cord. 12 b. Tab. 15. Clus. 202 b |  |   | Hepatica Tab. 362  |
| Gladiolus Indicus 19 b  |  |   | Hepatica aurea Tab. 330 b.   |
| Glans virginea 421. unguentaria 402   |  |   | alba Cordi 509. palustris ibid. b. stellata Tab. 334 b. trifolia Lob. 330 b  |
| Glandes terrestres Clus. 344 b  |  |   | Hepatorium aquaticum Dodo. 321   |
| Glastivida Creten. 201 b. Belli, Ponæ 291   |  |   | Heptaphyllum Fuch. 326   |
| Glastum ejusque species 133. Ang. 204 b. syl. Cæf. 97 b   |  |   | Heracantha Tab. 379  |
| Glaucium 167 b. Diof. 172   |  |   | Heraclea Trag. 231 b   |
| Glaux, Anguil. 332. Clus. 347. Gef. 350. vulgaris, Lob. 353. maritima 215   |  |   | Herba alba Plinij Lugd. 8 b. amoræ Cæfal. Lugd. 319 b. 287 b. articularis Tab. 205. cava Imper. 364. Malvarica 437. mimosia 360. molle ibid. |
| Glycisida Plinij 323  |  |   | Herba S. Alberti Cæf. 101 b. Antonij 97 b. S. Barbaræ Fuch. 98 b   |
| Glyzyrrhiza ejusque species 352. spinosa, Lac. 386  |  |   | Herba de Balestera 186 b. benedicta Brunf. 321. de Bengala 320 b   |
| Glyzyrrhiza astragaloides 328   |  |   | Herba cancri major Lon. 253. minor Cord. 282. cervi Gef. 248. clytiæ Cam. 253 b. costa Cæf. 156 b. S. Crucis 169                             |
| Globularia Moutp. 262   |  |   | Herba doria Lob. 168. fullo-nium Brunf. 188. gauria Matth. 228. Gerardi Dod. 155 b. Kunigundis 320   |
| Gluten Alborion. Avic. 500  |  |   | Herba Laurentiana 260  |
| Gnaphalium ejusque species 263 Diofcor. Tragi 4 b. Diof. Ponæ 222. maritimum Dalech. 265  |  |   | Herba S. Jacobi 131. Joannis infantis Monard. 114 b. Judaica   |
| Gaoconaz 404 b  |  |   |  |
| Goan arbor 441  |  |   |  |
| Gongularia marina Imp. 365  |  |   |  |
| Gomphrena Lugd. 121 b   |  |   |  |
| Gor fructus 419 b   |  |   |  |
| Gossypium ejusq; species 430 mulcus 363 b   |  |   |  |
| Gotne album 190 b. rubrum 191 b   |  |   |  |
| Grain 25  |  |   |  |
| Gramen & ejus species 1. aculeatum 7 b. 8 a. alopecu-   |  |   |  |

|                                |                                |                                |                                  |         |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|
| daica Gef. 233. Dod. 246 b.    | Hieracium ejusq; species 126.  | Hebraeorum 217. montana        | Inhame Cluf.                     | 90 b    |
| Julia Ang. 221                 | arborescens 127. asperum       | Lon. 466. nemorum Lugd.        | Iniamos Linc.                    | ibid. b |
| Herba S. Mariz Cæfal. 225 b.   | 126. echinoides Tab. 128 b     | 234 b. vulgaris Col. 279 b     | Intybus ejusque species 125.     |         |
| Moluccana 321. mimosa          | Hieracium chondrilla folio     | Hivourah 444                   | aphyllocaulos Thal. 129 b.       |         |
| Lug. 360. mollis Acoft. ib.    | ejusq; species 127 b. Cretu-   | Hobos Linc. 417 b              | platiphyllus Thal. 124 b.        |         |
| Herba montem prædicens 512     | cum 127. dentis leonis fol.    | Hoher Steinfrey/Lon. 205       | tylv. Trag. 123                  |         |
| radiali Apul. 359. Senticola   | 126. foetidum ibid. b          | Hoyrin Theveti 384 b           | Inturus Gazæ 450                 |         |
| Linc. ibid. viva, Cluf. ibid.  | Hieracium fruticosum ejusq;    | Holcus Plinij Ang. 9           | Jolo Suchel 133 b                |         |
| Herba Papagalli Dod. 121 b.    | species 129 b. intybaceum      | Holoconitis Hipp. 14 b         | Jondraba alifloides Col. 107 b   |         |
| paralytis 241. parus Marth.    | 128. majus 126 b               | Holofchænos Lugd. 11 b. 12     | Jon thlaspi Col. 107             |         |
| 167. perforata Trag. 279.      | Hieracium montanum ejus-       | Holotheum ejusq; species 190   | Jovis barba Plinij 473           |         |
| pudica Lugd. 512 b             | que species 128. glabrum       | Marth. 7. alterum Lobel.       | Jovis flos Theoph. 203 b         |         |
| Herba rena Cæf. 156 b. renum   | 129. phlomidoides 128 b. pra-  | 358 b. caryophylleum Ta-       | Japhyon Theoph. Ang. 28 b        |         |
| morbos curans Mon. 123 b.      | tente ibid. b                  | ber. 210 b                     | Irautch 495 b                    |         |
| adrupturas 282 b               | Hieracium Sabaudum ibid. b.    | Holothuria Arist. 369          | Irion Fuch. 95. Matthioli, Lo-   |         |
| Herba lactica Dalecham. 231 b. | sinqua falcata 128             | Hordeum ejusque species 22.    | bel. 101                         |         |
| Ang. 269 b. Sardoia Dodo.      | Hierobotane mas Lugd. 249.     | alterum ibid. b. causticum     | Iris ejusque species 30. alba    |         |
| 177. Guil. 180. Simeonis       | Brunf. 269. foemina Brunf.     | 23 b. Galaticum 24. gla-       | 31. Africana ibid. Afarica       |         |
| 316. Srephani Taber. 168 b.    | 100. Lugd. 249                 | brum 22 b. marinum 9. nu-      | ibid. b. agria Theoph. 30.       |         |
| Stella Dod. 190 b. studioflo-  | Higuero Oviedo 434 b           | dum 22 b. spurium 9            | biflora 32                       |         |
| rum Tab. 212                   | Hyoefcyamus ejusque species    | Horminum ejusque species       | Iris angustifolia ejusq; species |         |
| Herba trientalis Cord. 191 b.  | 169. peregrin. Dod. 107 b.     | 238                            | 32 b. prunum redelens 33         |         |
| tunitatis Fuch. 199 b. tuni-   | Peruvianus Cord. 168. Do-      | Hovos fructus 446              | Iris chalcædonica 31. Dama-      |         |
| ca 207 b. rurea Lob. 182.      | don. 169                       | Hoxocoquomaclit Cam. 352.      | scena & Damatica 31 b.           |         |
| turca montan. Cæf. 281 b       | Hyoifris Plinij 271 b. Taber.  |                                | Florentina 31. Ilyrica 31. 32    |         |
| Herba venti Trag. 177. Mon-    | 127 b                          | I.                             | latifolia 30. Lusitanica 31 b.   |         |
| spel. 230 b. Ungarica Lon.     | Hypecoon ejusq; species 172.   | Aca Garz. 511. major Cast.     | 32. lutea 32 b. 34 b. Mauri-     |         |
| 317. vulneraria ad flumen      | Matth. 317. forte Lug. 337 b   | 434                            | tanica 39 b. maritima 32         |         |
| Trag. 266 b. 278               | Hypericum ejusq; species 279   | Jacea ejusq; species 271. al-  | b. 33                            |         |
| Herba Wiapassa 326 b           | Hypericum frutescens 521 b     | ba Lugd. 273. aculeata Ta-     | Iris pratensis 30 b. Pharaonis   |         |
| Herbæ admirandæ 512            | Hippia Lob. 250 b              | ber. 377. Babylonica 272.      | 31 b. Susiana 31. Tripolita-     |         |
| Hermodyctylus Mesuzi Gef.      | Hippion Gef. 188               | incana Lobel. ibid. b. laci-   | na 32 b                          |         |
| 87 b. Tragi 308 b. vulgo 67.   | Hypocheiris Dalech. 125 b. Ta- | nata 271 b. capite spinoso     | Iris bulbosa latifolia ejusque   |         |
| verus 40 b                     | bern. 127 b                    | 272. major tricolor Cast.      | species 38. angustifolia 38 b    |         |
| Herniaria Dod. 182             | Hypocistis 465                 | 199 b. nigra Lob. 271 b. o-    | carulea 40. lutea 39. ver-       |         |
| Hesperis ejusque species 202   | Hypodrys 422 b                 | lex folijs 272 b. Tab. 273 b   | ficolor 39 b                     |         |
| Hetich Americanorum 90         | Hypoglossum Valentinum         | Jaceros 511                    | Iris tuberosa Lob. 40 b          |         |
| Hyacintho asphodelus 70 b      | Cluf. 463                      | Jacobæ ejusque species 131     | Itaces ejusq; species 113. tylv. |         |
| Hyacinthus ejusque species     | Hippomanes 511 b               | Jaiama 384 b                   | Lob. 204 b                       |         |
| 41. Arabicus 45. autumnal-     | Hippomelis Palladij 454        | Jalapium 278                   | Ichæmon Lob. 8                   |         |
| is 46 b. 47. botrioides 42 b.  | Hippophæ 293. Diofc. Col.      | Jalave fructus 407 b           | Ichas alter Cluf. 292 b          |         |
| 43. Campan. flore 44 b.        | 477 b. Anguil. 478 b           | Jambolones 460 b               | Icophyllon Cord. 278             |         |
| Colchici folio 47 b. como-     | Hippophaestum 189. Col. 387    | Jambos 441                     | Icoryum Dioscor. Col. 144.       |         |
| fus 42                         | Lugd. 478 b                    | Jangomas 444 b                 | Marth. 145 b. Cæfal. 343 b.      |         |
| Hyacinthus flore oblongo 43    | Hippoglossum Lugd. 303 b       | Japatri 407                    | Gefn. 327                        |         |
| b. 44. obsoleto 44. Indicus    | Marth. 304 b                   | Jasme montana Lugd. 284        | Iva moschata Tabern. 138 b.      |         |
| 47. latifolius 46 b            | Hippolapathum Marth. 114 b.    | Jasminum ejusq; species 397.   | Monspeliens. 249. Rhæ-           |         |
| Hyacinthus non scriptus e-     | Lob. 115 b                     | rubrum Cæf. 168 b              | torum 132 b                      |         |
| jusq; species 43. 44           | Hippomanes Cratæv Ang.         | Javanos fructus 407 b          | Jucca Benzoni 51                 |         |
| Hyacinthus Orientalis ejusq;   | 168                            | Iberis ejusque species 97      | Juglans 417                      |         |
| species 44 b. flore pleno 45   | Hippomarathrum Cam. 147        | Idæa ficus Lug. 451. radix Di- | Jujubæ ejusque species 44. 46.   |         |
| b. ferotinus 45. Ornitho-      | a. Belli b. Franco 158 b. Ta-  | oscor. 470 b                   | tylv. Cæf. 478 b                 |         |
| galoides Col. 70 b             | bern. 162 b                    | Ignamie 90. 91                 | Juliola Scalig. 330 b            |         |
| Hyacinthus Peruanus 47 b de    | Hippofelinum Theoph. 154 a.    | Ilaturum Cæf. 476 b            | Juncaria Tab. 334                |         |
| padre nostro 69 b. poëta-      | Dod. Fuch. Lob. b. Lugd.       | Illex ejusque species 424      | Juncellus Ad. 112 b              |         |
| rum Lob. 38. 39. Lobel. 40.    | 158 b                          | Illecebra major Lob. 283       | Juncus avellana Ama. 14 b.       |         |
| Trag. 77 b. racemosus 42 b     | Hippuris Lob. 15. Saxea Cluf.  | Impatiens herba Dod. 307       | odor. aquat. Dod. 163            |         |
| Hyacinthij stellaris species   | 365 b                          | Imperatoria ejusq; species 156 | Juncus & ejus species 11. a-     |         |
| 45 b. Tripolitanus 45. Vir-    | Hirculus 165. Friscus 466      | Impia Plinij 263               | cutus 11 b. asper Dod. 20 b.     |         |
| gilij 31. uvarumola 42 b       | Hirundinaria Tab. 309 b        | Incenfaria Camer. 136. Cæf.    | bombycinus 12 b. Lob. 4          |         |
| Hiberis Fuch. 104              | Hirundinaria Trag. 303         | 266                            | b. capitulis equiseti ibid.      |         |
| Hydrolapathum Lob. 116 b       | Hyslopifolia 218 b             | Inceasum 500 b                 | capitulo lanuginoso ibid.        |         |
| Hydropiper ejusque species     | Hyslopoides Cam. ibid. Gef-    | Indiamos fructus 407           | clavatus ibid. cyperoides        |         |
| 101. lanceolatum Lugdun.       | neri 465 b                     | Indicum officin. 113           | ibid. floridus ibid.             |         |
| 180 b. rubeum Fuch. 195 b.     | Hysopus ejusq; species 217.    | Indorum ferruminatrix 458 b    | Juncus lævis 12. lychnanthe-     |         |
| Lugdun. 321                    | campestris 465. Diof. 223 b    | Inguinaria Plinij 335 b        | mos 7. 12. maritimus grami-      |         |
|                                |                                |                                | neus                             |         |

|                               |                               |                               |        |                                |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|
| neus 4 b. maritimus 6 b.      | Lagopus ejusq; species 328 b. | alterum Cæf.                  | 143 b  | 452 b. aromat. Monard.         |
| melanocranis 12 b. odora-     | Diofc. 321. 328 b. ptimus     | Leontopodium Lon.             | 254 b. | 409 b. Brasilium 393           |
| tus 11. rotundus ibid.        | Trag. 332. alter Trag. 263 b  | Diofc. 264. Brunfels. 319.    |        | Lignum Calamba ibid. de        |
| Juncus petrosus, Ang.         | Lamium ejusque species 230.   | Creticum 190. vulgare         |        | Cochi 449. cortis vicem        |
| Junipappaeyma 366             | annonicum Cluf. 236           | Marth.                        | 263 b  | præbens 424 b. colubri-        |
| Juniperus ejusq; species 488. | Lampfana Matth. 95. Lob. 125  | Lepidium ejusque species 297. |        | num ejusque species 301.       |
| major Diofc.                  | Lanaria Imper. 206 b          | Diofc. quibus; 226 b. minus   |        | exoticum; Cluf. 489 b. exo-    |
| Juniperi gummi 500 b          | Lancea fructus 444            | Cord.                         | 104    | ric. alt. Cluf. 393 b          |
| Junfel Avicen.                | Lancea Christi Gef. 230. Cæ-  | Leplab Clusij                 | 341    | Lignum ferri duritie 449. for- |
| Junfa 346 b                   | salpin. 354                   | Terchenblumen/ Gef. 242 b     |        | mitis vicem præbens 424 b      |
| Juvvb Cluf.                   | Lanceola Cæf. 89 b. monta-    | Leucacantha Ang. 377. Dod.    |        | Lignum Guajacum ejusque        |
| Ixia 379                      | na Gef. 90                    | 380. Lac. 381. Lugd. 382 b.   |        | species 448                    |
| Ixione Theophr.               | Lancus 35                     | quorundam Lugd. 387 b         |        | Lignum de Mangles 449 Mo-      |
| Ixocaulos Thal. 205 b. alte-  | Lanifera arbor Cluf. 430 b    | Leucanthemum alpin. 136 b     |        | lucense 393 b. nephriti-       |
| ra Thal.                      | Lantana Dod. 419              | Leucas Cæf. 231. Diofc. 327   |        | cum 416 b                      |
| Ixopus Cordi 130.             | Lantor 19. 509 b              | Leucographis Plinij Ang. 268  |        | Lignum odoratum Cæf. 392.      |
|                               | Lapathum ejusq; species 113.  | Lugd.                         | 381 b  | rubrum Cæfalp. 393. Para-      |
|                               | Ægyptiacum 116. aquati-       | Leucoium aizoides Col. 284    |        | num ibid. b. Rhodium 392.      |
|                               | cum ibid. b                   | b. bulbosum ejusq; species    |        | Belli 399                      |
| K.                            | Lapathum sylv. larifolium     | 55. non bulbosi species 200   |        | Lignum Sambarane 393 b.        |
| Kaavy porus 25                | ejusq; species 115 b. folio   | Leucoium corniculat. 202 b.   |        | Sanctum 448 b. S. Crucis       |
| Kaate arbor 410 b             | acuto 115                     | Creticum ejusque species      |        | 423. Sapo. 393 b. Teixo        |
| Kaye Baka 464 b               | Lapides resinacei 504 b       | 201 b. luteum ejusque spe-    |        | 449                            |
| Katschu openauk 91 b          | Lappa ejusque species 198. a- | cies ibid. alyssoides ibid.   |        | Lignapetre facta diversa 421   |
| Kali ejusq; species 289. ter- | gestis Trag. 152. boaria      | maritimum 201. montan.        |        | Ligusticum ejusque species     |
| rium Alpini 191 b             | Lugd. 153. syl. Tragi 168 b   | 107 b. Syriacum 202 b         |        | 162. Ang. 156 b. Belgarum      |
| Keiri 202 b                   | Lappago 334. Plinij 250. Cæ-  | Leuconarcissiflorion 55       |        | Lob. 161. Matth. 157 a. vul-   |
| Zäpferlin 242 b               | falp. 333 b                   | Leuconarcissus æstivus 51 b   |        | gare 157 b. sylv. 161          |
| Kermia 316 b                  | Lappula canaria 152 b. multi- | Levisticum Lob. 157           |        | Ligustrum ejusq; species 475.  |
| Kionna Diofc.                 | corum Lugd. 257 b             | Libanotis ejusque species 1b. |        | Brunfels. 447 b. nigrum        |
| Kikaion S. Jonæ 432           | Larix 492 b                   | coronaria 217. nigra Thal.    |        | 476. Columellæ 295. ori-       |
| Klismen 402 b                 | Laferpitium ejusque species   | 150 a. Taber. 150 b. Theo-    |        | entale 398                     |
| Klapmussen 365 b              | 156. Lac. 155. Anguil. 158 b  | phrast. Sterilis Tab. 123 b   |        | Lilac Matth. ibid.             |
| Xreugbeer 428 b               | Lara fructus 439 b            | Libanotis ferulæ facie ejusq; |        | Iliago Cord. 29. Cæfalpin.     |
| Koavvel Tragi 281.            | Lathyrus ejusq; species 293   | species 158                   |        | 80 a. b                        |
|                               | Lathyrus ejusq; species 343   | Libyiticum Fuch. ibid.        |        | Lilialphodelus Cluf. 83        |
| L.                            | Lavandou 35 b                 | Lichen ejusque species 362.   |        | Lilionarcissus ejusq; species  |
| Ablab Alpini 341              | Lavandula ejusq; species 216  | Diofc. Col. 361 b. arborum    |        | 56. 57. orientalis 55          |
| Labrum veneris ejusque        | Lavandulæ folio arbor Cluf.   | Tab. ibid. marinus 458 b.     |        | Lilium album ejusq; species    |
| species 385                   | 401 b                         | marinus Cluf. 364. Plinij     |        | 76. Alexandr. 69 b. alphi-     |
| Labrusca 299                  | Laver Dod. 104 b. Fuch. Dod.  | Col.                          |        | deli radice 80. marinum        |
| Laburnum 391                  | Lob. 154. minus Lon. 163      | Lichen primum Plinij 285      |        | 54 b                           |
| Lacara Theoph.                | Laureola ejusq; species 462   | Lychnis ejusque species 203.  |        | Lilium bulbiferum ejusque      |
| Lacca 499                     | Laurus ejusque species 460.   | Chalcedonica Lob. b. coc-     |        | species 77. Canadense 79.      |
| Lac arborum 496 b. lunæ       | Græca Plinij Gef. 416         | cinea ib. marina Lob. 205     |        | faunû 80 b. floribus reflexis  |
| Gefa. 375 b                   | Laurus Alexandrina 303 b. ta- | Lychnis coronaria ejusq; spe- |        | 77 b. Persicum 79 b. po-       |
| Lachryma Christi 218. Jobi    | xa Plinij 305                 | cies 203 b. aquatica 204.     |        | lyrrhizon 29                   |
| ibid. Joppi 401 b             | Laurocerasus 450 b            | multiplex ibid.               |        | Lilium purpureo croceum e-     |
| Laftaris Plinij 129 b         | Lechyas fructus 444           | Lychn. alpina species 206 b.  |        | jusq; species 76 b. rubrum     |
| Laftariola Cæf.               | Ledum ejusque species 467.    | hirsuta species 206. sege-    |        | 77. variegatum 64. Zufi-       |
| Lactuca ejusque species 122.  | alpinum 468. Silefiacum       | cies 205. viscosa species     |        | nare 78                        |
| sylv. ejusque species 123 b   | 467 b                         | ibid.                         |        | Lilium convallium 304. ve-     |
| Lactuca agnina Tab. 165 b.    | Legumina 337. capreolis do-   | Lycinum ejusq; species 478.   |        | rum Theoph. ibid.              |
| leporina Apuleij Ang. 128.    | nata ibid. carentia 346       | Creticum Belli 454 b          |        | Limas 426 b                    |
| Trag. ib. murorum Cæf.        | Legumen leoninum Ruel. 89     | Licondo 513                   |        | Limeum Guil. 186 b. Plin. 184  |
| petræa Cretica 93. 124 b      | Lemna Theoph. Lugd. 362       | Lycopericum 167               |        | Limnæum Cord. 279              |
| Lactuca marina Tab. 360       | Leus ejusque species 346. ma- | Lycopodium Tab. 360 b.        |        | Limnopeuce Cord. 16            |
| Lactucella repens Cam. 262 b  | jor repens Tab. 530           | Lycopis ejusque species 255.  |        | Limoderum Austriac. Cluf.      |
| Ladanum 467                   | Lentago 461 b                 | Ang. 230. Cord. 254. Fuch.    |        | 86 b. Dod. 87                  |
| Ladanum segetum Plin. Lug-    | Lentibularia Gef. 141 b       | 257. Anglica 256              |        | Limones ejusq; species 436     |
| dun. 233 b                    | Lenticula marina Lobel. 365.  | Lycopus Fuch. 230             |        | Limonium ejusq; species 192    |
| Lagenula Americanæ 313        | palustris ejusq; species 362  | Lycostaphylon Cord. 456 b     |        | Monspeliensium 165. Lon.       |
| Lagochimica 272 b             | Lentiscus ejusque species 399 | Lignum Aloës 393. America-    |        | 191. Gef. 192. aliud Lugd.     |
| Lagochimillia Bellon. 264     | Leo herba 87. Dod. 379 b      | num varium 392. aquili-       |        | 268. pratense Trag. 327        |
| Lagochymeni Bellon. 146 b     | Leontobotanos Gef. 87         | num 393. aquila Amato         |        | Limus arborum 444 b            |
| Lagopyron Hipp. Gef. 263 b.   | Leontopetalon Matth. 324.     |                               |        | Linagroftis 4 b                |
| Adversar. 328 b               |                               |                               |        | Lioa-                          |
| Lagopodium Tab. 333           |                               |                               |        | Xxx                            |



# I N D E X.

**Melope-**



|   |                                 |  |   |
|---|---------------------------------|--|---|
| Melopepo ejusq; species 312.                            | Mippi 458 b                     | Muscari 43   | Ionicum Lob. 109. hyper-                                |
| Lon. 310. Galeni Cæf. ibid.                             | Mirabilis Peruviana 168 b       | Muscipula 205 b. 206                                 | num Thalij 99. hortense                                 |
| Melothron 297. Theoph. 167                              | Mira sole Italij 432            | Muscus arboreus 361. coral-                          | 103. Indicum 306. mariti-                               |
| Melospinus 168  | Myrica ejusque species 484.     | linus, Tab. ibid. fœnicula-                          | um Lugd. 99 b. montan-                                  |
| Melt 20   | marina Clusf. 365 b             | ceus ibid. b   | um 104 b  |
| Melroscidum 496 b                                       | Myriophyllum aquatic. 141.      | Muscus maritim. ejusq; spe-                          | Nasturtium palustre Gef. 99.                            |
| Memecylon 460   | pelagium Clusf. 363 b           | cies 363. 364  | pratenfe 104. sylvest. Tha-                             |
| Mentianthes palust. Lugd. 327                           | Myrobalanus ejusq; species 445. | Muscus pulmonarius 361 b.                            | lij 105 b   |
| Mentha fativa ejusq; species 226. aquatica 227 b. cata- | nij 419. Trogloditis Plin. 402  | pyxioides 361. quernus Co-                           | Nasturtium Gef. 105                                     |
| taria Lobel. 228 b. corym-                              | Myrrha 501 b. Aminea 499        | lum. 361 b. ramosus 361 a. b.                        | Natrix Plinij Aug. 222 b. Lo-                           |
| bifera Cord. 226 b. corym-                              | Myrrhis ejusque species 160.    | scoparius, Lob. 361                                  | bel. 389 b  |
| bifera minor Cord. 227. lu-                             | cicutaria 161. lappa Lug-       | Muscus saxatilis ejusque spe-                        | Negundo 412 b   |
| tea 266. Sarracenia Lug-                                | dun. 152 b                      | cies 362. stellaris roseus 361                       | Nenuphar 193  |
| dun. 98 b   | Myrrhida Plinij Lob. 319        | Muscus terrestris ejusq; spe-                        | Neotria Dod. 86 b                                       |
| Mentha sylv. ejusque species 227                        | Myrtacantha 470 b               | cies 360. capillaris Dodon. 356 b.                   | Nepa Theophr. Lob. 394                                  |
| Mentastrum ibid. b. Brunf. 229 b                        | Myrtidæum 469 b                 | clavatus 360 b. cor-                                 | Nepeta agrestis Cord. 228.                              |
| Mentula marina Rond. 369                                | Myrtillus ejusq; species 470    | niculatus 358 b. denticula-                          | Trag. 219 b. aquatica Tra-                              |
| Mercurialis ejusque species 121. montana 122. sylv. se- | Myrtocistus 468                 | tus 369. filicinus ibid. Ro-                         | gi 227. fruticosa Cord. 228.                            |
| cund. Trag. 306 b                                       | Myrtomelis Gef. 452 b           | vidus 206 b. in parietibus                           | minor Cam. ibid. b. mon-                                |
| Mesereum German. 462                                    | Myrtus ejusque species 468.     | Cæsalp. saxatilis aut sylv.                          | tana Cord. 229. vulgaris                                |
| Mespilus ejusque species 453.                           | Brabantica 441 b. Indica 469 b. | Tragi 356  | Trag. 228   |
| anchedon 452 b. Aronia 453 b. sylv. 454 b               | ligustrifolio 475 b.            | Musco similis ad pisces capi-                        | Nepetella Eyst. ibid. b                                 |
| Messe Avicæ. 413 b                                      | nemoralis 414 b. sylv. 470 b.   | endos 360 b  | Nerion ejusq; species 464. al-                          |
| Meraguelunox 439 b                                      | b. tenuifolia Thal. 471 b       | Mutellina Gef. 148 b                                 | pinum Gef. 468 b  |
| Metallum Italorum 452                                   | Myrticoccus 469 b. excre-       | Mux 507 b.   | Nicotiana ejusq; species 169                            |
| Meum ejusq; species 148. a-                             | mentum ibid.                    | N.   | Nidus avis 86 b   |
| quaticum Gef. 141 b                                     | Michridatum cratevæ Cæ-         | Nabea Alpini 477 b                                   | Nigella ejusque species 145.                            |
| Mezereon Arab. 462                                      | salp. 87                        | Nachani 99 b   | Brunf. 204 b  |
| Myacaorthos Theophr. Lug-                               | Miuros Aëtij Ang. 206 b         | Nanas Theveti 384                                    | Nigellastrum Dod. ibid.                                 |
| dun. 387  | Myxus 446. alba 416             | Napeca Belli 477                                     | Nil Avicennæ Frago. 113. A-                             |
| Myagræm ejusq; species 109.                             | Mochus Cæf. 344. Dod. 346       | Napellus ejusq; species 183 b.                       | rabum Gef. 295  |
| Taber. 204 b. alterum mi-                               | Mogori 470                      | Napellus ejusq; species 183 b.                       | Nimbo 416 b   |
| nus Lugd. 334   | Moly ejusq; species 75. alte-   | Napus ejusque species 95                             | Nimphæa ejusq; species 193                              |
| Mignol perio 507  | rum Plinij 29 b. monta-         | Narcissoleucosium 55 b                               | Nocceus herba 14  |
| Milax arbor 505. lye Acyla-                             | num 75. moschatum ib. b         | Narcissifolium 63 b                                  | Nodularia 366 b   |
| ca Bellon. 425 b  | Moly Homeri Guil. 512 b         | Narcissus ejusque species 48.                        | Noli me tangere Gef. 307                                |
| Miliaria herba 8 b                                      | Molybdæna Plinij Ang. 97 b      | Africanus 49 b. 50 b. albus 49 b.                    | Nozilicha Lob. 67                                       |
| Milie Abrayn 22 b. 25                                   | Palech. 386 b. Plinij forte 192 | aquaticus 51. d'Argi-                                | Nuchani 23 b  |
| Milium ejusq; species 26. æ-                            | Molvza Hipp. 74                 | ers 51. autumnalis 51. 69 b                          | Nuchti 458  |
| thiopicum ibid. b. agreste 27. alterum Theophr. 28.     | Mollie Clusf. 399               | Narcissus calice oblongo 53.                         | Nummularia ejusque species 309. sylv. Gef. 352          |
| caprearum 307. Indicum 24. 25 b. 26                     | Mollugo ejusq; species 334      | calice magno & parvo 51 b                            | Nux juglans ejusque species 417. barbata Plinij 418 b   |
| Milium syl. Taber. 234 b. fo-                           | Molluca nux 417                 | magno & oblongo 52. can-                             | Nux moschata ejusq; species 407. Bandensis ibid. Indica |
| lis 258   | Molochia Serapion. 252          | didus 46. caruleus 45. 49.                           | Matth. 507. de Coulcoul                                 |
| Militaris Galeni 129 b                                  | Molon Plinij 163 b              | Constantinopol. 63 b                                 | 510 b   |
| Millefolium ejusque species 140. aquaticum 141. no-     | Moloca 229 b                    | Narcissus Diosc. 49. flore ple-                      | Nux insana 444. metella Mat-                            |
| bile 132  | Momordica 306                   | no 53 b. Indicus 49. junce-                          | thiol 168. officinar. 511 b.                            |
| Millefolium aquaticum cor-                              | Monococcon frament. 216         | folius 51. latifolius 49 b. lu-                      | purgatrix 418 b. vellearia                              |
| nutum majus 141. minus 520 b                            | Monophyllum 304                 | teus totus 50 b                                      | 401 b. vomica officio. 511                              |
| Millegrana 281 b  | Monorchis Gefu. 84              | Narcissus maritimus 54 b.                            | Nuces exoticæ ibid.                                     |
| Millemorbia 235 b                                       | Morabati 479. terrestria 326    | Martius 55. medio luteo 50                           | Nucula terrestris 162                                   |
| Millepora Imper. 367                                    | Moracia nux 417                 | orientalis 49 b                                      | Nucula Indica 510                                       |
| Millo 26  | Morgiani 480 b                  | Narcissus Persicus 69 b. por-                        | Nuciperfusa 440 b.                                      |
| Milzarella 231  | Moringa 399                     | raceo latifolio 48. angu-                            |   |
| Mimulus Plinij 163 b                                    | Morochen 25 b                   | sfolio 51. quartus Matth. 70 b                       |   |
| Myofotis Lob. 254 a. b. par-                            | Morsus gallinæ 250. 251. dia-   | Nardus 13. agrestis 164. cel-                        |   |
| va 108 b  | boli 269. ranæ 193              | tica 165. celtica altera 185.                        |   |
| Myofuros 190 b  | Morus ejusq; species 459        | Italica 216. montana 165.                            |   |
|   | Moschatella Cordi 178 b. ex-    | sylv. 197  |   |
|   | rulea 221 b                     | Narthecia Theophr. 148 b                             |   |
|   | Mumeiz Arabum 459 b             | Nascaptrum 452                                       |   |
|   | Mungo 413 b. similis 412 b      | Nastos 17 b  |   |
|   | Murra 468                       | Nasturtium ejusque species 103. aquaticum 104. Baby- |   |
|   | Musa 507 b                      |  |   |

# I N D E X.

|                                      |            |  |          |                                    |          |  |            |
|--------------------------------------|------------|--|----------|------------------------------------|----------|--|------------|
| <i>Ocymoides alpinum</i> Gefue.      | 205 b.     | <i>Opopanax</i>                        | 494 b.   | <i>Opismunda</i> Lob. 358. Trag.   | 345      | <i>fera Thevero</i>                    | 507        |
| <i>205 b. fruticosum</i> Camer       |            | <i>Opopanax</i>                        | 494 b.   | <i>Opismunda</i> Lou.              | 358      | <i>Palmapinus</i>                      | 510 b.     |
| <i>205. lychnitis</i> Col. 206 b.    |            | <i>Opulus</i> Colum. Dod.              | 447 b.   | <i>Opoffa</i> Belli                | 116      | <i>Palmæ faule similis</i>             | 448 b.     |
| <i>minus seu album</i> Lug. 205.     |            | <i>campestr.</i> 431 b. montana        |          | <i>Opoffa</i> Lon.                 | 447 b.   | <i>Palmaria</i> Tab.                   | 285 b.     |
| <i>musculosus</i> Poen. 206 b. no-   |            | <i>Lugd.</i> 431. Ruellij              | 456 b.   | <i>Osteocollon</i> Lugd. 15 b. Ca- |          | <i>Palmeta humilia</i> Scalig.         | 19         |
| <i>ctiflorum</i> Cam. 205. pere-     |            | <i>Opuocia</i> 458. marina Corufi.     |          | <i>mer.</i>                        | 209 b.   | <i>Palmifolium giganteum</i> Im-       |            |
| <i>grinum</i> Gef. 203. polygon-     |            | <i>364 a. Osteocollos</i> 458 b.       |          | <i>Otericium montanum</i> Tra-     |          | <i>per.</i>                            | 364 b.     |
| <i>folio</i> Lobel. 206 b. repens    |            | <i>Ostrea in arboribus</i> 514 b.      |          | <i>gissæ. sylv.</i> Trag.          | 155 b.   | <i>Palmiras</i> 507 b. femellæ 509 b.  |            |
| <i>Cam.</i>                          |            | <i>Orbitochyro</i> Belli               | 330      | <i>Ostrucium</i> Lon.              | 155      | <i>Palmula marina</i> Imper.           | 363        |
| <i>Ocimum ejusque species</i> 225.   |            | <i>Orchis ejusque species</i> 81. ab-  |          | <i>Ostrva</i> Cord. 427. Theophr.  |          | <i>Pannula Thebaica</i>                | 403 b.     |
| <i>syly.</i>                         | ibid.      | <i>ertiva</i> Cluf. 86 b. andrach-     |          | <i>Ostrys</i> Theophr.             | 415      | <i>Palo d'Agula</i> Linfc. 394. del    |            |
| <i>Ocymum cereale</i>                | 27 b.      | <i>nicis</i> 83. 84. angustifolia      |          | <i>Othonna</i> Lob.                | 132 b.   | <i>cebra</i>                           | 30         |
| <i>Ocosolt</i>                       | 502 b.     | <i>Fuchfij</i> 82. antropophora        |          | <i>Orites</i> Tab.                 | 206      | <i>Palto arbor</i>                     | 439 b.     |
| <i>Ocularia</i>                      | 233 b.     | <i>Col.</i> 82 b. bifolia 82. Cam.     |          | <i>Ova olearum</i>                 | 472      | <i>Paludapium</i> Tab.                 | 154        |
| <i>Oculus bovis</i> Brunf.           | 261        | <i>83. trifolia</i>                    | ibid.    | <i>Ovaria</i> Gef.                 | 226 b.   | <i>Palus Indiæ</i>                     | 448        |
| <i>Oculus Christi</i> Lugd.          | 266        | <i>Orchis foetida ejusque species</i>  |          | <i>Ouludia</i> Lugd.               | 57       | <i>Panax ejusque species</i> 156. a-   |            |
| <i>Odontis</i> Cam.                  | 205 b.     | <i>82 b. fucum referens</i> 83. la-    |          | <i>Ouararia</i>                    | 184 b.   | <i>telepias</i> 158. chironium         |            |
| <i>Odontitis</i> Gef. 210. Tab. 234. |            | <i>tifolia</i> 80. lutea 83. 84. me-   |          | <i>Oxyagroftis</i>                 | 7        | <i>Theoph. Ang.</i> 176. Camer.        |            |
| <i>lutea</i> Lugd.                   | 277 b.     | <i>littias</i> Lobel. 83 b. mon-       |          | <i>Oxalis ejusque species</i>      | 114      | <i>156 b. Marth.</i> 465. Tab. 266.    |            |
| <i>Oenanthe ejusque species</i> 162. |            | <i>tana</i>                            | 86 b.    | <i>Oxya Bellon.</i>                | 419      | <i>Lugd.</i> 156. 278. Lon. ibid. b.   |            |
| <i>fructus</i>                       | 299 b.     | <i>Orchis morio ejusque species</i>    |          | <i>Oxyacantha</i>                  | 454      | <i>chironium minus</i> Camer.          |            |
| <i>Oenopia</i>                       | 477        | <i>81 b. muscam referens</i> 83.       |          | <i>Oyacanthus</i> Galeni           | ibid. b. | <i>Panax costinum</i> Tab.             | 156 b.     |
| <i>Oenothera</i> Plinij              | 245 b.     | <i>minor odoratus</i> 86 b. odo-       |          | <i>Oxyarcentis</i>                 | 489 b.   | <i>Panax Herculeum</i> Marth. 156      |            |
| <i>Oefum</i> Theoph.                 | 473        | <i>rara</i> 84. ornithophora Lo-       |          | <i>Oxycedrus</i> Lob. 487. Theo-   |          | <i>b. Ang.</i> 319 b. Cæf.             | 156        |
| <i>Oetum</i> Plinij                  | 90         | <i>bel.</i>                            | 83. 84.  | <i>phraft.</i>                     | 489      | <i>Panax peregrinum</i> Dod. ib.       |            |
| <i>Ogegha</i>                        | 444        | <i>Orchis palmata ejusque species</i>  |          | <i>Oxycocon</i> Cordi              | 471 b.   | <i>Pharnacium</i> Plinij 268. re-      |            |
| <i>Okaponauk</i>                     | 91         | <i>85. repens</i> 84 b. rotunda        |          | <i>Oxycapathum</i> 115. aquat.     | 193      | <i>centiorum olufatri</i> Lobel.       |            |
| <i>Okundiger</i>                     | 340        | <i>Lugd.</i>                           | 81 b.    | <i>Oxymirline</i> Ang.             | 470 b.   | <i>156. Syriacum</i> ibid. tenui-      |            |
| <i>Olea ejusque species</i> 471. Æ-  |            | <i>Orchis Serapias ejusque species</i> |          | <i>Oxyphrenicum</i>                | 403      | <i>folium</i> Theoph.                  | 278        |
| <i>thiopica</i> Cordi 392. Bohe-     |            | <i>82. sphagodes</i> 83. stratea-      |          | <i>Oxys Plinij</i>                 | 330      | <i>Pancratium</i> Gef. 42. 43. Do-     |            |
| <i>mica</i>                          | 472 b.     | <i>matica</i>                          | 81       | <i>Oxyschenos</i>                  | 10 b.    | <i>don. Lob.</i> 54 b. Diof. Cluf.     |            |
| <i>Oleander</i> 464. syl. Avic.      | 463        | <i>Orailion</i> Ang.                   | 161      | <i>Oxytriphylion</i> Lobel. 332 b. |          | <i>73. Cæf.</i> 75. Indicum            | 55         |
| <i>Oleaster</i> 472 b. Germanicus    |            | <i>Oregioella</i> Cluf.                | 406      | <i>Trag.</i>                       | 330 b.   | <i>Pancafeolus</i> Cæf.                | 162 b.     |
| <i>477 b.</i>                        |            | <i>Oreofelinum</i> Tab. 150. Ang.      |          |                                    |          | <i>Panicaftrella</i> Cæf.              | 8 b.       |
| <i>Oleum abiegnum</i> 505 b. sty-    |            | <i>152. Fuch.</i> 153. Dod. Lobel.     |          |                                    |          | <i>Panicum ejusque species</i> 27.     |            |
| <i>racinum</i>                       | 502 b.     | <i>Tabern.</i>                         | ibid b.  |                                    |          | <i>Æthiopicum</i> ibid. b. Indi-       |            |
| <i>Olibanum</i>                      | 500 b. 501 | <i>Origanum ejusque species</i> 223.   |          |                                    |          | <i>cum</i> 26. 27. peregrinum 25-      |            |
| <i>Olyra</i> Ad. 22. Cord.           | 23         | <i>terrium</i> Diof. Quad. 221 b.      |          |                                    |          | <i>syly.</i>                           | 8 a. b.    |
| <i>Olifenichium</i> Cord.            | 153 b.     | <i>verricillatum</i> Thal. 225         |          |                                    |          | <i>Panis cuculi</i> 330 b. porcineus   |            |
| <i>Olufatrum</i> Cæf.                | 154 b.     | <i>Oryza</i> 24. Germanica 22 b.       |          |                                    |          | <i>308. Indorum</i>                    | 90 b. 91   |
| <i>Olus Hispanicum</i> Trag. 114 b.  |            | <i>syly.</i>                           | 2        |                                    |          | <i>Pannachio Perfiano</i>              | 80         |
| <i>Olus Judaicum</i> Avicen. Rau-    |            | <i>Ornithogalum ejusque species</i>    |          |                                    |          | <i>Pannus è libro</i>                  | 19 b.      |
| <i>wolf.</i>                         | 317        | <i>69. Arabicum</i> 70. luteum         |          |                                    |          | <i>Pao de Cebra</i>                    | 301        |
| <i>Omphalocarpus</i> Plinij 332      |            | <i>ejusque species</i> 71. spica-      |          |                                    |          | <i>Papaje fructus</i>                  | 457 b.     |
| <i>Onagra</i> Cæf.                   | 245 a. b.  | <i>tum</i>                             | 70       |                                    |          | <i>Papas Indorum</i>                   | 167        |
| <i>Onobletum</i> Hipp.               | 285        | <i>Ornithopodium ejusque spe-</i>      |          |                                    |          | <i>Papaver ejusque species</i> 170 b.  |            |
| <i>Onobrychis arvensis</i> ejusque   |            | <i>cies</i> 350. alt. Dod.             | 349 b.   |                                    |          | <i>cristatum</i> 171. erraticum        |            |
| <i>species</i> 215. leguminosæ e-    |            | <i>Crnoglossum</i>                     | 416      |                                    |          | <i>ibid. b. Heracleum</i> Colum.       |            |
| <i>jusque species</i> 350. Fra-      |            | <i>Ornas</i> 415 b. Bellon. 416 b.     |          |                                    |          | <i>273 b. spinolium</i> 171 b. spu-    |            |
| <i>caf.</i>                          | 352        | <i>Pandect.</i> 419 b. Tragi 417       |          |                                    |          | <i>nium</i> Lob. 205. Cæf. 273         |            |
| <i>Onocles</i>                       | 255 b.     | <i>Orbranche ejusque species</i>       |          |                                    |          | <i>b. Diof.</i> quorundam 279.         |            |
| <i>Onogyres</i> Nicandri Gef. 382    |            | <i>87. Geln.</i> 86 b. Ruellij 295.    |          |                                    |          | <i>G. fn.</i>                          | 291 b.     |
| <i>Oonis ejusque species</i> 389     |            | <i>Theophr.</i> 294 b. legumen         |          |                                    |          | <i>Paperas</i>                         | 19         |
| <i>Onoperdon</i> Dod. 382 b. Ger.    |            | <i>Lugd.</i>                           | 345 b.   |                                    |          | <i>Papyrus ejusque species</i> ibid.   |            |
| <i>385 b. Lugd.</i>                  | 382 b.     | <i>Orobis ejusque species</i> 346.     |          |                                    |          | <i>Papillaris</i> Cam.                 | 125        |
| <i>Onopoxis rectia</i> Lugd. 382 b   |            | <i>Americanus</i>                      | 344 b.   |                                    |          | <i>Papulles</i> Cretica                | 343 b.     |
| <i>Dodon.</i>                        | 385        | <i>Orobis sylv. ejusque species</i>    |          |                                    |          | <i>Paquovere</i>                       | 508        |
| <i>Onopteris</i> Tab.                | 355 b.     | <i>351. sylv.</i> Trag.                | 345      |                                    |          | <i>Palaeocalon</i> Guiland.            | 168        |
| <i>Onofma</i> Marth.                 | 255        | <i>Orentium</i> Dod.                   | 212      |                                    |          | <i>Paralytica</i>                      | 421 b. 242 |
| <i>Ophioglossum ejusque spe-</i>     |            | <i>Ovala</i> Dod.                      | 238      |                                    |          | <i>Parapara</i> 184 b. Cluf.           | 341 b.     |
| <i>cies</i>                          | 354        | <i>Orzada</i> Monard.                  | 25 b.    |                                    |          | <i>Paravas</i>                         | 123 b.     |
| <i>Ophioscorodon</i>                 | 74         | <i>Otamener</i>                        | 421      |                                    |          | <i>Parietaria</i> 121. Monspel. 230 b. |            |
| <i>Ophris ejusque species</i>        | 87         | <i>Osyris</i> Dod. 212. Lob. ibid. b.  |          |                                    |          | <i>syly.</i>                           | 234        |
| <i>Ophthalmica</i>                   | 233 b.     | <i>Austriaca</i> Cluf. 213. minor      |          |                                    |          | <i>Parifarico</i>                      | 469 b.     |
| <i>Opinavik</i>                      | 91         | <i>Tab.</i>                            | ibid. b. |                                    |          | <i>Paronychia</i> Ang. Tab. 281 b.     |            |
| <i>Opium</i>                         | 494 b.     | <i>Osleonis</i> Cæf.                   | 211. 212 |                                    |          | <i>altera,</i>                         |            |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| altera Matth. 282. alfinefolia Lob. 108 b. Hispanica Clus. 281 b. myagrifolia Gess. 109           | Perfoliata Achillea Gess. 278  | Phyllon Lugdun. 284 b. 285  | Pyra infana Cæf. 167 b  |
| Paronychia Matth. 156. lacinia 285. rutaceo folio Lob. 108 b. 109                                 | Perlaro gramen secundum Bellon. 415 b  | Theoph. Cord. 121   | Pyraea Theoph. Guil. 486  |
| Parot Mexioc. 118. 520 b  | Permonaria Ang. 360 b  | Phyllon spicatum & testiculatum 122   | Pyrafter 439. Idæus Gess. 451 b   |
| Parthenium ejusq; species 133   | Perpenia Dod. 197  | Phyteuma Cæf. 92. Matth. 93.  | Pyrethrum ejusq; species 148  |
| Trag. 135. nobile Gess. 135   | Persea Clus. 441. forte Plinij 512   | Belli 212. Montpel. 100 b.  | Brunf. 98. syl. Dod. ibid. b.   |
| Passerina Trag. 259. minor saxatilis 214 b  | Persea ejusque species 440   | Diof. Colum. 270 b. minor Col. 271  | alpinum Gess. 136 b   |
| Pastilla Corinthiacæ 229  | nux 417. minor 442 b   | Phyloxylon 507 b  | Pyrola ejusque species 191  |
| Pastellus herba Lincf. 113 b  | Perficaria ejusque species 101   | Philomitis Lobel. 241. phlo-mos 239. 240  | Pyrum marinum Ald. 369  |
| Pastinaca ejusque species 151.  | filiquosa Lob. 307   | Phileon & Phleos Theop. 194   | Pyrus ejusq; species 438  |
| aquatica Lob. 154. latifolia 155. latifolia syl. Dod. ibid. b                                     | Perfonata Plinij 197. 198  | Phleos mas Lugd. 194. fæmina Lugd. 15   | Pisa nuda Indica 399 b  |
| marina Lob. 288 b. nigra syl. Cord. 162 b. pratensis Theoph. Cord. ib. b. Syriaca Lugd. 155 b     | Peruana Aloës facie 423 b  | Phlox Theoph. 178. 203 b  | Pitum ejusq; species 342. cordatum Lobel. 343. Græcorum Trag. ibid. nigrum Cam. 338 b. Tab. 343. syl. Trag. 344 |
| Patecas 311 b   | Pervinca Trag. 301   | Phœnicobalanus 445 b  | Pisum Americanum Lugd. 343 b. Indicum ejusq; species ibid.  |
| Pater noster Lugd. 14   | Pes anferius Fuch. 119. affini Pandect. 110. cati 367 b.   | Phœnix carduus 379 b  | Pistacia ejusque species 401  |
| Pavane Indorum 431  | columbinus 318 b. corvi Brunf. 179 b. leoninus Ad. 264. leonis 319. milvi Angul. 336 b                       | Phœnix Galeni 508   | Pistana Magonis Plinij 104  |
| Pavana 395 b  | Petafitis ejusque species 197  | Photel 97 b   | bel. 194  |
| Pavate 399 b  | Petrocerasus 457   | Phthora Lob. 184  | Pistologia Fuchfij 143 b. Dodon. 307 b  |
| Pecten veneris Lob. 152   | Petromarula Belli 93   | Phytodonon 324  | Pitine Theoph. Ang. 345 b   |
| Pedicularis ejusq; species 163.   | Petroscotodon Gess. 75 b   | Phu ejusq; species 164  | Pitys ejusque species 419   |
| Cor. 324 b. ferida Trag. 185  | Petroselinum 153. syl. 163   | Picea ejusq; species 493. Dodon. 505  | Pityula ejusque species 291.  |
| Paderota Paulin. 247  | Petum Thever. 169  | Py. nocum Ang. 100. Diof. Cor. 167. Brunf. 155 b. Colum. 269 b. Creta. Lob. 379 b | major 291   |
| Pedua Guiland. 133  | Peuce ejusque species 491  | 155 b. Colum. 269 b. Creta. Lob. 379 b  | Pix 504. navalis ibid.  |
| Peganion Narbon. Ad. 336 b  | Peucedanum ejusque species 149 Lon. 158 b. aquaticum Tab. 141 b  | Pieris Lugd. 128  | Pixacantha Dod. 478   |
| Pelecinus Gess. 319   | Phacoides Orbasij 463 b  | Pigamum Lugd. 336   | Planta Bantania Clusij 259.   |
| Penobisou 512   | Phagus Græcorum 420  | Pigus Theoph. 456 b   | marina retiformis Clus. 366   |
| Pennachio marinus 366   | Phalangium Cord. 29  | Pila marina Cæf. 368 b  | b. sanguinem movens 512   |
| Penna marina Rondel 369 b   | Phalangium ejusque species ibid. Cretæ ibid.   | Pilotella ejusque species 162.  | Plantula peregr. Clus. 412  |
| Imper. 363  | Phalaris ejusque species 28.   | major 128 b. major Gallor. Thal. 129. minor Fuch. 263.                            | Plantago ejusque species 189.   |
| Pentaphyllum ejusq; species 325   | parva Cæf. pratensis Lob. 2. syl. 8 b  | siliquata Cam. 108 b. syl. Trag. 254  | albida Dodon. 190. marina Lobel. ibid. b  |
| Pentorobon Plinij 323   | Phallus Hollandicus 85. 374 b  | Trag. 254   | Plantago angustifolia ejusq; species 189 b. aquatica ejusque species 190  |
| Pepais 434 b  | Phana Bellon. 485  | Pimento del rubo 412 b  | Plantaginis similis Lugdun. ibid. b   |
| Pepitas del Peru 441  | Phaeolus vulgaris ejusq; species 339. Æthiopicus 340 b.  | Pimpinella ejusq; species 59.   | Plantaleonis D. d. gal. 185   |
| Peplos Quich 480 b  | Africanus Clus. 340. Præf. 119   | fol. Agrimonia 321 b. Romana Cæf. 161. sphenoc. 358 b                             | Plantula cardamines. amula 105  |
| Pephon Dod. 282   | lianus 341 b. Guinenfis ib. Nigritarum ibid.   | Clus. 358 b   | Plantaria Dod. 15   |
| Peplis ejusq; species 293   | Phaeolus Indicus ejusq; species ibid. peregrinus Clus. 338. 340. Belli 301. Peruanus 338 b. primus Trag. 342 | Pinas 384 b. 433 b  | Plantanus Diof. 421. aquatica 456 b. Ovied. 508. Lon. 431   |
| Peplus Lob. 291   | Phaeolus sativus Dod. 538. syl. Dod. ibid. b. syl. Lugd. 343. sylvarum Lugd. 351.                            | Pina radix 51 b   | b. Trag. 430  |
| Pepo ejusq; species 311. latus 312. Matth. 310  | Turcicus Cæf. 339  | Pindo 515 b   | Phurphylos 419  |
| Pepolina Cæf. 219   | Phatela Cæf. 339 b   | Pinea purgativa 492 b   | Plumbago Clus. 97 b. Plinij 401   |
| Percheper Lob. 152 b  | Phatela Romanus 432  | Pinguicula Gess. 245 b  | quorundam 101. Plinij 192   |
| Perdicium 121. Theoph. 130  | Phellodrys ejusq; species 423  | Pinoen 492 b  | Pneumonanthe Lob. 188 b   |
| Perebeceue 169  | Phaeolus sativus Dod. 538. syl. Dod. ibid. b. syl. Lugd. 343. sylvarum Lugd. 351.                            | Pimpinichi 434 b  | Podagraria Lob. 165   |
| Periclymenum ejusq; species 302   | Turcicus Cæf. 339  | Pinafter ejusque species 492  | Podifarina 158 b  |
| Periclymenum Allibrog 451   | Phatela Cæf. 339 b   | Austricus 491. Belli 492  | Poconia ejusq; species 323. flore pleno 324. Indica 343 b.  |
| b. rectum 451   | Phatela Romanus 432  | Pinus ejusq; species 491. maritima 492. tubulus Plinij 491 b. syl. Cæf. 490       | mafcula Lon. 222 b. Gale-ni 512   |
| Periplocaria ejusq; species 303.  | Phellodrys ejusq; species 423  | Piper 411. abortivum 412 b.   | Polemonium Tab. ibid. pe-trum Gess. 205. alt. Dod. 107. palustre 279 b  |
| prior Dodon. 294 b. altera Dod. 303. minor Lob. ibid.   | coccifera 425  | Æthiopicum ibid. caudatum ibid. longum ib. Martioli 411 b. rotundum 411           | Polemonium Montpel. 106. 398 b  |
| serpens Lob. ibid. b  | Phellandrium Dod. 161 b  | thiol. 411 b. rotundum 411  | Polyacantha Cord. 387. Theophrast.  |
| Peristrona Cratæ Ang. 150   | Philanthropus Plinij 324   | Piper Indicum ejusque species 102   |   |
| Perfoliata ejusq; species 277   | Phyllica Theoph. 476   | cies 102  |   |
| altera Lugd. 154 b. minor Gess. 112 b. napifolia Lob. ibid. filiquosa Lobel. ibid. syl. Brunf. 87 | Phyllura Guil. 416 b   | Piperis radix Diof. 50 b  |   |
|   | Phillyrea ejusq; species 476.  | Piperitis Brunf. 571  |   |
|   | Cast. 426 b. Dod. 475  | Pyracantha Lob. 454 b   |   |
|   | Phyllitis ejusque species 353.   | Pyramidalis Lugd. 93  |   |
|   | lacustris Cord. 193  |   |   |

|                                |        |                               |       |                               |                                 |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|
| phraft. Lugd.                  | 385 b  | Praefum Ang.                  | 230 b | Matthiol. 272. montana        | Ran. grumofa radice ejusque     |
| Polyauthemum Ang. 178. pa      |        | Priapera Gef.                 | 170 b | Lugd.                         | species 179. lanecolatus        |
| lufre Dod. gal.                | 180    | Primula veris ejusque species |       | Pteridion Cordi               | Tab. 180 b. lanuginofus         |
| Polycarpum Lugd.               | 281    | 141. Crf. 261 b. Brunf. 67    |       | Pteridion mafc. Cordi         | 181. latifol. Lugd. 309 b.      |
| Polycnemum Lugd.               | 229 b  | Præcocia                      | 442 b | Pucho Linfc.                  | longifolius 180 b. Lufita-      |
| Polygala ejusque species 215.  |        | Procure                       | 362   | Pulegium ejusque species 222. | nicus 181 b.                    |
| legumen ejusque species 349    |        | Proterpinaca Apul.            | 281   | aquaticum Eyft.               | Ran. montanus 180 b. ejusque    |
| Polygala Ang. ibid. b. Gefn.   |        | Prucella ejusque species 260  |       | montaoum Lon. 215. pe-        | species 181 b. nemorofus        |
| 350. Camer. 351. Cordi 353.    |        | Prunus ejusque species 442.   |       | træum Gefn. ibid. fyl. Do-    | 176 b. nemorum 177. 178.        |
| Lugd.                          | 350    | Myrobalanus 444. fylvest.     |       | don.                          | palustris 180. phragmitis       |
| Polygonatum ejusque species    |        | ibid. b                       |       | Pulicaris herba Lugd.         | 178. pratensis 178. laxatilis   |
| 303. Tiagi 204 b. 205          |        | Pruno fylv. affinis Canaden-  |       | Pulicaria Gazæ                | 182 b. tuberosus Dod. 179       |
| Polygonum ejusque species      |        | lis 521 b                     |       | Pulmonaria ejusque species    | Rapa ejusque species 89         |
| 281. bacciferum 15. cocci-     |        | Pruna infana 444              |       | 259. Gallica Lob. 129.        | Rapa braſica 111                |
| ferum Tab. ibid. femina        |        | Prunidaftyla 443              |       | Gefn. 322. minor Lugd.        | Raphanus ejusque species 96     |
| Matth. ibid. hederaceum        |        | Pseudoacorus cæruleus Tra-    |       | 258 b. Romana Crf. 258.       | aquaticus 97. major ibid.       |
| Colum. 295. marinum Ta-        |        | gi Lugd.                      | 32 b  | Vegetij Gefn.                 | ruſticanus 96 b. Lob. 97.       |
| bern.                          | 15 b   | Pseudoagnus Dod.              | 451   | Pulmonaria Matth.             | ſylv. Cord. 95. Lob. 97         |
| Polygonum mafculum fruti-      |        | Pseudoamomum Gef. 455 b       |       | Pulmo marinus Matth.          | Rapiftrum ejusque species 95.   |
| colum Thal. 284. quartum       |        | Pseudoapios Matth.            | 344 b | Pullatilla ejusque species    | aquaticum Tab. 97 b. fylv.      |
| Plinij Cluſ. 15 b. Plinij Da-  |        | Pseudoapocyon 307 b           |       | Pumex quercioner              | Ironis folio Col. 101 b         |
| lech.                          | 212 b  | Pseudoaphodelus Cluſ. 29 b    |       | Pummuckoner                   | Rapum Americanum 90.            |
| Polypodium ejusque species     |        | Pleudobunias Dod gal. 99      |       |                               | Brasiliæum ibid. geniftæ        |
| 359. Ilvenſe Lugd. ibid. b     |        | Pleudocapſicum Dod. 167       |       |                               | 87. ſylv. Matth. 90 b           |
| Polypodium matinum Im-         |        | Pleudochamæbuxus 471 b        |       |                               | Rapunculus ejusque species      |
| per.                           | 363 b  | Pleudochamædryx Gef. 249      |       |                               | 92. alopecuroides Cluſ. ib.     |
| Polypremom Lugd.               | 165 b  | Pleudocyperus Lob. 6. Thal.   |       |                               | corniculatus Col. ibid. b.      |
| Polyrrhizos Lugdun.            | 322 b. | ibid. b                       |       |                               | hortenſis Trag. 155. nemo-      |
| Plinij                         | 186    | Pleudocytisus Dod. 390        |       |                               | roſus 93. ſpicatus 92. um-      |
| Polyſpermon Lob.               | 118    | Pleudoclinopodium Matth.      |       |                               | bellatus Thal. ibid.            |
| Polytricha Bellon.             | 490 b  | 225                           |       |                               | Rapuntium umbellatum            |
| Polytrichum aureum ejusque     |        | Pleudocolocynthis Eyft. 314   |       |                               | Col. 287                        |
| species 356. Apuleij album     |        | Pleudocoronopus Dod. gal.     |       |                               | Rattiak 513 b                   |
| Lon 357 b. officinar.          | 356    | 190                           |       |                               | Regina prati Dod. 64 b          |
| Potium ejusque species 220.    |        | Pleudocofus Matth. 156 b      |       |                               | Reſeda ejusque species 160.     |
| Græcorum Col. 136 b. ma-       |        | Pleudocrania Cordi 447 b      |       |                               | lapidea ibid. b                 |
| ritimum 221                    |        | Pleudodiftamnus Matth. 222    |       |                               | Reſeda maritima 365 b           |
| Pomum Adami 437 b. para-       |        | Pleudoeleborus Matth. 186     |       |                               | Reſina ejusque species 500.     |
| dyſi 507 b. 508 b              |        | Pleudoeupatorium Dodon.       |       |                               | laricea ibid. b. ſicca 504 b    |
| Pomum amoris Lob. 167 b        |        | gal. 320                      |       |                               | Reſta bovis ejusque species 388 |
| Hiericotium Imper. 168         |        | Pleudoiris Dod. 34 b          |       |                               | Retula 366 b                    |
| ſpinofum ibid.                 |        | Pleudoleontopodium Mat-       |       |                               | Rha ejusque species 116         |
| Poncires 437 b                 |        | thiol. 263 b                  |       |                               | Rhabarbarum ibid. Indicum       |
| Pontica nux 418                |        | Pleudoliguftrum Dod. 451      |       |                               | 297 b. monachorum Tra-          |
| Populago Tab. 276 b            |        | Pleudolyſimachium Dodon.      |       |                               | gi 115 b                        |
| Populus ejusque species 429.   |        | 245 b                         |       |                               | Rhagadiolus Crf. 128            |
| albæ ſimiles Crf. 427          |        | Pleudolonchitis aſpera Mar-   |       |                               | Rhamnus ejusque species 477.    |
| Porti corallio affines 367     |        | thiol. 359 b                  |       |                               | tertius Dioſc. Lob. 454 b       |
| Portum ejusque species 71      |        | Pleudomelanrhium Matth.       |       |                               | Rhaponticum 116. 117.           |
| Portulaca ejusque species 288. |        | 204 b                         |       |                               | Rhaſut Lugd. 307 b              |
| aquatica 251 b. major 287.     |        | Pleudomelilotus Cam. 332.     |       |                               | Rhizotomos Plinij 33            |
| marina Dodon. 120. tertia      |        | Pleudomyagrum Matth. 109      |       |                               | Rhodacina 440                   |
| Brunf. 383                     |        | Pleudomyrtus Bellon. 469 b    |       |                               | Rhododaphne Crf. 464            |
| Portulaca arbor 460            |        | Pleudomoly Lugd. 211          |       |                               | Rhododendron Dioſc. 464.        |
| Potamogeton ejusque species    |        | Pleudonardus Matth. 216       |       |                               | alpinum Crf. 468 b              |
| 193. Caſtoris 141              |        | Pleudonarcifſus ejusque spec. |       |                               | Rhodora Plinij 163              |
| Potates 91                     |        | 52 b. gramineo folio 51 b     |       |                               | Rhumboctinus 431 b              |
| Potentilla herbariorum 321     |        | Pleudoorchis Cluſ. 84 b       |       |                               | Rhus ejusque species 414.       |
| prima Angu. 164. ſecunda       |        | Dod. 87                       |       |                               | coriariorum Crſalp. 429.        |
| Ang. 163 b                     |        | Pleudofycomorus Matth. 415    |       |                               | herba Plinij Cluſ. 414 b        |
| Poterium ejusque species 388   |        | Pleudofruthium Matth. 100     |       |                               | Rhus myrtifol. Plin. 471 b.     |
| Pothol Theveti 459             |        | Pleudorupetum 149 b           |       |                               | Plinij minor 470 b. Vir-        |
| Pothos Theophr. 203 b. cæ-     |        | Pſyllium ejusque species 191  |       |                               | ginianum 521 b                  |
| ruleus Lug. 301. Theoph.       |        | Pſipacia Belli 313 b          |       |                               | Ribes ejusque species 455.      |
| quorundam 295                  |        | Pſipheida Belli 325 b         |       |                               | ſerap. Crſalp. 454 b. Ca-       |
| Poutiou 246 b                  |        | Pſarmica Matth. 98. altera    |       |                               | mer. 455 b                      |
|                                |        |                               |       |                               | Rici-                           |

|                               |         |                                 |              |                                |                  |                                |                    |              |                 |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Ricinus ejusq; species        | 432.    | Sagapenum Geln.                 | 156.         | la-                            | Sargazo Lugd.    | 365                            | Scelopendria Trag. | 354.         | le-             |
| Americanus folio              | ficus   | 494 b                           | cryma        | 421                            | Sari Theophrast. | 19.                            | Indorum            | gummosa      | 349. major Lon. |
| 521 b                         |         |                                 | Sageramener  | 421                            | 246 b            |                                |                    | 359. vulgar. | 353             |
| Rima maria Ang.               | 110     | Sagitta ejusq; species          | 194          | Saleni                         | 99 b             | Scoparia                       |                    | 212          |                 |
| Ritro Theoph. Lob.            | 381 b   | Saga                            | 508          | Sallifica Itatorum             | 274 b            | Scopa regia                    | 98 b.              | Plinij Da-   |                 |
| Robur ejusque species         | 420     | Sahang                          | 411          | Sallafias                      | 431              | lech.                          | 132 b.             | 238          |                 |
| Robus                         | 21 b    | Salicaria Geln.                 | 245          | Sallifragia Indica             | ibid.            | Scordium ejusq; species        | 247.               |              |                 |
| Roccella Imper.               | 365 b.  | Salicistrum Plinij              | 297 b.       | Satyrum Cæfal.                 | 40 b.            | alterum Plinij                 | 238.               | major        |                 |
| Cardan.                       | 455     | Plinij Cæf.                     | 167          | cum 85. castratum 86. eri-     |                  | Plin. Geln.                    | 248                |              |                 |
| Rogga ejusq; species          | 23      | Salicornia                      | 289 b        | thronium 46. erythron.         |                  | Scordotis Plin. Beni           | 248 b              |              |                 |
| Rofa ejusque species          | 480.    | Saliunca                        | 165          | Lob.                           | 87               | Scorodonia Thal.               | 247 b              |              |                 |
| alpina Geln. 466 b.           | 468 b.  | Salix ejusque species           | 473.         | Satyrum mas 81 b.              | 82. ru-          | Scorodoprafum                  | 74                 |              |                 |
| Hiericonth. 484.              | Hieric. | merina Amat. 472 b.             | Mat-         | brum Lugdun. 87 a. b.          | pru-             | Scorpioides ejusq; species     | 287                |              |                 |
| Frago. 276. b.                | molcata | thiol. 475. Plinij 473.         | Helic-       | mum Brunf. 80. octavum         |                  | aquaticum Geln. 254.           | al-                |              |                 |
| 482. pomifera 484.            | Sper-   | ce Theophr. 474. marina         |              | Trag. 186 b. trifolium Do-     |                  | alum Geln. 253. legumino-      |                    |              |                 |
| monia Plin. 483. b.           | sub-    | Lugdun. 365 b.                  | Sabina Co-   | don. 45 b. Diof. 57. Fuch.     |                  | sa Lob.                        | 350 b              |              |                 |
| viridis                       | 482 b   | lumel.                          | 473 b        | 83. Lugd. 87 b. trifolium      |                  | Scorpius ejusque species       | 394.               |              |                 |
| Rofa fylv. ejusq; species     | 482     | Salix pumila ejusque species    |              | Matth.                         | 374 b            | maritimus                      | 15 b               |              |                 |
| Rofa Indica Geln. 132.        | Ju-     | 474 b                           |              | Satyrum utrunq; Matth.         | 85               | Scorzonera ejusq; species      | 275.               |              |                 |
| noois 76. matiana 203 b.      | 205     | Sallaparrilla                   | 295          | Satureia ejusque species       | 218.             | quarta Cluf.                   | 129                |              |                 |
|                               |         | Sallola Cæf.                    | 289          | lutea Lugd.                    | 234 b            | Scotinum                       | 415 b              |              |                 |
| Rofa græca Plinij             | 203 b   | Salvia ejusque species          | 237. a-      | Savina fylv. Tragi             | 360 b            | Scrophularia ejusque species   |                    |              |                 |
| Ros Libani                    | 497     | greffus Dod. 248. fylv. Cæf.    |              | Saxifraga tertia Matth. 149 b. |                  | 235. major Trag. 287. mi-      |                    |              |                 |
| Rofmarinum fylv.              | 415 b   | 236. Trag. 247 b. montana       |              | tertia Cæf. 153 b. tertia Co-  |                  | nor Brunf.                     | 309                |              |                 |
| Matth.                        | 467 b   | Gef.                            | 248          | lum. 251 b. Anglica 281. an-   |                  | Scutellaria                    | 231 b              |              |                 |
| Rofmarinus 217. ferulaceus    |         | Salvia vitæ Lob.                | 316 b        | tiqorum 211. aurea 309 b       |                  | Sebesten                       | 446                |              |                 |
| Ad. 158. Theoph. Ang. 157     |         | Sambac                          | 397. 398 b   | Saxifraga alba rotundifolia    |                  | Secacali Arabum Lugd. 155 b.   |                    |              |                 |
| Ros Solis ejusq; species      | 357     | Sambaya                         | 36 b         | 309. Fuch. 356. prima Mat-     |                  | Ang. 288 b. quorundam          |                    |              |                 |
| Roftrum porcium               | 116 b   | Sambataue                       | 393 b        | thiol. 218 b. magna Matth.     |                  | maie                           | 303                |              |                 |
| Rota                          | 18 b    | Sambucus ejusq; species         | 456          | 211. tertia Brunf. 258. al-    |                  | Secale ejusque species         | 23                 |              |                 |
| Rubella tinctorum             | 364 b   | Sainolus Plinij                 | 251 b. 471 b | tera Cæf.                      | 333 b            | Secalis mater                  | ibid. b            |              |                 |
| Rubeola ejusq; species        | 334 b   | Samparanton                     | 399 b        | Saxifraga montana Gef. 322     |                  | Secamone Alpin.                | 303                |              |                 |
| Rubea ejusque species         | 333     | Sampfachus ejusque species      |              | lutea Gefneri 336. lutea       |                  | Securidaca ejusq; species      | 348                |              |                 |
| marina Lob. 334. spicata      |         | 224                             |              | Fuch.                          | 331              | Sedum ejusque species          | 282.               |              |                 |
| ibid. Virginea ibid. b        |         | Sanamunda 278 b                 | 221. Cluf    | Saxifr. Pannonica 150. petra-  |                  | alpinum ejusq; species         | 284                |              |                 |
| Rubus ejusque species         | 479.    | 463 b                           |              | Pone 284 b. pimpinella 159.    |                  | Sedum aquatile 286 b. Mada-    |                    |              |                 |
| canis tur.                    | 483     | Sana fancla                     | 169          | Romanorum Lugd. 101.           |                  | galcaricum 283. palustre       |                    |              |                 |
| Rubus Idæus non spinolus      | 316     | Sandali fermen Cæf.             | 343          | rubra Tab. 163 b. Bunt. 166.   |                  | Cluf.                          | 205 b              |              |                 |
| Rucula marina Trag.           | 98      | Sandalida Cretica               | 332 b        | rubra Thal.                    | 356              | Sedum folijs laciniatis ejusq; |                    |              |                 |
| Rumex ejusque species         | 115     | Sandaraha Aristot.              | 500 b        | Scabiosa ejusque species       | 269.             | species 284 b. minus ejusq;    |                    |              |                 |
| Rufcus 470. fylv.             | 425 b   | Sandarax                        | ibid.        | alpina Lob. 270. arvensis      |                  | species 283. petrum Poo.       |                    |              |                 |
| Rufco affinis Cæf. 303 b      | 305     | Sanguen Cæf.                    | 447 b        | 269. capitulo globoso 270      |                  | 277 b                          |                    |              |                 |
| Ruta baccifera Tab.           | 398 b.  | Sanguinalis mas Cord.           | 281.         | b. folio fiffio Catalp. 269.   |                  | Sedum ferratum ejusq; spe-     |                    |              |                 |
| canina Lob.                   | 236 b   | fœmina Cord.                    | 16           | montana 270. ovilla 92 b.      |                  | cies                           | 285                |              |                 |
| Ruta capraria Tab.            | 352.    | Sanguinaria Trag.               | 8            | pratensis 269. prolifera 270   |                  | Seiffen                        | 473                |              |                 |
| lunaria Tab. 354 b. mu-       |         | Sanguisorba                     | 160          | Steilata                       | 271              | Sciago Plinij ejus species     | 360                |              |                 |
| rararia Dod.                  | 356 b   | Sanguis draconis herba          | 115.         | Scammonea ejusque species      |                  | b. Plinij Cæf. 284. quibus-    |                    |              |                 |
| Ruta ejusque species          | 336.    | officin                         | 499          | 294. minor Plinij Tab. 295     |                  | dam 485. Guil. 486. Lug-       |                    |              |                 |
| hypericoides                  | 280 b   | Sanícula alba Gef. 312. officin |              | b. parva Cam. 194 b. Patz-     |                  | dun.                           | ibid.              |              |                 |
| Ruta pratensis ejusque spe-   | 336.    | na 319. fœmina Fuch. 186        |              | vina                           | 295 b            | Selinum 153. montanum Clu-     |                    |              |                 |
| cies                          | 336.    | Sanícula alpina ejusq; species  |              | Scammoneum succus              | 295 b            | fiy                            | 150                |              |                 |
| Ruta fylv. Diof. 279 b. fylv. |         | 242                             |              | Scandix ejusque species        | 152.             | Selt-rays                      | 123                |              |                 |
| Cæf. 336. alt. Cæf. 337 b     |         | Sanícula rotundifolia ejusq;    |              | 153                            |                  | Simen Canariense 28. Coa-      |                    |              |                 |
| Ruthrum alterum Lugd. 381.    |         | species                         | 243 b        | Scatiola 125. fylv. Ang.       | 124              | giam 27. sanctum 139 b         |                    |              |                 |
|                               |         | Santalum ejusq; species         | 392.         | Scelerata Apuleij              | 180              | Sementina                      | 139 b              |              |                 |
|                               |         | cinericium 393. rubrum ib.      |              | Scheba Arabum                  | 139 b            | Sempevivum ejusque spe-        |                    |              |                 |
|                               |         | 136 b. 137                      |              | Scheona Græc.                  | 476              | cies 282. tertium Diofcor.     |                    |              |                 |
|                               |         | Santolina Dod.                  | 136 b.       | Schœnoprafum                   | 72 b             | Col.                           | 285 b              |              |                 |
|                               |         | Santonicum Cord.                | 136 b        | Schvvaden                      | 8                | Sempia                         | 366 b              |              |                 |
|                               |         | Sapinus Bellon.                 | 493          | Scilla ejusque species         | 73               | Sena Ruellij 396. vera         | 397                |              |                 |
|                               |         | Saponaria ejusq; species        | 206.         | Scirpus Trag. 7. Indicus 12.   |                  | Senerio ejusq; species         | 131                |              |                 |
|                               |         | de concava ibid. b. minor       |              | ibid.                          |                  | Senerio carduus Col.           | 130 b              |              |                 |
|                               |         | Lugd.                           | ibid.        | Sclarea Matth.                 | 258              | Sentis 479. canis              | 483                |              |                 |
|                               |         | Sapummenor                      | 421          | Scolymus ejusq; species        | 383.             | Serapias Diof. 81. batrachii-  |                    |              |                 |
|                               |         | Sarcocolla                      | 498          | Diof. Lugd. 384 b. Theoph.     |                  | tus 85 b. minus                | 86                 |              |                 |
|                               |         | Sarcophago                      | 97 b         | Cluf.                          | 384              | Serapium officin.              | 156                |              |                 |
|                               |         |                                 |              |                                |                  | Seti-                          |                    |              |                 |

S.

Sabdariffa

Sabina ejusq; species

Sabuciae

Sabanhpure

Saccharum alhusar

Mambu

Saccolaa

Sacquemimemor

Saffia Syrorum

# I N D E X.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Serica 446  | Dodon. 297   | Smilax laevis ejusq; spec. 294   | Spina Arabica Cæf. 382. Do-  |
| Sericum 416 b   | Sigillum Salomonis ejusque 186 b   | Smyrniun Matth. 154. Cord. 155. Fuch. 158 b  | don. 381 b. Lugd. 381. cer-  |
| Serifolia Frago. 435 b  | Species 303. Cæf. 186 b  | Soda Lob. 289. Cam. 316 b  | vina 478 b. Christi Cæfal.   |
| Seriphium Diof. Lob. 137 b.                                       | Silium Plinij Ang. 154. Cæf. 161. forte 162 b  | Sodouvaia 246 b  | 394. hirci 388   |
| German. Trag. 105 b   | Silene Theoph. Aldroa. 205 b   | Solaris herba Gazæ 253   | Spina appendix Plinij 454 b  |
| Seriola 125   | Siler montanum Lobel. 162.   | Sol Indianus Eon. 276 b  | Spina infectoria 478 b. Judai-   |
| Seris Diof. ib. longifolia 130                                    | officin. Ger. 161 b. Cretic- 162 b.  | Solanum ejusque species 166.   | ca 478. Larinorum 454 b.   |
| Ser montanum Cæf. 162 b   | um Cam. 162 b. pratense 162 b.   | bacciferum ibid. b. Mexio- 167   | Marruca 478 b. regia The-  |
| Serpentaria Fuch. 129. Brunf. 309. fœmina Fuch. 192.              | Dod. ibid.   | canum 168 b. spinosum 167  | ophraft. 387 b   |
| major Lugd. 194 b. minor 195 b                                    | Siler Plinij Cæf. 428 a. Lugd. 428 b. arbor Ang. 474   | b. 168. tuberosum 167  | Spina felinitis Theoph. Guil.  |
| Serpentina Dod. 190 b   | Silybum Lob. 381. Lugd. 382  | Solanum pomiferum ejusq; 167   | 385. foliitialis Lob. 387 b.   |
| Serpyllum ejusq; species 210.                                     | Siligo Lob. 21. Trag. 23. Tur- 22 b  | Species ibid. peregrinum 167   | foliit. altera 272   |
| hortense 219  | Silqua Theophr. Tragi 339  | Lac. 343. tetraphyllum Lo- 167.  | Spinachia 114 b  |
| Serpyllum acioarium 471 b   | Silqua arbor ejusque species 402. Indica 403   | bel. 167. triphyllum ibid.   | Spinastella Tab. 387 b   |
| Serratula 238   | Silquastrum Bellon. 402  | Soldanella ejusq; species 295  | Spin merlo Cast. 478 b   |
| Sertula campana Matth. 331  | Silquastrum ejusque species 102  | Solea equina Lugd. 349   | Spiræa Theophr. 475. Lugd. 429   |
| Sertolaria Imper. 364   | Silphion Diof. 156   | Solidago Brunf. 261. Ang. 268  | Spini vineta 454   |
| Sesamoides majus & minus 463 b                                    | Silphium fucus 499   | Sarracenia Lon. 235. alia 246.   | Split Cæf. 143   |
| Lugd. 463 b   | Symphycum ejusque species 259. petraeum Thalij 211.  | Trag. 246. tertia Tragi 266 b  | Spongia ejusque species 368.   |
| Sesamum verum 27. Tra. 109  | Lob. 260 b. tertium Ta- 268 b  | Soliflora Thal. 357  | in tofis 483   |
| Sesban Alpini 352   | Symphycum petraeum Ma- 280   | Sonchus ejusque species 123.   | Sponsa Solis Thal. 357   |
| Sesamoides magnum Lacun. 100. Lobel. 185. Salmanti- cum Cluf. 206 | thiol. 280   | artoreicens ibid. b. asper 124. laevis ibid. lanatus Da- 124 b                                 | Spuma maris Cæf. 368 b   |
| Sesamoides parvum 100 b.  | Symphycum maculosum e- 259   | Sonchus montanus ejusque species 124 b   | Squamata 88 b  |
| Cord. 186. Matthiol. 130 b.                                       | jusq; species 259  | Sonchus villosus ejusque spe- 124 b  | Squinanthum 11   |
| Diof. Lob. ibid.  | Symphonia Plinij 121 b   | cies ibid.   | Stachys ejusque species 236.   |
| Seseli ejusque species 151. æ- 277. Creticum 148. Massili- 162.   | Synanchica Lugd. 333 b. 334  | Sopha alpini 352   | spinola ibid. b. Ang. 216 b.   |
| thiopium Matth. 157. Cæf. 277. Creticum 148. Massili- 162.        | Sinapi ejusque species 99. a- 95. albū Lugd. 112. echinatum Lugd. 99 b. pumilum alpi- num Cluf. 105. sylv. Fuch. 100 b | Sopha chirurgorum 105 b  | Plinij 238 b   |
| Seseli palustre Cam. ibid. pe- 148.                               | Sinapi & Thlaspi media pro 109 b   | Sora potus 25 b  | Stacte 502   |
| Fuchij 150. Ang. 160. Mat- 161                                    | vincialis planta 109 b   | Sorbus ejusq; species 415. al- 454 b. aculeata 454 b. corminalis Gallor. 454. tormio. Lob. 454 | Staphylinus Trag. 151  |
| thiol. 161  | Sion Cratevæ 104 b. Fuchij 152 b. ejusq; species 154   | Sorghi 26 b  | Staphylodendrum Plin. 401 b  |
| Seutolomalache 115  | Syrinx Lob. 17 b   | Sparanium Dod. 12 b. ejus- 15. Ruell. 30.  | Staphis agria 324  |
| Seutololapathum ibid.   | Sisarum ejusque species 155  | que species 15. Ruell. 30. 69 b  | Staticæ Lugd. 211  |
| Seutolostaphylinum 118  | Peruanum Tab. 91 b   | Placæ 69 b   | Stelephurus Theoph. 4  |
| Sferro cavallo Gef. 349   | Sifer Matth. 151 b. palustre 163   | Spartium ejusq; species 396.   | Stelis viscum 505  |
| Sycamine Theoph. 459  | Sifon Diof. 154. Lon. 161  | Advers. 395  | Stella leguminosa Lob. 350 b   |
| Sycaminodes Theoph. 412   | Sifymbrium Matth. 228. car- 104. sylv. Cæfal. 397 b  | Spartum Plinij 5. apbyllon 394 b   | Stellaria Lugd. 251. aquatica 141 b. argentea Cam- 326 b. Brunf. 334. Mat- 320 |
| Siciliana 280 b   | Sifymbria mentha Lob. 227. 228.  | Spatha 506   | Sternutamentaria Lob. 98   |
| Sycomorus ejusque species 459. Italic. 415. Ruel. 430 b           | Sifyrinchium ejusque species 40. Cordi 71  | Spatula fœtida 30  | Styrax ejusq; species 452. la- 502. liquida ibid. b                            |
| Sida Theophr. 306 b   | Smilax aspera ejusq; species 295   | Speculum Veneris 215 b   | Stœbe ejusq; species 273. ca- 271. Salmantica 272.                             |
| Sideritis ejusque species 233.                                    | Smilax arbor Lugd. 245. Ca- 505 b  | Spelta Cæf. 21 b. Trag. 22   | Theoph. Lugd. 194 b  |
| prima Matth. 230. secunda 233 b. 233 b.                           | Smilax hortensis ejusque spe- 339  | Spergula ejusq; species 251  | Stœbe Diofcor. Bellon. 388 b   |
| Matthioli Lug. 232 b. 233 b.                                      | Smilax latissima Fuch. 98 b.   | Sphacelus Guil. 236. quorun- 238 b. sylvest. 247 b.  | Theoph. Cæf. 387   |
| tertia Matth. 132 b. 136. An- 319                                 | latissima Plinij Gefn. 129.  | Theoph. 237  | Stœchas Arabica 216. citrina 264   |
| guil. 319   | Monfpe. 230 b. pratensis 234 a. b  | Sphæritus 273 b  | Storax 502   |
| Sideritis secunda Diof. Col. 160 b. Cæfal. 236 b. tertia 319      | Sigillum Maris Cæfalp. 187.  | Sphægnus Plinij 422 b  | Stramonium 168   |
| Sideritis prima Thalij 136 b.                                     |  | Sphæculæ saponariæ 511   | Stratiotes 140. potamios Do- 286 b   |
| cærulea Thal. 246 b. Hera- 233. Fracast. 238. montana 233 b       |  | Sphondylium ejusque species 157  | don. gal. 286 b  |
| clea Diof. Col. 232 b. Cluf. 233. Fracast. 238. montana 233 b     |  | Spica celtica 165. Indica 13. 216  | Stratiotes Diof. Alpin. 362 b.   |
| Sideritis latissima Fuch. 98 b.                                   |  | Spicant vulgo 259  | Struthiopteris Cordi 359.  |
| latissima Plinij Gefn. 129.                                       |  | Spica nardus 216   | Thal. 358  |
| Monfpe. 230 b. pratensis 234 a. b                                 |  | Spina acaciæ Lob. 392. acida 454. alba Cæf. 382 b. Fuch. 381. Dalech. 386. Lob. 382.           | Suber ejusq; species 424   |
| Lugd. 234 a. b  |  | Lon. 478 b. Matth. 381   | Succisa ejusque species Mat- 381   |
| Sigillum Maris Cæfalp. 187.                                       |  |  | thiol.   |



|                                |                                |                                 |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| thiol. 269. tertia Trag. 127 b | Tertanaria Tab. 246 b          | Typha ejusq; species 20. Dio-   | 330 b. capitulo spumoso         |
| Succudus Avic. 216 b           | Terræ glandes Lob. 344 b       | scor. 4 b. cerealis Dod. gal.   | 329. cervinum 320 b             |
| Succus Cyrenais 499 b          | Testiculus canis 80 b. hirci-  | 21 b. Portæ 23                  | Trifolium cochleatum ejusq;     |
| Succi exotici 497 b. planta-   | nus 82 b. muscarius 83. vul-   | Tithium Theoph. 197             | species 329. cochleatum c.      |
| rum 493                        | pinus 82 b. 83                 | Tit Lincori 320 b               | chinatum ibid. b. cornicu-      |
| Sudar Serap. 477               | Tetragonia Theoph. 428         | Tithymalus ejusq; spec. 290     | latum Dod. 331. 332.            |
| Sultan Zambach 76              | Tetrabit Lob. 233              | amygdalus ibid. characias       | Trifolium falcatum Clus. 330    |
| Sumach 414                     | Tetrorchis 84 b                | ibid. cyparissus 291 b. den-    | fibrium Tab. 317. fragife-      |
| Suneg Ægypt. 145 b             | Teucrium ejusq; species 247.   | droides 290 b. helioscopius     | rum Clu. 329. globosum ib.      |
| Superba 209 b. 210             | alpinum 248 b. pratense        | 291 a. b. latifolius 291. lini- | Trifolium hepaticum ejusq;      |
| Suraban 296 b                  | Lob. 249 b. Trag. 246. 247     | folius 291. leptophyllus ib.    | species 330 b. maritimum        |
| Sura liquor 509                | Thalictrum ejusq; species 336  | b. lunato flore 290 b. ma-      | Cæsalp. 329                     |
| Surdæ nuxes 417.               | angustifolium Tab. 105 b       | ritimus 291. sylv. Lon. 307.    | Trifolium montanum ejusq;       |
|                                | Thamecnemon Cord. 204 b        | verrucosus Lugd. 291            | species 328. oculatum Ang.      |
|                                | Thapsia ejusque species 148.   | Tithymalus tuberosus ejusq;     | 331 b. odoratum Dod. 331.       |
|                                | 37 b. Asclepiadis Ang. 333     | species 292                     | Fuch. ibid. b.                  |
|                                | Thapsus barbatus 239           | Tocot Guebir 430                | Trifolium pratense ejusque      |
|                                | Theligono affinis Cæf. 309     | Tokaun 320 b                    | species 327. palustre Dod.      |
|                                | Theombrotum Plinij 121 b       | Tomates grana 103 b             | ibid. peltatum 329              |
|                                | Thilictrina Theoph. 447 b      | Tomonpate radix 37 b            | Trifolium spicatum ejusque      |
|                                | Thymelæa Ang. 462. Matth.      | Tomentum Cord. 263              | species 328 b. spinosum 330.    |
|                                | 463. Trag. 462. minor Cor-     | Tora Gef. 184                   | stellatum 329. vesicarium       |
|                                | di 463                         | Tordylion Cord. 148. Lob. 161   | 332 b                           |
|                                | Thuya 488. quarta Lugd. 487    | Tormentilla ejusq; spec. 326    | Trifolium fruticosum Dod. 398 b |
|                                | Thlaspidium cornutum Tra-      | Torna bona Cæf. 169 b           | Trinciarella Cam. 126 b         |
|                                | gi 110                         | Tota bona Lob. 115 b            | Trinitas Matth. 380 b           |
|                                | Thlaspi ejusque species 105.   | Toucon Brasileens. 360 b        | Trionum Theoph. 317 b           |
|                                | Alexandrinum 108 b. alter-     | Trachelium ejusq; species 94.   | Triorchis 83. lutea 84 b        |
|                                | rum Diofcor. 96 b. alterum     | giganteum 95. petreum           | Trifolium ejusq; species 267.   |
|                                | Cratæva 203. alpinum 107       | Ponæ 93 b. 94 b. thyrsoi-       | Diofcor. 149                    |
|                                | Thlaspi Alysson ejusq; species | des Clus. 254 b                 | Triffago Matth. 248             |
|                                | ibid. amarum 106. arvense      | Tragacætha 388. lacryma 498     | Triticospeltum 22               |
|                                | latis siliquis 105             | Tragium Gef. 15 b. Dod. 122     | Triticum ejusque species 21.    |
|                                | Thlaspi clypeatū ejusq; spe-   | b. Creticum Bellon. 280 b.      | amylæum 22. badrianum           |
|                                | cies 107 b. Creticum 106 b     | Diofcor. Col. 160. alterum      | 25. Indicum. ibid. maritimum    |
|                                | Thlaspi fatuum 108. hederac-   | Diof. Lugd. 216 b. Germa-       | Dod. 9. syl. Cæf. 10. tenu-     |
|                                | ceum Lob. ibid. b. incanum     | nicum Dod. gal. 119 b           | lentum Lob. 9                   |
|                                | Lob. 108 b                     | Tragum ejusque species 289.     | Triticum vaccinum Trag. 234     |
|                                | Thlaspi fruticosum ejusque     | vulgare Clus. 98. cereale       | Truxago 138 b. Col. 248 b. pa-  |
|                                | species 108. majus 97. mi-     | Trag. 22 b                      | lustris Ad. 247                 |
|                                | nus 105 b                      | Tragus Lob. 15 b. herba Cor-    | Trollius flos Gef. 182 b        |
|                                | Thlaspi montanum 105. 106 b    | di 283                          | Trombas 19                      |
|                                | Gef. 103. perfoliatum 106      | Tragopogon ejusque species      | Trumgibyn 497                   |
|                                | Thlaspi laxatile 107. spino-   | 274                             | Tsinavv radix 92                |
|                                | sum 108. vaccariz folio 105    | Tragorchis 82 b                 | Tubak & Tubacka 169             |
|                                | b. 106. villosum 106. Ve-      | Tragoriganum ejusq; species     | Tuba amoris Frag. 276 b         |
|                                | ronica folio 108 b             | 223. Clu. 234. northum Lug-     | Tuberaria major Lugd. 465       |
|                                | Thlaspi umbellatum ejusque     | dun. 255 b. prassoides 233.     | Tuber Plinij Cæf. 416. Cord.    |
|                                | species 106                    | Tragotelinum Tab. 159. 160      | 446 b                           |
|                                | Thymbra ejusq; species 218     | Tragotrophion Dod. gal. 27 b    | Tupha 441                       |
|                                | Thymus ejusque species 219.    | Tranichibil 497                 | Tubuli ad asthma 19             |
|                                | latifolium 220. nigrum         | Trali Matth. 14 b               | Tuero 148 b                     |
|                                | Taber. 219 b                   | Traupalus Theoph. 456           | Tulipa ejusque species 56. A-   |
|                                | Thymum magnum Alp. 223 b       | Trémula Latin. 429 b            | peninea 63 b. bulbifera 63.     |
|                                | Thýselinum Plinij Lob. 153 b   | Trec 499                        | dubia 61. flore pleno ibid.     |
|                                | Thiuracine Galeni 123 b        | Tribulus aquaticus 194. mu-     | folijs hyacinthi 60. min. 63    |
|                                | Thus terre 249                 | ner Clus. 193 b. marinus        | Tulipa præcox ejusq; species    |
|                                | Thus tot. Judææ rum 452 b      | Lugd. 288 b. sylv. Lon. 162     | 57. pumilio 63. ramosa 61       |
|                                | Thuris arbor 399               | b. terrestris Matthiol. 350.    | Tulipa serotina ejusq; species  |
|                                | Tianco fructus 407             | Lugd. 319. 330                  | 60 b. varij coloris 57 b. vi-   |
|                                | Tibcadi 43 b                   | Tribomanes ejusq; species       | ridis 61                        |
|                                | Tigridis flos Lob. 48 b        | 336                             | Tumatle Guil. 167 b             |
|                                | Tilia ejusq; species 426. mas  | Trifolium ejusq; species 329.   | Tunal 458                       |
|                                | Matth. 427                     | acetosum 330. alpinum Po-       | Tunica minima Lugd. 211 b       |
|                                | Tinctorius flos Tragi 267      | na 328. Americum 327 b.         | Tune ficifera Ad. 458           |
|                                | Tinurus 461                    | apfalites 327. aureum           | Tunne 457 b                     |



# I N D E X.

|                               |     |                                 |                                |       |                                    |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|
| Tulsi                         | 291 | supina Lob. 249. tetragona      | Septentrion.                   | 298   | W.                                 |
| Tussilago ejusq; species 197. |     | Colum. ibid. b                  | Vitis idæa ejusq; species 470. |       | W <sup>2</sup> effentiaut/Lon. 204 |
| alpina Clusf. ibid. b. altera |     | Verrucaria Gef. 130 b. Lug. 253 | tertia Clusf.                  | 452 b | Wape 184 b                         |
| Plinij 238. altera Matth. 276 |     | Vesicaria Cæfalp. 166. nigra    | Vitis Canadensis 521 b. precia |       | Wasservovr 113 b                   |
| Turata 184 b                  |     | Tragi 343                       | Plin. 455. Virginiana 521 b    |       | Wikonzovr 342 b                    |
| Turbit album Mesfucs Cæfal.   |     | Uhebebasou 512                  | Vitis vinifera 298             |       | Winauck 431                        |
| 142. nigrum 291               |     | Viburnum 429. Gallorū 300       | Viticella Cæf.                 | 300   | Wifanck five Vincetoxicum          |
| Turpetum ejusq; species 149   |     | Vicia ejusq; species 344. A.    | Vitriola Ad.                   | 121   | Indicum Ger. 303 b.                |
| Turris Lobel. five Turrita    |     | fricana 343. fefamacea Co-      | Viurna Lob.                    | 429   |                                    |
| Clusf. 112 b.                 |     | lum. 350. Tab. 344 b            | Ulex Plinij                    | 394 b | X.                                 |
| V.                            |     | Victoralis rotunda 41. longa    | Ulmaria 164 b. Clusf. ibid.    |       | X Abrai Rauvvolf. 293 b            |
| Vaccaria Tab. 112 b. Do-      |     | 74 b                            | Ulmus 426. atinia Lugd. 427.   |       | X Xagua Oviedi 434                 |
| don. 204 b                    |     | Vinca pervinca 301              | Ulmus 426. atinia Lugd. 427.   |       | Xanthium Lob. 198 b                |
| Vaccinia nigra Lob. 470       |     | Vincetoxicum Cæf. 187. 188.     | Uly Ang. 20 b. palustris In-   |       | Xyloaloes 393 b. fylv. 394 b       |
| Vaccinium Plinij Lugd. 451 b  |     | Indicum 303 b. vulgare 303      | dica 11 b                      |       | Xylobalsamum 400. 401              |
| Valeriana ejusq; species 164. |     | Vinciboscum 302 b               | Umbelliferae 146               |       | Xylocastia Lob. 409 b              |
| Græca Dod. ibid. b. rubra     |     | Vingum Gazæ 90                  | Umbilicus marinus Imper.       |       | Xylon 430                          |
| Dod. 165                      |     | Vinum de palma 507 b. 509       | 364. Mouspel. 367 b            |       | Xylostitium Dod. 451 a, b          |
| Vannanas 508 b                |     | Viola alba Theoph. 55. alpina   | Umbilicus veneris Aug. 283.    |       | Xiphion Tabern. 32 b. minus        |
| Valerianella Col. 165 b       |     | 199 b. agrestis Tragi 206.      | Matth. 285. Lon. 306 b         |       | Clusf. 41                          |
| Veelgutta Dod. 153 b          |     | aquatilis Dod. 141. arbore-     | Unedo 460                      |       | Xiquinas radix Indica 91 b         |
| Vella Galeni 104 b            |     | scens Matth. 199 b. barbata     | Unguentaria 137                |       | Xyris ejusque species 30.          |
| Veratrum nigrum 185           |     | Lugd. 208 b. 209 calathia-      | Ungula caballina Trag. 197     |       |                                    |
| Verbafeum ejusq; species 239  |     | na Gerard. 95 b. autumnna-      | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Y.                                 |
| digitale Costeo 243 b. ly-    |     | lis Gef. 188 b. calathiana      | Uture Gef. 309                 |       | Y Ga 513 b                         |
| chitis 239 b. Matth. 240.     |     | Plinij 241 b. canina 199        | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Yuca 90 b                          |
| 241. montanum Cord. 203       |     | Viola Damascena Lob. 202.       | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Yura palma 507                     |
| b. falvifolium 239. 240 b     |     | dentaria Dod. 322. flammae      | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Yuvera 513 b.                      |
| Verbafeulum ejusque species   |     | Fuch. 133. 207. humida 243 b    | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Z.                                 |
| 241. alpinum 242 b. Cya-      |     | hyemalis 202. lutea fylv. 109   | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Z Acintha Matth. 130               |
| noides 273. minim. Lugd.      |     | Viola lunatia ejusq; spec. 203  | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zaccon 444                         |
| 131. quorundam Lugd. 253.     |     | Viola maritima ejusq; spec. 199 | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zadura 36                          |
| Tragi 273                     |     | Viola matronalis ejusq; spe-    | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zagu 508                           |
| Verbena ejusq; species 269.   |     | cies 202. Fuch. 200. maria-     | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zarneb Rhafis 474 b                |
| mas Fuchf. 100. fœmina        |     | na Lob. 94. pentagonia Ta-      | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zarzaparilla 296                   |
| Trag. ibid. recta Diosf. 248  |     | ber. 215 b. Peruviana Tab.      | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zarrendi Alpin. 223 b              |
| b. recta Cordi 321. supina    |     | 168 b. petra Tab. 202 b         | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zea ejusq; species 21. dicoc-      |
| Trag. ib. genus alt. Cef. 239 |     | Viorna vulgi 300                | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | cos 22                             |
| Verbelina Gef. 321            |     | Viperaria Ger. 275              | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zedoaria ejusque species 35        |
| Verdemarcum Cæf. 336 b        |     | Virga aurea ejusque species     | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zenigole 474                       |
| Verengena 167 b               |     | 276. regia Cæf. 243 b. 244      | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zenfelacht 415 b                   |
| Veretrum Lugd. 422            |     | Virga aurea Mexiocana 521.      | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zeocryton 22 b                     |
| Vermicularis 283. infipida    |     | sanguinea Plin. 447 b           | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zeopyrum Dod. ibid.                |
| Thal. 284                     |     | Vifa semen 293 b                | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zerumbeth 36                       |
| Vermiculata mont. Col. 281 b  |     | Vifcago Cæf. 206                | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zibeba 299                         |
| Vermicularia arborefcens Cæ-  |     | Vifcaria Tab. 205 b. 206        | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zygia Theoph. Ad. 431              |
| falpin. 284                   |     | Vifcum arborum 423. artifi-     | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zingiber ejusque species 35        |
| Vermiculatus frutex Lugd.     |     | cialc 425 b                     | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zizania 9                          |
| ibid. 284                     |     | Vifnaga Matth. 151              | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zizyphus ejusq; species 446.       |
| Vernix 500 b                  |     | Vitalis major Cord. 283         | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | alba Colum. Bellon. 472 b.         |
| Veronica ejusq; species 246.  |     | Vitalba Dod. 300                | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | candida I. ob. 416. Cappa-         |
| fœmina Matth. 252. petra      |     | Vitex 475                       | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | docia Plinij 472 b. 473            |
| ponæ 248 b. recta cærulea     |     | Vitis alba 297. nigra 300. Mar- | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zoophyta 368                       |
| Eyft. 246. fepillifolia 247 b |     | thiol. 297. fylv. Matth. 167.   | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zopiffa 504                        |
|                               |     | Trag. 300. fylv. Diosf. 297.    | Ungulium Dod. 304. palu-       |       | Zurumbeth Serapion. 474 b.         |

F I N I S.



# E R R A T A.

Pagina 2. lin. 3. Thab, lege Tab. p. 8. l. 37. SORGHINUM. p. 12. b. l. 36. altera. p. 17. l. 7. Plutarcho. p. 19. b. l. 9. Acorum. p. 21. a. l. 14. Tragus, live Olyra. p. 23. b. l. 23. hist. 7. p. 25. a. l. 39. Triticum. p. 36. l. 28. Actuarii. p. 37. a. l. 25. Costæus. p. 46. a. l. 39. Gallacia. p. 48. b. l. 1. eriophorus. p. 71. b. l. 9. lutei. p. 78. a. l. 18. punctatum. p. 93. b. l. 22. Rapunculus. p. 106. a. l. 4. Cratæx. p. 113. l. 29. LAPATHUM. p. 114. a. l. 3. lapathum. p. 119. l. 4. aureum. p. 146. a. l. 42. notat. p. 150. l. 1. staphylino. p. 169. b. l. 42. quia. p. 191. l. 6. Coronopo. p. 193. a. l. 43. primæ. p. 216. b. l. 18. ferratæ. p. 218. b. l. 1. conferta. p. 220. l. 33. Πόλιον. p. 222. b. l. 45. hirci. p. 237. b. l. 28. legimus. p. 251. a. l. 41. delectui. p. 288. a. l. 23. Κεῖδμον. p. 295. a. l. 5. Orobanche. p. 305. b. l. 26. huic. p. 306. l. 4. Chamæclema. p. 330. a. l. 25. cornuta. p. 334. b. l. 10. laxatilis. p. 344. l. 37. legumen. p. 369. l. 5. pungat. p. 372. b. l. 24. salignus. p. 395. l. 38. in carne. p. 421. b. l. 17. radices. p. 431. l. ultim. gracilium. gravidarumque. p. 446. l. 13. cœpere. p. 473. l. 14. vinearum. pag. 489. l. 41. Orminum. Hujus. Hæc sunt, Lector benevole, sphalmata, quæ sensum turbare possint. Leviora facile condonabis.





0.4.0



